

Profesionální degustace vína

Metodika hodnocení, kalibrace panelu a popisná terminologie



1. Senzorická fyziologie: čich, chuť, trigeminální vjemy a adaptace




Schéma 1 ke kapitole: Senzorická fyziologie: čich, chuť, trigeminální vjemy a adaptace

Interakce taninů se slinami a vznik astringence




Schéma 2 ke kapitole: Senzorická fyziologie: čich, chuť, trigeminální vjemy a adaptace

Senzorická fyziologie je pro profesionální degustaci vína klíčová, protože popis vůně a chuti není jen otázkou slovní zásoby, ale odrazem toho, jak čichový, chuťový a trigeminální systém převádějí chemické podněty na vjemy a jak se tyto vjemy v čase mění vlivem adaptace. V evropském kontextu, kde se běžně porovnávají vína napříč apelacemi, ročníky a technologiemi (nerez vs. sud, batonáž, malolaktická fermentace, různé úrovně redukce/oxidace), je porozumění fyziologii nezbytné pro konzistentní hodnocení.

Čich u vína funguje dvěma cestami: ortonazálně (při přivonění nad sklenicí) a retronazálně (během ochutnání, kdy se těkavé látky uvolňují z ústní dutiny a prouděním vzduchu procházejí do nosohltanu). Obě cesty aktivují stejné čichové receptory v čichovém epitelu, ale vjem se může lišit v důsledku jiné dynamiky uvolňování aromat a současného působení chuti a trigeminálních podnětů. Čichové receptory jsou GPCR proteiny s širokou selektivitou; jedna molekula může aktivovat více receptorů a jeden receptor reaguje na více molekul. Mozek vyhodnocuje „vzorec aktivace“ jako konkrétní aroma. To vysvětluje, proč se komplexní

buket vína skládá z překrývajících se signálů, které se mohou při změně teploty, aeraci či sklenici přeskupit.

V praxi degustace ovlivňují čich: teplota vína (vyšší zvyšuje těkavost a intenzitu, ale může zvýraznit alkohol), povrchová plocha ve sklenici, doba po nalití a míra víření. V evropské profesionální praxi (např. soutěže, panelové hodnocení, školení sommeliérů) se proto standardizují sklenice a teploty servisu. Důležité je i složení matrice vína: ethanol zvyšuje rozpustnost mnoha aromat v kapalině, ale zároveň usnadňuje jejich uvolnění do hlavy nad sklenicí; oxid uhličitý u šumivých vín přenáší aroma do nosu, ale současně trigeminálně „štípe“ a může maskovat jemné tóny. Fenomén prahů vnímání je zásadní: některé látky mají extrémně nízký práh (např. TCA u korkové vady, některé thioly u aromatických bílých vín), jiné potřebují vyšší koncentrace. Navíc existují individuální rozdíly v receptorové výbavě a citlivosti, proto se v panelu pracuje s kalibrací a referencemi.

Chuť je tradičně popisována pěti základními kvalitami: sladká, kyselá, slaná, hořká a umami. U vína jsou nejdůležitější sladkost (zbytkový cukr, glycerol má spíše vliv na vnímané tělo), kyselost (především vinná, jablečná a mléčná), hořkost (často z fenolů, někdy z vyššího alkoholu či extrakce) a umami/“savory” vjem (může být patrný u zralých vín, vín na kalech, případně u některých fortifikovaných či oxidativně vyžrávaných stylů). Slanost se objevuje spíše jako komplexní minerální asociace než jako čistá chuť NaCl, ale v pobřežních terroirech či u vín s vyšší mineralitou může degustátor popisovat „slané“ zakončení; fyziologicky jde často o kombinaci iontů, kyselosti a aromatu.

Interakce chutí ve víně jsou výrazné: sladkost potlačuje vnímanou kyselost a hořkost; kyselost naopak zvyšuje svěžest, ale ve vysoké úrovni může zvýraznit trpkost. Ethanol posiluje vnímané teplo a plnost a může zvyšovat hořkost. Oxidace a zrání v sudu mohou přinést vjemy vanilinu, toastu a koření, které jsou primárně čichové, ale mění očekávání a tím i percepci chuti. Malolaktická fermentace snižuje ostrost jablečné kyseliny a přidává diacetyl (máslové aroma), což může posunout hodnocení rovnováhy i u stejného zbytkového cukru.

Trigeminální vjemy (chemestézie) jsou v degustaci vína stejně důležité jako čich a chuť, ale často jsou podceňované. Trigeminální nerv reaguje na dráždivé, tepelné a mechanické podněty. Ve víně zahrnuje pálivost a hřejivost ethanolu, chladihost některých těkavých látek (např. eukalyptolové asociace), štiplavost CO₂ u perlivých a šumivých vín, a svíravost tříslovin (astringence). Astringence není chuť v užším smyslu; vzniká srážením a interakcí polyfenolů (taninů) se slinnými proteiny, čímž klesá lubrikace a roste tření na sliznici. Proto se popisuje jako „vysušující“, „drsná“, „prašná“ či „sametová“ podle velikosti polymerů, míry extrakce, zrání v sudu a přítomnosti polysacharidů ze slupky či kvasinek.

Technologie výroby přímo moduluje trigeminální profil: delší macerace a intenzivní pump-over nebo délestage zvyšují extrakci fenolů a potenciální svíravost; zrání v dubu může taniny polymerovat a zakulatit, současně přidat ellagitanniny. U bílých vín práce na kalech a batonáž zvyšují obsah mannoproteinů, které mohou astringenci zjemnit a zvýšit vnímané tělo. U šumivých vín tradiční metodou autolýza kvasinek přidává krémovitost a může „obalit“ kyselinu i CO₂ štiplavost.

Adaptace je fyziologický pokles citlivosti při trvalé stimulaci. U čichu bývá adaptace rychlá: při dlouhém přivonění intenzita vjemu klesá během desítek sekund. V degustaci to vysvětluje, proč se doporučuje krátké, opakované přivonění a střídání vzorků s pauzou. U chuti a trigeminálních vjemů existuje jak periferní adaptace (na receptorech a sliznici), tak centrální habituace v mozku. Degustátor si může „zvyknout“ na vysokou kyselost nebo taniny v sérii vzorků, a následně podcenit jejich intenzitu. Významná je také křížová adaptace: po sladkém vzorku se suché víno jeví kyselejší a trpčí; po velmi tříslovitém červeném víně může

další vzorek působit měkčeji, i když má objektivně podobnou fenolickou strukturu.

V praxi profesionální degustace se proto používají postupy ke snížení zkreslení adaptací: pevné pořadí (od lehčích k plnějším, od suchých k sladším, od mladých k vyzrálším), vyplachování úst vodou, neutralizační sousta (neochucené pečivo), a časové rozestupy. U hodnocení českých a středoevropských bílých vín s vyšší kyselinou (např. Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené) je vhodné nepřecházet příliš rychle k výrazně sladkým výběrům z hroznů, protože sladkost následně výrazně změní vnímání kyselosti u dalších suchých vzorků. U červených vín s vyšší tříslovinou (např. Cabernet Sauvignon, Frankovka při tvrdší extrakci) je vhodné řadit vína podle fenolické intenzity a používat delší pauzy.

Z hlediska chemie vína je důležitý rozdíl mezi intenzitou a kvalitou vjemu. Intenzitu určuje koncentrace těkavých látek a jejich prahy, ale kvalitu ovlivňuje také poměr složek a jejich interakce. Esterová ovocnost mladých vín (např. isoamyl acetát, ethyl hexanoát) může být výrazná, ale rychle podléhá adaptaci; naopak komplexní terciární aroma vyzrávání (oxidativní oříškové tóny, medové a petrolejové nuance u ryzlinků, koření a tabák u sudových červených) se může rozvíjet v čase a lépe odolávat habituaci díky proměnlivému „profilu“ stimulace. Reduktivní tóny (sirné sloučeniny) mohou trigeminálně dráždit a současně maskovat jemné aromatické vrstvy; krátká aerace nebo přelití do karafy může změnit čichový obraz během minut.

Praktická dovednost degustátora spočívá v oddělování modalit: nejprve hodnotit ortonazální profil, poté při malém doušku vyhodnotit strukturu (kyselina, sladkost, hořkost, alkoholové teplo, svíravost), a nakonec retronazální aroma a délku dochuti. Vnímaná „délka“ je kombinací perzistence aromat v retronazálním prostoru a trigeminálního doznívání (teplo, svíravost, CO₂). Při popisu je vhodné uvádět, co je primárně čichové (ovoce, květy, koření), co chuťové (sladkost, kyselost) a co trigeminální (pálení, svíravost, perlení). Takový rozklad je zvláště užitečný při technologických závěrech: například zvýšená svíravost a hrubá struktura ukazuje na extrakci a nezralé fenoly, zatímco výrazné alkoholové teplo může souviset s pozdní sklizní nebo vyšším cukrem v moštu.

Nakonec je třeba počítat s individuální variabilitou a stavem degustátora: únava, nachlazení, kouření, parfém, zbytky mentolu či kávy výrazně mění čich i trigeminální citlivost. Standardem profesionální praxe je čisté prostředí, kontrola rušivých pachů a pravidelný trénink na referenčních standardech (např. typické aromatické sloučeniny pro odrůdy běžné v Evropě, vady jako TCA, těkává kyselina, reduktivní sirné tóny). Pochopení fyziologie čichu, chuti, trigeminu a adaptace umožňuje nejen přesnější popis, ale i spravedlivější hodnocení vín napříč styly, regiony a technologiemi výroby.

Tabulkové shrnutí:

Praktické mapování podnětů ve víně na senzorické modalitě a technologické příčiny

Senzorický vjem | Primární modalita | Typické sloučeniny/zdroje | Degustační poznámka | Časté technologické souvislosti

Máslový tón | Čich (retronazální) | Diacetyl | Vnímat po zakroužení a v dochuti | Malolaktická fermentace, práce na kalech


Svíravost, sucho | Trigeminus | Kondenzované taniny, ellagitanniny | Hodnotit strukturu po polknutí/odplivnutí | Macerace, extrakce, zrání v sudu, polyme

Pálivost, hřejivost | Trigeminus | Ethanol | Odlišit od kořenitosti aroma | Vyšší cukernatost hroznů, doslazení,

vyš

Svěžest, říz | Chuť | Vinná/jablečná kyselina | Posuzovat spolu se sladkostí a CO₂ | Chladnější ročník, dřívější sklizeň, pot

Petrolejová nuance | Čich | TDN | Často výraznější při zrání | Zrání ryzlinku, teplé ročníky, delší lah



Praktické mapování podnětů ve víně na senzorické modality a technologické příčiny

Senzorický vjem	Primární modalita	Typické sloučeniny/zdroje	Degustační poznámky	Časté technologické souvislosti
Máslový tón	Čich (retronazální)	Diacetyl	Vnímat po zakroužení a v	Malolaktická fermentace, práce na
Svíravost, sucho	Trigeminus	Kondenzované taniny, ella	Hodnotit strukturu po polkn	Macerace, extrakce, zrání v sudu
Pálivost, hřejivost	Trigeminus	Ethanol	Odlišit od kořenitosti arom	Vyšší cukernatost hroznů, doslaze
Svěžest, říz	Chuť	Vinná/jablečná kyselina	Posuzovat spolu se sladko	Chladnější ročník, dřívější sklizeň
Petrolejová nuance	Čich	TDN	Často výraznější při zrání	Zrání ryzlinku, teplé ročníky, delší
Štiplavé perlení	Trigeminus	CO ₂	Krátce držet v ústech pro	Druhotné kvašení, tlak v láhvi, se

2. Příprava degustace: sklo, teplota, osvětlení, pořadí vzorků

Příprava degustace ve vinařské komisi




Schéma 1 ke kapitole: Příprava degustace: sklo, teplota, osvětlení, pořadí vzorků

Typy sklenic

Aromatická zóna



Tulipán

Široká mísa

Teplotní pásma




Schéma 2 ke kapitole: Příprava degustace: sklo, teplota, osvětlení, pořadí vzorků

Příprava degustace je v profesionálním prostředí samostatná disciplína. O výsledku nerozhoduje jen zkušenost degustátora, ale i míra kontroly nad proměnnými, které ovlivňují volatilizaci aromat, vnímání kyselin a tříslovin, optické posouzení barvy i koncentraci vad v nose. V české a evropské praxi se vychází z metodik OIV, národních soutěžních řádů a interních standardů vinařství; cílem je reprodukovatelnost a minimalizace rušivých vlivů. Klíčové oblasti jsou volba skla, teplota podávání a stabilita vzorku, osvětlení a pozadí, a správné pořadí vzorků v rámci flightů.

Sklo je měřicí nástroj. Jeho geometrie určuje, jak se víno provzdušní, jak se nad hladinou vytvoří aromatická vrstva a jak se těkavé látky (estery, terpeny, vyšší alkoholy, thioly) směřují k nosu. V evropské praxi je rozšířené univerzální degustační sklo typu ISO 3591, případně varianty se širší „boulí“ a mírně zúženým hrdlem pro koncentrovanější aromatický vjem. Důležité je, aby sklo bylo bezbarvé, tenkostěnné a s hladkým okrajem; dekor, reliéfy a silné sklo zkreslují barvu, zvyšují tepelnou setrvačnost a ruší kontakt s rty. Pro

šumivá vína se v odborné degustaci často preferuje tulipánový tvar před úzkou flétnou: umožní zachytit aromatu sekundárního kvašení (autolýza, brioškové tóny) a zároveň udrží perlení. Naopak pro výrazně aromatická bílá a některá oranžová vína může být výhodnější sklo s větším objemem kalichu, které podpoří oxidativní rozvinutí. V rámci jedné komise však musí být sklo jednotné, jinak se mění intenzita vůní a percepce těla napříč vzorky.

Čistota skla je často podceňovaná. Zbytky saponátů, oplachových prostředků, chlóru nebo parfemace z leštidel se projevují jako falešné tóny (mýdlo, citrusový detergent) a mohou maskovat jemné reduktivní nuance. Sklo se má mýt bez parfemovaných prostředků, důkladně oplachovat a ideálně sušit bez kontaktu s textilií, která může přenést pachy. Pokud se leští, používají se neutrální mikrovláknové utěrky vyhrazené jen na sklo. Před naléváním se provádí rychlá kontrola proti světlu: zákal, mapy, otisky a zbytky vody jsou důvodem k výměně. Z praxe soutěží v EU vyplývá, že i drobný film na skle může snížit viditelnost „slz“ a ztížit posouzení viskozity, byť ta sama o sobě není přímým ukazatelem kvality.

Objem nalévky musí být standardizovaný, typicky 30–50 ml. Příliš malé množství brání roztočení a uvolnění aromatu, příliš velké zmenší headspace a zvyšuje tepelné ohřívání od ruky. Sklo se drží za stopku; ohřev je kritický zejména u bílých a šumivých vín, kde i 2–3 °C rozdílu během několika minut může změnit vnímání kyselin a zvýraznit alkohol. U červených vín je naopak mírné oteplení v nose žádoucí, ale musí být řízené.

Teplota podávání je nejdůležitější „neviditelný“ parametr. Ovlivňuje Henryho zákon pro uvolňování plynů, volatilitu aromatu i rozpustnost CO₂. Příliš nízká teplota potlačí vůni a zvýrazní vjem kyselosti a tříslovin; příliš vysoká zvýrazní alkohol, sníží dojem svěžesti a zrychlí oxidaci v poháru. V české praxi se často pracuje s orientačními pásmy: šumivá 6–10 °C, lehká bílá 8–12 °C, komplexní bílá a růžová 10–13 °C, červená středně plná 14–17 °C a plná 16–18 °C. Pro degustaci je vhodné držet se spíše středu až spodní hranice, protože vzorek v průběhu posuzování oteplí. U sladkých vín se nižší teplota (8–10 °C) používá ke zvýraznění kyselin a potlačení lepkavé sladkosti; u fortifikovaných se naopak hlídá, aby alkohol nepřebíjel aromatu.

Neméně důležitá je stabilita teploty během flightu. Vzorky by měly být temperovány v identických podmínkách, ideálně ve vinotéce nebo termoboxu, a přenášeny v izolaci. U profesionálních panelů se používají teploměry s rychlou odezvou a kontrola teploty se provádí na referenční lahvi z flightu. U šumivých se sleduje i tlakový efekt: teplejší vzorek rychleji uvolňuje CO₂, perlení je hrubší a aromatika může působit „štekavě“; u příliš studeného naopak klesá volatilita a v nose zůstává hlavně kysličník uhličitý.

Osvětlení a vizuální prostředí mají přímý vliv na hodnocení barvy, jasů, čirosti a případných vad (zákal, bílkovinné srážení, krystaly vinného kamene). Standardem je neutrální bílé světlo bez barevného posunu, ideálně v rozsahu 4000–5500 K, s vysokým indexem podání barev (CRI alespoň 90). Nízký CRI zplošťuje odstíny, takže mladý veltlín může vypadat šeději a pinot noir hnědnout dřívě, než odpovídá realitě. Světlo má být rovnoměrné, bez ostrých stínů a bez přímého oslnění; hodnocení se provádí nad bílým nebo velmi světlým pozadím. V soutěžním režimu se používají bílé degustační podložky a někdy i černý pruh pro posouzení okraje (meniskus) a intenzity barvy. Pro aromatické hodnocení je kritické, aby v místnosti nebyly pachy: čisticí prostředky, káva, parfémy, kuchyňské výpary či čerstvě natřený nábytek. V evropských komisích se proto zavádí „bezparfémová“ pravidla, větrání před degustací a zákaz aromatických svíček.

Pořadí vzorků je základní nástroj proti senzorické únavě a křížovým efektům. Cílem je postupovat od jemných k robustním, od sušších k sladším, od méně aromatických k intenzivně aromatickým, od nižšího alkoholu k vyššímu, a od nižšího tříslovinového zatížení k vyššímu. V českém a středoevropském kontextu to

typicky znamená začít šumivými (pokud jsou součástí), pokračovat lehkými bílými s vyšší kyselinou (např. ryzlink vlašský, veltlínské zelené), poté aromatictějšími (muškát moravský, tramín) a dřevem školenými či zralými bílými, následně růžovými, lehčími červenými (frankovka v mladé podobě, pinot noir), poté středně plnými (svatovavřínecké, merlot) a nakonec tříslovitějšími a extraktivními (cabernet sauvignon, barolo, tannat) či víny s výrazným novým sudem. Sladká vína a botrytické výběry se řadí na konec, protože reziduální cukr a glycerol výrazně mění vnímání kyselin a zanechávají dlouhý dojezd. Fortifikovaná, velmi oxidativní (sherry, madeira) nebo výrazně naturová/oxidativní oranžová vína je vhodné oddělit do samostatného flightu.

Zvláštní pozornost vyžadují vína s potenciálními vadami nebo technologickými odchylkami. Redukce (H_2S , merkaptany) může být v prvních minutách výrazná, ale po provzdušnění klesá; naopak těkává kyselina (ethylacetát) a některé „Brett“ fenoly se mohou v průběhu času zvýraznit. Proto je dobré u flightu nastavit jednotný čas od nalití k hodnocení (např. 2–3 minuty) a u komplexních červených počítat s krátkým časem na rozvinutí. U šumivých je důležité hodnotit relativně brzy, protože perlení a pěna se rychle mění.

Praktická organizace zahrnuje kódování vzorků, kontrolu uzávěrů a správnou manipulaci s lahvemi. V evropské praxi se používají anonymní tříciferné kódy a nalévání mimo zorné pole degustátorů, aby se minimalizoval vliv očekávání. U korkových uzávěrů je potřeba kontrola TCA (zatuchlina) a u šroubů zase riziko výrazné redukce. Každý vzorek má mít dostatečný objem pro případné přelévání do nového skla při podezření na kontaminaci. Voda by měla být neperlivá, neutrální, ideálně s nižší mineralitou; perlivá zvyšuje vjem kyselosti a může zkreslit třísloviny. Pro neutralizaci se používá bílé pečivo bez výrazné soli a bez aromat (žádné kmínové či sladové). Teplota místnosti se drží přibližně 20–22 °C, protože příliš chladno zhoršuje volatilitu a příliš teplo urychluje únavu.

Dobře připravená degustace vytváří podmínky, kde se projeví terroir a technologie výroby místo náhodných vlivů. U ryzlinků z Moravy či z Mosely se pak dá srovnávat kyselinová struktura bez zkreslení teplotou; u burgundských pinotů nebo frankovek se posoudí práce s dřevem a fenolická zralost bez rušivé aromatiky z prostředí. Při dodržení standardu skla, teploty, světla a pořadí vzorků se z degustace stává profesionální analytický nástroj, který je použitelný pro školení, nákup, kontrolu šarží i komunikaci stylu vína směrem k trhu.

Tabulkové shrnutí:

Doporučené podmínky pro profesionální degustaci podle typu vína

Typ vína | Sklo | Teplota (°C) | Osvětlení/pozadí | Poznámka k pořadí

Šumivé (tradiční metoda) | tulipán | 7–10 | bílé pozadí, CRI≥90 | na začátek flightu


Bílé lehké (redukční) | ISO univerzál | 8–11 | neutrální 4500–5500 K | před aromatickými

Bílé komplexní (sud, sur lie) | větší kalich | 11–13 | bílé pozadí, bez oslnění | po lehkých bílých

Růžové | ISO univerzál | 10–12 | neutrální světlo | mezi bílými a červenými

Červené středně plné | univerzál větší | 15–17 | bílé pozadí + černý pruh | před tříslovitými

Vliv teploty podávání na vnímanou aromatickou intenzitu (panelové skóre)



Doporučené podmínky pro profesionální degustaci podle typu vína

Typ vína	Sklo	Teplota (°C)	Osvětlení/pozadí	Poznámka k pořadí
Šumivé (tradiční metoda)	tulipán	7–10	bílé pozadí, CRI≥90	na začátek flightu
Bílé lehké (redukční)	ISO univerzál	8–11	neutrální 4500–5500 K	před aromatickými
Bílé komplexní (sud, sur lie)	větší kalich	11–13	bílé pozadí, bez oslnění	po lehkých bílých
Růžové	ISO univerzál	10–12	neutrální světlo	mezi bílými a červenými
Červené středně plné	univerzál větší	15–17	bílé pozadí + černý pruh	před tříslovitými
Sladké/botrytické	menší kalich	8–10	neutrální světlo	na konec degustace

3. Metodiky hodnocení: 100bodová škála, OIV, popisná analýza




Schéma 1 ke kapitole: Metodiky hodnocení: 100bodová škála, OIV, popisná analýza




Schéma 2 ke kapitole: Metodiky hodnocení: 100bodová škála, OIV, popisná analýza

Metodiky hodnocení vína se v profesionální praxi používají ze dvou hlavních důvodů: pro srovnatelné třídění vzorků (soutěže, nákupní komise, školení) a pro popis stylu a technologického profilu (vinařská kontrola, enologické poradenství, komunikace směrem k trhu). V evropském prostředí se nejčastěji setkáme se třemi přístupy, které se mohou kombinovat: 100bodová škála, systém OIV pro soutěžní hodnocení a popisná (deskriptivní) analýza. Každý přístup zdůrazňuje něco jiného: 100bodová škála maximalizuje rychlou orientaci v kvalitě, OIV standardizuje strukturu rozhodování komise a deskriptivní analýza poskytuje nejpreciznější jazyk pro profilování vůní, chutí a vad.

100bodová škála je rozšířená zejména v obchodní a mediální komunikaci. Její síla je v jemném rozlišení mezi vzorky a v možnosti pracovat se statistickými nástroji (průměr, medián, odchylka) i při relativně malém počtu hodnotitelů. Aby byla škála v profesionální degustaci použitelná, musí být doplněna o jasnou vnitřní metodiku, jinak se snadno zvrhne v subjektivní „celkové číslo“. Praktický a běžně používaný postup je rozdělit

výsledné skóre na dílčí komponenty, které hodnotitel posuzuje odděleně: vizuální dojem (čirost, intenzita, odstín a evoluce barvy), aromatická čistota a intenzita (primární, sekundární a terciární aroma), chuťová struktura (kyseliny, sladkost, třísloviny, alkohol, tělo), vyváženost a délka dochuti, typičnost a potenciál zrání. Dílčí body se následně sečtou a teprve potom je dovoleno provést malou korekci (např. ± 1 bod) na základě celkové harmonie.

V české a středoevropské praxi je klíčové zohlednit technologické rozdíly, které výrazně ovlivňují vnímanou kvalitu: práce s reduktivní aromatickou u bílých vín (ochrana před kyslíkem, řízené kvašení), použití batonáže a práce s kaly, malolaktická fermentace u Chardonnay či některých rulandských bílých, a u červených řízení extrakce (macerace, délka kontaktu se slupkami, teplota, délka a typ školení v sudu). Na 100bodové škále se tyto zásahy projeví v dimenzích čistoty, komplexity, struktury a délky. Z pohledu chemie vína je vhodné v poznámkách k hodnocení sledovat indikátory, které vysvětlují senzorický dojem: těkává acidita (octové tóny, štiplavost), reduktivní síra (sirky, guma), fenolická hořkost, zbytkový cukr versus kyselina (vjem sladkokyselé rovnováhy), případně projevy oxidace (acetaldehyd, ořechovost, ztráta primární aromaticky). 100bodová škála má nevýhodu, že „schová“ příčinu do jediného čísla; proto je nutné udržovat paralelní slovní komentář.

Systém OIV (International Organisation of Vine and Wine) je v Evropě standardem pro hodnocení na soutěžích a oficiálních akcích. Klíčová je jednotná struktura degustace a důraz na kvalitu provedení komise: anonymita vzorků, kontrola teploty, pořadí podávání, práce s referenčními vzorky a kalibrace panelu. OIV pracuje s bodovým hodnocením, které je rozděleno do kategorií odpovídajících logice degustace: vzhled, vůně, chuť a celkový dojem. Každá kategorie má přidělený bodový rozsah a v rámci něj hodnotitel rozhoduje podle intenzity, čistoty, harmonie a perzistence. V praxi je výhodou OIV to, že komise hodnotí podobně strukturovaně i napříč zeměmi a školami. V českém prostředí se tento systém používá v národních soutěžích a u vinařských akcí s mezinárodní ambicí.

Důležitou částí OIV praxe je práce s konsenzem a s omezením extrémních hlasů. Typicky se sbírají individuální bodová hodnocení a následně se počítá průměr; dle pravidel soutěže se mohou odstraňovat nejvyšší a nejnižší hodnoty nebo se vyžaduje opakované hodnocení, pokud je rozptyl příliš velký. Tím se snižuje vliv momentální únavy hodnotitele, rozdílné citlivosti na třísloviny či kyseliny a rozdíly ve zkušenosti s určitým stylem (např. aromatické odrůdy v reduktivním školení versus sudová bílá vína). OIV je také praktické pro hodnocení šumivých vín, kde je třeba oddělit posouzení perlení, pěny a integrace oxidu uhličitého s kyselinou a zbytkovým cukrem.

Popisná (deskriptivní) analýza je metodika, která primárně neprodukuje jedno číslo, ale mapu senzorických atributů. V praxi profesionální degustace slouží buď jako doplněk k bodovému hodnocení, nebo jako hlavní nástroj při vývoji produktu, kontrole šarží a technologickém rozhodování ve sklepě. Deskriptivní analýza vyžaduje disciplinovaný slovník a stupnice intenzit (např. 0–5 nebo 0–10) pro jednotlivé atributy: ovocnost (jablko, citrus, peckovina, černý rybíz), květinovost, kořenitost, bylinkovost, mineralita jako vjem (nikoli geologické tvrzení), sudové tóny (vanilka, toast, kouř), reduktivní tóny, oxidační tóny, těkává acidita, živočišné tóny, fenolická hořkost, svíravost, sladkost, kyselina, alkoholový hřejivý vjem, perzistence. Pro české a evropské vinařství je výhodné, že deskriptivní profil lze přímo spojit s technologickými kroky: například vyšší intenzita toastu a vanilky ukazuje na nové barrique nebo vyšší stupeň vypálení, výrazná zelená paprika u Cabernetů či Frankovky může souviset s methoxypyraziny a sklizní v nižší fenolické zralosti, tón másla u některých bílých vín souvisí s diacetylem z malolaktiky a následně práce s kaly.

V praxi se metodiky kombinují. U interního hodnocení ve vinařství je účelné použít krátkou 100bodovou známku pro rychlé třídění šarží, zároveň vyplnit OIV strukturu pro disciplínu posuzování a navíc připojit deskriptivní profil pro komunikaci s enologem a sklepmistrem. Typický postup degustace v evropském kontextu začíná vizuálním posouzením (čirost, jiskra, barva a její evoluce), pokračuje vůní (nejprve bez kroužení, poté po okysličení), a teprve potom chutí s důrazem na strukturu a harmonii. Kyseliny se posuzují jako kvalita (živost, přesnost) i kvantita, třísloviny jako zrnitost, zralost a integrace, alkohol jako hřejivost versus nosič aromat. Do závěru patří typičnost odrůdy a původu a odhad potenciálu zrání, který v evropské tradici stojí na rovnováze kyselin, fenolů a extraktu.

Zvláštní pozornost si zaslouží kalibrace panelu, protože rozdíly mezi hodnotiteli jsou v bodových systémech největší riziko. Kalibrace znamená společnou degustaci několika referenčních vín před hodnocením: jedno technologicky čisté a typické, jedno s mírnou vadou (např. lehce zvýšená těkavá acidita nebo slabá oxidace), jedno stylově výrazné (např. sudové Chardonnay nebo vysoce extraktivní červené). Cílem není vynutit shodu v preferenci, ale srovnat škály: co je pro panel „střední intenzita“ kyseliny, jaký je práh pro rušivou hořkost, jak rychle panel penalizuje zbytkový cukr u suchých kategorií. U soutěžních hodnocení je důležité také hlídat únavu: počet vzorků na sezení, pauzy, neutralizace (voda, neochucené pečivo), a především stabilní teplotu podávání (bílá vína obvykle 8–12 °C dle stylu, červená 14–18 °C, šumivá nižší).

Při interpretaci výsledků je nutné odlišit „kvalitu“ od „stylu“. V evropském prostředí existují legitimní technologické školy: reduktivní aromatika versus jemná oxidativní práce, čistě nerezové provedení versus sud, spontánní kvašení s širším aromatickým rozptylem versus řízené kvasinky s čistým profilem. Bodové systémy mají tendenci zvýhodňovat intenzitu a koncentraci; deskriptivní analýza naopak umožní ocenit i subtilní, terroirová vína, pokud panel pracuje s typičností a harmonií. Profesionální degustace proto musí být vždy zasazena do kontextu kategorie (odrůda, ročník, zbytkový cukr, způsob výroby) a do kontextu evropských pravidel původu a stylu.

Praktickým výstupem této kapitoly je doporučení: pokud potřebujete rychlé třídění a komunikaci směrem k trhu, použijte 100bodovou škálu, ale vždy s dílčí strukturou a slovním komentářem. Pokud hodnotíte v komisi a potřebujete srovnatelnost a procesní disciplínu, opřete se o OIV a pracujte s rozptylem hlasů. Pokud řešíte technologii, stabilitu a profil značky, zaveďte deskriptivní analýzu s definovaným slovníkem a intenzitními stupnicemi. V evropské praxi se nejlepší výsledky dosahují kombinací: číslo pro přehled, OIV pro proces a deskriptivní profil pro porozumění tomu, proč víno chutná tak, jak chutná.

Tabulkové shrnutí:

Srovnání metodik hodnocení v profesionální degustaci vína


Metodika | Hlavní výstup | Silné stránky | Rizika/omezení | Typické použití v EU/ČR

100bodová škála | Jedno číslo + poznámky | Jemné rozlišení, snadná komunikace, stat | Subjektivní „celkové číslo“ bez struktur | Média, nákupní komise, interní třídění š

OIV bodování | Body po kategoriích + průměr komise | Standardizovaný proces, srovnatelnost na | Náročnější organizace; vyžaduje kalibrac | Soutěže, oficiální hodnocení, školení ko

Popisná analýza | Profil atributů (intenzity) | Nejlepší diagnostika stylu a vad, vazba | Časová náročnost; nutný slovník a trénin | Kontrola kvality ve vinařství, vývoj pro

Kombinovaný přístup | Skóre + OIV struktura + profil | Vyváží rychlost, proces i interpretaci; | Vyšší nároky na záznam a konzistenci hod | Profesionální praxe vinařství, expertní



Srovnání metodik hodnocení v profesionální degustaci vína

Metodika	Hlavní výstup	Silné stránky	Rizika/omezení	Typické použití v EU/ČR
100bodová škála	Jedno číslo + poznámky	Jemné rozlišení, snadná k	Subjektivní „celkové číslo“	Média, nákupní komise, interní tří
OIV bodování	Body po kategoriích + prů	Standardizovaný proces, s	Náročnější organizace; vy	Soutěže, oficiální hodnocení, škol
Popisná analýza	Profil atributů (intenzity)	Nejlepší diagnostika stylu	Časová náročnost; nutný s	Kontrola kvality ve vinařství, vývoj
Kombinovaný přístup	Skóre + OIV struktura + pr	Vyváží rychlost, proces i in	Vyšší nároky na záznam a	Profesionální praxe vinařství, exp

4. Kalibrace panelu: referenční standardy aromat a prahové hodnoty




Schéma 1 ke kapitole: Kalibrace panelu: referenční standardy aromat a prahové hodnoty




Schéma 2 ke kapitole: Kalibrace panelu: referenční standardy aromat a prahové hodnoty

Kalibrace degustačního panelu je základní podmínkou pro to, aby byly senzorické výsledky v profesionální praxi srovnatelné v čase, mezi hodnotiteli i mezi vinařstvími. V českém a evropském prostředí se panel nejčastěji používá pro kontrolu jakosti, sledování vad a odchylek, ověřování stylu značky, posuzování šarží před lahvováním, validaci technologických zásahů a pro interní školení. Cílem kalibrace není „sjednotit vkus“, ale sjednotit jazyk, referenční body a práh citlivosti, tedy nastavit stabilní měřicí nástroj.

Výchozím krokem je definice referenčních standardů aromat. Referenční standard je vzorek (nebo sada vzorků), který reprodukovatelně reprezentuje určitý vjem: konkrétní aroma (např. vanilin), skupinu aromat (např. citrusy), technologický marker (např. toast z bariku) nebo vadu (např. korková vada). V profesionální degustaci se osvědčuje kombinovat tři úrovně standardů: (1) čisté chemické standardy (jednotlivé sloučeniny), (2) směsné standardy (kombinace sloučenin odpovídající typickému profilu) a (3) matricové standardy ve víně (sloučenina rozpuštěná v modelovém roztoku nebo v neutrálním víně). Čisté chemické

standards jsou nej přesnější pro práci s prahovými hodnotami a s rozlišením jednotlivých molekul, ale nejsou vždy „vinařsky realistické“. Matricové standardy naopak přibližují skutečné podmínky, protože vnímání je ovlivněno etanolem, kyselinami, fenoly, zbytkovým cukrem, CO₂ a celkovou aromatickou komplexitou.

Pro evropské podmínky je užitečné kalibrovat panel na aromatické markery typické pro odrůdy a technologie běžné v ČR a okolí: pro bílá vína (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Sauvignon, Rulandské bílé) např. thioly (grep, angrešt), terpeny (muškátové tóny), norisoprenoidy (petrolejové tóny u vyzrálějšího ryzlinku), estery (banán, hruška), vyšší alkoholy a reduktivní tóny. Pro červená (Frankovka, Svatovavřinecké, Modrý Portugal, Pinot noir) zejména fenolická struktura, vanilka a kouř/toast z bariku, těkavé fenoly (brettanomyces: „koňská stáj“, hřebíček), oxidace (aldehydové, ořechové tóny), a u vad dále těkává kyselina, sirné sloučeniny, TCA a zátkový charakter.

Při volbě konkrétních referencí je vhodné pracovat s dobře popsány standardy, které mají známé senzorické prahy ve víně nebo alespoň v modelové matici. Prahová hodnota může být definována různě: detekční práh (nejnižší koncentrace, kdy hodnotitel rozpozná, že je přítomno „něco“), rozpoznávací práh (kdy je schopen vjem správně pojmenovat) a diferenční práh (nejmenší změna, kterou vnímá jako rozdíl). Pro panelovou praxi jsou klíčové detekční a rozpoznávací prahy; u technologických zásahů (např. míra toastu, redukce SO₂, změna doby ležení na kalech) je často užitečný i diferenční práh.

Kalibrace začíná screeningem panelistů na základní citlivost, stabilitu a slovník. V praxi se používají triangulační testy (2 stejné + 1 odlišný), duo-trio testy, pořadové testy intenzity a krátké popisné profily. Následuje vytvoření referenční knihovny: pro každou cílovou vlastnost se připraví minimálně tři koncentrace standardu (pod prahem, okolo prahu, nad prahem) a stanoví se, jak panel pracuje se škálou (např. 0–10). Pro evropskou praxi je vhodné použít neutrální základ: suché bílé víno s nízkou aromatickou (např. jednoduché víno z neutrální odrůdy) nebo modelový roztok (12 % obj. etanolu, kyselina vinná a jablečná, pH kolem 3,2–3,4), protože některé sloučeniny se v přítomnosti etanolu a kyselin vnímají odlišně než ve vodě.

Zásadní je kontrola přípravy standardů: přesné vážení, práce s pipetami, minimalizace ztrát odparem u těkavých látek, používání uzavíratelných lahviček, časová standardizace (např. od přípravy do podávání max. 2 hodiny pro velmi těkavé sloučeniny) a teplota podávání (typicky 10–12 °C pro bílá, 16–18 °C pro červená). V českých podmínkách, kde se často degustuje ve sklepech, je nutné eliminovat vliv cizích pachů (čisticí prostředky, dřevo, kvasné aroma ve výrobě), stabilizovat osvětlení a hluk. Pro kalibraci vad je vhodné mít „tréninkové“ dny oddělené od běžného panelu, protože opakované vystavení vadám může ovlivnit následné hodnocení čistých vzorků.

Důležitým konceptem je interakce aromat: některé sloučeniny se maskují (např. zbytkový cukr může zjemnit vjem kyseliny a tříslovin; vysoká aromatická komplexita může snížit detekci slabých vad), jiné se naopak zesilují (synergie esterů ve „ovocnosti“). Proto je nezbytné ověřovat prahy nejen v modelové matici, ale i v reálných typech vín, se kterými panel pracuje: reduktivně vedené nerezové bílé, bílá ležící na kalech, barikovaná bílá, mladá ovocná červená a strukturovaná červená s vyšším fenolickým zatížením. V praxi se často ukáže, že hodnotitel, který má nízký práh pro TCA ve vodě, má vyšší práh ve víně s výrazným sudem, protože toast a vanilka částečně překrývají mdlý „kartonový“ charakter.

Standardy aromat se v panelu používají dvěma způsoby: jako „kotvy“ (před degustací nebo mezi flighty) a jako kontrolní vzorky (vlození do série naslepo). Kotvy stabilizují mentální reprezentaci daného vjemu, kontrolní vzorky ověřují, zda panel drží nastavenou škálu. Pro hodnotitele je užitečné pravidlo: nejdřív

identifikace (co to je), potom intenzita (jak silné), a až nakonec interpretace (co to znamená pro kvalitu a technologii). Tím se snižuje riziko, že hodnotitel promítne do intenzity svou preferenci.

U prahových hodnot je klíčové pracovat se statistikou. Panelová kalibrace by měla pravidelně vyhodnocovat opakovatelnost jednotlivce (test–retest), shodu panelu (např. rozptyl na škále), a detekční úspěšnost u slepých kontrol. Pro prahové testy se používají vzestupné série (ascending forced-choice): hodnotitel dostává postupně rostoucí koncentrace a v každém kroku volí, který vzorek je odlišný nebo který obsahuje daný vjem. Z několika opakování se stanoví individuální práh a následně panelový medián. Pro provozní potřeby vinařství je praktické zavést „pracovní prahy“: koncentrace, při které panel spolehlivě detekuje danou vlastnost v typické matici firmy. Tyto pracovní prahy se mohou lišit od publikovaných hodnot, protože panel je specificky trénovaný a protože matrice (alkohol, pH, fenoly) je vlastní danému portfolio.

Výběr referenčních vad by měl pokrýt nejčastější rizika v technologii. V českém a středoevropském provozu se často řeší oxidace (nedostatečná ochrana SO₂, nevhodná práce s kyslíkem), redukce (H₂S, merkaptany při nedostatku živin a při dlouhém ležení bez práce s kaly), těžká kyselina (hygiena, teplota, kontaminace), brettanomyces (sanitace sudů, mikrooxidace, SO₂ management) a korková vada (TCA). Kalibrace musí být provázána s výrobní praxí: panel by měl umět nejen vadu pojmenovat, ale i naznačit pravděpodobnou příčinu a rizikový bod procesu (kvašení, zrání, filtrace, lahvování). To posiluje užitečnost panelu pro technologická rozhodnutí.

Kalibrační sezení by měla být krátká, ale častá. V provozu se osvědčuje 30–45 minut jednou týdně pro udržovací kalibraci a 2–3 hodiny jednou za čtvrtletí pro hlubší přenastavení a práci s prahy. Každé sezení by mělo mít jasný cíl (např. „TCA a oxidace ve dvou maticích“) a předem definovanou škálu. Hodnotitelé musí mít standardizované podmínky: stejné sklo, objem nalití (např. 30 ml), čas na provonění, a stejný postup zapisování. Důraz je na konzistenci; i malé změny (jiný typ sklenky, jiná teplota) mohou posunout vnímání a znehodnotit srovnatelnost dat.

Výstupem kalibrace je „panelový profil“: seznam referenčních standardů, jejich pracovní koncentrace, popis slovníku, a individuální i panelové prahy pro klíčové markery. Tento profil je živý dokument a měl by být aktualizován s ohledem na ročník, změny technologií a materiálů (např. jiné sudy, nové uzávěry, jiné kvasinky). V evropském rámci je navíc vhodné sladit terminologii s používanými deskriptory (např. OIV a běžné profesní slovníky), ale vždy s ohledem na to, aby deskriptory odpovídaly místnímu portfolio vín. Dobře kalibrovaný panel pak funguje jako citlivý senzorický „přístroj“: odhalí slabé odchylky dříve, než se projeví v reklamaci nebo v nevyrovnanosti šarží, a umožní technologovi dělat rozhodnutí založená na opakovatelných datech, nikoli na momentálním dojmu.

Tabulkové shrnutí:

Referenční standardy pro kalibraci panelu: doporučené pracovní koncentrace a senzorické kotvy

Vjem/marker | Typ (pozitivní/vada) | Doporučená matrice | Pracovní koncentrace | Kotva popisu

2,4,6-trichloroanisol (TCA) | vada | neutrální bílé víno | 2 µg/l | karton, sklep


4-ethylfenol | vada | červené víno s nižším dubem | 420 µg/l | stáj, kůže

diacetyl | ambivalentní | bílé víno po MLF / model | 180 µg/l | máslo, smetana

linalool (terpen) | pozitivní | model 12 % etanol | 25 µg/l | květ, citrus

isoamyl acetát (ester) | pozitivní | neutrální bílé víno | 30 µg/l | banán, bonbón

Pracovní detekční prahy vybraných aromatických markerů ve víně (panelový medián)



Referenční standardy pro kalibraci panelu: doporučené pracovní koncentrace a senzorické kotvy

Vjem/marker	Typ (pozitivní/vada)	Doporučená matrice	Pracovní koncentrace	Kotva popisu
2,4,6-trichloroanisol (TCA)	vada	neutrální bílé víno	2 µg/l	karton, sklep
4-ethylfenol	vada	červené víno s nižším dub	420 µg/l	stáj, kůže
diacetyl	ambivalentní	bílé víno po MLF / model	180 µg/l	máslo, smetana
linalool (terpen)	pozitivní	model 12 % etanol	25 µg/l	květ, citrus
isoamyl acetát (ester)	pozitivní	neutrální bílé víno	30 µg/l	banán, bonbón
β-damascenon	pozitivní	bílé víno (rizlink styl)	0,08 µg/l	sušené ovoce

5. Popis aromatiky: primární, sekundární a terciární složky




Schéma 1 ke kapitole: Popis aromatiky: primární, sekundární a terciární složky

Degustace aromatiky ve sklenici

Bez kroužení

Po kroužení

Retronazálně




Schéma 2 ke kapitole: Popis aromatiky: primární, sekundární a terciární složky

Aromatika vína je výsledkem součtu těkavých látek, které se uvolňují z povrchu vína do prostoru nad sklenicí a následně se vnímají čichem přímou (orthonazální) i retronazální cestou. Pro profesionální degustaci je praktické členit aroma podle původu na primární, sekundární a terciární složky. Toto členění není jen didaktické: pomáhá při identifikaci odrůdy, určení stylu (např. reduktivní vs. oxidativní), odhadu technologických kroků (kontakt se slupkami, typ kvašení, práce s kaly) a při posouzení vyzrálosti a potenciálu archivace.

Primární aromatika (odrůdová a předfermentační) vychází z hroznů a z operací, které probíhají před alkoholovým kvašením. V evropském kontextu se primární projevy často pojí s odrůdami jako Sauvignon blanc (thioly: citrus, angrešt, černý rybíz), Ryzlink rýnský (terpeny a norisoprenoidy: limeta, květ, někdy petrolej až později), Tramín (terpeny: růže, liči), Muškát (intenzivní květinová parfemace) nebo u modrých odrůd s pyraziny (Cabernet franc, Cabernet Sauvignon: paprika, zelené tóny). Z chemického hlediska sem

patří zejména monoterpeny (linalool, geraniol), C13-norisoprenoidy (β -damascenon), methoxypyraziny (IBMP) a odrůdové thioly (3MH, 3MHA, 4MMP) uvolňované často až během kvašení z netěkavých prekurzorů.

Degustátor by měl u primární aromatiky hodnotit nejen „co“ (deskriptory), ale také intenzitu, čistotu a typičnost. V českých a středoevropských bílých vínech (Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Müller Thurgau) se primární složka projevuje v ovocné škále (jablko, hruška, citrus) a květinově-bylinných tónech. Výraz primární aromatiky ovlivňuje termín sklizně (zralost aromatických prekurzorů, kyseliny vs. cukry), výnos, listová stěna a oslunění hroznů, vodní stres i zdravotní stav. Technologie před kvašením (macerace rmutu, lisování, odkalení moštu, ochrana před oxidací) může aromatiku podpořit nebo potlačit. Například krátká studená macerace bílých aromatických odrůd zvýrazní terpenické tóny, zatímco příliš hrubé lisování či dlouhý kontakt s kalem v moštu může přinést vegetální nebo fenolické nuance. V praxi je užitečné rozlišit „primární ovocnost“ (čerstvé ovoce) od „primární zelenosti“ (pyraziny, stonkovitost), která může signalizovat nedostatečnou fenolickou zralost nebo příliš ranou sklizeň.

Sekundární aromatika vzniká především během alkoholového kvašení a bezprostředně po něm, tedy je silně svázána s činností kvasinek, teplotou kvašení, výživou (dusík, vitaminy), typem nádoby a režimem práce s kaly. Typickým znakem sekundární aromatiky jsou estery (např. isoamyl-acetát: banán; ethyl-hexanoát: jablko; ethyl-butyrate: ananas), vyšší alkoholy, aldehydy, těkavé kyseliny v nízké hladině a sirné sloučeniny v širokém spektru od pozitivních reduktivních tónů (křesadlo, pazourek) až po vady (sirovodík, merkaptany). U evropských „redukčních“ bílých vín vinifikovaných v nerez s řízenou teplotou (typicky Morava, Rakousko, severní Itálie) je sekundární složka často klíčem k vnímané svěžesti: čistá fermentační ovocnost, květinový nádech, někdy kvasný tón.

Do sekundární aromatiky patří také aroma vzniklá malolaktickou fermentací (MLF) a časným zráním na kvasničných kalech. MLF přeměňuje jablečnou kyselinu na mléčnou a současně může vytvářet diacetyl (máslo, smetana), acetoin a další karbonylové látky. U Chardonnay nebo některých burgundských stylů je máslovost žádoucí, u aromatických odrůd (Ryzlink, Sauvignon) se MLF často potlačuje, aby se zachovala odrůdová čistota. Ležení na kalech a batonáž mohou přinést tóny pečiva, briošky a krémovitost díky autolýze kvasinek (uvolnění mannoproteinů) a současně zlepšit stabilitu a vjem plnosti. Degustátor by měl posoudit, zda jsou kvasné tóny integrované a podporují odrůdový profil, nebo jej překrývají; také rozlišit „čistý reduktivní“ projev (minerální, kouřový, křesadlový) od nežádoucí redukce (vejce, kanalizační tón), která vyžaduje technologickou korekci.

Terciární aromatika je výsledkem zrání a stárnutí: v sudu, v tanku při delší elevaci i v láhvi. Vzniká kombinací pomalé oxidace, esterifikace, hydrolýzy, polymerizace fenolů a extrakce látek ze dřeva. V evropské praxi se terciární složka výrazně liší podle stylu: u červených vín zrajících v barrique nebo ve větších sudech (Bordeaux, Rioja, některé moravské cuvée) se objevují tóny vanilky, kokos, cedr, tabák, káva, kakao a koření (lactony, vanilin, eugenol, toastové aldehydy). U bílých vín zrajících oxidativněji nebo dlouho na kalech (Burgundsko, část šampaňských, některá vína z Tokaje) se přidávají tóny ořechů, sušeného ovoce, medu, vosku, lanýže, briošky a komplexní kořenitost.

Zvláštní místo má lahvová zralost. U ryzlinků evropského typu se může objevit tzv. petrolejový tón spojený s TDN (1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaftalen), který roste s časem a je podporován vyšším osluněním hroznů a určitými podmínkami zrání. U červených vín se terciární aromatika často posouvá od primárního ovoce

(třešeň, ostružina) k sušenému ovoci, kůži, zvěřině, podhoubí a lesní půdě. Degustátor v této fázi hodnotí komplexitu, harmonii a především integritu: zda se terciární tóny rozvíjejí bez známek únavy (přestárlost, oxidace, rozpad ovoce) a zda je stále přítomna struktura (kyselina, tříslovina), která aromatický vývoj nese.

Pro praktický popis aromatiky je důležité pracovat systematicky. Nejprve posoudit intenzitu bez kroužení (prchavé, svrchní tóny), poté po zakroužení (uvolnění těkavých látek, nárůst esterů a terpenů). Doporučuje se postupovat od obecných kategorií k detailu: ovocné (citrus, jádroviny, peckoviny, bobuloviny), květinové, bylinné, kořenité, živočišné, dřevité, empyreumatické (toast, kouř) a oxidativní (ořechy, jablko do hněda). U každého deskriptoru je vhodné uvést, zda pravděpodobně patří do primární, sekundární nebo terciární vrstvy; tím se z poznámky stává interpretace stylu a technologie.

V českém a středoevropském prostředí je častým úkolem odlišit primární od sekundární ovocnosti u mladých bílých vín: například u Veltlínského zeleného může „pepř“ vycházet jak z odrůdové složky, tak být podpořen fermentačními estery; u Sauvignonu se zase mísí thiolová „angreštovost“ s kvasnou tropikou. U červených vín z Moravy či Rakouska může být terciární dřevo přítomné i u relativně mladých ročníků; degustátor by měl rozpoznat, zda jde o jemnou integraci (cedr, sladké koření) nebo dominantní toast a vanilin, který překrývá odrůdu.

Nakonec je třeba mít na paměti, že hranice mezi vrstvami není absolutní. Mnoho aromatických sloučenin má prekursor v hroznu, ale uvolní se až během kvašení; některé terciární tóny se objevují už po několika měsících na kalech. Proto je v profesionální degustaci cílem nejen „pojmenovat“, ale také posoudit původ, vývoj a soulad aromatiky se strukturou vína. Dobře vyvážené víno vykazuje čitelnou primární typičnost, čistou sekundární podporu a přiměřenou terciární komplexitu odpovídající stylu a stáří.

Tabulkové shrnutí:

Příklady deskriptorů a jejich pravděpodobný původ v evropských stylech

Složka | Typické deskriptory | Časté odrůdy/style (EU/CZ) | Technologický nebo zrací faktor

Primární | citrus, květ, angrešt | Sauvignon blanc (Loire, Morava) | ochrana před oxidací, reduktivní vedení


Primární | růže, liči, koření | Tramín červený (Morava, Alsasko) | studená macerace, šetrné lisování

Sekundární | banán, hruška, bonbón | mladá bílá vína z nerez (AT/CZ) | nižší teplota kvašení, výživa kvasinek

Sekundární | máslo, smetana | Chardonnay (Burgundsko, některé CZ) | malolaktická fermentace, práce s kaly

Terciární | vanilka, cedr, tabák | červená vína se sudem (Bordeaux, Rioja,) | typ sudu, stupeň toastu, délka zrání

Typické aromatické skupiny podle původu (relativní intenzita ve vnímaném profilu)



Příklady deskriptorů a jejich pravděpodobný původ v evropských stylech

Složka	Typické deskriptory	Časté odrůdy/styley (EU/CZ)	Technologický nebo zrací faktor
Primární	citrus, květ, angrešt	Sauvignon blanc (Loire, Morava)	ochrana před oxidací, reduktivní vedení
Primární	růže, liči, koření	Tramín červený (Morava, Alsasko)	studená macerace, šetrné lisování
Sekundární	banán, hruška, bonbón	mladá bílá vína z nerezu (AT/CZ)	nižší teplota kvašení, výživa kvasinek
Sekundární	máslo, smetana	Chardonnay (Burgundsko, některé)	malolaktická fermentace, práce s kaly
Terciární	vanilka, cedr, tabák	červená vína se sudem (Bordeaux)	typ sudu, stupeň toastu, délka zrání
Terciární	petrolej, vosk, med	Ryzlink rýnský (DE/AT/CZ)	lahvová zralost, vznik TDN

6. Hodnocení struktury: kyseliny, taniny, alkohol, extrakt, perlení




Schéma 1 ke kapitole: Hodnocení struktury: kyseliny, taniny, alkohol, extrakt, perlení




Schéma 2 ke kapitole: Hodnocení struktury: kyseliny, taniny, alkohol, extrakt, perlení

Hodnocení struktury vína je jádrem profesionální degustace, protože popisuje, jak se víno „nese“ v ústech, jakou má kostru a jak se jednotlivé složky navzájem vyvažují. V evropské praxi se struktura nejčastěji rozpadá na pět pilířů: kyseliny, taniny, alkohol, extrakt a perlení. Degustátor je posuzuje odděleně, ale zároveň sleduje jejich souhru (balanc) a texturu (způsob, jakým působí na sliznice). Pro konzistentní výsledek je vhodné pracovat s opakovatelným postupem: nejprve krátký nátok (první dojem), poté rozprostření vína po celé dutině ústní, včetně retronazálního vjemu, a nakonec dochuť s vyhodnocením délky a charakteru doznívání.

Kyseliny jsou hlavní osou svěžesti a napětí. V Evropě dominují především kyselina vinná a jablečná; u některých vín se přidává i vyšší podíl kyseliny mléčné po jablečno-mléčné fermentaci (JMF). V chladnějších podmínkách (např. vyšší polohy Moravy, severnější apelace Německa či Rakouska) bývá zachována vyšší jablečná kyselina, zatímco v teplejších ročnících a oblastech klesá celková acidita a roste pH. Degustačně

kyseliny hodnotíme podle intenzity (nízká–vysoká), kvality (šťavnatá, citronová, jablečná, krémová) a integrace. Důležitý je rozdíl mezi „ostrým“ dojmem (často kombinace vyšší kyseliny a nižšího extraktu či nedostatečné zralosti) a „živou“ svěžestí, kdy acidita podpírá aroma a prodlužuje dochuť. Praktickým vodítkem je slinění: výrazné slinění a napětí po stranách jazyka obvykle signalizuje vyšší kyselinu. Vysoké pH může způsobit měkký dojem i při relativně vysoké analytické kyselině, zejména u vín s vyšším extraktem. V technologii výroby kyseliny ovlivňuje termín sklizně, práce s JMF (povolená typicky u červených a některých bílých), způsob odkalení moštu, kontakt se slupkami a volba nádoby. V české praxi je klíčové vnímat i doslazování u jakostních vín s přívlastkem (dle legislativy omezené) či u vín s vyšším zbytkovým cukrem: cukr aciditu maskuje, takže je třeba hodnotit svěžest i proti sladkosti.

Taniny (třísloviny) jsou fenolické látky, které dávají zejména červeným vínům strukturu, svíravost a schopnost zrání. U bílých se tanin objevuje při delší maceraci, ve vínech typu orange či při výraznějším kontaktu s dřevem. Degustačně rozlišujeme intenzitu (kolik svíravosti), zrnitost (jemné vs. hrubé), zralost (zralé vs. zelené), umístění v ústech (dásně, patra) a délku dozrívání. Hrubé, vysušující taniny často souvisejí s nedozrálými slupkami či semeny, příliš agresivním lisováním, dlouhou macerací bez kontroly extrakce nebo s nevhodným použitím nového dřeva. Naopak zralé taniny působí sametově, „křídově“ či „pudrově“ a integrují se s ovocností i alkoholem. V evropské technologii je klíčová práce s macerací (délka, teplota, délešťáž, remontáž), volba kvasinek a enzymů, a také řízení kyslíku: mikrooxidace či zrání v sudech podporují polymeraci taninů a jejich zjemnění. Degustátor by měl vnímat, zda tanin tvoří oporu (kostru) nebo zda přebíjí ostatní složky. U odrůd jako Frankovka, Cabernet Sauvignon či Nebbiolo bývá vyšší tanin odrůdově typický; u Pinot Noir se hodnotí spíše jemnost a textura než hrubá intenzita.

Alkohol je nosičem aromat a přispívá k tělu, sladkosti vjemu a hřejivosti. Hodnotíme nejen deklarovanou sílu, ale především integraci: zda alkohol zahřívá nepříjemně v krku, nebo je součástí harmonického celku. V evropském kontextu posledních ročníků je častý nárůst alkoholu vlivem teplejších sezón; u některých stylů (např. pozdní sběry, výběry z hroznů) je vyšší alkohol kombinován se zbytkovým cukrem, což může působit „likérově“. Alkohol interaguje s kyselinou a extraktem: vyšší alkohol může vyžadovat vyšší aciditu nebo vyšší extrakt, aby víno nepůsobilo rozplizle. Naopak nízký alkohol u velmi suchých vín může zvýraznit kyselinu a taninovou svíravost. Technologicky alkohol souvisí s vyzrálostí hroznů, výnosem, cukernatostí moštu a s průběhem kvašení; zastavené kvašení ponechá zbytkový cukr a sníží alkohol, což má přímý dopad na strukturu.

Extrakt (celkový i bezcukerný) je v degustační praxi vnímaný jako hustota, plnost, viskozita a „hmota“ vína. Nejde jen o cukr; extrakt tvoří i glycerol, polysacharidy, fenolické látky, minerální složky a produkty zrání na kalech. Degustátor hodnotí, zda je tělo lehké, střední či plné, a jaký je charakter plnosti: krémová, olejnatá, šťavnatá, slaná, křídová. V bílých vínech z Moravy (např. Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené) může extrakt výrazně stoupnout díky práci na jemných kalech (sur lie), batonáži nebo částečné fermentaci v sudu. Vyšší extrakt dokáže vybalancovat kyselinu a zvýšit délku dochuti. Naopak nízký extrakt spolu s vyšší kyselinou může vyústit v „tenké“ či „vodnaté“ víno. U červených extrakt často roste s mírou extrakce ze slupek a se zráním v dřevě; zároveň je třeba sledovat, zda vyšší extrakt není doprovázen hrubým taninem.

Perlení je specifickým strukturálním prvkem, relevantním zejména u šumivých vín, perlivých vín a u tichých vín s mírně zbytkovým CO₂ (tzv. spritz). V evropské praxi rozlišujeme tlak, jemnost bublinek, jejich perzistenci a způsob, jakým CO₂ ovlivňuje vnímání kyseliny a aromat. Jemné, dlouhé perlení (typické pro tradiční metodu, např. Crémant nebo česká jakostní šumivá vína vyráběná druhotným kvašením v lahvi)

vytváří krémovou texturu a podporuje retronazální projev. Hrubé, rychle mizící bubliny bývají spíše znakem tankové metody nebo nedostatečné integrace. Při degustaci je důležité hodnotit perlení ve vztahu k dozáži: vyšší zbytkový cukr zjemňuje kyselinu i CO₂, zatímco brut nature ukáže strukturu „na kost“. Z technologických faktorů ovlivňuje perlení délka zrání na kvasnicích, kvalita tirážního likéru, čistota vína před tiráží, teplota servisu a typ skla. I u tichých vín může mírný CO₂ zvýšit dojem svěžesti, ale v profesionální degustaci může být vnímán jako rušivý, pokud neodpovídá stylu.

Klíčovým krokem je syntéza: balanc mezi kyselinou, taninem, alkoholem, extraktem a případným perlením. V praxi se osvědčuje slovní „mapa“: co je dominantní, co podpůrné a co chybí. Například víno s vysokou kyselinou a nízkým extraktem působí ostře; řešením může být zbytkový cukr, práce na kalech nebo pozdější sběr (s rizikem vyššího alkoholu). Červené s vysokým taninem a středním alkoholem může být strukturované a vhodné k archivaci, pokud jsou taniny zralé; pokud jsou zelené, bude víno tvrdé i při dobré ovocnosti. Vysoký alkohol bez odpovídající kyseliny a extraktu vede k „pálivému“ dojmu; často pomůže podávání při nižší teplotě, ale strukturální deficit tím nezmizí.

Pro objektivnější hodnocení je vhodné pracovat s referenční škálou a tréninkem. Degustátor si může kalibrovat vjem kyseliny porovnáním suchých ryzlíků z chladnějších poloh s vlašáky z teplejších tratí, taniny porovnáním frankovky z nerezového tanku vs. ze sudu, alkohol porovnáním kabinetních stylů s pozdními sběry a extrakt s víny školenými na kalech. U šumivých vín pomáhá srovnání tradiční metody a tankové metody při podobné kyselině a dozáži. Důsledná terminologie a popis textury umožňují nejen bodové hodnocení, ale i doporučení pro gastronomii: vysoká kyselina a jemné perlení podporují párování s tučnějšími pokrmy; vyšší tanin vyžaduje bílkovinu a tuk; vyšší alkohol volá po intenzitě chuti nebo po sladší složce u dezertních vín. Výsledkem profesionálního hodnocení struktury je srozumitelný závěr o harmonii, potenciálu zrání a stylové správnosti v rámci českého a evropského kontextu.

Tabulkové shrnutí:

Praktické senzorické indikátory strukturálních složek a typické technologické příčiny

Složka | Co sledovat v ústech | Typické pozitivní znaky | Časté příčiny nevyváženosti (technologie)

Kyseliny | slinění, napětí po stranách jazyka, šťav | živé, šťavnaté, prodlužuje dochuť | příliš časná sklizeň; nedokončená/nevhod


Taniny | svíravost na dásních a patře, zrnitost, | jemné, zralé, sametové; opora pro zrání | nedozrálé slupky/semínka; agresivní liso

Alkohol | hřejivost v krku, sladkost vjemu, „šířka | integrovaný, podporuje aroma, bez pálení | vysoká cukernatost z teplého ročníku; do

Extrakt | plnost, viskozita, krémovost, „hmota“ st | kompaktní tělo, krémová textura, dlouhá | nízká zralost a výnosová vinařina; příliš

Perlení/CO₂ | jemnost bublinek, perzistence, dráždivos | jemné, dlouhé perlení; čistý mousse | krátké zrání na kvasnicích; nevhodná tep

Vztah pH a vnímané svěžesti u vybraných evropských bílých vín



Praktické senzorické indikátory strukturálních složek a typické technologické příčiny

Složka	Co sledovat v ústech	Typické pozitivní znaky	Časté příčiny nevyváženosti (techno
Kyseliny	slinění, napětí po stranách jazyka	živé, šťavnaté, prodlužuje dochuť	příliš časná sklizeň; nedokončená/nevhodná
Taniny	svíravost na dásních a patře, zrnitost	jemné, zralé, sametové; opora pro chuť	nedo zralé slupky/semínka; agresivní lisování
Alkohol	hřejivost v krku, sladkost v jazyce	integrovaný, podporuje aroma, bělost	vysoká cukernatost z teplého ročníku; do
Extrakt	plnost, viskozita, krémovost, „hmota“	kompaktní tělo, krémová textura, bělost	nízká zralost a výnosová vinařina; příliš
Perlení/CO ₂	jemnost bublinek, perzistence, dráždivost	jemné, dlouhé perlení; čistý mous	krátké zrání na kvasnicích; nevhodná tep

7. Identifikace vad: korková vada, redukce, oxidace, těkavé kyseliny




Schéma 1 ke kapitole: Identifikace vad: korková vada, redukce, oxidace, těkavé kyseliny




Schéma 2 ke kapitole: Identifikace vad: korková vada, redukce, oxidace, těkavé kyseliny

Identifikace vad v profesionální degustaci vyžaduje propojení senzoryky s porozuměním technologii výroby, chemickým mechanismům a kontextu evropského vinařství. Degustátor by měl pracovat systematicky: nejprve rychlá orientace (čistota aromatiky, intenzita, typické vs. atypické tóny), poté potvrzení podezření opakovaným přivoněním po zakroužení, porovnáním se strukturou v chuti a zhodnocením vývoje ve sklenici. U vad je důležité odlišit vadu od stylu (např. záměrná reduktivní práce se sírou, oxidative style u sherry či žlutých vín). V praxi se osvědčuje hodnotit vady v pořadí, které minimalizuje záměnu: korková vada (TCA), redukce (sírné sloučeniny), oxidace (acetaldehyd a související změny), a těkavé kyseliny (VA, zejména kyselina octová a ethylacetát). Současně je nutné zohlednit, že víno může vykazovat kombinaci jevů (např. lehká oxidace zvyšuje vnímanou těkavost a snižuje ovocnost, čímž se defekty senzoricky „přibližují“).

Korková vada je v evropském prostředí tradičně spojena s přírodním korkem, ale TCA (2,4,6-trichloroanisol) může vznikat i z jiných zdrojů v provozu (kontaminované dřevo, karton, někdy prostředí sklepa).

Mechanismus je typický extrémně nízkým prahem vnímání: sensorika reaguje nejen na samotný „korkový“ tón, ale především na potlačení ovocnosti a celkové „zploštění“ aromatiky. Vůně připomíná vlhký sklep, mokrá karton, zatuchlou hadru, někdy plíseň na dřevě. V chuti bývá víno nevýrazné, krátké, s jakousi prázdnotou; hořkost může působit výrazně, protože chybí ovocná protiváha. Klíčové je neplést TCA s prostou zatuchlinou z nesprávně skladovaného korku nebo s přirozeným vývojem terciárních tónů. Degustační postup: nejprve přičichnout bez víření (TCA se někdy ukáže hned), poté vířit a porovnat intenzitu ovoce vůči očekávání dané odrůdy a regionu (např. mladý ryzlink z Mosely či z Mikulovska by měl mít jasnou primární aromatu). Pomáhá také přivonění ke spodní části korku, pokud je k dispozici, ale nelze na tom stavět závěr (TCA se může projevit i bez výrazně „páchnoucího“ korku). Praktické rozhodnutí ve službě: při jasné sensorické degradaci se víno reklamuje; u hraničních případů je vhodné otevřít druhou láhev a srovnat.

Redukce v moderním evropském vinařství často souvisí s reduktivním přístupem: nízký přístup kyslíku, ochrana oxidem siřičitým, uzavřené nádoby, práce na jemných kalech a používání šroubových uzávěrů či velmi těsných zátek. Reduktivní aroma není automaticky vadou; může jít o dočasné, lehce „zavřené“ stadium, které se provzdušněním zlepší. Vadná redukce je však dána výskytem sirných sloučenin s výrazně nepříjemným charakterem a persisterací. Typické jsou: sirovodík (H_2S) – zkažená vejce; merkaptany (methanthiol, ethanthiol) – kanalizace, plyn; thioestery – spálená guma; někdy dimethylsulfid (DMS) – konzervovaná kukuřice, vařené zelí (ten může být u některých stylů i součástí komplexity). V chuti se redukce projevuje kovovou, štiplavou stopou, někdy pocitem „dusna“; ovocnost je překryta. Příčiny zahrnují výživový stres kvasinek (nedostatek asimilovatelného dusíku), příliš dlouhé ležení na kalech bez řízení, nadměrné síření, nebo kontaminace mědí a následné reakce. Degustační diagnostika: nejprve posoudit, zda se aroma mění v čase. Lehká redukce často ustoupí po intenzivním zakroužení nebo dekantaci do karafy, zatímco merkaptany mohou naopak „vylézat“ až po provzdušnění. Pro praxi je důležité rozlišit redukcii od kouřových či pazourkových tónů, které mohou být odrůdové či terroirové (např. některé rieslingy) a nejsou doprovázeny „špinavým“ sirným dojmem. Technologie nápravy ve sklepě může zahrnovat řízené provzdušnění, práci s mědí (s velkou opatrností a v souladu s předpisy), nebo úpravu výživy během kvašení; v servisu je realistickou intervencí jen provzdušnění a kontrola teploty.

Oxidace je soubor změn vyvolaných přístupem kyslíku, katalyzovaných kovy (Fe, Cu) a ovlivněných fenolickým složením. U bílých vín se často projevuje ztrátou primární aromatiky, přechodem do tónů jablečných slupek, ořechů, medu, sherry, a vznikem acetaldehydu (vůně zeleného jablka až „jablečného moštu“). Barva se posouvá od citronové ke zlatožluté až jantarové; u červených vín dochází k hnědnutí okrajů, ztrátě fialových odstínů a k „vysychání“ tříslovin. Oxidace může být úmyslná a stylová (např. některá vína z Jury, madeira, některé fortifikované styly), ale u běžných tichých vín z ČR a většiny Evropy je předčasná oxidace vada. V praxi je častá u lahví s nedostatečnou ochranou SO_2 , u špatně skladovaných vín (teplo urychluje reakce), nebo po dlouhém otevření. Degustační postup: hodnotit současně barvu a vůni, protože oxidace je často vizuálně patrná; ověřit přítomnost „sherry“ tónů a pokles kyseliny v dojmu (kyselina chemicky neklesá vždy výrazně, ale vjemově se ztrácí napětí). Pozor na záměnu s vývojovým stářím: vyžralý riesling může mít petrolejové tóny (TDN) bez oxidace; vyžralý pinot noir může být cihlový, ale stále čistý a živý. Rozhodující je čistota, svěžest a absence zatuchlé ořechovosti spojené s acetaldehydem.

Těkavé kyseliny (volatile acidity, VA) představují zejména kyselinu octovou a její estery, hlavně ethylacetát. V malých koncentracích je VA přirozenou součástí vína a může přispět k aromatické komplexitě, zejména u některých vyžralejších či botryticko ovlivněných vín. Nad určitou hranici však dominuje štiplavý octový tón a

rozpouštědlový charakter (lepidlo, lak na nehty), který ruší ovocnost a zvyšuje vjem pálivosti. Chemicky je VA často spojena s činností bakterií octového kvašení (*Acetobacter*) při přítomnosti kyslíku, nebo s neřízenou činností některých kvasinek a bakterií v pozdních fázích výroby. Rizika se zvyšují při poškozených hroznech (botrytis, hniloba), vysokém pH, nízké hladině volného SO₂, a při špatné hygieně. V chuti může VA vytvářet dojem „pálivosti“ i při nízkém alkoholu; aromatika je ostřejší a zkratkovitá. Degustační diagnostika: odlišit VA od vysokého alkoholu a od výrazného dubu, které také mohou působit hřejivě. Typicky VA „štípe“ v nose při krátkých nádechích a má jasnou asociaci s octem nebo ředidlem. Dále je vhodné sledovat, zda je vada konzistentní v aromatu i dochuti; u vína s lehkou VA může být v úvodu příjemný ovocný dojem, ale v dozívání se objeví rozpouštědlo. U šumivých vín může CO₂ zvýraznit těkavost a vada je v nose patrnější.

Pro praktickou výuku je užitečné spojit vady s rozhodovacími otázkami: Je ovocnost potlačená a aroma zatuchlé? Myslet na TCA. Je přítomný sirný, vejčitý či kanalizační tón, který se mění po provzdušnění? Myslet na redukci. Je barva posunutá do hněda, vůně ořechová a jablečná se ztrátou svěžesti? Myslet na oxidaci. Štípe to jako ocet či lak? Myslet na VA. V rámci evropské praxe je klíčová také komunikace: v gastronomii se vadná láhev řeší rychle a diskrétně; ve vinařství se závěr dokumentuje (šarže, uzávěr, skladování, teplota, datum otevření) a doplňuje analytikou (volný SO₂, VA, případně screening TCA). Degustátor, který dokáže vady správně pojmenovat, jejich pravděpodobnou příčinu zasadit do technologického kontextu a navrhnout odpovídající postup (provzdušnit vs. reklamovat vs. stylově akceptovat), poskytuje profesionální hodnotu a chrání reputaci vína i servisu.

Tabulkové shrnutí:

Rychlá diferenciální diagnostika hlavních vad při degustaci

Vada | Typické aroma (nos) | Vizuelní vodítka | Co ověřit v praxi | Typické příčiny


Korková vada (TCA) | mokrá karton, zatuchlý sklep, potlačené | barva často normální | porovnat s očekávanou ovocností; případně | kontaminovaný korek/obaly/dřevo; prostře

Redukce (sirné sloučeniny) | vejce, plyn, kanalizace, spálená guma (d) | bez jasných vizuelních změn | sledovat změnu po víření/dekantaci; odli | nízký O₂, stres kvasinek, práce na kalec

Oxidace | ořechy, jablečné slupky, sherry, med; zt | hnědnutí u bílých; cihlové okraje u červ | zkontrolovat barvu proti stylu/ročníku; | přístup kyslíku, nízký volný SO₂, teplé

Těkavé kyseliny (VA) | ocet, lak na nehty, lepidlo (ethylacetát) | barva často normální | krátké nádechy (štiplavost); odlišit od | *Acetobacter* + kyslík, poškozené hrozny,

Orientační prahy vnímání vybraných vadných látek ve víně



Rychlá diferenciální diagnostika hlavních vad při degustaci

Vada	Typické aroma (nos)	Vizuální vodítka	Co ověřit v praxi	Typické příčiny
Korková vada (TCA)	mokrá karton, zatuchlý skl	barva často normální	porovnat s očekávanou ov	kontaminovaný korek/obaly/dřevo
Redukce (sirn� slou�eniny)	vejce, plyn, kanalizace, sp	bez jasn�ch vizu�ln�ch zm	sledovat zmn�u po v�ření/	n�zk� O ₂ , stres kvasinek, pr�ce n
Oxidace	o�echy, jable�n� slupky, s	hn�dnut� u b�l�ch; cihlov�	zkontrolovat barvu proti st	p�st�p kysl�ku, n�zk� voln� SO ₂ ,
T�kav� kyseliny (VA)	ocet, lak na nehty, lepidlo	barva �asto norm�ln�	kr�tk� n�dechy (�tiplavost)	Acetobacter + kysl�k, po�kozen� l

8. Záznam a interpretace: degustační protokol, statistika a shoda hodnotitelů




Schéma 1 ke kapitole: Záznam a interpretace: degustační protokol, statistika a shoda hodnotitelů

 Vzhled 0 1 2 3 4 5 Barva Čírost Viskositá Deskriptory 	 Vůně 0 1 2 3 4 5 Intensita Komplexita Aromata Deskriptory
 Chuť 0 1 2 3 4 5 Sladkost Kyselost Trísloviny Deskriptory 	 Vady 0 1 2 3 4 5 Korek Oxidace Ostatní Poznámky
 Závěr 0 1 2 3 4 5 Harmonie Dochůt Potencial Hodnotící 	

Schéma 2 ke kapitole: Záznam a interpretace: degustační protokol, statistika a shoda hodnotitelů

Degustační protokol je základní nástroj, který převádí subjektivní senzorický zážitek na srovnatelný záznam. V profesionální praxi v ČR i v evropských soutěžích se používají strukturované formuláře navázané na školení hodnotitelů a na metodiky typu OIV nebo národní varianty 100bodové či 20bodové stupnice. Cílem není potlačit individualitu vjemu, ale standardizovat jazyk, pořadí kroků a způsob přiřazení intenzit a kvalitativních soudů tak, aby bylo možné rozhodovat o šaržích, kupážích, uvolnění vína na trh i o soutěžních medailích.

Záznam by měl být členěn do tří logických částí: identifikace vzorku a podmínek, senzorický popis a hodnotící závěr. Identifikační část obsahuje kód vzorku, ročník, odrůdu nebo kategorii (jakostní, VOC, pozdní sběr, kabinet, sekt), typ uzávěru, datum otevření, teplotu podávání, typ sklenky a případné dekantační podmínky. Tyto údaje nejsou administrativní detail; teplota posouvá volatilitu esterů a terpenů, sklenka ovlivní koncentraci aromat v hrdle, dekantace může změnit reduktivní tóny a vnímanou tríslovinu. U šumivých vín se

zapisuje i tlaková kategorie, způsob výroby (tradiční metoda, tanková), doba na kalech a intenzita perlení.

Senzorická část je postavena na konzistentním pořadí. Vizuální posouzení zahrnuje čírost, intenzitu barvy, odstín a viskozitu. U bílých vín se sleduje přechod od zelenkavých tónů přes citronové až po zlaté a jantarové, které mohou naznačovat zrání, oxidaci nebo botrytické vlivy. U červených vín se odstín od fialové přes rubínovou až po cihlovou váže na antokyany, polymeraci fenolů a technologii (macerace, mikrooxidace, sud). Viskozita může korelovat s alkoholem a extraktem, ale je třeba ji interpretovat opatrně, zejména u vín s vyšším glycerolem či zbytkovým cukrem.

Aromatický profil se zapisuje ve dvou rovinách: intenzita a kvalita. Doporučuje se oddělit první dojem (bez kroužení) a po provzdušnění (po kroužení), protože se odlišně uplatňují těkavé thioly, estery a vyšší alkoholy. V české a středoevropské praxi je běžné používat slovník spojený s odrůdami (např. ryzlink – citrus, petrol; sauvignon – angrešt, bez; veltlín – bílý pepř), ale profesionální protokol musí umožnit i technologické a vady: redukce (H₂S, merkaptany), oxidace (acetaldehyd, ořech), těkavé kyseliny (octový tón), korková vada (TCA), brettanomyces (stáj, hřebíček), myšina, světelná pachuť u bílých lahví. Zapisuje se i typ aromat (primární odrůdové, sekundární fermentační, terciární zrání v lahvi či sudu), protože je to důležité pro rozhodnutí o stylu a vhodnosti pro trh.

Chuťové hodnocení rozlišuje sladkost, kyseliny, alkohol, třísloviny, perlení (u šumivých), tělo a extrakt, aromatickou intenzitu v ústech a délku dochuti. V evropském kontextu je zásadní důsledně oddělit „intenzitu“ od „kvality“: vysoká kyselina může být u ryzlinku z chladnější polohy znakem typičnosti, u jiného stylu však působit nevyváženě. Třísloviny se hodnotí nejen množstvím, ale i texturou (jemné vs. hrubé) a zralostí (zelené vs. sladké), což úzce souvisí s fenolickou zralostí hroznů, délkou macerace, použitím celých hroznů a prací se sudem. U červených vín se doporučuje zapisovat i vnímanou zralost ovoce a míru dřeva (vanilin, toast, kouř), aby bylo možné odlišit vliv barrique od odrůdového projevu.

Závěrečná část protokolu shrnuje harmonii, typičnost a potenciál zrání. V provozní praxi vinařství se často doplňuje doporučení: vhodnost pro kupáž, korekční kroky (např. práce s kyselinou, scelování šarží s odlišnou tříslovinou), potřeba dalšího ležení na kalech, nebo naopak riziko oxidace. U hodnocení pro trh se přidává popis cílové gastronomie a ideálního servisního okna.

Protokol má být kompatibilní se statistikou. To znamená používat škály s jasnou interpretací: intenzity například 0–5, kvalita 0–5, nebo přímé bodování 50–100 s rozpisem kategorií (vzhled, vůně, chuť, celkový dojem). Důležité je dopředu definovat, zda hodnotitelé dávají „absolutní“ body (vázané na interní standard) nebo „relativní“ body (v rámci flightu). V soutěžích se typicky používá relativní rámeček, ale s kalibračním vzorkem na začátku komise, aby se minimalizoval posun stupnice.

Zpracování dat začíná kontrolou kvality: detekce chyb zápisu, chybějících hodnot, záměn kódů. Následuje agregace: průměr, medián, ořezaný průměr (trimmed mean) a směrodatná odchylka. Medián a ořezaný průměr jsou v degustaci často vhodnější než prostý průměr, protože tlumí vliv extrémních hodnot. Praktická metoda v komisích je vyloučení jednoho nejvyššího a jednoho nejnižšího bodu při pěti hodnotitelích, případně z-score kontrola odlehklých hodnot. U interních panelů je žádoucí sledovat dlouhodobě i drift hodnotitele: pokud jeden degustátor systematicky hodnotí o 3–5 bodů níže než panelový průměr, je vhodné provést recalibraci.

Klíčovým pojmem je shoda hodnotitelů. Nestačí, že se panel shodne na průměrném bodu; důležité je, zda se hodnotitelé shodují v pořadí vzorků, v identifikaci vad a v popisu klíčových atributů (kyselina, tříslovina,

redukce, oxidace). Pro ordinalní data (pořadí) se používá Kendallovo W, pro nominální klasifikace (vada ano/ne, typ aromatu) Cohenovo nebo Fleissovo kappa, pro intervalové bodování se hodí intratřídní korelace (ICC) a jednoduché metriky jako průměrná absolutní odchylka od mediánu. V komerční praxi bývá nejpraktičtější kombinace: ICC pro celkové skóre a kappa pro vady, protože právě vady mají největší ekonomický dopad.

Interpretace shody musí respektovat styl a technologii. U naturálních či minimálně sířených vín bývá variabilita aromat vyšší a některé fenomény (těkává kyselina, redukce) mohou být v malé míře vnímány jako součást stylu; panel musí mít jasné prahové hodnoty, kdy jde o vadu. V českém a evropském vinařství se typicky pracuje s legislativními limity (např. těkavé kyseliny) a současně se senzorickými prahy, které se liší podle matrice vína (alkohol, cukr, fenoly). Proto protokol často obsahuje i kolonku „vnímání“ a „závažnost“, aby šlo oddělit detekci od dopadu na kvalitu.

Doporučený workflow degustace, který podporuje dobrou statistiku, je následující: (1) Příprava místnosti a sklenic, kontrola teploty a neutralita prostředí. (2) Randomizace pořadí a kódování vzorků, aby se minimalizovaly očekávání (odrůda, cena, vinař). (3) Kalibrační vzorek pro panel, krátká diskuse jen o škále a terminologii, ne o bodech. (4) Tiché individuální hodnocení, záznam intenzit a bodů. (5) Sběr dat, rychlá kontrola odlehlých hodnot, případně opakování sporných vzorků. (6) Panelová diskuse zaměřená na popis a vady, nikoli na vyjednávání bodů; cílem je zlepšení budoucí shody. (7) Statistický výstup a archivace.

Vinařská technologie a chemie se do interpretace promítají přímo. Například vyšší vnímaná kyselina může být výsledkem nižšího pH a vyššího obsahu kyseliny vinné, ale i nízkého zbytkového cukru a absence malolaktické fermentace. Popis „krémovosti“ může souviset s batonáží a mannoproteiny z kvasinek. „Kouřové“ či „toastové“ tóny jsou často produktem sudu (ligninové deriváty), zatímco „petrolej“ u ryzlinku souvisí s TDN při zrání. Správný protokol proto umožňuje zachytit nejen co hodnotitel cítí, ale i pravděpodobný technologický původ, což je cenné při rozhodování ve sklepech.

Výsledkem profesionální kapitoly záznamu a interpretace je schopnost převést degustační sezení na rozhodnutí podložené daty: vybrat šarže pro VOC, nastavit kupáž s požadovanou strukturou kyselin a tříslovin, odhalit rizika oxidace nebo kontaminace *brettanomyces*, a současně udržet panel dlouhodobě kalibrováný. Nejlepší praxe v evropském kontextu je kombinovat přísně strukturovaný protokol, průběžné školení na referenčních vůních a chutích a pravidelnou statistickou kontrolu shody, protože teprve souhra těchto tří složek dává degustaci profesionální váhu.

Tabulkové shrnutí:

Vybrané metriky shody hodnotitelů a jejich použití v praxi degustace

Metrika | Typ dat | Co měří | Praktické použití ve vinařství

ICC (intratřídní korelace) | Intervalová skóre (např. 50–100) | Konzistenci bodování napříč hodnotiteli | Stabilita panelu při uvolňování šarží, s

Kendallovo W | Pořadí vzorků (ordinalní) | Shodu v rankingu vzorků | Výběr nejlepších cuvée pro prezentaci, f

Fleissovo kappa | Kategorie (např. vada ano/ne, typ aromat) | Shodu v klasifikaci mezi více hodnotiteli | Monitoring vad (korek, brett, oxidace) a

Medián + MAD (medián absolutních odchylek) | Intervalová skóre | Robustní variabilitu bez vlivu extrémů |

Rychlá kontrola odlehlých hodnot v inter

Ořezaný průměr (trimmed mean) | Intervalová skóre | Průměr po odstranění extrémů | Vyhodnocení komisí při 5–7 hodnotitelích



Vybrané metriky shody hodnotitelů a jejich použití v praxi degustace

Metrika	Typ dat	Co měří	Praktické použití ve vinařství
ICC (intratřídní korelace)	Intervalová skóre (např. 50–100)	Konzistenci bodování napříč hod	Stabilita panelu při uvolňování šarží, s
Kendallovo W	Pořadí vzorků (ordinalní)	Shodu v rankingu vzorků	Výběr nejlepších cuvée pro prezentaci, f
Fleissovo kappa	Kategorie (např. vada ano/ne, typ	Shodu v klasifikaci mezi více hod	Monitoring vad (korek, brett, oxidace) a
Medián + MAD (medián absolutn	Intervalová skóre	Robustní variabilitu bez vlivu extr	Rychlá kontrola odlehlých hodnot v inter
Ořezaný průměr (trimmed mean)	Intervalová skóre	Průměr po odstranění extrémů	Vyhodnocení komisí při 5–7 hodnotitelích