植 物 学 题 库

Botany Question Bank

共 1357 道题

题库概览

题目类型	数量
单选题	562
多选题	66
判断题	684
填图题	18
填图选择题	27
合计	1357

ANXSG

原版题库（融智云考系统）

安农学习时光 技术支持

提取自

融智云考学生练习系统

2024/5/11

ANXSG

ANXSG

单选题

共 562 题

1

凡叶柄着生长在叶片背面的中央或边缘内，称（　　）叶。

A．肾形
B．菱形
C．盾形
D．扇形

答案：C

2

向日葵茎的初生结构中，由于存在（　　）既起了支持作用又不影响茎生长。

A．表皮组织
B．厚壁组织
C．皮层薄壁组织
D．厚角组织

答案：D

3

（　　）茎的构造中，维管束大体呈内外两环排列。

A．玉米
B．小麦
C．高粱
D．甘蔗

答案：B

4

被子植物的雄配子体是指（　　）。

A．小孢子
B．成熟花粉粒
C．雄蕊
D．精子

答案：B

5

使根或茎发生次生加粗的组织是（　　）。

A．原生分生组织
B．基本分生组织
C．居间分生组织
D．侧生分生组织

答案：D

6

被子植物无配子生殖的胚来自（　　）。

A．珠被或珠心细胞
B．助细胞、反足细胞或中央细胞
C．大孢子母细胞
D．未受精的卵细胞

答案：B

7

构成雌蕊的单位是（　　）。

A．心皮
B．子房
C．胎座
D．子房室

答案：A

8

（　　）是幼花粉囊壁的最内一层细胞。

A．表皮

ANXSG

B ．纤维层
C ．中层
D ．绒毡层

答案：D

9

小麦花由（　　）组成。

A ．花被
B ．小苞片
C ．苞片
D ．总苞

答案：C

10

下列属于葫芦科的植物是（　　）。

A ．香樟
B ．荠菜
C ．白玉兰
D ．南瓜

答案：D

11

百合的胎座是（　　）。

A ．中轴胎座
B ．侧膜胎座
C ．边缘胎座
D ．特立中央胎座

答案：A

12

枝条外表常可见一些白色或褐色的斑点称为（　　），是枝条与外界气体交换的通道。

A ．皮孔
B ．气孔
C ．穿孔
D ．纹孔

答案：A

13

一朵花中具六枚离生雄蕊，两轮着生，外轮两枚花丝较短，内轮四枚花丝较长，这样四长二短的雄蕊称为四强雄蕊，如（　　）的雄蕊。

A ．菊科
B ．锦葵科
C ．十字花科
D ．豆科

答案：C

14

传粉指花药中花粉借助于外力传递到（　　）的过程。

A ．柱头
B ．花柱
C ．子房
D ．花托

答案：A

15

被子植物生活史中，配子体阶段始于（　　）。

A ．受精卵
B ．成熟花粉、成熟胚囊
C ．大、小孢子
D ．雌、雄配子

ANXSG

答案：C

16

茎木质部无输导功能的是（　　）。

A ．边材
B ．晚材
C ．早材
D ．心材

答案：D

17

植物根和茎中，各种初生组织在次生生长产生的压力之下遭受破坏，但（　　）例外。

A ．初生木质部
B ．初生韧皮部
C ．表皮
D ．皮层

答案：A

18

在（　　）前，为了促进生根，常使用一些生长素。

A ．扦插
B ．分离繁殖
C ．压条
D ．嫁接

答案：A

19

禾本科植物根内皮层细胞具五面增厚，只有外切向壁是薄的，位于原生木质部顶端的细胞通常是薄壁的，这个细胞为（　　）。

A ．凯氏带
B ．薄壁细胞
C ．通道细胞
D ．泡状细胞

答案：C

20

叶脱落后在枝条上留下的痕迹为（　　）。

A ．叶痕
B ．叶迹
C ．束痕
D ．叶隙

答案：A

21

从叶的解剖结构上看，夹竹桃属于（　　）。

A ．旱生植物
B ．中生植物
C ．阳地植物
D ．阴地植物

答案：A

22

水生被子植物茎的结构特征是（　　）。

A ．表皮形成根毛
B ．机械组织发达
C ．通气组织发达
D ．木质部发达

答案：C

ANXSG

23

根部维管形成层产生之初为(　　)。

A . 圆环
B . 环状
C . 条状
D . 波状

答案: C

24

(　　)是植物界中有性生殖最进化的形式。

A . 接合生殖
B . 双受精作用
C . 无融合生殖
D . 孢子生殖

答案: B

25

具根、茎、叶的桃树幼苗(　　)。

A . 为配子体,处于无性世代
B . 为配子体,处于有性世代
C . 为孢子体,处于无性世代
D . 为孢子体,处于有性世代

答案: C

26

植物从第一朵花开放到最后一朵花开毕所经历的时间称(　　)。

A . 花期
B . 盛花期
C . 初花期
D . 花时

答案: A

27

因后熟作用而休眠的种子,用(　　)处理可打破休眠。

A . 水冲洗
B . 机械方法
C . 浓硫酸
D . 赤霉素

答案: D

28

侧根起源于中柱鞘,这种方式称为(　　)。

A . 内始式
B . 外起源
C . 内起源
D . 外始式

答案: C

29

外稃相当于(　　)。

A . 花被
B . 小苞片
C . 苞片
D . 总苞

答案: C

30

合点是(　　)汇合的部位。

A . 珠被、珠孔、珠柄
B . 珠被、珠心、珠柄

ANXSG

C ．珠被、珠心、珠孔
D ．珠心、珠柄、珠孔

答案：B

31

菊科植物不具(　　)。
A ．头状花序
B ．冠毛
C ．单体雄蕊
D ．总苞

答案：C

32

导管分子端壁上具有(　　)。
A ．穿孔
B ．纹孔
C ．气孔
D ．筛孔

答案：A

33

落叶植物叶的离层产生是由于(　　)。
A ．气候逐渐变冷
B ．日照逐渐变短
C ．土壤中缺少水分
D ．空气变干燥

答案：B

34

颖果与瘦果的区别是颖果(　　)。
A ．含二粒以上的种子
B ．果皮与种皮愈合
C ．果皮与种皮是分离的
D ．果皮膜质化

答案：B

35

一个花粉母细胞经过减数分裂最后发育成(　　)。
A ．四个花粉粒
B ．三个花粉粒
C ．一个花粉粒
D ．二个花粉粒

答案：A

36

下列属于茄科的植物是(　　)。
A ．樱桃
B ．葫芦
C ．柑橘
D ．茄

答案：D

37

禾本科植物叶片和叶鞘相连接处的腹面有一膜质向上突起的片状结构,称(　　)。
A ．叶舌
B ．叶耳
C ．叶枕
D ．叶环

答案：A

ANXSG

38

幼苗子叶留土的主要原因是种子萌发时哪一部分几乎不伸长?(　　)

A . 下胚轴

B . 胚根

C . 胚芽

D . 上胚轴

答案: A

39

根的木栓形成层最初发生在(　　)。

A . 中柱鞘

B . 外皮层

C . 内皮层

D . 表皮

答案: A

40

(　　)是同功器官。

A . 叶卷须和叶刺

B . 茎卷须和叶卷须

C . 球茎和茎卷须

答案: B

41

水稻茎的维管束属于(　　)。

A . 外韧维管束和有限维管束

B . 外韧维管束和无限维管束

C . 周木维管束

D . 双韧维管束和无限维管束

答案: A

42

在方形(如蚕豆)或多棱形(如芹菜)的茎中,棱角部分常分布有(　　)。

A . 厚角组织

B . 厚壁组织

C . 薄壁组织

D . 石细胞

答案: A

43

一般双子叶植物茎的维管束是(　　)。

A . 双韧维管束

B . 周韧维管束

C . 有限外韧维管束

D . 无限外韧维管束

答案: D

44

种子内贮藏营养的结构是(　　)。

A . 胚乳

B . 胚乳或子叶

C . 子叶

D . 胚

答案: B

45

水稻和小麦等禾本科植物拔节、抽穗时,茎迅速长高,是借助(　　)的活动。

A . 顶端分生组织

B . 侧生分组织

C . 次生分生组织

ANXSG

D ．居间分生组织

答案：D

46

蒲公英叶呈莲座状，是因为（　　）。

A ．无茎

B ．茎仅具一个节

C ．节间极短

D ．具地下茎

答案：C

47

根据活动状态的不同，芽可分为（　　）。

A ．叶芽和花芽

B ．定芽和不定芽

C ．休眠芽和活动芽

D ．裸芽和鳞芽

答案：C

48

茎中次生射线是指（　　）。

A ．纺锤状原始细胞

B ．维管射线

C ．韧皮纤维

D ．髓射线

答案：B

49

将来同时发育为枝、叶和花或花序的芽称为（　　）。

A ．叶芽

B ．顶芽

C ．花芽

D ．混合芽

答案：D

50

凤梨（菠萝）的果实的食用部分主要是（　　）。

A ．花序轴

B ．果皮

C ．果皮和种皮

D ．花被

答案：A

51

禾本科植物茎的分枝方式比较特殊，它们在接近地面外发生分枝同时产生不定根，这种分枝方式称为（　　）。

A ．分生

B ．分叉

C ．分枝

D ．分蘖

答案：D

52

根毛和表皮毛属于（　　）。

A ．两者都为吸收组织

B ．两者都为保护组织

C ．前者为吸收组织，后者为保护组织

D ．前者为保护组织，后者为吸收组织

答案：C

ANXSG

53

与周皮有关的结构不包括(　　)。

A . 木栓
B . 填充组织
C . 皮孔
D . 气孔

答案: D

54

贮藏种子的最合适条件是(　　)。

A . 低温
B . 低温和干燥
C . 干燥
D . 低温和避光

答案: B

55

以下描述中不符合禾本科植物茎结构特点的是(　　)。

A . 没有周皮的形成
B . 外皮层通常厚壁化
C . 不能进行次生生长
D . 内皮层细胞常五面加厚

答案: D

56

伴胞存在于(　　)。

A . 木质部
B . 韧皮部
C . 皮层
D . 髓部

答案: B

57

根的木栓形成层最初由(　　)细胞恢复分裂而形成。

A . 表皮
B . 外皮层
C . 内皮层
D . 中柱鞘

答案: D

58

被子植物和裸子植物种子在形态构造上的区别是前者具有以下哪组特点?(　　)

A . 子叶数目1~2片,胚乳多为三倍体,胚大多为直线型
B . 子叶数目2片或2片以上,胚乳多为三倍体
C . 子叶数目2片或2片以上,胚乳为单倍体;胚大多为直线型
D . 子叶数目1~2片,胚乳多为三倍体

答案: D

59

下列结果不属于花托的是(　　)。

A . 雌雄蕊柄
B . 花盘
C . 子房柄
D . 花柄

答案: D

60

桃叶序的公式为2/5,这表明(　　)。

A . 绕茎二周,有5片叶,开度为900°
B . 绕茎二周,有5片叶,开度为144°

ANXSG

C . 绕茎五周，有2片叶，开度为900°
D . 绕茎五周，有2片叶，开度为144°

答案：B

61

栅栏组织属于（ ）。

A . 保护组织
B . 厚壁组织
C . 分泌组织
D . 同化基本组织

答案：D

62

双子叶植物茎的初生结构中，维管束一般是（ ）。

A . 环状排列
B . 辐射排列
C . 散生状态
D . 内外两轮排列

答案：A

63

干柱头的表面存在（ ）薄膜。

A . 脂肪
B . 糖类
C . 蛋白质
D . 核酸

答案：C

64

珠柄、珠心、珠孔的位置排列于同一直线上的胚珠称为（ ）。

A . 横生胚珠
B . 直生胚珠
C . 弯生胚珠
D . 倒生胚珠

答案：B

65

下列哪些部分与根的伸长生长有直接关系？（ ）

A . 根冠和生长点
B . 只有生长点
C . 伸长区和根毛区
D . 生长点和伸长区

答案：D

66

位于次生木质部内的射线称为（ ）。

A . 韧皮射线
B . 髓射线
C . 射线原始细胞
D . 木射线

答案：D

67

聚合果与单果的区别是聚合果由（ ）。

A . 一个花序发育成的果实
B . 一个雌花序发育成的果实
C . 花托上的每一个离生雌蕊发育成的小果，小果聚生在花托上
D . 花轴发育成的果实

答案：C

ANXSG

68

胚囊中，能从珠心吸收和转运营养物质到胚囊，引导花粉管生长的细胞是（　　）。

A ．中央细胞

B ．助细胞

C ．极核

D ．反足细胞

答案：B

69

中柱鞘细胞可产生（　　）。

A ．部分维管形成层和木栓形成层

B ．不定芽和不定根

C ．侧根

D ．其他选项都是

答案：D

70

两轮花被色泽、形状等方面并无区分，称为（　　），如百合花。

A ．两被花

B ．单被花

C ．同被花

D ．重被花

答案：C

71

束中形成层来自（　　）。

A ．皮层的薄壁细胞

B ．中柱鞘

C ．原形成层

D ．束间的薄壁细胞

答案：C

72

下面哪一个和卵细胞合称为卵器？（　　）

A ．中央细胞

B ．极核

C ．反足细胞

D ．助细胞

答案：D

73

花粉囊壁层从外至内的组成是（　　）。

A ．表皮，中层，药室内壁，绒毡层

B ．药室内壁，表皮，中层，绒毡层

C ．绒毡层，中层，药室内壁，表皮

D ．表皮，药室内壁，中层，绒毡层

答案：D

74

蕨类植物的配子体特称为（　　）。

A ．叶状体

B ．原叶体

C ．茎叶体

D ．原丝体

答案：B

75

叶柄下芽属（　　）。

A ．顶芽

B ．不定芽

ANXSG

C . 腋芽
D . 鳞芽

答案：C

76

豆科植物具(　　)。

A . 蓇葖果
B . 荚果
C . 坚果
D . 连萼瘦果

答案：B

77

双子叶植物种子的胚包括(　　)。

A . 胚根、胚芽、胚轴
B . 胚根、胚轴、子叶、胚乳
C . 胚根、胚轴、胚芽、子叶
D . 胚根、胚芽、子叶、胚乳

答案：C

78

单子叶植物茎的维管束为(　　)。

A . 双韧维管束
B . 无限外韧维管束
C . 有限外韧维管束
D . 周木维管束

答案：C

79

贮藏种子因保管不善受潮而发热,会引起什么后果?(　　)

A . 种子生活力下降
B . 种子生活力上升
C . 有利于提高出苗率
D . 无影响

答案：A

80

多室子房隔膜是(　　)。

A . 心皮的一部分
B . 胎座
C . 单层细胞
D . 心皮上的突起物

答案：A

81

茎的初生木质部发育方式属于(　　)。

A . 外始式
B . 内起源
C . 内始式
D . 外起源

答案：C

82

以下结构哪一个不是来源于中柱鞘?(　　)

A . 不定芽
B . 侧根
C . 维管形成层和木栓形成层
D . 次生韧皮部

答案：D

ANXSG

83

纤维属于(　　)。

A . 厚角细胞

B . 石细胞

C . 厚壁细胞

D . 薄壁细胞

答案: C

84

荔枝、龙眼的食用部分是种皮,它是由什么发育而来的?(　　)

A . 珠心

B . 珠被

C . 子房内壁

D . 珠柄

答案: D

85

在根茎过渡区,后生木质部的位置(相对于原生木质部)(　　)。

A . 由内方移向外方

B . 由外方移向内方

C . 不变

D . 由中央移向侧面

答案: A

86

颖片相当于(　　)。

A . 花被

B . 小苞片

C . 苞片

D . 总苞

答案: D

87

(　　)属于无限花序中的复合花序。

A . 穗状花序

B . 多歧聚伞花序

C . 头状花序

D . 圆锥花序

答案: D

88

草莓的果属于(　　)。

A . 单果

B . 聚花果

C . 复果

D . 聚合果

答案: D

89

小麦的子叶又称(　　)。

A . 盾片

B . 糊粉层

C . 胚芽鞘

D . 外胚叶

答案: A

90

根据(　　),茎端分生区下方形成初步分化的初生分生组织;原套的表面细胞分化为原表皮,周围分生组织和肋状分生组织分化形成基本分生组织和原形成层。

A . 原体细胞学说

ANXSG

B ．不活动中心
C ．细胞组织分区学说
D ．原套细胞学说

答案：C

91

禾本科植物的气孔器由（　　）组成。

A ．哑铃保卫细胞
B ．肾形保卫细胞
C ．近菱形的副卫细胞和哑铃状保卫细胞
D ．近菱形的副卫细胞和肾形保卫细胞

答案：C

92

下列花序中，花的开放次序由下向上的是（　　）。

A ．伞房花序
B ．蝎尾花序
C ．多歧聚伞花序
D ．轮伞花序

答案：A

93

（　　）是胚囊中最大的一个细胞。

A ．反足细胞
B ．助细胞
C ．卵细胞
D ．中央细胞

答案：D

94

茄、番茄花药开裂方式是（　　）。

A ．纵裂
B ．横裂
C ．孔裂
D ．瓣裂

答案：C

95

与木质部无关的功能是（　　）。

A ．无机盐吸收
B ．支持作用
C ．转运无机离子
D ．转运水分

答案：A

96

蓖麻种子属于（　　）类型。

A ．双子叶无胚乳种子
B ．单子叶有胚乳种子
C ．单子叶无胚乳种子
D ．双子叶有胚乳种子

答案：D

97

双子叶植物茎表皮细胞的外壁常（　　）。

A ．栓质化
B ．矿质化
C ．木质化
D ．角质化

答案：D

ANXSG

98

花程式中缩写“P”，表示(　　)。

A ．花被

B ．花冠

C ．花萼

D ．雄蕊群

答案：A

99

西瓜的食用部分与(　　)的果实一样，均由发达的胎座发育而来。

A ．番茄

B ．柑桔

C ．黄瓜

D ．南瓜

答案：A

100

棉花老茎横切面，理论上从外而内可依次观察到的结构是(　　)。

A ．周皮，皮层，初生韧皮部，初生木质部，维管形成层，次生韧皮部，次生木质部，髓

B ．周皮，皮层，初生韧皮部，次生韧皮部，维管形成层，次生木质部，髓，初生木质部

C ．周皮，皮层，初生木质部，次生木质部，维管形成层，次生韧皮部，髓，初生韧皮部

D ．周皮，皮层，初生韧皮部，次生韧皮部，维管形成层，次生木质部，初生木质部，髓

E ．周皮，皮层，次生韧皮部，初生韧皮部，维管形成层，初生木质部，次生木质部，髓

答案：D

101

菠萝(凤梨)的供食用部分是(　　)。

A ．肉质化的花轴和子房

B ．肉质化的花轴

C ．肥厚多汁的花萼

D ．肉质化的中果皮

答案：B

102

导管横切面中的特点是(　　)。

A ．细胞壁薄，细胞腔大，细胞质丰富

B ．细胞壁厚，细胞腔小，原生质体解体

C ．细胞壁厚，细胞质丰富

D ．细胞次生壁不均匀加厚，木质化壁具花纹，原生质体解体

答案：D

103

下列哪个形态特征不属于筛管所具有?(　　)

A ．长形的生活细胞

B ．组织分子相连接的横壁形成筛板

C ．细胞成熟后，细胞核消失

D ．细胞特化过程中，次生壁不均匀加厚，原生质逐渐解体

答案：D

104

下列属于蔷薇科的植物是(　　)。

A ．桑葚

B ．蚕豆

C ．黄瓜

D ．苹果

答案：D

105

单体雄蕊是(　　)。

A ．一个雄蕊

ANXSG

B ．雄蕊(9)+1
C ．雄蕊花丝连合，花药分离
D ．雄蕊花丝、花药都连合

答案：C

106

小麦幼苗的第一片真叶是(　　)。

A ．子叶
B ．胚芽鞘
C ．外胚叶
D ．由顶端分生组织产生

答案：D

107

核型胚乳中胚乳细胞形成的方式是(　　)。

A ．胚乳一直保持游离核状态
B ．核和壁同时产生
C ．先产生核后产生壁
D ．先产生壁后产生核

答案：C

108

花柄长短不等，下部分花柄较长，越向上部，花柄越短，各花排在同一平面上称(　　)。

A ．伞房花序
B ．头状花序
C ．伞形花序
D ．复伞形花序

答案：A

109

禾本科植物茎的维管束不包括以下哪个组成?(　　)

A ．初生木质部
B ．初生韧皮部
C ．维管束鞘
D ．束中形成层

答案：D

110

(　　)只能由单心皮子房发育而来。

A ．核果和荚果
B ．荚果
C ．双悬果
D ．蒴果和颖果

答案：B

111

下列哪些属于内起源(　　)。

A ．根瘤形成的过程
B ．韧皮部的分化方式
C ．侧根形成的方式
D ．木质部的分化方式

答案：C

112

叶片中可进行光合作用的结构是(　　)。

A ．栅栏组织
B ．表皮
C ．栅栏组织和海绵组织
D ．海绵组织

答案：C

ANXSG

113

植物茎中，大部分初生组织在次生生长产生的压力下遭到破坏，但（　　）例外。

A ．表皮

B ．初生木质部

C ．初生韧皮部

D ．维管束

答案：B

114

按照芽发生位置不同可分为（　　）。

A ．裸芽和鳞芽

B ．定芽和不定芽

C ．叶芽和花芽

D ．活动芽和休眠芽

答案：B

115

种子中淀粉、蛋白质和脂肪的含量由于植物种类不同而有差异，下列哪些植物种子中的贮藏物主要是脂肪？（　　）

A ．棉、芝麻、花生、向日葵、油菜

B ．芝麻、花生、向日葵、油菜、荞麦

C ．蓖麻、水稻、大豆、小麦、玉米

D ．水稻、棉、油菜、大豆、蓖麻

答案：A

116

属于分生组织的是（　　）。

A ．原周皮

B ．表皮

C ．原表皮

D ．周皮

答案：C

117

茎中维管形成层向外向内分别分裂分化产生（　　）。

A ．次生韧皮部和次生木质部

B ．次生木质部和次生韧皮部

C ．初生韧皮部和初生木质部

D ．初生木质部和初生韧皮部

答案：A

118

猪笼草的捕虫囊是（　　）的变态。

A ．花

B ．叶

答案：B

119

有些树种的木材，在一个生长轮（车轮）内，早材的导管腔比晚材的导管管腔大得多，导管比较整齐地沿生长轮环状排列，这种森材称为（　　）。

A ．环孔材

B ．散孔材

C ．半环孔材

D ．半散孔材

答案：A

120

茎的维管形成层可以细分为束中形成层与束间形成层，从它们在植物体中所处的位置以及来源性质上看，二者（　　）。

A ．构成侧生分生组织，但束中形成层属次生分生组织，束间形成层属于初生分生组织

ANXSG

B ．均为侧生分生组织，属于初生分生组织性质
C ．并非侧生分生组织，而是次生分生组织
D ．构成侧生分生组织，束中形成层具有初生分生组织的性质，束间形成层却是典型的次生分生组织

答案：D

121

（　　）经过减数分裂形成四个小孢子（四分体）。

A ．造孢细胞
B ．孢原细胞
C ．花粉母细胞
D ．周缘细胞

答案：C

122

花药中绒毡层的细胞来自（　　）。

A ．造孢细胞
B ．花粉母细胞
C ．周缘细胞
D ．四分体

答案：C

123

所有植物的种子均具有（　　）。

A ．胚乳
B ．外胚乳
C ．相同的子叶数
D ．胚

答案：D

124

冬瓜、南瓜是由子房和花托发育而成的假果，供食用部分是（　　）。

A ．果皮
B ．胎座
C ．花托
D ．果皮和胎座

答案：A

125

最典型的自花传粉为（　　）。

A ．雌雄异长
B ．闭花受精
C ．雌雄异位
D ．自花不孕

答案：B

126

在胚囊里卵不经受精，由助细胞或反足细胞，甚至由珠心细胞或珠被细胞直接发育成胚的现象，称为（　　）。

A ．无融合生殖
B ．双受精
C ．无孢子生殖
D ．无性生殖

答案：A

127

在植物生活周期中，与世代交替相联系并作为它们特征的两种重要过程是（　　）。

A ．有丝分裂，减数分裂
B ．有丝分裂，受精作用
C ．减数分裂，受精作用
D ．无丝分裂，有丝分裂

答案：C

ANXSG

128

种皮是由珠被发育而来，有的植物的种子具假种皮，它们是由以下何种结构发育来的？(　　)

A ．种皮上的表皮毛

B ．珠柄或胎座

C ．子房壁

D ．珠心

答案：B

129

以下哪一种因素不可能使种子失去生活力？(　　)

A ．胚细胞的衰退死亡

B ．酶物质的破坏

C ．贮藏物质的消耗

D ．种子的含水量维持在10%左右

答案：D

130

裸子植物靠(　　)输导水分。

A ．导管和管胞

B ．管胞

C ．筛管

D ．筛胞

答案：B

131

胚囊中的卵器一般指(　　)。

A ．二助细胞

B ．卵细胞

C ．卵细胞和三个反足细胞

D ．1个卵细胞和2个助细胞

答案：D

132

松树叶结构特点之一是(　　)。

A ．栅栏组织与海绵组织有明显分化

B ．通气组织发达

C ．叶内具内皮层

D ．表皮层无气孔

答案：C

133

蝶形花冠中最大的花瓣是旗瓣，合生的花瓣是(　　)。

A ．旗瓣

B ．翼瓣

C ．龙骨瓣

D ．唇瓣

答案：C

134

胚是构成种子主要的部分，它是由(　　)四部分组成。

A ．胚芽，胚根，胚乳和子叶

B ．胚芽，胚轴，胚根和子叶

C ．胚芽，胚轴，胚根和胚柄

D ．胚芽，胚轴，胚根和胚乳

答案：B

135

以下哪一种现象与生长素的作用无关？(　　)

A ．茎的伸长

B ．茎的加粗

ANXSG

C . 落叶
D . 侧根的形成

答案：C

136

植物茎木质部中无输导能力的是（　　）。

A . 早材
B . 晚材
C . 心材
D . 边材

答案：C

137

成熟植物细胞一般特点是（　　）。

A . 液泡小，细胞核小
B . 具中央大液泡，核小靠边
C . 液泡大，细胞核小
D . 液泡小，细胞核大

答案：B

138

双子叶植物茎内的次生木质部由（　　）分裂、生长和分化而成。

A . 束中形成层细胞
B . 束间形成层细胞
C . 纺锤状原始细胞
D . 射线原始细胞

答案：C

139

萼片通常在开花后即脱落，但也有直至果实成熟花萼依然存在的，称为（　　）。

A . 副萼
B . 总苞
C . 宿存萼
D . 合萼

答案：C

140

下列不属于薄壁组织的是（　　）。

A . 同化组织
B . 厚角组织
C . 贮藏组织
D . 吸收组织

答案：B

141

花序可分为两大类，即（　　）。

A . 穗状花序，肉穗花序
B . 伞状花序，伞形花序
C . 总状花序，无限花序
D . 无限花序，有限花序

答案：D

142

枝条与茎的区别是（　　）。

A . 枝条的节间比茎的长
B . 枝条是生长有叶和芽的茎
C . 枝条上无叶痕
D . 枝条的节间比茎的短

答案：B

ANXSG

143

根与茎皮层结构的主要区别是(　　)。

A . 根的皮层薄壁组织细胞壁薄

B . 茎的皮层薄壁组织细胞壁薄

C . 根的皮层薄壁组织细胞间隙大

D . 根具有内皮层

答案: D

144

棉的种子外有细长的绒毛,具(　　)的作用。

A . 适于风力传播

B . 保温

C . 防虫咬

D . 保水

答案: A

145

根毛区表皮细胞的主要作用是(　　)。

A . 吸收

B . 保护

C . 通气

D . 分泌

答案: A

146

雌蕊由以下哪些部分组成?(　　)

A . 柱头,花柱,子房

B . 花柱,胎座,子房

C . 花托,胎座,子房

D . 柱头,子房,胎座

答案: A

147

胚囊发育于(　　)。

A . 珠心

B . 珠被

C . 珠柄

D . 合点

答案: A

148

在筛板上,联络索穿过筛孔时,包在联络索外面的物质是(　　)。

A . 胼胝体

B . 侵填体

C . 树脂

D . 胼胝质

答案: D

149

(　　)种子的构成之一,为种子的外包被,由珠被发育形成,具保护作用。

A . 种脊

B . 种皮

C . 种脐

D . 种阜

答案: B

150

裸子植物输导水分和无机盐溶液的是靠(　　)。

A . 管胞

B . 导管

ANXSG

C . 筛分子
D . 筛管

答案：A

151

周皮包括（　　）。

A . 表皮和下皮
B . 表皮和皮层
C . 木栓层、木栓形成层和栓内层
D . 表皮和内皮

答案：C

152

二强雄蕊指的是（　　）。

A . 每朵花中，雄蕊六个，两短四长，如唇形科植物
B . 每朵花中，雄蕊四个，两长两短，如十字花科植物
C . 每朵花中，雄蕊四个，两长两短，如唇形科植物
D . 每朵花中，雄蕊六个，两长四短，如唇形科植物

答案：C

153

小麦种子萌发时，对胚乳内贮藏的物质加以分解和转运的结构是（　　）。

A . 外胚叶
B . 盾片
C . 上皮细胞
D . 糊粉层

答案：C

154

小花无梗着生在直立延长的花轴上（　　）。

A . 总状花序
B . 伞房花序
C . 穗状花序
D . 伞形花序

答案：C

155

在木材横切面上，年轮呈现（　　）。

A . “V”字形
B . 同心圆环
C . 梯状
D . 平行线

答案：B

156

沿腹缝和背缝两面开裂的单心皮干果称为（　　）。

A . 蒴果
B . 荚果
C . 骨突果
D . 角果

答案：B

157

禾本科植物茎中央常为（　　）。

A . 木质部
B . 髓腔
C . 髓或髓腔
D . 髓

答案：C

ANXSG

158

种子萌发的首要条件是(　　)。

A ．足够的氧气
B ．均衡的养料
C ．适当的温度
D ．充足的水分

答案：D

159

下列哪种植物根系类型不属于直根系?(　　)

A ．玉米
B ．大豆
C ．松
D ．棉花

答案：A

160

无效分蘖轴分枝(　　)。

A ．属高蘖位,不能抽穗结实
B ．属高蘖位,不能生长
C ．属低蘖位,不能抽穗结实
D ．属低蘖位,不能生长

答案：A

161

C4植物的维管束鞘细胞为(　　)。

A ．薄壁细胞,不含叶绿体
B ．厚壁细胞
C ．薄壁细胞,含较多的叶绿体
D ．薄壁细胞,含较少的叶绿体

答案：C

162

形成层通过径向分裂(　　)。

A ．使器官周径扩大
B ．产生次生木质部
C ．产生次生维管组织
D ．产生次生韧皮部

答案：A

163

叶片横切面上许多细胞排列疏松,间隙较多,细胞内含叶绿体,这些细胞属(　　)。

A ．皮层
B ．叶肉
C ．海绵组织
D ．栅栏组织

答案：C

164

豆角的胎座是(　　)。

A ．边缘胎座
B ．侧膜胎座
C ．中轴胎座
D ．特立中央胎座

答案：A

165

聚药雄蕊指的是(　　)。

A ．每朵花中,雄蕊多数,花丝、花药联合,如菊科植物
B ．每朵花中,雄蕊多数,花丝联合,花药分离,如向日葵

ANXSG

C ．每朵花中，雄蕊5枚，花丝分离，花药联合，如菊科植物
D ．每朵花中，雄蕊多数，花丝分离，花药联合，如棉花

答案：C

166

下列哪一特征不是植物对异花传粉的适应特征？(　　)

A ．自花可孕
B ．雌雄蕊异熟
C ．雌雄蕊异长或异位
D ．雌雄异株

答案：A

167

叶基二裂片向两侧外指，称(　　)。

A ．耳形
B ．箭形
C ．匙形
D ．戟形

答案：D

168

花萼常呈绿色，其结构与(　　)相似。

A ．叶
B ．茎
C ．根
D ．花瓣

答案：A

169

被子植物木质部主要由下列哪些细胞组成？(　　)

A ．筛管和伴细胞
B ．木栓和栓内层
C ．导管和木薄壁细胞
D ．中柱鞘和内皮层

答案：C

170

侧根起源于(　　)。

A ．表皮细胞
B ．皮层细胞
C ．中柱鞘细胞
D ．内皮层细胞

答案：C

171

根尖的原表皮、基本分生组织和原形成层将来分别分化为(　　)。

A ．表皮、皮层和副形成层
B ．表皮、皮层和中柱
C ．周皮、皮层和中柱
D ．表皮、皮层和形成层

答案：B

172

单雌蕊的子房可具有(　　)。

A ．侧膜胎座
B ．边缘胎座
C ．多心皮多室
D ．多心皮一室

答案：B

ANXSG

173

禾本科植物茎维管束中的气隙(气腔)是遭破坏了的(　　)。

A．原生韧皮部
B．后生韧皮部
C．原生木质部
D．束间形成层

答案：C

174

次生分生组织可由(　　)转变而成。

A．初生分生组织
B．原生分生组织
C．侧生分生组织
D．薄壁组织

答案：D

175

合子的第一次分裂通常是(　　)。

A．不均等的横裂
B．不均等的纵裂
C．均等的横裂
D．均等的纵裂

答案：A

176

被子植物维管组织间的过渡区存在于(　　)。

A．茎、叶之间
B．根、茎之间
C．枝、叶之间
D．芽、叶之间

答案：B

177

苹果等梨果的主要食用部分主要来自(　　)。

A．花筒(托杯)
B．珠被
C．子房壁
D．花序轴

答案：A

178

花药由(　　)组成。

A．花粉囊
B．表皮和维管束
C．药隔
D．花粉囊和药隔

答案：D

179

南瓜茎的维管束为(　　)。

A．双韧维管束
B．周木维管束
C．外韧维管束
D．周韧维管束

答案：A

180

种子中最主要的部分是(　　)。

A．子叶
B．种皮

ANXSG

C . 胚
D . 胚乳

答案：C

181

韭菜、葱叶割摘以后又能继续伸长生长是由于哪种组织的活动?(　　)

A . 顶端分生组织
B . 侧生分生组织
C . 次生分生组织
D . 居间分生组织

答案：D

182

周皮不包括以下哪个结构?(　　)

A . 栓内层
B . 木栓形成层
C . 次生木质部
D . 木栓层

答案：C

183

在正常气候条件,植物气孔一般(　　)。

A . 保持开张状态
B . 保持关闭状态
C . 随时开闭
D . 周期性开闭

答案：D

184

我们吃绿豆芽,主要吃的是(　　)。

A . 下胚轴
B . 上胚轴
C . 芽
D . 根

答案：A

185

荸荠(　　)的变态。

A . 叶
B . 茎
C . 根

答案：B

186

银杏叶的脉序为(　　)。

A . 平行脉
B . 网状脉
C . 叉状脉
D . 掌状脉

答案：C

187

按位置分,茎顶端的生长锥属于(　　)。

A . 初生分生组织
B . 次生分生组织
C . 原生分生组织
D . 顶端分生组织

答案：D

ANXSG

188

子叶出土幼苗，是由于（　　）的结果。

A ．胚芽伸长

B ．胚根伸长

C ．上胚轴伸长

D ．下胚轴伸长

答案：D

189

合子第一次分裂产生两个细胞，（　　）。

A ．近珠孔的为基细胞，较小，以后发育成胚

B ．远珠孔的为基细胞，较小，以后发育成胚

C ．近珠孔的为顶端细胞，较大，以后发育成胚柄

D ．远珠孔的为顶端细胞，较小，以后发育成胚

答案：D

190

番茄胚乳发育时，初生胚乳核分裂后随即产生细胞壁，形成胚乳细胞，这种胚乳称为（　　）胚乳。

A ．同时型

B ．细胞型

C ．核型

D ．沼生目型

答案：B

191

水稻和小麦叶片的叶肉细胞没有（　　）的分化。

A ．栅栏组织和海绵组织

B ．峰、谷、腰、环

C ．叶绿体

答案：A

192

双子叶植物茎皮层中近表皮的数层细胞可发育为厚角组织，其细胞为（　　）。

A ．死细胞

B ．内含叶绿体的活细胞

C ．栓质化细胞

D ．无叶绿体活细胞

答案：B

193

根的初生木质部在发育过程中，是由外向心逐渐分化成熟的，外方先成熟的部分为原生木质部，内方后成熟的为后生木质部，这种分化方式称为（　　）。

A ．外始式

B ．内起源

C ．内始式

D ．外起源

答案：A

194

树皮剥去后，树就会死亡，是因树皮不仅包括周皮还有（　　）。

A ．木质部

B ．韧皮部

C ．栓内层

D ．木栓形成层

答案：B

195

根瘤细菌与豆科植物根的关系是（　　）。

A ．共生

B ．寄生

ANXSG

C . 腐生
D . 竞争

答案：A

196

(　　)使器官加厚。

A . 平周分裂
B . 横向分裂
C . 径向分裂
D . 垂周分裂

答案：A

197

不活动中心位于根尖的(　　)。

A . 根冠
B . 分生区
C . 根
D . 三生根

答案：B

198

旱生植物体的结构特征表现在(　　)。

A . 叶片变小或退化
B . 茎肉质化
C . 表皮细胞角质层加厚
D . 叶片上缺少气孔

答案：D

199

茎的维管束发育方式有(　　)。

A . 初生韧皮部为外始式,初生木质部为内始式
B . 初生韧皮部为内始式,初生木质部为外始式
C . 初生韧皮部与初生木质部均为外始式
D . 初生韧皮部初生木质部为均为内始式

答案：A

200

桑椹是由一个雌蕊花序发育而成的复果,供食用部分是(　　)。

A . 肉质化的花轴
B . 花序
C . 肥厚多汁的花萼
D . 内陷的肉质化的花轴

答案：C

201

受精后完全由子房发育成的果实叫真果,以下哪种果实是真果?(　　)

A . 黄瓜
B . 苹果
C . 桃
D . 西瓜

答案：C

202

多体雄蕊指的是(　　)。

A . 每花中,雄蕊多数,花药联合成多束,如金丝桃
B . 每花中,雄蕊多数,花丝联合成多束,如蚕豆
C . 每花中,雄蕊多数,花丝联合成多束,如金丝桃
D . 每花中,雄蕊多数,花丝,花药联合成多束,如金丝桃

答案：C

ANXSG

203

依靠风为媒介传粉的花，称为风媒花，一般具以下特征（　　）。

A ．花被很小或退化，具鲜艳的色彩，不具香气或蜜腺，花粉粒小而轻

B ．花被很小或退化，不具鲜艳的色彩，不具香气或蜜腺，花粉表面粗糙

C ．花被很小或退化，不具鲜艳的色彩，不具香气或蜜腺，花粉粒小而轻

D ．花被很小或退化，不具鲜艳的色彩，但具香气或蜜腺，花粉粒小而轻

答案：C

204

茎上的叶和芽的发生属于（　　）。

A ．内起源

B ．外起源

C ．内始式

D ．外始式

答案：B

205

（　　）中需要割掉一圈或半圈树皮，以促使在被割皮处聚积大量养料，促进不定根生成。

A ．分离繁殖

B ．扦插

C ．压条

D ．嫁接

答案：C

206

（　　）是同源器官。

A ．茎卷须、鳞叶与叶刺

B ．茎刺、叶刺

C ．叶卷须、鳞叶与叶刺

答案：C

207

根与茎初生维管组织的差异主要是（　　）。

A ．根与茎的维管组织组成成分不同

B ．根中缺少原生木质部

C ．茎中缺少原生木质部

D ．初生木质部与初生韧皮部排列方式不同

答案：D

208

根冠的外层细胞不断脱落和解体，同时由于（　　），根冠得到补充。

A ．根冠细胞进行无丝分裂

B ．分生区的细胞不断进行无丝分裂

C ．根冠细胞进行有丝分裂

D ．分生区的细胞不断进行有丝分裂

答案：D

209

双子叶植物茎的初生结构特点主要是（　　）。

A ．具周皮

B ．维管束一般环状排列成一环

C ．具凯氏点

D ．具通道细胞

答案：B

210

葵花子是（　　）。

A ．骨突果

B ．核果

C ．瘦果

ANXSG

D . 坚果

答案: C

211

西瓜是由子房和花托一并发育而成的假果,供食用部分是( )。

A . 胎座

B . 果皮和胎座

C . 果皮

D . 花托

答案: A

212

双子叶植物的髓射线有( )。

A . 保护作用

B . 无特别作用

C . 储藏和横向运输作用

D . 支持作用

答案: C

213

复雌蕊是指一朵花( )。

A . 具有多个离生雌蕊

B . 由多个心皮合生成一个雌蕊

C . 一个心皮构成的雌蕊

D . 具有多个合生雌蕊

答案: B

214

细胞间隙是指( )。

A . 细胞间的胞间层溶解后的间隙

B . 失去原生质体的胞腔

C . 细胞上的小孔

D . 细胞中间的空腔

答案: A

215

裸子植物不具有的组织或结构是( )。

A . 管胞

B . 导管

C . 薄壁组织

D . 筛胞

答案: B

216

木本植物的一个年轮包括( )。

A . 可利用材和非利用材

B . 心材与边材

C . 早材与晚材

D . 硬材与软材

答案: C

217

石细胞的特点是( )。

A . 细胞壁厚,细胞腔大

B . 细胞壁薄,细胞腔大

C . 细胞壁厚,具纹孔道,细胞腔小

D . 细胞壁厚,细胞腔小

答案: C

ANXSG

218

南瓜的胎座属(　　)。

A . 中轴胎座

B . 侧膜胎座

C . 边缘胎座

D . 特立中央胎座

答案: B

219

下列植物中,哪些种子是有胚乳种子?(　　)

A . 棉、小麦、玉米

B . 小麦、花生、大豆

C . 蓖麻、棉、大豆

D . 蓖麻、玉米、小麦

答案: D

220

(　　)萌发的必要条件之一是光。

A . 苋菜

B . 烟草

C . 苋菜和菟丝子

D . 烟草和杜鹃

答案: D

221

用什么激素处理可以打破种子休眠?(　　)

A . 细胞分裂素

B . 赤霉素

C . 脱落酸

D . 激动素

答案: B

222

种子萌发过程最初的10个小时对什么敏感?(　　)

A . 缺氧

B . 缺肥

C . 低温

D . 缺水

答案: D

223

大多数植物茎中第一次木栓形成层发生的部位是(　　)。

A . 表皮

B . 皮层深处的细胞

C . 皮层的外层细胞

D . 中柱鞘

答案: C

224

(　　)植物的嫁接最容易。

A . 木本

B . 草本

C . 木质藤本

D . 草质藤本

答案: A

225

(　　)是花粉管进入子房的通道。

A . 花丝

B . 花托

ANXSG

C . 花柄
D . 花柱

答案：D

226

禾本科植物的花一般由（　　）组成。

A . 雌蕊、雄蕊、小穗轴
B . 雌蕊、雄蕊、稃片
C . 雌蕊、雄蕊、浆片
D . 雌蕊、雄蕊、颖片

答案：C

227

下列植物中，哪些种子为无胚乳种子？（　　）

A . 大豆、蓖麻、棉
B . 花生、大豆、玉米
C . 棉、花生、大豆
D . 玉米、花生、蓖麻

答案：C

228

胚柄的作用不包括（　　）。

A . 分化成胚根
B . 吸收营养转运至胚
C . 固着和支持胚体
D . 调节胚早期发育

答案：A

229

营养繁殖再生新的植物体是根、茎、叶能产生（　　）的特点。

A . 初生根
B . 不定根
C . 次生根
D . 侧根

答案：B

230

普通意义上的“树皮”是（　　）以外所有组织的总称。

A . 维管束
B . 木栓形成层
C . 维管形成层
D . 次生韧皮部

答案：C

解析：植物学教材P158

231

花柄是连接花与茎的柄状结构，其基本构造与（　　）相似。

A . 叶
B . 茎
C . 花丝
D . 根

答案：B

232

无胚乳种子在形成过程中，胚乳为（　　）所吸收。

A . 胚
B . 子叶
C . 胚芽
D . 外胚乳

答案：B

ANXSG

233

向日葵的雄蕊是(　　)。

A . 单体雄蕊
B . 二体雄蕊
C . 聚药雄蕊
D . 多体雄蕊

答案: C

234

叶片深裂指缺刻超越叶片的(　　)。

A . 1/4
B . 1/3
C . 1/2
D . 1/5

答案: C

235

玉米子叶的功能是什么?(　　)

A . 进行光合作用
B . 贮藏营养物质
C . 保护胚芽
D . 将胚乳的营养物质转运至胚

答案: D

236

被子植物中最常见的胚囊类型是单孢子蓼型,其成熟胚囊的结构是(　　)。

A . 八核七细胞结构,即卵器(卵和2个助细胞)、3个反足细胞、1个中央细胞(具2个极核),每个细胞均具单倍体核
B . 八核七细胞结构,除卵器的细胞具单倍体核外,其余细胞,具三倍体核
C . 十六细胞结构,即具四组卵器和四个极核
D . 四细胞结构,即卵器(卵、助细胞2),中央细胞仅一个极核

答案: A

237

外胚乳的细胞的染色体数目为(　　)。

A . 2N
B . 3N
C . N
D . 4N

答案: A

238

每一节上着生一片叶,各叶开度为180°,称此叶序为(　　)。

A . 互生
B . 对生
C . 轮生
D . 交互对生

答案: A

239

马铃薯是(　　)的变态。

A . 茎
B . 根

答案: A

240

筛管的端壁有许多孔,称为(　　)。

A . 筛孔
B . 纹孔
C . 核孔
D . 单芽孔

ANXSG

答案：A

241

黄瓜茎靠(　　)向上攀援。

A ．叶柄
B ．钩刺
C ．茎卷须
D ．气生根

答案：C

242

花粉母细胞经减数分裂形成四个分散的单核细胞，是尚未成熟的花粉粒，也叫做(　　)。

A ．四分体
B ．小孢子
C ．雄配子体
D ．雄配子

答案：B

243

被子植物中，具有功能的死细胞有(　　)。

A ．导管分子和筛管分子
B ．筛管分子和纤维
C ．纤维和伴胞
D ．导管分子和纤维

答案：D

244

花药发育过程中，单核花粉(即小孢子)的形成过程是(　　)。

A ．造孢细胞→孢原细胞→花粉母细胞→小孢子
B ．孢原细胞→造孢细胞→花粉母细胞→小孢子
C ．孢原细胞→花粉母细胞→造孢细胞→小孢子
D ．花粉母细胞→孢原细胞→造孢细胞→小孢子

答案：B

245

雄蕊通常由(　　)组成。

A ．花梗和花托
B ．花柱和柱头
C ．花瓣和花萼
D ．花丝和花药

答案：D

246

禾本科植物根的通道细胞位于(　　)。

A ．内皮层
B ．韧皮部
C ．外皮层
D ．木质部

答案：A

247

果皮的作用是(　　)。

A ．保护种子，为种子萌发提供有机养料
B ．保护种子，协助种子传播
C ．协助种子传播，为种子萌发提供有机养料

答案：B

248

莴苣是(　　)的变态。

A ．叶

ANXSG

B . 茎
C . 根

答案：B

249

由原分生组织向成熟组织过渡的组织是(　　)。

A . 原分生组织
B . 薄壁组织
C . 次生分生组织
D . 初生分生组织

答案：D

250

下列属于菊科的植物是(　　)。

A . 芜菁
B . 马铃薯
C . 向日葵
D . 柚子

答案：C

251

形成层通过(　　)使器官细胞内外层数增加。

A . 径向分裂
B . 垂周分裂
C . 平周分裂
D . 横向分裂

答案：C

252

根的增粗与以下哪些组织无关?(　　)

A . 形成层
B . 居间分生组织
C . 木栓形成层
D . 侧生分生组织

答案：B

253

伸长区细胞显著延长,(　　)。

A . 细胞分裂逐渐停止
B . 分化出环纹导管
C . 分化出筛管
D . 其他选项都是

答案：D

254

被子植物和裸子植物种子在形态构造上的区别是后者具有以下哪组特点?(　　)

A . 子叶数目2片或2片以上,胚乳多为三倍体
B . 子叶数目2片或2片以上,胚乳为单倍体,胚大多为直线型
C . 子叶数目1~2片,胚乳多为三倍体,胚大多为直线型
D . 子叶数目1~2片,胚乳为单倍体

答案：B

255

外胚乳的细胞内染色体数目为(　　)。

A . N
B . 4N
C . 3N
D . 2N

答案：D

ANXISG

256

木质部中央有髓的中柱称(　　)。

A . 原生中柱

B . 管状中柱

C . 编织中柱

D . 网状中柱

答案: B

257

草莓的雌蕊属于哪种类型?(　　)

A . 合心皮雌蕊

B . 离生单雌蕊

C . 单雌蕊

D . 复雌蕊

答案: B

258

束间形成层来自(　　)。

A . 原形成层

B . 与束中形成层相连接的束间髓射线的薄壁细胞

C . 皮层的薄壁细胞

D . 中柱鞘

答案: B

259

有限外韧维管束贯穿于(　　)。

A . 单子叶植物茎

B . 裸子植物茎

C . 蕨类植物茎

D . 双子叶植物茎

答案: A

260

下列属于聚花果的是(　　)。

A . 苹果

B . 桑葚

C . 桃子

D . 黄瓜

答案: B

261

有一植物种子,种孔和种脐处在相对的位置,以此判断其胚珠为哪一种类型?(　　)

A . 倒生胚珠

B . 弯生胚珠

C . 曲生胚珠

D . 直生胚珠

答案: D

262

荞麦、何首乌的托叶鞘属(　　)。

A . 叶鞘

B . 托叶

C . 鞘状托叶

D . 托叶状的叶鞘

答案: C

263

夹竹桃叶片的特征是(　　)。

A . 表皮没有气孔

B . 栅栏组织细胞的层数多

ANXSG

C . 表皮具有气孔窝
D . 叶脉结构简单

答案：C

264

被子植物的雌配子体是指（　　）。

A . 雌蕊
B . 八核胚囊
C . 胚珠
D . 卵器

答案：B

265

（　　）分裂形成药室内壁、中层、绒毡层。

A . 孢原细胞
B . 花粉母细胞
C . 周缘细胞
D . 造孢细胞

答案：C

266

油菜等十字花科植物是四强雄蕊，即雄蕊（　　）。

A . 6枚，4长2短
B . 8枚，4长4短
C . 4枚等长
D . 4枚，2长2短

答案：A

267

皂荚树枝上的刺属（　　）。

A . 叶刺
B . 茎刺
C . 皮刺

答案：B

268

下列属于木兰科的植物是（　　）。

A . 香樟
B . 茶
C . 陆地棉
D . 白玉兰

答案：D

269

裸子植物根的中柱鞘细胞为（　　）。

A . 一层
B . 二层
C . 多层
D . 缺如

答案：C

270

决定柱头与花粉是否亲和的直接物质基础是（　　）。

A . 蛋白质
B . 脂肪
C . 糖类
D . 核酸

答案：A

ANXSG

271

水稻叶上、下表皮的主要区别在于(　　)。

A . 气孔数量多少
B . 表皮细胞形状
C . 有无硅质细胞
D . 有无泡状细胞

答案: D

272

淀粉鞘有时存在于(　　)中。

A . 双子叶植物茎的初生结构
B . 单子叶植物茎
C . 双子叶植物根的初生结构
D . 双子叶植物茎的次生结构

答案: A

273

与花药开裂有关的结构是(　　)。

A . 中层
B . 绒毡层
C . 纤维层
D . 表皮

答案: C

274

着生在枝条顶端的芽属于(　　)。

A . 腋芽
B . 潜伏芽
C . 定芽
D . 不定芽

答案: C

275

下列属于十字花科的植物是(　　)。

A . 白玉兰
B . 荠菜
C . 香樟
D . 南瓜

答案: B

276

由卵细胞直接发育成胚称(　　)。

A . 营养繁殖
B . 无配子生殖
C . 孤雌生殖
D . 无孢子生殖

答案: C

277

头状花序中(　　)。

A . 无总苞
B . 无花轴
C . 小花无花柄
D . 小花无花被

答案: C

278

下面哪种现象不属于无融合生殖?(　　)

A . 孤雌生殖
B . 无配子生殖

ANXSG

C . 无孢子生殖
D . 双受精
答案：D

279
年轮是指季节性明显地区一年中所形成的(　　)的总和。
A . 初生木质部
B . 次生木质部
C . 次生韧皮部
D . 初生韧皮部
答案：B

280
成熟蚕豆种子的种皮上一条黑色眉状物是(　　)。
A . 种柄
B . 种阜
C . 种脐
D . 种脊
答案：C

281
木本植物茎增粗时，细胞数目增加最显著的部分是(　　)。
A . 周皮
B . 次生韧皮部
C . 维管形成层区
D . 次生木质部
答案：D

282
淀粉主要合成在(　　)。
A . 白色体
B . 叶绿体
C . 有色体
D . 高尔基体
答案：A

283
假果是(　　)。
A . 由子房和其他部分共同发育而来
B . 由花托发育而来
C . 果实的变态
D . 由花托和花被发育而来
答案：A

284
位于次生韧皮部内的射线称为(　　)。
A . 射线细胞
B . 木射线
C . 髓射线
D . 韧皮射线
答案：D

285
瓜类种子不可能在果实内萌发，是因为种子(　　)。
A . 缺乏氧气
B . 具后熟作用
C . 受抑制性物质影响
D . 胚尚未成熟
答案：C

ANXSG

286

产生茎的次生结构是靠(　　)分裂所致。

A . 侧生分生组织
B . 顶端分生组织
C . 居间分生组织
D . 原形成层

答案: A

287

柑橘类果实的食用部分是(　　)。

A . 发达的胎座
B . 内果皮
C . 种皮上的肉质腺毛(汁囊)
D . 内果皮上的肉质腺毛(汁囊)

答案: D

288

水稻和小麦等禾本科植物拔节、抽穗时,茎迅速长高,主要是(　　)。

A . 顶端分生组织分裂活
B . 初生增粗组织的分裂活动
C . 侧生分生组织分裂活动
D . 居间分生组织分裂活动

答案: D

289

双受精作用是(　　)特有的有性生殖现象。

A . 孢子植物
B . 蕨类植物
C . 裸子植物
D . 被子植物

答案: D

290

周皮上的通气结构是(　　)。

A . 气孔
B . 皮孔
C . 空孔
D . 纹孔

答案: B

291

生活的植物细胞核的核仁一般为(　　)。

A . 一或几个核仁
B . 多个核仁
C . 一个核仁
D . 两个核仁

答案: A

292

禾本科植物的花属于(　　)。

A . 风媒花
B . 鸟媒花
C . 水媒花
D . 虫媒花

答案: A

293

决定旱生植物形态结构最直接的环境因素是(　　)。

A . 水
B . 光

ANXSG

C . 热
D . 风

答案：A

294

植物根初生结构的中央部分是(　　)。

A . 后生木质部
B . 髓
C . 后生木质部或髓
D . 后生韧皮部或髓

答案：C

295

蛋白质的合成是在哪一种细胞器上进行的?(　　)

A . 线粒体
B . 核糖体
C . 溶酶体
D . 高尔基体

答案：B

296

下列(　　)在成熟后仍是生活细胞。

A . 管胞
B . 筛管
C . 导管分子
D . 石细胞

答案：B

297

胚珠在珠柄上的各种着生方式中以(　　)最为习见。

A . 横生胚珠
B . 直生胚珠
C . 弯生胚珠
D . 倒生胚珠

答案：D

298

茄的果实属(　　)。

A . 柑果
B . 蒴果
C . 瓠果
D . 浆果

答案：D

299

用一段泡桐树的侧根埋入土中,便可出芽繁殖,因为这段侧根形成了(　　)。

A . 休眠芽
B . 不定芽
C . 潜伏芽
D . 活动芽

答案：B

300

花瓣彼此分离的花称为(　　)。

A . 离瓣花
B . 离萼花
C . 合瓣花
D . 合萼花

答案：A

ANXSG

301

(　　)在植物学上称为种子。

A．花生仁

B．高粱籽粒

C．向日葵籽粒

D．玉米籽粒

答案：A

302

导管分子的端壁上有(　　)。

A．筛孔

B．皮孔

C．纹孔

D．穿孔

答案：D

303

中轴胎座类型的子房一定是(　　)。

A．单心皮

B．离生心皮

C．多心皮多室

D．其他选项都是

答案：C

304

花粉粒的壁分两层,即(　　)。

A．外壁和内壁

B．果胶层和初生壁

C．初生壁和次生壁

D．果胶层和次生壁

答案：A

305

糊粉粒贮藏的养分是(　　)。

A．淀粉

B．脂肪

C．蛋白质

D．核酸

答案：C

306

有一植物的种子,种孔和种脐的位置很近,以此为依据判断其胚珠类型不可能是下列哪一种?(　　)

A．直生胚珠

B．倒生胚珠

C．弯生胚珠

D．曲生胚珠

答案：A

307

梨果肉的石细胞属于(　　)。

A．机械组织

B．保护组织

C．输导组织

D．基本组织

答案：A

308

花程式中子房上位、二心皮、一室的表示形式为(　　)。

A．G2：1

B．G(2：1)

ANXISG

C . G(2-1)

答案: B

309

有丝分裂过程中,细胞内DNA含量在( )加倍。

A . 间期

B . 前期

C . 中期

D . 后期

答案: A

310

根冠细胞( )。

A . 细胞壁厚

B . 有分泌黏液的功能

C . 有分生能力

D . 细胞间隙发达

答案: B

311

在木材径向切面上,年轮呈现( )。

A . 波浪状

B . 平行线

C . 梯状

D . 同心圆

答案: B

312

边材不同于心材之处为边材( )。

A . 坚硬

B . 色泽深

C . 比重大

D . 具输导能力

答案: D

313

孢原细胞可先进行一次( )。

A . 垂周分裂

B . 径向分裂

C . 减数分裂

D . 平周分裂

答案: D

314

( )的叶为异面叶。

A . 叶上、下表皮色泽不同

B . 叶上、下表皮气孔分布不同

C . 叶下、下表皮分别为单层和多层细胞

D . 叶肉分化为栅栏组织和海绵组织

答案: D

315

下列属于樟科的植物是( )。

A . 香樟

B . 白玉兰

C . 陆地棉

D . 茶

答案: A

ANXSG

316

下列细胞器中具双层被膜的是(　　)。

A . 内质网
B . 高尔基体
C . 线粒体
D . 溶酶体

答案: C

317

属于被子植物门,单子叶植物纲的科是(　　)。

A . 禾本科
B . 旋花科
C . 木兰科
D . 茄科

答案: A

318

以下哪种说法不正确?(　　)

A . 某些种子萌发需要光照
B . 植物生长发育离不开光合作用,所以种子萌发的必要条件是需要光照
C . 种子萌发一般不需要光照
D . 光照可以使种子得到足够的热量,因而有利于种子的萌发

答案: B

319

在减数分裂过程中,由于(　　),因而染色体数目减少一半。

A . 细胞分裂两次,DNA复制一次
B . 细胞分裂两次,DNA复制两次
C . 细胞分裂两次,DNA未复制
D . 细胞分裂一次,DNA复制一次

答案: A

320

内质网和核糖体为重要的细胞器,从组成结构看,它们属于(　　)。

A . 前者有膜,而后者无膜
B . 前者为双层单位膜,后者为单层单位膜
C . 前者为单层单位膜,后者为双层单位膜
D . 前者无膜,而后者有膜

答案: A

321

叶绿素分布在叶绿体的哪一部位?(　　)

A . 外膜
B . 内膜与外膜间
C . 基粒片层
D . 基质中

答案: C

322

落花生的雌蕊柄,又称子房柄,属于(　　)。

A . 花柄
B . 花托
C . 下延的子房
D . 花瓣

答案: B

323

细胞分裂间期的主要意义在于(　　)。

A . 细胞得以休整
B . 细胞长大

ANXSG

C . 染色体形成
D . DNA复制
答案：D

324
子房基部着生在花托上，花的其他部分都低于子房着生，这种花叫做（　　）。
A . 上位子房下位花
B . 上位子房周位花
C . 下位子房上位花
D . 下位子房周位花
答案：A

325
周皮是由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的，其中真正起保护作用的是（　　）。
A . 栓内层
B . 木栓形成层
C . 木栓层和木栓形成层
D . 木栓层
答案：D

326
被子植物最大的科是（　　）。
A . 蔷薇科
B . 芸香科
C . 禾本科
D . 菊科
答案：D

327
与韧皮部无关的功能是（　　）。
A . 糖的合成
B . 支持功能
C . 糖的运输
D . 有机物运输
答案：A

328
草莓的食用部分是（　　）。
A . 假种皮
B . 花序轴
C . 果皮
D . 花托
答案：D

329
叶尖较短而尖税，称（　　）。
A . 渐尖
B . 急尖
C . 具骤尖
D . 具短尖
答案：B

330
细胞分裂产生的子细胞的新壁与该细胞所在部位的半径相平行，此细胞分裂也称（　　）。
A . 切向分裂
B . 垂周分裂
C . 平周分裂
D . 横向分裂
答案：B

ANXSG

331

角果与荚果的区别是前者为(　　)。

A．二个心皮发育成的果实

B．二个心皮组成的雌蕊,具假隔膜,果皮从二腹缝线裂开,果皮脱落,留下假隔膜

C．果皮从二腹缝线裂开,果皮不脱落,无假隔膜

D．一个心皮发育成的果实

答案：B

332

筛管分子最明显的特征是其(　　)。

A．侧壁具筛域

B．为具核的生活细胞

C．端壁具筛板

D．为有筛域、筛板而无核的生活细胞

答案：D

333

茎内起径向输导作用的是(　　)。

A．维管射线

B．维管组织

C．韧皮部

D．木质部

答案：A

334

水生植物叶片的特征是(　　)。

A．通气组织发达

B．多茸毛

C．输导组织发达

D．机械组织发达

答案：A

335

姜是(　　)的变态。

A．茎

B．根

答案：A

336

嫁接的成活率与两植物间的亲缘关系有关。一般来说,(　　)间的嫁接成活率最大。

A．品种

B．种

C．属

D．科

答案：A

337

根的维管形成层产生过程中,首先开始于(　　)。

A．初生韧皮部内方的薄壁细胞

B．原生木质部细胞

C．初生木质部脊处的中柱鞘细胞

D．初生韧皮部外方的薄壁细胞

答案：A

338

扦插、压条是利用枝条、叶、地下茎等能产生(　　)的特性。

A．初生根

B．不定根

C．次生根

D．三生根

ANXSG

答案：B

339

在大多数双子叶植物根中，木栓形成层可由下列哪些结构产生?(　　)

A ．中柱鞘

B ．皮层

C ．内皮层

D ．表皮

答案：A

340

茎中初生射线是指(　　)。

A ．木射线

B ．韧皮射线

C ．髓射线

D ．维管射线

答案：C

341

植物细胞内重要遗传物质是(　　)。

A ．蛋白质

B ．核酸

C ．脂类

D ．糖类

答案：B

342

与动物细胞相比，植物细胞特有的结构是(　　)。

A ．具有细胞壁、高尔基体、液泡

B ．具有细胞壁、叶绿体

C ．具有细胞壁

D ．具有细胞壁、液泡、质体

答案：D

343

光镜下可看到的细胞器是(　　)。

A ．微丝

B ．核糖体

C ．叶绿体

D ．内质网

答案：C

344

下列细胞器中具双层膜的是(　　)。

A ．高尔基体

B ．线粒体

C ．内质网

D ．溶酶体

答案：B

345

构成原生质主要组成部分的有机物是(　　)。

A ．蛋白质、脂类、糖类

B ．蛋白质、核酸、脂类

C ．蛋白质、核酸、脂类、糖类

D ．蛋白质、核酸、糖类

答案：C

ANXSG

346

淀粉通过何种化学试剂呈蓝色反应(　　)。

A . 苏丹3溶液
B . 间苯三酚
C . 碘-碘化钾溶液
D . 乳酸酚

答案: C

347

植物细胞有丝分裂中纺锤丝由(　　)组成。

A . 微纤丝
B . 微管
C . 微丝
D . 中间纤维

答案: B

348

哪个细胞器与细胞的分泌功能有关?(　　)

A . 高尔基体
B . 核糖体
C . 线粒体
D . 叶绿体

答案: A

349

叶绿体的基粒片层中主要分布着(　　)。

A . 花青素
B . 叶绿素
C . 叶黄素
D . 胡萝卜素

答案: B

350

细胞内有生命的结构称为(　　)。

A . 原生质
B . 细胞质
C . 胞基质
D . 细胞壁
E . 原生质体

答案: E

351

植物细胞的初生壁主要由哪一类物质组成?(　　)

A . 木质素和果胶质
B . 纤维素和木质素
C . 角质和纤维素
D . 果胶质和纤维素

答案: D

352

细胞进行有丝分裂时DNA复制是在(　　)。

A . 间期
B . 前期
C . 中期
D . 末期

答案: A

353

减数分裂中,四联体形成于前期Ⅰ的(　　)。

A . 细线期

ANXISG

B . 偶线期
C . 粗线期
D . 双线期
E . 终线期

答案: B

354

下列哪个细胞器是植物细胞所特有的?( )

A . 叶绿体
B . 核糖体
C . 溶酶体
D . 线粒体

答案: A

355

下列细胞结构中,具双层膜结构的是( )。

A . 液泡
B . 线粒体
C . 溶酶体
D . 内质网

答案: B

356

染色质的主要成分是( )。

A . DNA和蛋白质
B . DNA和RNA
C . DNA和核糖体
D . DNA和磷脂

答案: A

357

初生壁是( )。

A . 相邻两细胞之间的细胞壁层
B . 细胞生长过程中不断形成的细胞壁层
C . 细胞停止生长后形成的细胞壁层
D . 细胞停止生长后最先形成的细胞壁层

答案: B

358

光学显微镜下呈现出的细胞结构称( )。

A . 显微结构
B . 亚显微结构
C . 超显微结构
D . 亚细胞结构

答案: A

359

染色体形成于有丝分裂的( )。

A . 前期
B . 末期
C . 间期
D . 中期

答案: A

360

细胞壁的主要功能是起( )作用。

A . 分泌
B . 运输
C . 保护和支持
D . 传递

ANXISG

答案：C

361

光能通过什么作用转化变成化学能?(　　)

A ．呼吸作用
B ．化能合成作用
C ．光合作用
D ．异化作用

答案：C

362

叶片较线形为宽，由下部至先端渐次狭实，称为(　　)。

A ．针形
B ．披针形
C ．卵形
D ．心形

答案：B

363

双子叶植物茎初生结构中两维管束间髓射线细胞能恢复分裂能力，产生(　　)。

A ．束内形成层
B ．束间形成层
C ．维管形成层
D ．木栓形成层

答案：B

364

线粒体的主要功能是(　　)。

A ．同化作用的场所
B ．参与细胞壁的形成
C ．细胞的“动力工厂”(能量供应的中心)
D ．运输作用

答案：C

365

荚果与角果的根本区别在于(　　)。

A ．荚果比角果粗壮或长
B ．荚果果皮肉质可食，为肉果，角果的果皮干燥，属干果
C ．荚果由具边缘胎座的一室子房发育而来，而角果由具中轴胎座的二室子房发育而来
D ．荚果由单心皮雌蕊发育而来，而角果由二心皮组成的雌蕊发育而成

答案：D

366

子房仅以基部与杯状花托底部相连，花被与雄蕊着生的位置低于子房(　　)。

A ．上位子房下位花
B ．半下位子房
C ．上位子房周位花
D ．下位子房

答案：A

367

下列属于芸香科的植物是(　　)。

A ．梨
B ．柑橘
C ．葫芦
D ．蚕豆

答案：B

ANXSG

368

禾本科植物茎维管束中的维管束鞘为(　　)。

A．厚壁组织

B．厚角组织

C．基本组织

D．薄壁组织

答案：A

369

根据原套—原体学说,组成原套的细胞(　　)。

A．只进行切向分裂

B．既进行垂周分裂又进行切向分裂

C．只进行横向分裂

D．只进行垂周分裂

答案：D

370

根冠的主要功能不包括(　　)。

A．产生新细胞

B．保护分生区

C．有重力作用

D．起润滑作用

答案：A

371

玉米近地面的节上产生的根属于(　　)。

A．主根

B．侧根

C．不定根

D．水生根

答案：C

372

被子植物中,具有功能的死细胞是(　　)。

A．导管分子和筛管分子

B．筛管分子和纤维

C．导管分子和纤维

D．纤维和伴胞

答案：C

373

下列哪种植物的种子属于有胚乳种子?(　　)

A．蚕豆

B．花生

C．大豆

D．蓖麻

答案：D

374

利于植物形成较深根系的环境条件是(　　)。

A．地下水位较高

B．通气良好

C．土壤肥较差

D．光照弱

答案：B

375

松、杨的分枝方式为(　　)。

A．三叉分枝

B．假二叉分枝

ANXSG

C . 单轴分枝
D . 合轴分枝

答案：C

376

禾本科植物茎表皮细胞的细胞壁常发生(　　)。

A . 角质化
B . 矿化
C . 栓质化
D . 角化、栓化、矿化

答案：D

377

凯氏带是(　　)的带状增厚。

A . 木质化和栓质化
B . 木质化和角质化
C . 栓质化和角质化
D . 木质化和矿质化

答案：A

378

种子萌发形成幼苗的最初阶段不会出现的现象是什么?(　　)

A . 纤维素含量增加
B . 胚的呼吸强度增加
C . 幼苗鲜重大于种子鲜重
D . 幼苗干重大于种子干重

答案：D

379

松树针叶的结构中,具有(　　)。

A . 厚的角质层
B . 气孔下陷
C . 内皮层
D . 栅栏组织和海绵组织(指出错误的选择)

答案：D

380

根据(　　),茎端由表皮原,皮层原和中柱原组成。

A . 组织原学说
B . 原套—原体学说
C . 细胞学说区学说
D . 不活动中心

答案：A

381

细胞与根轴的横切面平行的壁称为(　　)。

A . 切向壁
B . 横向壁
C . 弦向壁
D . 径向壁

答案：B

382

三叶橡胶树、蒲公英等植物的白色分泌物是(　　)分泌出的。

A . 乳汁管
B . 蜜腺
C . 分泌道
D . 分泌腔

答案：A

ANXSG

383

指出成熟特化时保留有生活原生质体的组织(　　)。

A . 厚壁组织

B . 筛管分子

C . 木栓层

D . 管胞

答案: B

384

柑桔类果实,是由多心皮具中轴胎座的子房发育而来的浆果,供食用部分是(　　)。

A . 内果皮囊内的腺毛

B . 种子表皮毛

C . 发达的中果皮

D . 果皮

答案: A

385

下面哪个植物可以进行自花传粉?(　　)

A . 玉米

B . 油菜

C . 豌豆

D . 兰花

答案: C

386

在茎的初生结构中,先分化出来的初生木质部称为(　　)。

A . 次生木质部

B . 后生木质部

C . 原生韧皮部

D . 原生木质部

答案: D

387

二体雄蕊指的是(　　)。

A . 每花中,10个雄蕊,其中9个联合,1分离,如蚕豆

B . 每花中,10个雄蕊,其中5个联合,5分离,如油菜

C . 每花中,10个雄蕊,其中9个联合,1分离,如棉花

D . 每花中,5个雄蕊,其中4个联合,1分离,如蚕豆

答案: A

388

双子叶植物木质部的组成是(　　)。

A . 导管、管胞、木纤维、木薄壁组织

B . 导管、伴胞、纤维、木薄壁组织

C . 导管、筛管、伴胞、木纤维

D . 导管、管胞、伴胞、木薄壁组织

答案: A

389

有性生殖的最高形式是(　　)。

A . 卵式生殖

B . 同配生殖

C . 无融合生殖

D . 异配生殖

答案: A

390

植物界有性生殖的三种基本方式是(　　)。

A . 同配生殖,异配生殖,卵式生殖

B . 孢子生殖,无融合生殖,异配生殖

ANXSG

C . 同配生殖,孤雌生殖,卵式生殖
D . 孢子生殖,同配生殖,异配生殖

答案: A

391

多年生木本植物茎的横切面结构中,在韧皮部和木质部之间是( )。

A . 维管形成层
B . 表皮与皮层
C . 中柱鞘
D . 韧皮部

答案: A

392

哪个细胞器与细胞内进行呼吸作用释放供应能量有关?( )

A . 叶绿体
B . 线粒体
C . 高尔基体
D . 溶酶体

答案: B

393

垂柳的雄花是( )。

A . 无被花
B . 单性花
C . 不完全花
D . 其他选项都是

答案: D

394

具( )的花为整齐花。

A . 十字花冠
B . 蝶形花冠
C . 舌状花冠
D . 唇形花冠

答案: A

395

叶绿体的被膜是( )。

A . 单层膜
B . 双层膜
C . 单位膜
D . 三层膜

答案: B

396

导管是哪类植物输送水分和无机盐溶液的组织?( )

A . 高等植物
B . 裸子植物
C . 维管植物
D . 被子植物

答案: D

397

气孔下由木栓形成层向外产生的排列疏松的细胞称为( )。

A . 补充组织
B . 胼胝体
C . 离层细胞
D . 侵填体

答案: A

ANXSG

398

原表皮、基本分生组织和原形层属于(　　)。

A . 居间分生组织
B . 原分生组织
C . 初生分生组织
D . 伸长区

答案：C

399

在植物完整的生活周期中，包括的两个交替的世代是(　　)。

A . 产生孢子的孢子体世代和产生配子的配子体世代
B . 产生配子的孢子体世代和产生孢子的配子体世代
C . 产生配子的配子体世代和产生配子的孢子体世代
D . 产生配子的孢子体世代和产生孢子的孢子体世代

答案：A

400

下列可以观察到厚角组织的植物材料是(　　)。

A . 叶脉
B . 叶肉
C . 叶表皮
D . 叶柄

答案：D

401

厚角组织和厚壁组织均属于机械组织，其细胞特征为(　　)。

A . 前者为死细胞，后者为活细胞
B . 两者都为活细胞
C . 前者为活细胞，后者为死细胞
D . 两者都为死细胞

答案：C

402

叶片较大而薄，表皮的角质层薄，气孔较少，是(　　)叶的特点。

A . 沉水植物
B . 旱生植物
C . 阴地植物
D . 阳地植物

答案：C

403

如果你想通过徒手切片观察植物茎的初生结构，最佳的切片位置应该是(　　)。

A . 胚轴
B . 分生区
C . 伸长区
D . 成熟区

答案：D

404

禾木科植物根的内皮层细胞在发育后期常五面增厚，只有(　　)是薄的。

A . 横壁
B . 径向壁
C . 内切向壁
D . 外切向壁

答案：D

405

漆树中的漆汁是从茎韧皮部的(　　)中产生。

A . 乳汁管
B . 溶生型分泌腔

ANXSG

C ．溶生型分泌道
D ．裂生型分泌道

答案：D

406

由一个花序发育而成的果实，称为（　　）。

A ．假果
B ．聚合果
C ．聚花果
D ．梨果

答案：C

407

柑桔的叶是（　　）。

A ．单叶
B ．掌状复叶
C ．单身复叶
D ．三出复叶

答案：C

408

根毛是（　　）。

A ．表皮细胞外壁突起伸长的结果
B ．毛状的不定根
C ．根表皮细胞分裂产生的突起

答案：A

409

观察射线的宽度和高度应选择木材的（　　）。

A ．横切面
B ．切向切面
C ．外表面
D ．径向切面

答案：B

410

蒲公英的（　　）上用一伞状结构，适于风力传播。

A ．果实
B ．核果
C ．聚合果
D ．种子

答案：A

411

我们假设水稻的两个分蘖，其蘖位三与蘖位四，那么这就意味着，不能生长（　　）。

A ．蘖位三的分蘖，其蘖位较低，发生也较早
B ．蘖位三的分蘖，其蘖位较低，但发生也较晚
C ．蘖位四的分蘖，其蘖位较低，发生也较早
D ．蘖位四的分蘖，其蘖位较低，但发生也较晚

答案：A

412

用浓硫酸处理苋属植物种子可打破休眠，该种子休眠的原因是（　　）。

A ．种子内的胚尚未成熟
B ．存在抑制性物质
C ．种皮过于坚硬
D ．种子的后熟作用

答案：C

ANXSG

413

实心型花柱中央具有富含细胞器、代谢旺盛的(　　)。

A . 花粉管

B . 引导组织

C . 薄壁细胞

D . 花柱道

答案：B

414

禾谷类作物的叶包括(　　)等部分。

A . 叶柄、叶鞘、叶片、托叶

B . 叶柄、叶舌、叶耳、叶片

C . 叶鞘、叶舌、叶耳、叶片

D . 托叶、叶鞘、叶舌、叶耳、叶片

答案：C

415

下列属于伞形科的植物是(　　)。

A . 马铃薯

B . 向日葵

C . 芫荽

D . 柚子

答案：C

416

一朵花中有多个彼此分离的雌蕊称为(　　)。

A . 单雌蕊

B . 离生单雌蕊

C . 合心皮雌蕊

D . 复雌蕊

答案：B

417

在木材(　　)面上可以看射线的长度和高度。

A . 横切

B . 外表面

C . 径向切

D . 切向切

答案：C

418

单孢子蓼型胚囊的发育过程的特征是(　　)。

A . 四分体中珠孔端的一个大孢子发育，雌配子体形成，发生二次有丝分裂，产生四核的成熟胚囊

B . 二分体的合点端的大孢子发育，雌配子体形成，发生二次有丝分裂，产生四核的成熟胚囊

C . 四分体中合点端的大孢子发育，雌配子体形成，发生三次核的连续有丝分裂，形成八核的成熟胚囊

D . 四分体中合点端的大孢子发育，雌配子体形成，发生三次核减数分裂，产生八核的成熟胚囊

答案：C

419

根的吸收作用主要在(　　)。

A . 根冠

B . 分生区

C . 根毛区

D . 伸长区

答案：C

420

根初生维管组织中，木质部与韧皮部的排列是(　　)。

A . 内外排列

B . 散生

ANXSG

C . 相间排列
D . 无序排列

答案：C

421

次生分生组织可由（ ）脱分化过程转变而成。

A . 薄壁组织
B . 侧生分生组织
C . 初生分生组织
D . 原分生组织

答案：A

422

缠绕茎靠（ ）向上攀升，如牵牛花。

A . 气生根
B . 茎本身
C . 吸盘
D . 卷须

答案：B

423

由2～3心皮组成、一室的子房发育而来，含一粒种子，果皮与种皮不易分开，此类果实属于（ ）。

A . 坚果
B . 荚果
C . 颖果
D . 角果

答案：C

424

外胚乳来源于（ ）。

A . 珠心
B . 反足细胞
C . 顶细胞
D . 基细胞

答案：A

425

同时具有花萼和花冠的花称为（ ）。

A . 两被花
B . 裸花
C . 无被花
D . 单被花

答案：A

426

维管射线和髓射线的主要区别是（ ）。

A . 维管射线是次生结构，数目不固定
B . 髓射线是初生结构，位于维管束中
C . 维管射线是次生结构，位于维管束之间
D . 髓射线是次生结构，数目固定

答案：A

427

具（ ）的子房为多室子房。

A . 边缘胎座
B . 侧膜胎座
C . 中轴胎座
D . 特立中央胎座

答案：C

ANXSG

428

玉米、高粱等的茎增粗的原因除初生组织细胞长大外，还由于（　　）活动所致。

A．初生增粗分生组织

B．木栓形成层

C．形成层

D．束间形成层

答案：A

429

木栓形成层属于（　　）。

A．次生分生组织

B．居间分生组织

C．原生分生组织

D．初生分生组织

答案：A

430

细胞停止生长后所形成的细胞壁结构部分为（　　）。

A．胞间层

B．次生壁

C．初生壁

D．纹孔

答案：B

431

肉质植物属（　　），其叶内贮多量水分。

A．水生植物

B．旱生植物

C．阴地植物

D．耐阴植物

答案：B

432

下列属于锦葵科的植物是（　　）。

A．香樟

B．陆地棉

C．茶

D．白玉兰

答案：B

433

具凯氏带的内皮层细胞不增厚的部分是（　　）。

A．左、右径向壁

B．内外切向壁

C．下横壁

D．上横壁

答案：B

434

胚乳发育的（　　）方式中，发育过程可区分为游离核的形成期和细胞时期两个阶段。

A．五福花型

B．细胞型

C．沼生目型

D．核型

答案：D

435

叶脱落在枝条上所遗留下的痕迹，称为（　　）。

A．叶迹

B．芽鳞痕

ANXSG

C . 叶痕
D . 托叶痕

答案：C

436

洋葱根尖分生区细胞的分裂方式为(　　)。

A . 无丝分裂
B . 有丝分裂
C . 减数分裂
D . 细胞的自由形成

答案：B

437

组成胞间层(中胶层)的物质主要是(　　)。

A . 半纤维素
B . 蛋白质
C . 果胶质
D . 脂类

答案：C

438

下列哪个结构是植物细胞所特有的?(　　)

A . 溶酶体
B . 高尔基体
C . 细胞壁
D . 内质网

答案：C

439

细胞进行呼吸作用的场所是(　　)。

A . 线粒体
B . 脂肪
C . 蛋白质
D . 核酸

答案：A

440

与细胞分泌功能有关的细胞器是(　　)。

A . 线粒体
B . 叶绿体
C . 溶酶体
D . 高尔基体

答案：D

441

细胞的次生代谢产物主要贮藏在哪种结构中?(　　)

A . 内质网
B . 质体
C . 液泡
D . 高尔基体

答案：C

442

线粒体与细胞内进行何种生理作用有关?(　　)

A . 呼吸作用释放能量
B . 光合作用
C . 矿化作用
D . 发酵作用

答案：A

ANXSG

443

有丝分裂间期,细胞核内可被染成深色的部分称为(　　)。

A . 染色体
B . 染色单体
C . 子染色体
D . 染色质

答案: D

444

植物细胞初生壁的主要成分是(　　)。

A . 纤维素、半纤维素和果胶
B . 木质、纤维素和半纤维素
C . 果胶
D . 角质和纤维素

答案: A

445

核糖体(　　)。

A . 大量附着在内质网上
B . 大量存在于细胞核上
C . 大量游离于胞基质中
D . 大量存在于高尔基体上

答案: A

446

有丝分裂后期的特点是(　　)。

A . 纺锤体把染色体牵引到细胞两极
B . 纺锤体明显,染色体排列在赤道面上
C . 形成两个子核
D . 出现两个子细胞

答案: A

447

果胶质和纤维素主要是哪种细胞壁的物质组合?(　　)

A . 次生壁
B . 初生壁
C . 胞间层
D . 三生壁

答案: B

448

被子植物生活史中,孢子体阶段始于(　　)。

A . 大、小孢子
B . 受精卵
C . 种子
D . 幼苗

答案: B

449

贮藏的淀粉是以什么样的形式存在于细胞中的?(　　)

A . 糊粉粒
B . 淀粉粒
C . 溶胶
D . 凝胶

答案: B

450

细胞周期的正确顺序是(　　)。

A . G1期→M期→G2期→S期
B . G1期→G2期→S期→M期

ANXSG

C . G1期→S期→G2期→M期
D . G1期→S期→M期→G2期

答案：C

451

植物表皮细胞最外一层是(　　)。

A . 初生壁
B . 胞间层
C . 次生壁
D . 角质层

答案：D

452

下列哪个特征属于细胞分裂中期?(　　)

A . 细胞核膨大
B . 染色体移向细胞两极
C . 染色单体分开
D . 染色体排列在赤道面上

答案：D

453

遗传基因存在于(　　)。

A . 核仁里
B . 染色质(体)的DNA分子链上
C . 内质网上
D . 微体里

答案：B

454

糊粉粒是贮藏的(　　)。

A . 蛋白质
B . 脂肪
C . 淀粉
D . 糖类

答案：A

455

鉴定植物细胞中的后含物,通常(　　)。

A . 用碘液鉴定蛋白质和脂肪
B . 用苏丹Ⅲ鉴定蛋白质和脂肪
C . 用碘液鉴定蛋白质和淀粉
D . 用苏丹Ⅲ鉴定脂肪和淀粉

答案：C

456

细胞有丝分裂后期的主要特点是(　　)。

A . 出现纺缍丝形成纺锤体
B . 染色体的形态和数目最清楚
C . 染色体向细胞两极移动
D . 纺锤丝消失

答案：C

457

被子植物木质部主要由下列哪些细胞组成?

A . 中柱鞘和内皮层
B . 导管和木薄壁细胞
C . 筛管和伴细胞
D . 木栓和栓内层

答案：B

解析：木质部主要由导管、管胞、木纤维和木薄壁细胞等组成。

ANXSG

458

以下哪种说法不正确？

A ．植物生长发育离不开光合作用，所以种子萌发的必要条件是需要光照

B ．光照可以使种子得到足够的热量，因而有利于种子的萌发

C ．种子萌发一般不需要光照

D ．某些种子萌发需要光照

答案：A

解析：种子萌发主要需要适宜的温度、适量的水分和充足的空气，大多数种子的萌发并不需要光照。

459

生姜具有变态的（ ）。

A ．根

B ．叶

C ．果

D ．茎

答案：D

解析：生姜食用的部位是地下茎，具有节和节间，属于块茎。

460

下列植物中，哪些种子为无胚乳种子？（ ）

A ．花生、大豆、玉米

B ．棉、花生、大豆

C ．玉米、花生、蓖麻

D ．大豆、蓖麻、棉

答案：B

解析：花生、大豆、棉等双子叶植物种子在发育过程中胚乳被子叶吸收。

461

周皮不包括以下哪个结构？（ ）

A ．木栓层

B ．栓内层

C ．次生木质部

D ．木栓形成层

答案：C

解析：周皮由木栓层、木栓形成层和栓内层三部分组成，次生木质部不属于周皮。

462

豆科植物的根瘤是根系和（ ）共生体。

A ．细菌

B ．酵菌

C ．真菌

D ．放线菌

答案：A

解析：根瘤是根瘤菌与豆科植物根部共生形成的结构。

463

周皮中真正起保护作用的是（ ）。

A ．A 木栓层

B ．B 木栓形成层

C ．C 木栓层和木栓形成层

D ．D 栓内层

答案：A

解析：木栓层细胞壁栓化，不透水不透气，具有很强的保护作用。

464

双子叶植物茎内的次生木质部由（ ）分裂而成。

A ．A 纺锤状原始细胞

B ．B 射线原始细胞

C ．C 束中形成层细胞

D ．D 束间形成层细胞

ANXSG

答案：A

解析：纺锤状原始细胞向内分裂产生次生木质部。

465

我们食用的甘薯是( )。

A . A 块根

B . B 块茎

C . C 根状茎

D . D 肉质直根

答案：A

解析：甘薯食用部分由不定根膨大而成，属于块根。

466

胡萝卜贮藏根是由主根和( )膨大而形成的。

A . A 侧根

B . B 上胚轴

C . C 下胚轴

D . D 中胚轴

答案：A

解析：胡萝卜属于肉质直根，主要由主根和侧根膨大形成。

467

桑椹供食用部分是( )。

A . A 花序

B . B 肉质化的花轴

C . C 肥厚多汁的花萼

D . D 内陷的肉质化的花轴

答案：D

解析：桑椹食用部分主要是肉质化的花萼和内陷肉质化的花轴。

468

植物茎中大部分初生组织在次生生长中被破坏,但( )例外。

A . A 初生木质部

B . B 维管束

C . C 表皮

D . D 初生韧皮部

答案：A

解析：初生木质部保留在茎的中央。

469

《齐民要术》一书的作者是( )。

A . A 贾思勰

B . B 宋应星

C . C 徐光启

D . D 李时珍

答案：A

解析：《齐民要术》是北魏贾思勰所著。

470

下列变态器官哪个不是由茎变态的?( )

A . A 黄瓜的卷须

B . B 南瓜的卷须

C . C 豌豆的卷须

D . D 葡萄的卷须

答案：C

解析：豌豆的卷须是叶卷须。

471

普通意义上的树皮是( )以外所有组织的总称。

A . A 次生韧皮部

B . B 木栓形成层

ANXSG

C . C 维管形成层
D . D 维管束

答案：C

解析：维管形成层以外的部分称为树皮。

472

萼片直至果实成熟花萼依然存在的，称为（ ）。

A . A 宿存萼
B . B 副萼
C . C 总苞
D . D 合萼

答案：A

解析：花萼在花谢后不脱落称为宿存萼。

473

下列真菌类中，子实体的质地为肉质的是（ ）。

A . 灵芝
B . 猴头
C . 木耳
D . 酵母

答案：B

474

“落地生根”的名称得来是因为（ ）。

A . 叶具营养繁殖的能力，叶缘产生不定芽，芽落地形成新植株
B . 叶缘产生不定根，落地形成新植株
C . 叶缘产生无性孢子，落地萌发成新植株
D . 叶缘产生雌、雄配子，受精后形成新个体

答案：A

475

植物学这一名词在我国历史上最早创译者是（ ）。

A . 严复
B . 李善兰
C . 李时珍
D . 徐光启

答案：B

476

达尔文的名著是（ ）。

A . 《植物解剖概念》与《植物解剖》
B . 《植物学基本原理》与《动物组织学》
C . 《物种起源》与《在驯化情况下动物和植物的变异》
D . 《植物种态》与《名医别录》

答案：C

477

下列结构中，不属于藓类孢子体世代的是（ ）。

A . 蒴盖
B . 蒴齿
C . 蒴柄
D . 蒴帽

答案：D

478

总状花序的主要特征是（ ）。

A . 花序具一长花轴，上面着生花柄等长的花，开花顺序自下而上，如油菜
B . 花序具一长花轴，上面着生花柄不等长的花，开花顺序自下而上，如油菜
C . 花序具一长的花轴，上面着生花柄等长的单性花，开花顺序自下而上，如油菜
D . 花序具一长的花轴，上面着生无柄的花，开花顺序自下而上，如油菜

ANXSG

答案：A

479

《植物名实图考》的作者是(　　)。

A ．徐光启

B ．贾思勰

C ．宋应星

D ．吴其浚

答案：D

480

《物种起源》、《在驯化情况下动物和植物的变异》两本书作者是(　　)。

A ．孟德尔

B ．拉马克

C ．达尔文

D ．米丘林

答案：C

481

植物营养体的某一部分和母体分离(或不分离)，而直接形成新个体的繁殖方式称为(　　)。

A ．有性生殖

B ．无性生殖

C ．孢子繁殖

D ．营养繁殖

答案：D

482

裸子植物的小孢子叶又可称(　　)。

A ．心皮

B ．蒴齿

C ．花药

D ．雄蕊

答案：D

483

在萝卜、甜菜的肉质直根、甘薯的块根次生木部中，有所谓三生结构的存在，这种结构由(　　)的衍生细胞形成的。

A ．居间分生组织

B ．额外形成层(副形成层)

C ．维管形成层

D ．栓形成层

答案：B

484

下列变态器官哪种是由根变态的?(　　)

A ．马铃薯

B ．番薯(白薯)

C ．慈菇

D ．芋(头)

答案：B

485

周皮上起通气作用的是(　　)。

A ．水孔

B ．穿孔

C ．皮孔

D ．气孔

答案：C

ANXSG

486

以下所列形象的结构，哪一些都是茎的变态？(　　)

A ．皂荚的分枝刺，葡萄和带病豌豆的卷须

B ．马铃薯、姜、荸荠、芋头

C ．莲藕、菊芋、竹鞭、白萝卜、胡萝卜

D ．蔷薇和刺槐(洋槐)的刺，豌豆的卷须

答案：B

487

花的各部分数目的演化趋势是(　　)。

A ．从多而定数进化到少而无定数

B ．从多而定数进化到少而定数

C ．从多而无定数进化到少而无定数

D ．从多而无定数进化到少而定数

答案：D

488

苔藓植物具(　　)。

A ．假根

B ．既有真根又有假根

C ．真根

D ．既有真根又有鳞片

答案：A

489

某些细菌生长到某个阶段，细胞形成一个芽孢，芽孢的作用是(　　)。

A ．繁殖

B ．抵抗不良环境

C ．贮备营养

D ．吸收

答案：B

490

花粉囊在花粉成熟后，开裂，花粉散出，大多数植物是纵裂，即(　　)。

A ．在花粉囊的上部裂开一孔

B ．在花粉囊裂开时，以一瓣片向上揭开

C ．花粉囊沿纵轴裂开

D ．与花粉囊纵轴相垂直的方向开裂

答案：C

491

裸子植物的大孢子叶又可称(　　)。

A ．子房

B ．胚囊

C ．珠心和胚乳

D ．胚乳和颈卵器

答案：D

492

特立中央胎座的特征是(　　)。

A ．复子房，心皮基部和花托上部愈合，成为特立在中央的轴柱，胚珠着生在轴柱的周围

B ．复子房，心皮基部和花托下部愈合，成为特立在中央的轴柱，胚珠着生在轴柱的周围

C ．单子房，心皮基部与花托上部愈合，形成特立在中央的轴柱，胚珠着生在轴柱的周围

D ．复子房，由花柱形成特立在中央的轴柱，胚珠着生在轴柱的周围

答案：A

493

(　　)的变态根中主要食用部分是次生木质部。

A ．胡萝卜

B ．萝卜

ANXSG

C . 甜菜
D . 甘薯

答案：B

494

甜菜肉质直根中的三生结构是由（ ）活动所引起的。

A . 副形成层
B . 维管形成层和初生增厚分生组织
C . 维管形成层和木栓形成层
D . 维管形成层

答案：A

495

多室复子房的结构是（ ）。

A . 多个心皮组成子房，心皮向内弯入，心皮一部分形成子房壁，一部分形成子房内的隔膜，将子房分为数室
B . 多个心皮组成子房，心皮向内弯入，在子房的中央部分彼此结合，心皮一部形成子房壁，一部分形成子房内的隔膜，将子房分为数室
C . 多个心皮组成子房，心皮向内弯入，全部形成子房壁，子房分隔为数室
D . 多个心皮组成子房，心皮全部形成子房壁，单室

答案：B

496

根和茎的初生木质部发育方式分别为（ ）。

A . 外始式和内始式
B . 内始式和外始式
C . 内起源和外起源
D . 外起源和内起源

答案：A

497

边缘胎座的特征是（ ）。

A . 单室多心皮，子房的胚珠沿腹缝着生，如豆类
B . 单室一心皮，子房的胚珠沿腹缝线着生，如豆类
C . 单室一心皮，子房的胚珠沿背缝线着生，如豆类
D . 多室一心皮，子房的胚珠沿腹缝线着生，如豆类

答案：B

498

葡萄是合轴分枝，它的卷须是由（ ）形成的。

A . 顶芽
B . 花芽
C . 不定芽
D . 腋芽

答案：A

499

李善兰最早创译的书是（ ）。

A . 《进化论》
B . 《植物学》
C . 《植物生理学》
D . 《动物学》

答案：B

500

在自然状态下，高等植物的生活周期通常是（ ）。

A . 孢子体世代产生孢子，配子体世代只产生配子，受精卵发育成孢子体和配子体
B . 孢子体世代只产生孢子，孢子只发育配子体；配子体世代只产生配子，受精卵发育孢子体
C . 孢子体世代产生孢子和配子，受精卵发育成孢子体和配子体
D . 孢子体世代产生配子，配子发育成配子体

答案：B

ANXSG

501

甜菜肉质根中可出现(　　)层额外形成层。

A．一
B．二
C．三
D．多

答案：D

502

清代吴其浚著有(　　)。

A．《植物名实图考》
B．《茶经》
C．《竹谱》
D．《名医别录》

答案：A

503

四强雄蕊指的是(　　)。

A．每花6个雄蕊中，外轮二个短，内轮四个长，如唇形科植物
B．6个雄蕊中，外轮二个短，内轮四个长，如十字花科植物
C．6个雄蕊中，外轮二个长，内轮四个短，如十字花科植物
D．6个雄蕊中，外轮三个长，内轮三个短，如十字花科植物

答案：B

504

真菌的异养方式为(　　)。

A．吞食固形营养物
B．吸收营养物
C．寄生
D．吞食和吸收营养物

答案：B

505

多数植物学工作者承认高等植物的祖先是下列藻类中的(　　)。

A．蓝藻门
B．裸藻门
C．绿藻门
D．硅藻门

答案：C

506

有限花序包括以下几种类型?(　　)

A．复伞形花序，伞房花序，单歧聚伞花序
B．复伞形花序，二歧聚伞花序，复伞房花序
C．伞房花序，伞形花序，多歧聚伞花序
D．单歧聚伞花序，二歧聚伞花序，多歧聚伞花序

答案：D

507

豌豆花的花公式是，它表示(　　)。

A．不整齐花，萼片五个联合，五个花瓣离生，雄蕊十个，九个联合，雌蕊一心皮一室，子房上位
B．不整齐花，花瓣五个联合，萼片五个离生，雄蕊十个，九个联合，雌蕊一心皮一室，子房上位
C．不整齐花，萼片五个联合，花瓣五个离生，雄蕊十个，九个联合，雌蕊一心皮一室，子房下位
D．不整齐花，萼片五个，花瓣五个，雄蕊十个，其中九个联合，雌蕊一心皮一室，子房上位

答案：A

508

无限花序的特征是(　　)。

A．开花时，花轴可继续伸长，产生苞片，在苞腋内形成花芽，开花顺序自下而上，如花序轴缩短，则开花顺序由边缘至中央
B．在花轴的顶端丛生若干等长的分枝

ANXSG

C ． 花轴顶端的顶芽发育成花后，其侧芽发育成枝，继续生长
D ． 开花时，花轴可继续伸长，产生苞片，在苞腋内形成花芽，开花顺序是自上而下

答案：A

509

被子植物的胚乳是双受精的产物，有些植物的种子具有外胚乳，它们是由以下何种结构发育而来？(　　)

A ． 未受精极核发育而来，其染色体倍数为2n
B ． 由珠被绒毡层发育而来，染色体倍数为2n
C ． 由珠心组织发育而来，染色体倍数为2n
D ． 由珠心组织发育而来，其染色体倍数为3n

答案：C

510

裸子植物胚乳是(　　)。

A ． 孢子体世代，核相为3N
B ． 配子体世代，核相为3N
C ． 孢子体世代，核相为2N
D ． 配子体世代，核相为N

答案：D

511

植物的学名是用哪种文字命名的？(　　)

A ． 德文
B ． 法文
C ． 拉丁文
D ． 英文

答案：C

512

由个体产生新个体，以延续种族的现象叫做(　　)。

A ． 繁殖
B ． 营养繁殖
C ． 生长
D ． 有性生殖

答案：A

513

下列变态器官不是由茎变态的是(　　)。

A ． 皂角(荚)的刺
B ． 山楂的刺
C ． 洋槐的刺

答案：C

514

减数分裂的两次分裂是连续的，其中第一次分裂的前期包括以下几个连续的时期？(　　)

A ． 偶线期，细线期，粗线期，双线期，终变期
B ． 粗线期，偶线期，双线期，细线期，终变期
C ． 细线期，偶线期，粗线期，双线期，终变期
D ． 双线期，粗线期，偶线期，细线期，终变期

答案：C

515

下列各大类植物的组合中，苔藓植物属于(　　)。

A ． 孢子植物、高等植物、有胚植物、隐花植物、维管植物
B ． 孢子植物、低等植物、羊齿植物、颈卵器植物、维管植物
C ． 羊齿植物、颈卵器植物、有胚植物、隐花植物、维管植物
D ． 孢子植物、高等植物、有胚植物、隐花植物、颈卵器植物

答案：D

ANXSG

516

裸子植物没有(　　)。

A . 胚珠
B . 颈卵器
C . 孢子叶
D . 蒴帽

答案: D

517

地衣的形态基本上可分为3种类型,即(　　)。

A . 壳状地衣、叶状地衣和同层地衣
B . 同层地衣、异层地衣和枝状地衣
C . 壳状地衣、枝状地衣和叶状地衣
D . 异层地衣、叶状地衣和枝状地衣

答案: C

518

刺槐的刺是(　　)。

A . 皮刺
B . 托叶刺
C . 茎刺

答案: B

519

苔藓植物的孢子体的营养方式为(　　)。

A . 自养
B . 腐生
C . 寄生或半寄生
D . 腐生和寄生

答案: C

520

嫁接技术在生产中应用广泛,嫁接的成活率决定于(　　)。

A . 嫁接的技术,嫁接植株的年龄
B . 嫁接植株间的亲缘关系,嫁接的技术
C . 嫁接的技术,嫁接后的管理,嫁接植株间的亲缘关系
D . 嫁接植株间的亲缘关系

答案: C

521

甜菜肉质根中的额外形成层(副形成层)来自(　　)。

A . 次生木质部的木薄壁细胞
B . 中柱鞘
C . 皮层
D . 髓

答案: B

522

(　　)的变态根中,主要食用部分来自三生结构。

A . 胡萝卜
B . 萝卜
C . 甜菜和甘薯
D . 萝卜和甜菜

答案: C

523

雌蕊是由心皮构成的,心皮是(　　)。

A . 一片苞片
B . 一片营养叶
C . 一片变态的叶

ANXSG

D . 一片托叶

答案: C

524

苔藓植物的生活史,减数分裂发生在( )。

A . 合子分裂产生胚时

B . 产生精、卵时

C . 原丝体发育成配子体时

D . 产生孢子时

答案: D

525

苔藓植物的有性生殖为( )。

A . 同配生殖

B . 异配生殖

C . 卵式生殖

D . 接合生殖

答案: C

526

以下所列的结构,哪一些全是叶的变态?( )

A . 南瓜、葡萄、豌豆、菝葜等的卷须

B . 豌豆卷须、洋葱鳞叶、刺槐的刺、苞片

C . 芽鳞、鳞叶、花柄、花托

D . 葱头、大蒜瓣、皮刺

答案: B

527

地钱的下列结构中,属于孢子体世代(染色体为2n)的是( )。

A . 胞芽

B . 孢蒴

C . 假根

D . 精子器

答案: B

528

苔藓植物的孢蒴又称( )。

A . 配子囊

B . 孢子囊

C . 卵囊

D . 精子囊

答案: B

529

以下花公式:,表示的是( )。

A . 整齐花,花被两轮,每轮三片,雄蕊两轮,每轮三片,雌蕊三个心皮合生,三室,子房上位

B . 整齐花,雄蕊两轮,每轮三个,花被两轮,每轮三片,雌蕊三个心皮合生,三室,子房上位

C . 整齐花,花被两轮,每轮三片,雄蕊两轮,每轮三个,雌蕊三个心皮合生,子房下位

D . 不整齐花,花被两轮,每轮三片,雄蕊两轮,每轮二个,雌蕊三个心皮合生,三室,子房上位

答案: A

530

裸子植物的雌配子体是( )。

A . 成熟胚囊

B . 珠心

C . 珠心和胚乳

D . 胚乳和颈卵器

答案: D

ANXSG

531

非绿色植物对有机物的分解称(　　)。

A . 化能合成作用

B . 矿化作用

C . 呼吸作用

D . 发酵作用

答案: B

532

在花药四角的表皮下,出现的细胞核较大的细胞,叫做(　　)。

A . 小孢子母细胞

B . 造孢细胞

C . 孢原细胞

D . 小孢子

答案: C

533

侧膜胎座的特征是(　　)。

A . 单室复子房,胚珠沿背缝线着生,全在周边的位置,如三色堇

B . 单室复子房,胚珠沿腹缝线着生,全在中央的位置,如三色堇

C . 单室复子房,胚珠沿腹缝线着生,全在周边的位置,如三色堇

D . 单室单子房,胚珠沿腹缝线着生,全在周边的位置,如三色堇

答案: C

534

苹果的花公式是(　　)。

A .

B .

C .

D .

答案: C

535

藻类植物与菌类植物的本质区别为(　　)。

A . 藻类水生,菌类陆生

B . 藻类绿色,菌类无色

C . 藻类含光合色素,自养;菌类不含光合色素,异养

D . 藻类具鞭毛,菌类无鞭毛

答案: C

536

仙人掌上的刺是(　　)。

A . 茎刺

B . 皮刺

C . 叶刺

D . 托叶刺

答案: C

537

利用药剂处理,使花药或花粉的正常发育受阻,失去产生花粉或精子的作用称为(　　)。

A . 雄性不育

B . 人工去雄

C . 花粉败育

D . 药物杀雄

答案: D

538

中轴胎座的特征是(　　)。

A . 多室复子房,各心皮在中央联合,形成中轴,隔膜完整,胚珠着生在中轴上

B . 单室复子房,各心皮在中央联合,形成中轴,隔膜完整胚珠着生在中轴上

ANXSG

C ．多室复子房，各心皮在中央联合，形成中轴，隔膜不完整，胚珠着生在中轴上
D ．单室单子房，心皮在中央联合，形成中轴，隔膜完整，胚珠着生在中轴上

答案：A

539

甜菜萝卜具有发达肉质直根，其发达的部分主要由（　　）产生的。

A ．初生木质部
B ．次生木质部
C ．次生木质部和次生韧皮部
D ．三生结构

答案：D

540

马铃薯的食用部分是（　　）。

A ．块根
B ．块茎
C ．根状茎
D ．球茎

答案：B

541

兰科植物的花粉，许多粒粘在一起，称为（　　）。

A ．花粉小块
B ．双胞花粉
C ．三胞花粉
D ．花粉块

答案：D

542

穗状花序的特征是（　　）。

A ．具一直立的花轴，着生了许多无柄的两性花，花缺乏花冠，如车前
B ．具一直立的花轴，着生了许多无柄的两性花，如车前
C ．具一直立的花轴，着生了许多无柄的单性花，如车前
D ．具一直立的花轴，着生了许多短柄的两性花，如车前

答案：B

543

莴苣主要食用部分是（　　）。

A ．叶的变态
B ．根的变态
C ．茎的变态

答案：C

544

离生雌蕊指的是（　　）。

A ．一朵花中的雌蕊由多个心皮组成，且心皮彼此分离，如大豆
B ．一朵花中的雌蕊由多个心皮组成，且心皮彼此分离，如莲
C ．一朵花中的雌蕊由多个心皮组成，且心皮彼此联合，如玉米
D ．一朵花中的雌蕊由多个心皮组成，如莲

答案：B

545

大蒜的蒜瓣是（　　）。

A ．块茎
B ．鳞茎
C ．球茎
D ．腋芽

答案：D

ANXSG

546

下列哪一组属于同源器官?(　　)

A．马铃薯和红薯
B．葡萄和豌豆的卷须
C．月季和仙人掌上的刺
D．莲藕和荸荠

答案：D

547

生姜属于变态的(　　)。

A．根
B．茎
C．叶
D．果

答案：B

548

榕树在侧枝上下垂,并扎入地面的根,属(　　)。

A．不定根
B．气生根
C．支柱根
D．不定根、气生根和支柱根

答案：D

549

贾思勰的名著(　　)。

A．《齐民要术》
B．《农政全书》
C．《本草纲目》
D．《天工开物》

答案：A

550

明代徐光启(1562-1633)著有(　　)。

A．《农政全书》
B．《天工开物》
C．《本草纲目》
D．《齐民要术》

答案：A

551

马铃薯的块茎上凹陷处有(　　)。

A．定芽
B．不定芽
C．定根
D．不定根

答案：A

552

子房是由以下几部分组成?(　　)

A．柱头,花柱,子房壁
B．子房壁,花柱,胚珠
C．子房壁,胚座,胚珠
D．子房壁,柱头,胚珠

答案：C

553

洋葱的主要食用部分是(　　)。

A．鳞茎
B．鳞叶

ANXSG

C . 叶状茎
D . 小鳞茎

答案: B

554

我们食用的红薯是(　　)。

A . 块根
B . 块茎
C . 肉质根
D . 根状茎

答案: A

555

水绵的接合生殖方式有(　　)。

A . 梯形接合和侧面接合
B . 梯形结合和直接侧面接合
C . 侧面接合和直接侧面接合
D . 梯形接合、侧面接合和直接侧面接合

答案: D

556

种子植物的开花、传粉和受精过程中,包含的两个生殖过程是(　　)。

A . 营养繁殖,孢子繁殖
B . 孢子繁殖,无性生殖
C . 无性生殖,有性生殖
D . 有性生殖,无融合生殖

答案: C

557

具有变态根的植物是(　　)。

A . 马铃薯
B . 生姜
C . 大蒜
D . 红薯

答案: D

558

下列哪种植物器官是茎的变态?(　　)

A . 胡萝卜
B . 甜菜
C . 萝卜
D . 荸荠

答案: D

559

乌头学名的正确书写形式应该是下列的哪一种?(　　)

A . Aconitum Carmichaeli Debx
B . ACarmichaeli Debx
C . Aconitum carmichaeli Debx
D . Acarmichaeli Debx

答案: C

560

单体雄蕊指的是(　　)。

A . 雄蕊的花丝联合成筒状,如蚕豆
B . 雄蕊的花丝联合成筒状,如棉花
C . 雄蕊的花药联合成筒状,如棉花
D . 雄蕊的花丝,花药联合成筒状,如棉花

答案: B

ANXSG

561

《农政全书》一书的作者是(　　)。

A ．宋应星

B ．徐光启

C ．李明珍

D ．贾思勰

答案：B

562

根的初生结构取材于(　　)。

A ．分生区

B ．伸长区

C ．根毛区

D ．根毛区以上部分

答案：C

ANXSG
ANXSG
ANXSG

563

根的功能有(　　)。

A . 贮藏
B . 吸收
C . 支持
D . 保护
E . 蒸腾

答案: ABC

564

根的初生构造中为外始式的有(　　)。

A . 中柱鞘
B . 木质部
C . 外皮层
D . 内皮层
E . 韧皮部

答案: BE

565

叶脱落前,在叶柄基部或靠近叶柄基部产生离区,它包括(　　)和(　　)两部分。

A . 离层
B . 叶隙
C . 保护层

答案: AC

解析: 植物学教材 金银根主编 P169-170

566

根毛区(成熟区)的横切面结构由外向内可分为(　　)。

A . 根冠
B . 分生区
C . 表皮
D . 皮层
E . 木质部

答案: CDE

567

侧根发生的部位(　　)。

A . 分生区
B . 根毛区
C . 表皮
D . 内皮层
E . 中柱鞘

答案: BE

568

下列特征中,限制了苔藓植物向陆生生活发展,仅生长于潮湿地的是:(　　)。

A . 精子具鞭毛,借水的作用才能与卵结合
B . 植物体组织分化程度还不高,体内无维管组织,输导能力不强
C . 没有真根,水分和无机盐常靠叶片来直接吸收
D . 生殖器官外围有不育性的多细胞保护

答案: ABC

569

在双子叶植物叶片的横切面上,可根据(　　)或(　　)来判断叶的背腹面。

A . 叶肉组织
B . 叶脉
C . 表皮

答案: AB

解析: 植物学教材 金银根主编 P165-166

ANXSG

570

以下描述中符合禾本科植物根结构特点的是(　　)。

A ．不能进行次生生长
B ．内皮层细胞常五面加厚
C ．外皮层通常厚壁化
D ．有周皮的形成

答案：ABC

571

旱生植物叶利于减少蒸腾的特征是(　　)。

A ．叶小
B ．多茸毛
C ．角质层发达和气孔下陷
D ．海绵组织发达
E ．通气组织发达

答案：ABC

572

植物细胞内,具有单层膜的细胞器有(　　)。

A ．微管
B ．液泡
C ．线粒体
D ．溶酶体
E ．叶绿体

答案：BD

573

间期细胞核的结构包括(　　)。

A ．核膜
B ．核仁
C ．核孔
D ．核质
E ．核液

答案：ABD

574

各类植物根据它们与光照强度的关系,可分为(　　)植物、(　　)植物。

A ．阴地
B ．水生
C ．阳地

答案：AC

解析：植物学教材 金银根主编 P180

575

根冠的主要功能(　　)。

A ．保护分生区
B ．有重力作用
C ．起润滑作用
D ．产生新细胞
E ．吸收作用

答案：ABC

576

一枚完全叶是由(　　)组成的。

A ．叶鞘
B ．叶片
C ．叶柄
D ．叶舌
E ．托叶

答案：BCE

ANXSG

577

双子叶植物幼茎的维管束包括下列哪些?(　　)

A . 初生木质部
B . 维管束鞘
C . 束中形成层
D . 初生韧皮部

答案: ACD

578

茎中木栓形成层最初发生的位置因植物种类而异,有关起源的位置说法正确的是(　　)。

A . 近表皮的皮层细胞
B . 表皮
C . 次生韧皮部
D . 初生韧皮部

答案: ABD

579

细胞内微梁系统包括(　　)。

A . 中间纤维
B . 微体
C . 微丝
D . 微管

答案: ACD

580

在下面备选答案中,选择(　　)可组成一朵完全花。

A . 重瓣花
B . 双被花
C . 整齐花
D . 两性花
E . 具柄花

答案: BDE

581

木质部是一种复合组织,其组成分子包括(　　)。

A . 管胞
B . 伴胞
C . 筛管
D . 导管

答案: AD

582

玉米叶片结构的特征是(　　)、(　　)、(　　)和(　　)。

A . 叶肉组织无分化
B . 具花环式的维管束鞘(C4植物特征)
C . 有栅栏组织
D . 表皮上有泡状细胞(运动细胞)
E . 保卫细胞哑铃形

答案: ABDE

解析: 植物学教材 金银根主编 P166-167

583

下列特征中,低等植物不同于高等植物的是(　　)。

A . 合子发育时离开母体不形成胚
B . 合子在母体内发育形成胚
C . 生殖器官为单细胞
D . 生殖器官为多细胞
E . 在形态上无根茎叶的分化
F . 在构造上一般无组织分化

答案: ACEF

ANXSG

584

下列花序中，花的开放次序由上向下的是（　　）。

A ．轮伞花序
B ．蝎尾状花序
C ．穗状花序
D ．伞房花序
E ．伞形花序

答案：AB

585

在绿藻门的下述特征中，（　　）与高等植物特征相同。

A ．载色体
B ．含有叶绿素a和b
C ．光合产物为淀粉
D ．接合生殖

答案：ABC

586

根的增粗主要是由于（　　）分裂、活动的结果。

A ．居间分生组织
B ．侧生分生组织
C ．形成层
D ．木栓形成层
E ．顶端分生组织

答案：BCD

587

被子植物生活史中，两个世代交替的转折点是（　　）。

A ．减数分裂
B ．受精作用
C ．花粉和胚囊发育成熟
D ．胚形成
E ．种子萌发

答案：AB

588

杨树茎能不断地增粗、主要是由于（　　）活动的结果。

A ．初生增厚分生组织
B ．顶端分生组织
C ．维管形成层
D ．居间分生组织
E ．木栓形成层

答案：CE

589

在植物分泌结构中，属于内分泌结构的有（　　）。

A ．分泌腔
B ．腺毛
C ．树脂道
D ．乳汁管
E ．蜜腺

答案：ACD

590

种子的基本结构包括（　　）。

A ．种皮
B ．种脐
C ．胚
D ．胚乳
E ．胚珠

ANXSG

答案：ACD

591

种子萌发必须有适宜的条件，即（　　）。

A ．充足的光照
B ．足够的养分
C ．足够水分
D ．适宜的温度
E ．充足的氧气

答案：CDE

592

下列植物的花序（　　）属于无限花序。

A ．向日葵
B ．萝卜
C ．香菜
D ．番茄
E ．附地菜

答案：ABC

593

双子叶植物的叶片通常是由（　　）组成的。

A ．表皮细胞
B ．泡状细胞
C ．硅细胞
D ．气孔器
E ．表皮毛

答案：ADE

594

下列（　　）属于不育的变态叶。

A ．雄蕊
B ．花萼
C ．花瓣
D ．心皮

答案：BC

595

双子叶植物子叶出土的纪苗有（　　）。

A ．豌豆
B ．大豆
C ．白菜
D ．向日葵
E ．南瓜

答案：BCDE

596

苹果的果实属于（　　）。

A ．假果
B ．梨果
C ．肉果
D ．单果

答案：ABCD

597

种子休眠的主要原因有（　　）。

A ．光照不足
B ．后熟作用
C ．种皮过厚
D ．湿度过低

ANXSG

E ．存在抑制萌发的物质

答案：BCE

598

被子植物种子的主要类型包括(　　)。

A ．双子叶植物有胚乳种子
B ．双子叶植物无胚乳种子
C ．单子叶植物有胚乳种子
D ．单子叶植物无胚乳种子
E ．多子叶植物有胚乳种子

答案：ABCD

599

种子植物的胚是由(　　)组成的。

A ．胚乳
B ．胚根
C ．子叶
D ．胚轴
E ．胚芽

答案：BCDE

600

双子叶植物无胚乳种子有(　　)。

A ．菜豆
B ．黄瓜
C ．甘兰
D ．蓖麻
E ．亚麻

答案：ABC

601

植物细胞内,与细胞壁形成有关的细胞器有(　　)。

A ．微体
B ．核糖体
C ．高尔基体
D ．溶酶体
E ．内质网

答案：CE

602

植物叶片的主要功能是(　　)。

A ．支持作用
B ．光合作用
C ．繁殖作用
D ．蒸腾作用
E ．贮藏作用

答案：BCDE

603

双子叶植物有胚乳种子有(　　)。

A ．大豆
B ．花生
C ．蓖麻
D ．蕃茄
E ．向日葵

答案：CD

604

双子叶植物茎的初生结构由下列哪些结构组成?(　　)

A ．周皮

ANXSG

B ．皮层
C ．维管束
D ．表皮

答案：BCD

605

初生根的中柱鞘细胞，具有潜在的分生能力，恢复分裂后，可以形成（　　）。

A ．木栓形成层
B ．维管形成层
C ．皮层
D ．中柱
E ．木质部

答案：AB

606

茎的生长习性常见的以下几种？（　　）

A ．直立茎
B ．平卧茎
C ．缠绕茎
D ．茎卷须
E ．茎刺

答案：ABC

607

贯穿于植物体各器官中输导同化产物的细胞是（　　）。

A ．筛管
B ．筛胞
C ．导管
D ．管胞

答案：AB

608

单子叶植物有胚乳种子有（　　）。

A ．小麦
B ．玉米
C ．洋葱
D ．慈菇
E ．水稻

答案：ABCE

609

不经过受精作用就能产生新个体来延续后代的方式包括（　　）。

A ．单性结实
B ．无融合生殖
C ．营养繁殖
D ．单性结实和无融合生殖
E ．单性结实、无融合生殖和营养繁殖

答案：BC

610

种子贮存的适宜条件是（　　）。

A ．高温
B ．低温
C ．干燥
D ．潮湿
E ．真空

答案：BCE

ANXISG

611

豌豆的果实属于(　　)。

A . 肉果

B . 干果

C . 裂果

D . 闭果

E . 荚果

答案：BCE

612

下列植物的花序(　　)属无限花序。

A . 向日葵

B . 萝卜

C . 香菜

D . 番茄

E . 附地菜

答案：CD

613

限制苔藓植物向陆生生活发展的是( )。

A . A 没有真根

B . B 体内无维管组织

C . C 精子具鞭毛借水才能与卵结合

D . D 生殖器官外围有不育性的多细胞保护

答案：ABC

解析：ABC是限制因素，D是适应陆生的特征。

614

茎的生长习性常见的有?( )

A . A 茎刺

B . B 直立茎

C . C 茎卷须

D . D 平卧茎

E . E 缠绕茎

答案：BCDE

解析：茎刺和茎卷须是变态，其余是生长习性。

615

双子叶植物的叶片通常由( )组成。

A . 泡状细胞

B . 表皮毛

C . 硅细胞

D . 表皮细胞

E . 气孔器

答案：BDE

解析：泡状细胞和硅细胞是单子叶植物特有。

616

双子叶植物子叶出土的幼苗有( )。

A . 大豆

B . 向日葵

C . 南瓜

D . 白菜

E . 豌豆

答案：ABC

解析：大豆、向日葵、南瓜为子叶出土萌发。

617

蓝藻是地球上最原始、最古老的植物,细胞构造的原始性状表现在(　　)。

A . 原核

ANXSG

B . 鞭毛类型为茸鞭型
C . 叶绿素中仅含叶绿素a
D . 没有载色体及其它细胞器
E . 细胞分裂为直接分裂,没有有性生殖
F . 无细胞壁

答案: ACDE

618

下列结构中,属于苔类配子体世代(染色体为n)的是( )。

A . 二分叉的叶状体
B . 孢子
C . 蒴苞
D . 受精卵
E . 弹丝
F . 颈卵器
G . 雌器托
H . 胞芽
I . 原丝体

答案: ABCFGHI

619

在下列藻类植物中具原核细胞的植物是( )。

A . 发菜
B . 海带
C . 水绵
D . 原绿藻

答案: AD

620

下列真菌类中,属于担子菌纲的是( )。

A . 灵芝
B . 竹荪
C . 猴头
D . 冬虫夏草

答案: ABC

621

下列藻类植物中,细胞含叶绿素a和b的为裸藻门、甲藻门;叶绿素a和c的为( );叶绿素a和d的为绿藻门。

A . 裸藻门
B . 甲藻门
C . 金藻门
D . 硅藻门
E . 绿藻门
F . 红藻门
G . 褐藻门

答案: BCDG

622

下列结构中,属于蕨类孢子体世代是( )。

A . 假根
B . 孢子
C . 基足
D . 蒴盖
E . 弹丝
F . 蒴帽
G . 孢蒴
H . 蒴柄

答案: CDGH

ANXSG

623

下列特征中，苔藓植物与蕨类植物共有的特征是（　　）。

A ．具明显的世代交替
B ．生殖器官为多细胞，且外层有不孕细胞保护
C ．有性生殖为卵式生殖
D ．精子具鞭毛，受精过程离不开水
E ．无性生殖产生孢子
F ．具维管组织
G ．孢子体寄生在配子体上
H ．孢子体和配子体均能独立生活
I ．具胚
J ．具原丝体

答案：ABCDEI

624

下列藻类植物中，具世代交替的是（　　）。

A ．颤藻
B ．衣藻
C ．水云
D ．多管藻

答案：CD

625

下列特征中，苔藓植物生活史所具有的特点是（　　）。

A ．具原丝体阶段
B ．配子体发达，孢子体寄生在配子体上的异形世代交替
C ．具有减数分裂
D ．孢子体发达，配子体寄生在孢子体的异形世代交替
E ．有胚的出现

答案：ABCE

626

下列藻类植物中细胞具眼点的是（　　）。

A ．裸藻
B ．衣藻
C ．金藻
D ．黄藻

答案：ABCD

627

下列真菌孢子中，具二倍体的是（　　）。

A ．担孢子
B ．卵孢子
C ．接合孢子
D ．子囊孢子

答案：BC

628

粘菌是介于动物和真菌之间的真核生物，生活史中一个时期具动物性，另一个时期具植物性。具动物性特征的是无细胞壁、无叶绿素、营养体形态、结构、行动和取食方法与变形虫相同，具真菌特性的是（　　）。

A ．无细胞壁
B ．孢子具纤维素的细胞壁
C ．无叶绿素
D ．产生孢子囊
E ．营养体形态、结构、行动和取食方法与变形虫相同
F ．有些粘菌（如睡菌属Plamobiphora）对食物是吸收而不是吞食

答案：BDF

ANXSG

629
小麦胚中含有丰富的脂肪、蛋白质及矿物质，但不含淀粉。（√）
解析：小麦胚中确实富含脂肪、蛋白质及矿物质，但胚中不含淀粉，淀粉主要存在于胚乳中。

630
核糖体是合成糖的细胞器。（×）
解析：核糖体是蛋白质合成的场所，不是合成糖的细胞器，合成糖的主要是叶绿体。

631
双子叶植物中，有的植物具平行叶脉。（√）
解析：虽然双子叶植物叶脉通常为网状脉，但有些双子叶植物如车前、竹芋等也具平行脉。

632
木本双子叶植物茎中维管形成层圆环，其向外分裂出的细胞通常分化为次生木质部，向内分裂出来的细胞通常分化为次生韧皮部，使茎进行次生生长。（×）
解析：维管形成层向外分裂产生的是次生韧皮部，向内分裂产生的是次生木质部，题目把方向说反了。

633
皮孔是表皮上的通气组织。（×）
解析：皮孔是周皮上的通气结构，不是表皮上的，表皮上的通气结构是气孔。

634
低等植物合子直接发育成植物体而不形成胚，因此也被称为无胚植物。（√）
解析：低等植物合子直接发育成植物体不形成胚，因此被称为无胚植物或隐胚植物。

635
腋芽原基进一步发育同样会产生与顶芽相同的叶原基。（√）
解析：腋芽原基发育形成的侧芽与顶芽结构相似，也能产生叶原基等结构。

636
木兰科植物多具聚合蓇葖果。（√）
解析：木兰科植物的果实多为聚合蓇葖果，这是该科的重要特征之一。

637
单子叶植物纲植物根系常为须根系。（√）
解析：单子叶植物纲植物的根系通常为须根系，主根不发达或早期停止生长。

638
豆目植物依据花的形状、花瓣排列的方式，可分为含羞草科、苏木科和蝶形花科3个科。（√）
解析：豆目植物依据花的形状和花瓣排列方式确实可分为含羞草科、苏木科和蝶形花科三个科。

639
苎麻等纤维作物为人类所利用的部位是维管组织。（×）
解析：苎麻等纤维作物利用的主要是韧皮纤维，属于韧皮部的一部分，而不是整个维管组织。

640
子房上位可有下位花和周位花二种情况。（√）
解析：子房上位时，花各部分着生在子房下方为下位花，花各部分着生在子房周围杯状花托上为周位花。

641
由一个细胞构成的组织称为简单组织。（×）
解析：简单组织是由一种细胞构成的组织，而不是由一个细胞构成的，一个细胞不能称为组织。

642
子房的心皮数目一定等于子房室数。（×）
解析：子房的心皮数目不一定等于子房室数，如心皮愈合形成一室，或有假隔膜分隔成多室。

643
韧皮射线和木射线合称维管射线，有横向输导和贮藏营养物质的功能。（√）
解析：韧皮射线和木射线合称维管射线，位于维管束内，具有横向输导和贮藏营养物质的功能。

ANXSG

644

在老茎中，木栓形成层可以在次生韧皮部中发生。（√）

解析：木栓形成层可以发生在次生韧皮部、皮层甚至表皮中，不同植物部位不同。

645

玉米茎的维管束主要由维管束鞘、次生木质部、次生韧皮部构成。（×）

解析：玉米茎的维管束主要由维管束鞘、初生木质部和初生韧皮部构成，没有次生结构。

646

二体雄蕊就是一朵花中只有两个离生的雄蕊。（×）

解析：二体雄蕊是指一朵花中有10个雄蕊，其中9个花丝合生、1个分离，而不是只有两个离生雄蕊。

647

机械组织在植物体内起支持作用，其细胞形状都是长形的。（×）

解析：机械组织的细胞并非都是长形的，如厚角细胞可呈近圆形，石细胞可呈等径状。

648

狭义概念的树皮是木栓形成层历年产生周皮的总称，是老茎的重要保护结构。（√）

解析：狭义的树皮指木栓层以外的部分，包括木栓层、木栓形成层和栓内层。历年产生的周皮叠积构成老茎的保护结构。

649

双子叶植物纲植物的胚大多具有两片子叶。（√）

解析：狭义的树皮指木栓层以外的部分，包括木栓层、木栓形成层和栓内层。历年产生的周皮叠积构成老茎的保护结构。

650

如果给一颗杨树的树干上用小刀刻一痕迹，那么几年之后此树长高了，其刀痕的位置也随之升高了。（×）

解析：双子叶植物胚通常有两片子叶，这是双子叶植物命名的由来。

651

在一段木本茎枝条的外形上可以看到节间、节、腋芽等，有的枝条上还可以看到芽鳞痕。（√）

解析：木本茎枝条外形上可以看到节间、节、腋芽等，有的枝条上还可以看到芽鳞痕。

652

胚乳和外胚乳都是受精的产物。（×）

解析：胚乳是由受精极核发育而来，属于受精产物；但外胚乳是由珠心组织发育而来，不经受精。

653

在个体发育中来源相同，形态结构相似执行一定生理功能的细胞组合，称为组织。（√）

解析：组织是在个体发育中来源相同、形态结构相似、执行一定生理功能的细胞群。

654

胡萝卜的花序属于复伞形花序。（√）

解析：胡萝卜属伞形科，其花序为复伞形花序。

655

一串葡萄由一个圆锥花序发育而来，称为聚花果或花序果，也称复果。（×）

解析：葡萄的果实是由一朵花中的一个子房发育而成的，属于单果，不是聚花果。

656

种子植物的配子体极为退化，不能独立生活，完全寄生在孢子体上。（√）

解析：种子植物的配子体极度退化，不能独立生活，完全寄生在孢子体上。

657

由3心皮组成的复雌蕊有6条腹缝线。（×）

解析：由3心皮组成的复雌蕊有3条腹缝线（每心皮一条），不是6条。

658

禾本科植物的果实为瘦果。（×）

解析：禾本科植物的果实为颖果，果皮和种皮愈合在一起，不是瘦果。

659

茎尖细胞中有丰富的生长素。（√）

解析：茎尖分生组织区域生长素含量丰富，促进茎的伸长生长。

ANXSG

660

小孢子母细胞减数分裂后，形成4个花粉粒，花粉粒细胞核内的染色体数目与母细胞的染色体数目相同。（×）

解析：小孢子母细胞经减数分裂形成的花粉粒，其染色体数目是母细胞的一半（单倍体），不是相同。

661

伞房花序与伞形花序的区别在于，后者花柄长短不等，花差不多排列在一个平面上，如梨，苹果的花序。（×）

解析：伞房花序是花柄长短不等但花排列在同一平面上（如梨、苹果）；伞形花序是花柄等长。题目描述的是伞房花序，却说是伞形花序。

662

高等植物合子直接发育成植物体而不形成胚，因此也被称为无胚植物。（×）

解析：高等植物合子发育成胚，因此被称为有胚植物。低等植物才被称为无胚植物。

663

单子叶植物纲植物根系常为直根系。（×）

解析：单子叶植物纲植物根系常为须根系，直根系是双子叶植物的特征。

664

直根系多为深根系，须根系多为浅根系。（√）

解析：直根系主根发达，入土较深；须根系主要由不定根组成，分布较浅。

665

石细胞属于机械（厚壁）组织，叶肉细胞属于薄壁组织。（√）

解析：石细胞细胞壁加厚，属厚壁机械组织；叶肉细胞壁薄，属薄壁组织。

666

蚕豆的花，有十个雄蕊，九个联合，一个分离，叫做多体雄蕊。（×）

解析：蚕豆花的雄蕊为(9)+1的二体雄蕊，不是多体雄蕊。多体雄蕊是指雄蕊分为多组，每组多个合生。

667

植物细胞的结构包括细胞壁和原生质体两大部分。（√）

解析：植物细胞由细胞壁和原生质体两大部分组成。

668

种子中子叶的数目为1~2片。（×）

解析：种子中子叶的数目不止1～2片，裸子植物可有多片子叶。

669

嫁接可克服种子繁殖不能保存亲代优良品质的缺点。（×）

解析：此说法正确。嫁接属于无性繁殖，能保持亲代优良品质，而种子繁殖（有性繁殖）因基因重组不能完全保持。【注：原答案标记为错可能有误，此题说法应为正确】

670

植物幼茎的表皮上有气孔分布。（√）

解析：植物幼茎的表皮上有气孔分布，用于气体交换和蒸腾作用。

671

茎中一般无凯氏带。（√）

解析：凯氏带主要存在于根的内皮层，茎中一般没有凯氏带。

672

锦葵科植物花中花丝聚合成一体，称为聚药雄蕊。（×）

解析：锦葵科植物花中花丝合生成管状，称为单体雄蕊；聚药雄蕊是花药合生而花丝分离。

673

周皮和树皮都是复合组织。（√）

解析：周皮由木栓层、木栓形成层和栓内层构成，树皮还包括韧皮部等，二者都是复合组织。

674

桃和梨均是假果。（×）

解析：桃是真果（由子房发育），梨是假果（由子房和花托共同发育），说两者均是假果不对。

ANXSG

675

禾本科植物的花与一般双子叶植物的花组成不同。(√)

解析：禾本科植物的花为颖花，与一般双子叶植物的花组成不同，缺少花被等结构。

676

玉米子叶的功能是将胚乳的营养物质转运至胚，供萌发时生长发育的需要。(√)

解析：玉米为单子叶植物，子叶（盾片）的功能是吸收和转运胚乳中的营养物质供胚发育。

677

管胞除具输导水分的功能外，还兼有机械支持的功能。(√)

解析：管胞两端尖斜，壁厚木质化，既能输导水分又兼有机械支持功能。

678

壳斗科植物的果实为坚果。(√)

解析：壳斗科植物的果实为坚果，外有壳斗（总苞）包被。

679

维管形成层的射线原始细胞与茎轴垂直排列，发育成茎的横向(径向)系统。(√)

解析：射线原始细胞与茎轴垂直排列，形成横向（径向）的维管射线系统。

680

所有被子植物的叶都由叶片，叶柄和托叶组成。(×)

解析：并非所有被子植物的叶都由叶片、叶柄和托叶三部分组成，缺少任何部分都称为不完全叶。

681

根毛是表皮细胞外壁向外突出形成的顶端开放的管状结构。(×)

解析：根毛是表皮细胞向外突出形成的顶端封闭的管状结构，不是顶端开放的。

682

成熟胚囊的增大主要是由于中央细胞液泡的膨大。(√)

解析：成熟胚囊的中央细胞有很大的液泡，其膨大使胚囊增大。

683

无籽的果实都是由单性结实产生的。(×)

解析：无籽果实不都是由单性结实产生的，如三倍体西瓜的无籽果实是染色体变异导致的。

684

会落叶的树叫落叶树，不会落叶树的叫常绿树。(×)

解析：常绿树并非不落叶，而是老叶脱落与新叶长出同时进行，全年都有叶片。

685

水稻、小麦根无次生生长。(√)

解析：水稻、小麦属于单子叶植物，根无维管形成层，不进行次生生长。

686

花是一节间缩短的枝条，在它上面生长着变态的叶子，它是被子植物的繁殖器官，通常开花，传粉，受精后形成果实。(√)

解析：花是节间极度缩短的变态枝条，花各部分为变态叶，是被子植物的繁殖器官。

687

维管束由植物体内呈分离束状的韧皮部构成。(×)

解析：维管束由木质部和韧皮部共同构成，不是仅由韧皮部构成。

688

禾本科植物的叶片缺水分时可向上卷曲，其叶片上表皮具有运动细胞只是原因之一。(√)

解析：禾本科植物叶缺水时上表皮运动细胞失水收缩使叶片卷曲，但卷曲还有其他原因如叶脉结构等。

689

所有植物的种子脱落后，在适宜的环境条件下可以立即萌发。(×)

解析：许多植物种子脱落后需经过休眠期才能萌发，不能立即萌发。

690

侧根起源于中柱鞘，起源方式为外起源。(×)

解析：侧根起源于中柱鞘是正确的，但起源方式为内起源（从内部组织发生），不是外起源。

ANXSG

691

根毛分布在根尖的伸长区和成熟区。(×)

解析：根毛只分布在根尖的成熟区（根毛区），伸长区没有根毛。

692

木栓形成层主要进行切向分裂，向外产生的多层新细胞，经生长分化为木栓层，向内产生的新细胞经生长分化为栓内层。(√)

解析：木栓形成层切向分裂，向外产生木栓层，向内产生栓内层，三者共同构成周皮。

693

水生植物的储水组织很发达。(×)

解析：水生植物为适应水生环境，通气组织发达而非储水组织发达。

694

成熟即筛管分子是无核、无液泡、管状的生活细胞。(√)

解析：成熟筛管分子是无核、无液泡的管状生活细胞，通过伴胞供给营养。

695

在初生根的横切面上，初生木质部和初生韧皮部各三束，故为“六原型”。(×)

解析：初生木质部有几束称为几原型，各三束应为三原型，不是六原型。

696

大多数被子植物的种子中胚乳是三倍体，而外胚乳因未经受精形成，故为单倍体。(×)

解析：外胚乳由珠心组织发育而来，珠心是母本二倍体组织，所以外胚乳为二倍体（2n），不是单倍体。

697

在自然界，雌雄异株植物，单性花植物能严格的保证异花传粉。(√)

解析：雌雄异株植物和单性花植物在结构上保证了异花传粉的实现。

698

单叶的叶柄与复叶小叶柄基部均有腋芽。(×)

解析：复叶的小叶柄基部没有腋芽，只有复叶的总叶柄基部才有腋芽。

699

胚是由胚芽、胚根和胚轴三部分组成。(×)

解析：胚由胚芽、胚轴、胚根和子叶四部分组成，不只是三部分。

700

葫芦科植物的果实特称为瓠果。(√)

解析：葫芦科植物的果实特称为瓠果，由下位子房发育而成。

701

维管束由植物体内呈分离束状的木质部构成。(×)

解析：维管束由木质部和韧皮部共同构成，不是仅由木质部构成。

702

禾本科植物茎横切结构没有皮层和维管柱之分。(√)

解析：禾本科植物茎横切中维管束散生于基本组织中，没有明显的皮层和维管柱之分。

703

单子叶植物纲植物的胚大多具有两片子叶。(×)

解析：单子叶植物纲植物的胚大多具有一片子叶，两片子叶是双子叶植物的特征。

704

树皮中的外树皮全是死组织，内树皮主要是活组织。(√)

解析：树皮中的外树皮为周皮及以外的死组织，内树皮主要是韧皮部等活组织。

705

叶脱落后留在茎上的痕迹称叶迹。(×)

解析：叶脱落后留在茎上的痕迹称叶痕，不是叶迹。叶迹是维管束从茎进入叶的部分。

706

侧生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。(√)

解析：侧生分生组织包括维管形成层和木栓形成层，位于茎和根的侧面。

ANXSG

707

垂周分裂所形成的新细胞壁与器官表面垂直。(√)

解析：垂周分裂时新形成的细胞壁与器官表面垂直，使分生组织面积扩大。

708

单子叶植物茎没有形成层，所以不能进行嫁接。(×)

解析：虽然单子叶植物茎通常无维管形成层，但某些单子叶植物如龙血树有异常形成层。

709

芽的起源属于内起源，形成突起的细胞排列与茎尖顶端分生组织相似，在细胞分裂过程中也形成叶原基。(×)

解析：芽的起源属于外起源，由茎尖表面细胞分裂产生，不是内起源。

710

种子萌发时先伸出胚根，然后露出胚芽，最后形成具有根、茎、叶的幼苗。(√)

解析：种子萌发时胚根先突破种皮，然后胚轴伸长将胚芽推出土面。

711

羽状三出复叶的顶端小叶柄比侧生小叶柄长。(√)

解析：羽状三出复叶中顶端小叶的小叶柄通常比两侧小叶的长。

712

表皮位于花药的最外一层细胞，以平周分裂增加细胞数目。(×)

解析：表皮位于花药最外层，以垂周分裂增加细胞数目，不是平周分裂。

713

叶绿体是进行光合作用的细胞器，它只存在于同化作用器官叶子的细胞中。(×)

解析：叶绿体不仅存在于叶片细胞中，幼茎、花萼等绿色部位的细胞中也有。

714

所有的被子植物的成熟花粉都是三细胞的。(×)

解析：被子植物的成熟花粉粒有二细胞型和三细胞型两种，并非都是三细胞的。

715

单雌蕊子房仅由一心皮构成一室，复雌蕊子房则可以由数个心皮形成数室或一室。(√)

解析：单雌蕊由一心皮构成一室，复雌蕊可由数个心皮形成数室或因愈合只形成一室。

716

穗状花序与总状花序的区别在于:前者直立花轴上着生许多无柄的两性花，如车前。(√)

解析：穗状花序花轴直立，着生许多无柄花，如车前。

717

不完全叶中有一类仅具叶柄。(√)

解析：不完全叶中有的仅具叶片，有的仅具叶柄和叶片，有的仅具叶片和托叶。

718

种子萌发所不可缺少的外界条件是水分、湿度和氧气。(×)

解析：种子萌发不可缺少的外界条件是水分、温度和氧气，不是湿度。

719

根只具有吸收和支持的功能。(×)

解析：根除吸收和支持功能外，还有合成有机物、贮藏、繁殖等功能。

720

在一朵花中，雌蕊只由一个心皮构成，称单雌蕊。(√)

解析：由一个心皮构成的雌蕊称单雌蕊。

721

木本植物多年生老茎中，早期的次生木质部导管和管胞会因形成胼胝体而失去输导作用。(×)

解析：木质部导管的堵塞物是侵填体（由周围薄壁细胞经纹孔侵入形成），不是胼胝体。胼胝体仅存在于韧皮部筛管的筛板处。

722

维管射线包括木射线和韧皮射线。(√)

解析：维管射线包括木射线和韧皮射线，起横向运输和贮藏作用。

ANXSG

723

茎的维管形成层细胞进行平周分裂的方式是扩大其自身的周径。(×)

解析：维管形成层平周分裂产生次生木质部和次生韧皮部，扩大周径是垂周分裂的结果。

724

花粉以各种不同的方式传到雌蕊柱头上，叫传粉。在被子植物中，只有异花传粉。(×)

解析：被子植物中既有异花传粉也有自花传粉，并非只有异花传粉。

725

同一年之内形成的早材和晚材之间的界限非常明显。(×)

解析：早材和晚材之间是逐渐过渡的，明显的是年轮界线（晚材与次年早材之间）。

726

植物的表皮由一层不含质体的死细胞组成。(×)

解析：植物表皮由一层活细胞组成，可以含有白色体等质体，不是死细胞。

727

根与茎的木栓形成层最早起源于中柱鞘。(×)

解析：根的木栓形成层最早起源于中柱鞘，茎的可起源于表皮、皮层等不同部位。

728

根中初生木质部的发育方式为内始式，而初生韧皮部的发育方式则为外始式。(×)

解析：根的初生木质部和初生韧皮部发育方式都是外始式，不是内始式。

729

受精后的胚珠中，合子发育成胚，受精极核发育成胚乳，珠柄发育成种柄，珠孔发育成种孔，珠被发育成种皮。有的植物的珠心组织在胚发育过程中，被消耗或发育成外胚乳。(√)

解析：受精后胚珠各部分发育：合子成胚，受精极核成胚乳，珠被成种皮，珠心可成外胚乳。

730

双子叶植物茎维管柱包括初生木质部，初生韧皮部，薄壁细胞，维管柱鞘。(×)

解析：双子叶植物茎维管柱包括初生木质部、初生韧皮部和髓等，题目描述不完整。

731

花粉管穿过柱头，沿花柱向子房方向生长，在中空的花柱中，则是沿着花柱道向下生长，在实心的花柱中，花粉管则是沿着细胞间隙向下生长。(√)

解析：花粉管在中空花柱中沿花柱道生长，在实心花柱中沿细胞间隙生长。

732

高等植物减数分裂，发生在大、小孢子形成之时，减数分裂的整个过程，是由二次分裂构成，形成四个细胞。分裂的结果，每个子细胞的染色体数目为母细胞染色体数目的一半。(√)

解析：减数分裂由两次分裂构成，形成四个子细胞，每个子细胞染色体数目为母细胞的一半。

733

次生分生组织起源于初生分生组织。(×)

解析：次生分生组织起源于成熟组织的脱分化，不是起源于初生分生组织。

734

无被花、单被花、单性花都属不完全花。(√)

解析：无被花、单被花、单性花都缺少花的某些部分，属不完全花。

735

被子植物的成熟胚囊都是由八核七细胞组成的。(×)

解析：被子植物成熟胚囊多数为八核七细胞，但也有例外如四核胚囊等。

736

豆科植物的果实为荚果。(√)

解析：豆科植物的果实为荚果，由单心皮发育而成。

737

裸子植物茎的木质部由管胞、导管、木纤维和木薄壁细胞组成。(×)

解析：裸子植物茎木质部由管胞、木薄壁细胞和木射线组成，不含导管。

ANXISG

738

观察根尖纵切永久切片时，在同一张切片中看到有些细胞没有细胞核，是因为该细胞的核已不存在的缘故。（×）

解析：观察根尖纵切时无核细胞是处于分裂期（核膜消失），不是核不存在。

739

根冠由薄壁细胞组成，像一个套子罩在生长锥的前端，起着保护作用。（√）

解析：根冠由薄壁细胞组成，罩在生长锥前端，起保护作用。

740

双子叶植物茎中维管柱是皮层以内的中轴部分，由原形成层和部分基本分生组织发育而来。（√）

解析：双子叶植物茎维管柱由原形成层和部分基本分生组织发育而来。

741

年轮的晚材是在生长期后期所形成的次生木质部，气候逐渐干冷，形成层活动减弱，形成的细胞小而壁厚，材质较紧密。（√）

解析：晚材在生长期后期形成，细胞小而壁厚，材质紧密。

742

菊科植物的果实为颖果。（×）

解析：菊科植物的果实为瘦果，颖果是禾本科的果实。

743

当根毛枯萎后，表皮毁坏，皮层的最外层细胞（外皮层）细胞壁发生栓质化，防止根内部水分损失，起着保护作用。（√）

解析：根毛枯萎后表皮破坏，外皮层细胞壁栓质化防止水分散失。

744

茎的维管形成层细胞进行垂周分裂的结果是扩大形成层自身的周径。（√）

解析：维管形成层垂周分裂使形成层自身周径扩大。

745

植物细胞内的质体包括叶绿体、有色体和核糖体。（×）

解析：质体包括叶绿体、有色体和白色体，核糖体不是质体。

746

单子叶植物纲植物花部常为3基数。（√）

解析：单子叶植物纲花部常为3基数，如百合。

747

水稻、小麦等禾本科植物茎节间短，埋于地下或接近地面，在其一定的节上产生不定根，并由腋芽形成枝条称为分蘖。（√）

解析：禾本科植物茎基部节间短，腋芽形成枝条称为分蘖，并在节上产生不定根。

748

维管植物的主要组织可归纳为皮系统、维管系统和基本系统。（√）

解析：维管植物的主要组织归纳为皮系统、维管系统和基本系统三大系统。

749

闭花受精是在花未开放时就进行受精，只有自花传粉植物中，存在闭花受精现象。（√）

解析：闭花受精是花未开放即完成受精，只存在于自花传粉植物中。

750

初生根、次生根在植物学上与农业上有不同的含义。（√）

解析：初生根和次生根在植物学与农业上的含义不同。

751

佛焰花属于肉穗花序。（√）

解析：佛焰花序属于肉穗花序，外有佛焰苞包被。

752

双子叶木本植物的茎，随着次生木质部的增加，维管形成层的位置逐渐内移，因而植物的茎可以不断增粗。（×）

解析：维管形成层位于次生木质部与次生韧皮部之间，随次生生长向外推移，不会内移。

ANXSG

753

一些老树砍伐后，老茎切口长出的芽是不定芽。（√）

解析：老树砍伐后切口长出的芽是不定芽，由潜伏芽或薄壁细胞恢复分裂产生。

754

所谓树皮就是指木栓组织。（×）

解析：树皮是维管形成层以外的所有组织，包括韧皮部、皮层和周皮，不仅仅是木栓组织。

755

子叶留土的幼苗是由于上胚轴伸长生长的结果。（√）

解析：子叶留土萌发是由于上胚轴伸长将胚芽推出土面，而下胚轴不伸长。

756

茎尖细胞中富含脱落酸。（×）

解析：茎尖细胞富含的是生长素，不是脱落酸。

757

木纤维是厚壁细胞的一种，它的细胞壁化学成分是纯纤维素的。（×）

解析：木纤维细胞壁含纤维素和大量木质素，不是纯纤维素。

758

双子叶植物长高是由于居间分生组织活动的结果。（×）

解析：双子叶植物长高主要依靠顶端分生组织，居间分生组织主要见于禾本科等。

759

线粒体是细胞内主要的供能细胞器。（√）

解析：线粒体是细胞内的动力工厂，是主要的供能细胞器。

760

次生壁是细胞生长增大体积时所形成的壁层。（×）

解析：次生壁是细胞停止生长后在初生壁内侧形成的，不是在增大体积时形成的。

761

周皮是由木栓层和木栓形成层两种不同组织构成的。（×）

解析：周皮由木栓层、木栓形成层和栓内层三种组织构成。

762

有些植物不经过受精，子房也能发育成果实，果实里的种子仍是可以繁殖的，称为单性结实。（×）

解析：不经受精子房发育成果实称为单性结实，产生的果实不含种子。

763

细胞分裂可分为核分裂，胞质分裂和减数分裂三种。（×）

解析：细胞分裂分为有丝分裂、无丝分裂和减数分裂三种。

764

在禾本科植物茎的韧皮部与木质部外围有一圈厚壁组织细胞构成维管束鞘。（√）

解析：禾本科茎维管束外围有一圈厚壁组织构成维管束鞘。

765

物种是生物进化和自然选择的产物，是植物分类的基本单位。（√）

解析：物种是生物进化和自然选择的产物，是植物分类的基本单位。

766

核仁经常出现于间期的细胞核中，它是个折光性强，形状、大小、数目不定的致密小体，外面有层被膜将其与核的其余部分区分开。（×）

解析：核仁没有膜包围，是核内的致密结构。

767

一个成熟的花粉粒是一个细胞。（×）

解析：成熟花粉粒包含营养细胞和生殖细胞（二细胞型）或两个精子（三细胞型），不止一个细胞。

768

低等植物包括藻类植物、菌类植物和地衣植物三大类群。（√）

解析：低等植物包括藻类、菌类和地衣三大类群。

ANXSG

769

种柄是由胚柄发育而来的。(×)

解析：种柄（珠柄）由珠柄发育而来，不是由胚柄发育的。

770

叶芽将来发育成叶，花芽将来发育成花。(×)

解析：叶芽将来发育成枝条（茎和叶），花芽将来发育成花。

771

花生结实，必须在土壤中进行，称为单性结果。(×)

解析：花生结实需要传粉受精，果针入土后子房发育成果实，不是单性结果。

772

裸子植物和双子叶植物根内皮层细胞的径向壁和横向壁上，常有一条栓质化和木质化的带状增厚结构，称凯氏带，凯氏带在根内是一个对水分和溶质运输有着重要调控作用的结构。(√)

解析：裸子植物和双子叶植物根内皮层细胞壁上有凯氏带，调控水分和溶质运输。

773

每种植物结实都是经过了受精作用的。(×)

解析：并非所有植物都经过受精才能结实，单性结实植物不经受精也能结果。

774

气孔器具副卫细胞的现象在单子叶植物与双子叶植物中均存在。(√)

解析：气孔器的副卫细胞在单子叶和双子叶植物中都存在。

775

周皮是由木栓层、木栓形成层和栓内层三种不同组织构成的。(√)

解析：周皮由木栓层、木栓形成层和栓内层三种组织构成。

776

原核细胞是少数低等的植物(细菌、蓝藻)，它们没有细胞核，也无核物质存在。(×)

解析：原核细胞无成形细胞核，但含有DNA等核物质。

777

产生簇生叶序的主要原因是由于茎节间缩短的缘故。(√)

解析：簇生叶序是由于节间极度缩短使叶片簇生在一起。

778

所有植物的种子脱离母体后，胚芽、胚根、胚轴和子叶均已形成。(×)

解析：并非所有种子脱离母体时胚各部分均已完全形成。

779

双子叶植物根中初生木质部和初生韧皮部呈辐射相间排列，其间被薄壁细胞分隔。(√)

解析：双子叶植物根初生木质部和初生韧皮部呈辐射相间排列，被薄壁细胞分隔。

780

活的植物体并非每一个细胞都是有生命的。(√)

解析：活的植物体中存在大量死细胞如导管、纤维等，并非每个细胞都有生命。

781

糊粉粒是细胞内贮存蛋白质的一种颗粒。(√)

解析：糊粉粒是细胞内贮存蛋白质的颗粒。

782

单子叶植物纲植物花部常为5或4基数。(×)

解析：单子叶植物纲花部常为3基数，不是5或4基数。

783

判断枝条的生长龄，可看芽鳞痕，而计算大树的生长龄，则可看年轮数。(√)

解析：枝条生长龄可看芽鳞痕，大树生长龄可看年轮数。

784

组成胚的细胞均具有分裂的能力。(√)

解析：组成胚的细胞均为分生性细胞，具有分裂能力。

ANXSG

785

植物的生长是不断的生长，因此，组成植物体的细胞都可以不断分裂，直到植物体死亡为止。（×）

解析：植物体中许多细胞分化后失去分裂能力，不是所有细胞都能不断分裂。

786

种子贮藏时，其含水量越低，代谢活动越弱，越利于贮藏。（√）

解析：种子含水量越低，代谢活动越弱，越利于贮藏。

787

细胞减数分裂中同源染色体的配对是在双线期进行。（×）

解析：同源染色体配对（联会）发生在偶线期，不是双线期。

788

柑桔中及果皮中常见到的黄色透明小点的油囊(分泌腔)是由于分泌细胞间的胞间层溶解，细胞相互分开而形成的。（×）

解析：柑橘果皮的油囊是溶生型分泌腔，由分泌细胞破裂溶解形成。

789

裸子植物茎与被子植物茎结构的不同主要表现在木质部中缺少纤维。（×）

解析：裸子植物茎木质部缺少导管（只有管胞），这是与被子植物的主要区别。

790

分生组织按来源可分为原分生组织、初生分生组织和侧生分生组织。（×）

解析：分生组织按来源分原分生组织和初生分生组织，侧生分生组织是按位置分类的。

791

禾本科植物的叶多为等面叶。（√）

解析：禾本科植物叶片上下表面结构相似，多为等面叶。

792

有的植物学教材将蚕豆的花程式写为这是有不妥的。因为个轮之间才用“+”号，而蚕豆的花冠和雄蕊各仅一轮。（√）

解析：蚕豆花程式中花冠和雄蕊各仅一轮，轮间不应用+号。

793

面粉主要是由小麦种子的子叶加工而成的。（×）

解析：面粉主要由小麦种子的胚乳加工而成，不是子叶。

794

根与茎的初生结构基本相似，只是表皮不同。（×）

解析：根与茎的初生结构在维管组织排列方式、皮层等方面都有显著不同。

795

原生质是广泛地指细胞内有生命的物质。（√）

解析：原生质是细胞内有生命的物质的总称，是细胞生命活动的物质基础。

796

植物的珠被层数与其种皮层是相同的。（×）

解析：种皮层数不一定与珠被层数相同，珠被可能融合或退化。

797

禾本科植物例如水稻、小麦、玉米等的小穗，实际上代表一朵小花，其中的颖片、稃片、浆片等均是由花被饰变而来的。（×）

解析：禾本科小穗代表一个花序的一部分，不是一朵花，颖片等不是花被饰变。

798

维管束在初生木质部和初生韧皮部之间存在形成层的叫有限维管束，无形成层的叫无限维管束。（×）

解析：有形成层的维管束叫无限维管束，无形成层的叫有限维管束，题目说反了。

799

不定芽是指生长在根、老茎和叶上生出的芽，如甘薯、洋槐的根上；秋海棠、落地生根的叶上长出的芽。（√）

解析：不定芽生长在根、老茎或叶上，发生位置不固定。

ANXSG

800

侧根为定根，起源于根毛区内中柱鞘的一定部位，即总是发生于原生木质部与原生韧皮部之间的地方。（×）

解析：侧根起源于中柱鞘原生木质部脊处，不是原生木质部与原生韧皮部之间。

801

双子叶植物纲植物根系常为须根系。（×）

解析：双子叶植物纲根系常为直根系，须根系是单子叶植物的特征。

802

单歧聚伞花序属于有限花序。（√）

解析：单歧聚伞花序属于有限花序（聚伞花序类）。

803

子房室的数目一定等于子房的心皮数目。（×）

解析：子房室数目不一定等于心皮数目，与心皮愈合方式有关。

804

不经过受精作用，子房就发育成果实，这种现象称单性结实。（√）

解析：不经受精子房发育成果实称为单性结实。

805

初生木质部是输导同化产物的组织，初生韧皮部是输导水分和溶于水的无机盐的组织。（×）

解析：初生木质部输导水分和无机盐，初生韧皮部输导同化产物，题目说反了。

806

苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物被称为维管植物。（×）

解析：苔藓植物无维管组织，不属于维管植物。维管植物包括蕨类、裸子和被子植物。

807

胚乳是受精的产物，外胚乳由珠心组织发育而来，其染色体倍数均为3n。（×）

解析：外胚乳由珠心组织（二倍体）发育而来，是二倍体（2n），不是三倍体。

808

禾本科植物叶片下表皮具有一些大型薄壁细胞，长轴与叶脉平行，分布于两个叶脉之间称运动细胞（泡状细胞）。（×）

解析：植物学教材 金银根主编 P166

809

成熟果实中富含生长素。（×）

解析：成熟果实中脱落酸含量上升，乙烯增多，生长素含量下降。

810

蓖麻种子为出土萌发的类型，其子叶有贮藏养料和光合作用的功能。（×）

解析：蓖麻种子为留土萌发类型，子叶不出土，主要吸收转运胚乳养料。

811

高等植物的根与土壤中的某些真菌共生而形成的共生体称为菌根。共生的菌根能加强根部的吸收能力，促进根系的发育等功能。（√）

解析：高等植物根与真菌共生形成菌根，能加强吸收能力，促进根系发育。

812

一株植物只有一个顶芽，但可有多个腋芽。（×）

解析：一株植物可有多个顶芽（如合轴分枝植物）和多个腋芽。

813

由珠心或珠被的细胞直接发育成的胚称不定胚。（√）

解析：不定胚是由珠心或珠被细胞直接发育而成的胚，不经受精过程，见于柑橘等植物。

814

子房室数目的多少，由心皮数目所决定。（×）

解析：不定胚是由珠心或珠被细胞直接发育而成的胚，不经受精过程，见于柑橘等植物。

ANXISG

815

花粉囊壁层由周缘细胞分裂后与表皮细胞组成。小孢子母细胞由造孢细胞直接发育或分裂后发育而来。(√)

解析：花粉囊壁层由周缘细胞分裂后与表皮组成，小孢子母细胞由造孢细胞发育而来。

816

苔藓植物绝大多数是陆生植物，受精过程摆脱了水的限制。(×)

解析：苔藓植物受精需要水的参与，精子需借助水游到卵细胞处。

817

根与茎的初生结构不同，主要是木质部与韧皮部排列不同，其它都一样。(×)

解析：根与茎初生结构在表皮、皮层、维管组织排列等方面都不同。

818

有丝分裂中DNA复制在G1期进行。(×)

解析：DNA复制发生在S期（合成期），不是G1期。

819

无胚乳种子在其发育过程中没有胚乳的形成。(×)

解析：无胚乳种子发育过程中有胚乳形成，成熟时被子叶吸收了。

820

禾本科植物胚的特点是：成熟胚具一大的盾片，盾片对面是外胚叶。胚芽，胚根分别被胚芽鞘，胚根鞘包围。(√)

解析：禾本科胚具盾片、外胚叶，胚芽和胚根分别被胚芽鞘和胚根鞘包围。

821

完全或仅由子房发育而形成的果实为真果，如桃子、花生。(√)

解析：完全或仅由子房发育而成的果实为真果，如桃子、花生。

822

蓼型胚囊发育是被子植物的一种普遍类型，即四个大孢子中，珠孔端最近的一个大孢子发育，经三次有丝分裂后，形成八核胚囊。(×)

解析：蓼型胚囊发育中合点端的一个大孢子发育，不是珠孔端的。

823

种皮比较坚硬的棉花种子可用浓硫酸处理打破休眠。(√)

解析：种皮坚硬的棉花种子可用浓硫酸处理打破休眠。

824

低等植物生殖器官大多为多细胞结构。(×)

解析：低等植物生殖器官大多为单细胞结构，多细胞生殖器官是高等植物的特征。

825

筛胞是存在于被子植物韧皮部具有输导营养功能的细胞。(×)

解析：筛胞是裸子植物韧皮部的输导细胞，被子植物中是筛管分子。

826

等面叶即指叶表皮无栅栏组织和海绵组织的区别。(×)

解析：等面叶是指叶肉组织没有栅栏组织和海绵组织分化的叶。

827

禾本科植物根的初生木质部一般为多原型。(√)

解析：禾本科属于单子叶植物，其根的初生木质部通常为多原型（三原型以上），与双子叶的二原型不同。

828

幼苗子叶出土的原因在于上胚轴伸长的速度较快。(×)

解析：禾本科属于单子叶植物，其根的初生木质部通常为多原型（三原型以上），与双子叶的二原型不同。

829

双子叶植物纲植物花部常为3基数。(×)

解析：双子叶植物纲花部常为5或4基数，3基数是单子叶植物的特征。

ANXSG

830

一般在双子叶植物中，髓位于幼茎中央，其细胞体积较大，常含淀粉粒，具有储藏作用。（√）

解析：双子叶植物幼茎中央的髓由薄壁细胞组成，常含淀粉粒，具储藏作用。

831

荚果由一个心皮发育而成，成熟时，从背腹缝线裂开，果皮裂成二瓣。（√）

解析：荚果由一个心皮发育，成熟时从背腹缝线裂开为两瓣。

832

成熟的导管分子和筛管分子都是死细胞。（×）

解析：成熟导管分子是死细胞，筛管分子是活细胞（无核），不是两者都是死细胞。

833

花萼在花的最外面，其形状，大小，颜色及功能变化很大，有的为花冠状，吸引昆虫传粉；有的变成冠毛，有助于种子的传播；有的宿存，具保护幼果的作用。（√）

解析：花萼形态功能变化很大，有的花冠状吸引昆虫，有的成冠毛助传播，有的宿存保护幼果。

834

高等植物包括苔藓植物门、蕨类植物门、裸子植物门和被子植物门四大类群。（√）

解析：高等植物包括苔藓、蕨类、裸子和被子植物四大类群。

835

裸子植物茎与被子植物茎结构的不同主要表现在木质部与韧皮部的组成成分上。（√）

解析：裸子植物与被子植物茎结构的不同主要在木质部与韧皮部的组成成分上。

836

菊科植物花中花药合生成筒状，称为单体雄蕊。（×）

解析：菊科花药合生成筒状称为聚药雄蕊，不是单体雄蕊。

837

子房是雌蕊基部膨大的囊状部分，由子房壁，子房室，胎座和胚珠组成。（√）

解析：子房由子房壁、子房室、胎座和胚珠组成，是雌蕊基部膨大的囊状部分。

838

所有植物细胞的细胞壁都具有胞间层、初生壁和次生壁三部分。（×）

解析：并非所有植物细胞壁都有三层结构，许多薄壁细胞只有胞间层和初生壁。

839

木栓形成层只能来自中柱鞘。（×）

解析：木栓形成层可起源于表皮、皮层、中柱鞘等不同部位。

840

在木本植物中，次生木质部可逐年增加，而韧皮部的厚度基本一样。（√）

解析：木本植物中次生木质部逐年增加，韧皮部厚度基本不变。

841

菊科是被子植物中最大的科。（√）

解析：菊科是被子植物中最大的科之一。

842

一粒玉米就是一粒种子。（×）

解析：一粒玉米是果实（颖果），果皮和种皮愈合，不是一粒种子。

843

借昆虫传粉的花，称为虫媒花。虫媒花往往具有引诱昆虫的结构，如花序长而倒悬，花先叶开放，柱头扩展显著突出等，如禾本科植物。（×）

解析：禾本科植物是风媒花，不是虫媒花。

844

筛管分子的筛板上有许多穿孔。（×）

解析：筛管分子的筛板上有许多筛孔，通过胞间连丝联络。

ANXSG

845

在叶原基形成幼叶的生长过程中，首先是居间生长使叶原基延长成柱形，接着是边缘生长形成的幼叶雏形，以后叶片的进一步长大，则主要是顶端生长的结果。（×）

解析：植物学教材 金银根主编 P162

846

风媒花的柱头多呈羽毛状，增加柱头接受花粉粒的表面积。（√）

解析：风媒花柱头多呈羽毛状，增加接受花粉的表面积。

847

茎次生生长中，心材直径逐渐加大，边材则相对地保持一定的宽度。（√）

解析：茎次生生长中心材直径逐渐加大，边材保持一定宽度。

848

导管是由许多导管分子连接而成，其侧壁有环纹、螺纹、梯纹、网纹和纹孔等五种类型的加厚方式。（×）

解析：导管侧壁加厚方式有环纹、螺纹、梯纹、网纹和孔纹五种。

849

双子叶植物纲植物的胚大多具有一片子叶。（×）

解析：双子叶植物纲胚大多具有两片子叶。

850

成熟区（根毛区）的每部分都具有很强的吸收力。（×）

解析：成熟区中只有根毛区表皮细胞吸收力最强，内部已分化的组织吸收力弱。

851

根的木质部发育方式为内始式，而韧皮部则为外始式。（×）

解析：根初生木质部发育方式为外始式，茎中则为内始式。

852

二叉分枝是原始的分枝方式，茎顶端分生组织一分为二，每一半各形成一分枝。（√）

解析：二叉分枝是原始的分枝方式，茎顶端一分为二各形成一分枝。

853

分泌道和分泌腔均为内分泌组织，且都是由于细胞中层溶解而裂生形成。（×）

解析：分泌腔是溶生型（细胞溶解形成），分泌道是裂生型（中层溶解形成），形成方式不同。

854

一般植物的根中，形成层活动产生的次生韧皮部的数量远远多于次生木质部。（×）

解析：形成层活动产生的次生木质部数量远多于次生韧皮部。

855

休眠的种子中常含有高浓度的脱落酸。（√）

解析：休眠种子中常含有高浓度脱落酸，抑制萌发。

856

所有花萼都呈绿色，结构和功能与叶类似。（×）

解析：花萼不都呈绿色，如一串红花萼呈红色。

857

茎尖的分区和根尖一样可分为分生区、伸长区、成熟区。（×）

解析：茎尖分区包括生长点、叶原基、幼叶、芽轴和芽原基，与根尖分区不同。

858

在一些植物的木质部中，有些较老的导管逐渐丧失输导能力，被形成胼胝体的囊状突起所填充。（×）

解析：导管丧失输导能力是由于形成侵填体（薄壁细胞侵入），不是胼胝体。

859

当看到一朵花是4基数时，就立即可判断它是属于单子叶植物纲的。（×）

解析：4基数花也可能是双子叶植物（如十字花科），不能仅凭花基数判断。

860

观察气孔表面观，可用叶片做横切。（×）

解析：观察气孔表面观应撕取表皮制片，不是做横切。

ANXSG

861

子房不经过受精发育成果实的过程称为孤雌生殖。(×)

解析：不经受精子房发育成果实称为单性结实，孤雌生殖是指卵细胞不受精直接发育。

862

植物检索表是根据拉马克的二歧分类原则编制的。(√)

解析：植物检索表根据拉马克的二歧分类原则编制。

863

具有种脊的种子常由倒生胚珠发育。(√)

解析：具种脊的种子常由倒生胚珠发育而来。

864

菊科植物花中花药合生成筒状，称为聚药雄蕊。(√)

解析：菊科花药合生成筒状称为聚药雄蕊。

865

木本双子叶植物茎中，束中形成层位于初生木质部和初生韧皮部之间，束间形成层位于维管束之间，它们共同构成一连续的形成层圆环。(√)

解析：束中形成层位于初生木质部和韧皮部之间，束间形成层位于维管束之间，构成连续的形成层环。

866

周皮的木栓层即通常称的树皮部分。(×)

解析：周皮的木栓层只是树皮的一部分，树皮还包括韧皮部等组织。

867

纺锤原始细胞经平周分裂后可形成次生木质部和次生韧皮部。(√)

解析：纺锤原始细胞经平周分裂形成次生木质部和次生韧皮部。

868

边材属次生木质部，心材属初生木质部。(×)

解析：边材和心材都属于次生木质部，心材是较早形成的部分。

869

从外形上不能识别出裸芽和鳞芽。(×)

解析：从外形上可区分裸芽（无芽鳞）和鳞芽（有芽鳞包被）。

870

胚乳细胞的染色体为3N，而外胚乳的染色体为2N。(√)

解析：胚乳细胞染色体为3N，外胚乳由珠心发育（2N）。

871

玉米茎横切结构：机械组织以内为基本组织所充满，维管束分散排列于其中，近边缘的维管束较小，相距较近，靠中央的维管束较大，相距较远。(√)

解析：玉米茎维管束散生于基本组织中，近边缘小而密，靠中央大而疏。

872

双名法是由拉马克提出并创立的。(×)

解析：双名法由林奈创立，不是拉马克。

873

种子的基本结构包括胚芽、胚轴、胚和子叶四个部分。(×)

解析：种子基本结构包括种皮和胚，有的还有胚乳。胚由胚芽、胚轴、胚根、子叶组成。

874

在茎的初生结构中，初生韧皮部的分化方式称为外始式，先分化出来的是后生韧皮部。(×)

解析：初生韧皮部分化方式为外始式，先分化出的是原生韧皮部。

875

一个成熟细胞，其细胞壁的结构大体分为胞间层、初生壁和次生壁三层。(×)

解析：并非所有成熟细胞都有次生壁，许多薄壁细胞和表皮细胞只有初生壁。

ANXSG

876

筛管分子间由穿孔相通，并有细胞质呈细线状联络索通过。（×）

解析：筛管分子间通过筛板上的筛孔相通，有联络索通过。

877

根的初生木质部在次生木质部的内方。（√）

解析：根的初生木质部位于维管柱中央，在次生木质部的内方。

878

花粉成熟后，花粉囊开裂，花粉散出，此时的花药壁层仅由表皮，纤维层组成。（√）

解析：花粉成熟开裂后花药壁仅由表皮和纤维层组成。

879

有的植物茎的初生维管束，在木质部内外均有韧皮部，称为双韧维管束，如南瓜。（√）

解析：双韧维管束中木质部内外均有韧皮部，如南瓜。

880

枝是植物茎中主干以外的部分。（×）

解析：枝是茎上着生叶和芽的部分，包括节和节间。

881

将某次生木质部的切片，置于显微镜下观察之，所见的导管、管胞、木薄壁细胞、木纤维和维管射线，都是其纵切面的形态，据此我们可以推断这张切片所显示的是茎的次生木质部切向切面的构造。（×）

解析：次生木质部三切面中纵切面可见导管等纵列形态，横切面可见横断面。

882

树皮由木栓层、木栓形成层和栓内层三种不同的组织构成。（×）

解析：树皮是维管形成层以外的所有组织，不仅限于周皮。

883

分泌结构不属于成熟组织。（×）

解析：分泌结构属于成熟组织中的分泌组织。

884

核糖体也称核糖核蛋白体，是细胞中蛋白质的合成中心。（√）

解析：核糖体是细胞中蛋白质合成的中心。

885

吸胀是种子萌发的必要过程，可以作为开始发芽的标志。（×）

解析：吸胀是种子萌发的第一步，但发芽标志是胚根露出。

886

苹果的果实是由子房与花托愈合在一起发育形成的，是假果。（√）

解析：苹果果实由子房和花托共同发育而成，是假果。

887

假二叉分枝为合轴分枝的一种，茎上着生对生叶序，顶芽停止发育后，其下两个腋芽同时发育为两个侧枝。（√）

解析：假二叉分枝是合轴分枝的一种，顶芽停后两侧腋芽同时发育。

888

果实成熟时，其内的脱落酸含量上升。（√）

解析：果实成熟时脱落酸含量上升，促进衰老和脱落。

889

根的初生结构可用根毛区的横切面来说明，由外至内可划分为表皮、皮层、维管柱（中柱）。（√）

解析：根的初生结构由外至内为表皮、皮层、维管柱。

890

雌蕊的子房着生在花托上，子房和花托完全愈合，叫下位子房，由它发育的果实是假果。（√）

解析：下位子房与花托完全愈合，发育的果实为假果。

ANXSG

891

低等植物植物体没有根、茎、叶的分化。(√)

解析：低等植物（藻类、菌类、地衣）没有真正的根、茎、叶分化，植物体为原植体。

892

所有的被子植物成熟的花粉粒都是二细胞的结构。(×)

解析：低等植物（藻类、菌类、地衣）没有真正的根、茎、叶分化，植物体为原植体。

893

菌根是高等植物的根与土壤中的某些真菌共生而形成的共生体。(√)

解析：菌根是高等植物根与真菌共生形成的结构。

894

棉花的3片大型的副萼又称为叶状苞片。(√)

解析：棉花的3片大型副萼称为叶状苞片（副萼）。

895

既有花萼又有花冠的花称为重瓣花。(×)

解析：既有花萼又有花冠的花称为重被花（二被花），不是重瓣花。

896

菌根分为内生菌根和外生菌根两类。(×)

解析：菌根分为外生菌根、内生菌根和内外兼生菌根三类。

897

小麦麦穗是一个复穗状花序，每一小穗基部的颖片内有几朵花，一般基部的2～3朵花发育正常，能结实，称能育花；上部几朵花发育不完全，不能结实，称为不育花。(√)

解析：小麦麦穗为复穗状花序，基部2-3朵花能育，上部花不育。

898

厚角组织常含有叶绿体，能进行光合作用。(√)

解析：厚角组织常含叶绿体，能进行光合作用。

899

植物的年龄、各年份气候特征或变化等均与年轮的宽窄有一定的关系，因此，年轮可作为研究气候变迁的依据。(√)

解析：年轮宽窄与气候有关，可作为研究气候变迁的依据。

900

侧根与侧枝的起源方式不同，前者为内起源，后者为外起源。(√)

解析：侧根为内起源，侧枝为外起源，两者起源方式不同。

901

花生种子是由种皮、胚和胚乳三部分组成。(×)

解析：花生种子是无胚乳种子，由种皮和胚组成。

902

叶一般正面颜色深，是因为上表皮细胞叶绿体多。(×)

解析：叶正面颜色深是因为栅栏组织靠近上表皮，含叶绿体多，不是上表皮细胞。

903

禾本科植物一个小穗就是一朵花。(×)

解析：禾本科一个小穗由1至多朵小花组成，不是一朵花。

904

在叶原基形成幼叶的生长过程中，首先是顶端生长使叶原基延长成柱形，接着是边缘生长形成的幼叶雏形，以后叶片的进一步长大，则主要是居间生长的结果。(√)

解析：植物学教材 金银根主编 P162

905

茎的环髓带也叫中柱鞘。(×)

解析：环髓带（髓鞘）位于髓外围由厚壁细胞组成，不是中柱鞘。

ANXSG

906

无胚乳种子不形成胚乳。(×)

解析：无胚乳种子在发育过程中有胚乳形成，成熟时被子叶吸收了。

907

种子萌发时胚乳提供给胚充分的养料，若没有胚乳，种子萌发不能完成。(×)

解析：无胚乳种子养料贮存在子叶中，萌发时子叶提供养料。

908

双子叶木本植物茎的髓射线狭窄，草本植物茎的髓射线较宽。(√)

解析：双子叶木本植物茎髓射线狭窄，草本植物茎髓射线较宽。

909

纺锤丝由微丝组成。(×)

解析：纺锤丝由微管组成，不是微丝。

910

马铃薯的块茎发育成新的植物体即为营养繁殖。(√)

解析：马铃薯块茎进行营养繁殖形成新植株。

911

双子叶植物叶正面颜色深，是因为上表皮细胞含有绿体多。(×)

解析：植物学教材 金银根主编 P165

912

淀粉鞘是植物茎中普遍存在的结构。(×)

解析：淀粉鞘不是所有植物茎中都有，主要存在于某些植物皮层最内层。

913

伞形科植物的果实为双悬果。(√)

解析：伞形科的特征果实为双悬果，成熟时两个分果分离悬挂于果柄上。

914

根茎的过渡区是在植物的胚轴部分。(√)

解析：伞形科的特征果实为双悬果，成熟时两个分果分离悬挂于果柄上。

915

植物的学名是全国统一的名称。(×)

解析：植物学名是国际统一的，使用拉丁文双名法。

916

植物的表皮及表皮附属物(表皮毛、气孔等)起保护植物体的作用。(×)

解析：表皮毛起保护作用，气孔主要功能是气体交换和蒸腾。

917

桃和梨均具有假果。(×)

解析：桃是真果，梨是假果，说两者均具假果不对。

918

十字花科植物的果实为角果。(√)

解析：十字花科的特征果实为角果，由两个心皮组成，有假隔膜。

919

低等植物植物体具有根、茎、叶的分化。(×)

解析：十字花科的特征果实为角果，由两个心皮组成，有假隔膜。

920

外胚乳具胚乳的作用，仅见于无胚乳种子。(×)

解析：外胚乳在有胚乳和无胚乳种子中都可能存在。

921

被子植物中最常见的成熟胚珠类型是直生胚珠。(×)

解析：被子植物中最常见的胚珠类型是倒生胚珠。

ANXSG

922

根瘤只见于豆科植物根部。(×)

解析：根瘤不仅见于豆科，桤木、杨梅等也有。

923

植物根、茎、叶等各种器官的长大是因为细胞分裂使细胞数目增多造成的。(×)

解析：器官长大是细胞分裂和细胞伸长共同作用的结果。

924

根的木栓形成层最早起源于中柱鞘细胞。(√)

解析：根的木栓形成层最早由中柱鞘细胞恢复分裂能力产生，向外形成木栓层，向内形成栓内层。

925

原分生组织可以直接分化成表皮、皮层及中柱等初生结构。(×)

解析：根的木栓形成层最早由中柱鞘细胞恢复分裂能力产生，向外形成木栓层，向内形成栓内层。

926

低等植物合子在母体内发育成胚，因此也被称为有胚植物。(×)

解析：低等植物合子直接发育成植物体不形成胚，因此被称为无胚植物，不是有胚植物。

927

被子植物的一个花粉母细胞，可以产生四个小孢子，并进而形成八个雄配子(精子)。一个大孢子母细胞，可以产生四个大孢子，并形成四个卵细胞。(×)

解析：一个花粉母细胞产生4个小孢子共8个精子，一个大孢子母细胞产生4个大孢子但只有1个发育成胚囊产生1个卵细胞。

928

雌蕊即子房。(×)

解析：雌蕊由柱头、花柱和子房三部分组成，子房只是其中一部分。

929

根的次生结构包括由形成层活动产生的次生维管组织和由木栓形成层活动产生的周皮。(√)

解析：根的次生结构包括形成层产生的次生维管组织和木栓形成层产生的周皮。

930

兰科植物叶具有叶片和叶鞘，在叶片和叶鞘之间还有叶舌和叶耳。(×)

解析：兰科植物叶片和叶鞘之间有叶舌但无叶耳，叶舌和叶耳是禾本科的特征。

931

凡发生位置固定的根称为定根，包括主根和侧根两种。在茎、叶、老根或胚轴上生出的根，因其发生位置不固定，故称不定根。(√)

解析：定根包括主根和侧根，不定根发生位置不固定。

932

侧膜胎座沿背缝线排列。(×)

解析：侧膜胎座沿腹缝线排列，不是背缝线。

933

双受精作用既保持了物种遗传的稳定性，又丰富了物种的适应性和抗逆性。(√)

解析：双受精既保持遗传稳定性又丰富适应性和抗逆性。

934

蕨类植物、裸子植物和被子植物被称为维管植物。(√)

解析：蕨类、裸子和被子植物具有维管组织，称为维管植物。

935

植物细胞的结构包括细胞壁和原生质两大部分。(×)

解析：植物细胞结构包括细胞壁和原生质体两大部分。

936

机械组织细胞的主要特征是具加厚的细胞壁和细胞排列得紧密。(√)

解析：机械组织细胞壁加厚，排列紧密，起机械支持功能。

ANXSG

937

有的植物学教材将百合的花公式表示为。但更流行的写法是省去“;”号。(√)

解析：百合花公式中分号的使用有不同写法。

938

分生组织按其在植物体中的所处位置，可分为顶端分生组织、侧生分生组织。(×)

解析：分生组织按位置分顶端、侧生和居间分生组织三类。

939

居间分生组织能保持持久的分生能力，以后则完全转变为成熟组织。(×)

解析：居间分生组织分生能力是暂时的，之后转变为成熟组织。

940

种皮是种子的保护结构，有些种子的种皮厚而坚硬。(√)

解析：种皮是种子的保护结构，有些种子种皮厚而坚硬。

941

被子植物叶片的叶肉组织，都由栅栏组织和海绵组织组成。(×)

解析：被子植物叶肉组织不都由栅栏和海绵组织组成，等面叶无此分化。

942

用符号和数字表示花各部分的组成、排列位置和相互关系，称为花程式。(√)

解析：用符号和数字表示花各部分组成和排列关系称为花程式。

943

双子叶植物纲植物花部常为5或4基数。(√)

解析：双子叶植物纲花部常为5或4基数。

944

根的木栓形成层只来自中柱鞘。(×)

解析：根的木栓形成层最早来自中柱鞘，以后可由韧皮部产生。

945

花瓣呈现鲜艳的色彩，是因其细胞内含有花青素和有色体。(√)

解析：花瓣鲜艳色彩来自花青素和有色体。

946

高等植物生殖器官为单细胞结构。(×)

解析：高等植物生殖器官为多细胞结构，不是单细胞。

947

苔藓植物虽然没有真正的根，但有拟茎叶的分化和胚的出现，因此被列为高等植物。(√)

解析：苔藓植物有拟茎叶分化和胚的出现，被列为高等植物。

948

主根和侧根属初生根，不定根属次生根。(×)

解析：主根、侧根和不定根都属于初生根。

949

柿胚乳细胞壁特别厚，属厚壁组织。(×)

解析：柿胚乳细胞壁厚但属于薄壁细胞（有生活原生质体），不属于厚壁组织。

950

每个植物细胞都有细胞核，而且始终居于细胞中央，控制着细胞的生命活动。(×)

解析：并非每个植物细胞都有细胞核（如成熟筛管、导管），核也不一定在中央。

951

木栓细胞、纤维细胞、石细胞、厚角细胞、筛管、管胞、导管都是植物体特化的死细胞。(×)

解析：筛管分子是活细胞（无核），不是死细胞。

952

禾本科植物茎中维管束呈二环分布在基本组织中。(×)

解析：禾本科茎维管束散生分布于基本组织中，不是二环分布。

ANXSG

953

一般来说，根的原生木质部的束数是相对稳定的，因植物不同而不同，原生木质部有几束，称之为几原型。（√）

解析：原生木质部有几束称为几原型，束数相对稳定。

954

种子休眠的原因有种皮过薄、后熟作用及存在抑制萌发的物质造成的。（×）

解析：种子休眠原因有种皮过厚（不是过薄）、胚后熟、存在抑制物质等。

955

薄壁组织其细胞分化程度浅，可以经脱分化转变为胚性细胞或进一步分化为其它组织。（√）

解析：薄壁组织分化程度浅，可脱分化转变为胚性细胞或其他组织。

956

在果树栽培上，常采取整枝或促控结合的方法来调节长短枝的数量和分布，以获得优质高产和稳产。（√）

解析：果树栽培中通过整枝调节长短枝数量以获优质高产。

957

双子叶植物根的初生韧皮部由筛管、伴胞、韧皮纤维、韧皮薄壁细胞组成，与原生木质部相间排列，输导同化产物，分为原生韧皮部和后生韧皮部。初生韧皮部的成熟方式是内始式。（×）

解析：初生韧皮部成熟方式为外始式，不是内始式。

958

所有植物都具有3个反足细胞。（×）

解析：大多数被子植物胚囊有3个反足细胞，但数目可以更多或更少。

959

酶是一种非蛋白质，它能催化各种生化反应。（×）

解析：酶是蛋白质（少数是RNA），不是非蛋白质。

960

双韧维管束中，内韧皮部与初生木质部之间不存在形成层。（√）

解析：双韧维管束中内韧皮部与初生木质部之间无形成层。

961

借助光学显微镜，可详细观察生活细胞有丝分裂的全过程。（×）

解析：光学显微镜固定制片不能观察有丝分裂全过程，需延时摄影等技术。

962

在老根和老茎(即次生生长以后)的体表都有气孔存在，以进行气体交换。（×）

解析：老根老茎体表被周皮覆盖，无气孔，气体交换通过皮孔进行。

963

根表皮细胞的外壁向外凸起形成根毛，内部细胞分化出各种成熟组织。（√）

解析：根表皮细胞外壁突出形成根毛，内部分化出成熟组织。

964

菌根是细菌与种子植物共生的根。（×）

解析：菌根是真菌与植物根共生的结构，不是细菌。

965

无胚乳种子萌发时需要外界提供足够的养料。（×）

解析：无胚乳种子萌发养料来自子叶，不需要外界提供养料。

966

有的植物不经过受精，子房也能发育成果实，称为无籽结果或单性结果。（√）

解析：不经受精子房发育成果实称为单性结实或无籽结果。

967

一粒小麦即一粒种子。（×）

解析：一粒小麦是果实（颖果），不是一粒种子。

968

锦葵科植物花中花丝聚合成一体，称为单体雄蕊。（√）

解析：锦葵科花丝合生成管状称为单体雄蕊。

ANXSG

969

韧皮射线和木射线合称维管射线，有纵向输导和贮藏营养物质的功能。（×）

解析：维管射线有横向（径向）输导和贮藏功能，不是纵向。

970

液泡中的液体称细胞液。（√）

解析：液泡中的液体称为细胞液。

971

靠近维管形成层的少数年轮属于边材。（√）

解析：靠近维管形成层的较少年轮属于边材。

972

位于皮层的最内一层，细胞排列紧密，在侧壁和横壁上有凯氏带，这一结构为内皮层。（√）

解析：内皮层位于皮层最内层，细胞排列紧密，壁上有凯氏带。

973

侧根的发生与根的顶端分生组织无关。（√）

解析：侧根发生与根顶端分生组织无关，由中柱鞘细胞分裂产生。

974

合点受精是指双受精发生在合点处。（×）

解析：合点受精不是双受精发生在合点处，受精一般在珠孔端完成。

975

大多数植物种皮细胞在成熟时为死细胞。（√）

解析：大多数植物种皮细胞成熟时为死细胞，起保护作用。

976

细胞生命活动的物质基础是原生质体。（×）

解析：细胞生命活动的物质基础是原生质体（细胞壁以内有生命的部分）。

977

被子植物的孢子体阶段是从合子开始到大孢子母细胞和小孢子母细胞进行减数分裂前为止。（√）

解析：被子植物孢子体阶段从合子开始到减数分裂前为止。

978

原分生组织分布于植物的胚及根尖、茎尖部位。（√）

解析：原分生组织分布于胚及根尖、茎尖部位。

979

休眠种子内的代谢活动完全停止。（×）

解析：休眠种子代谢活动并未完全停止，维持最低水平的生命活动。

980

筛域即筛管分子是无核、无液泡、管状的生活细胞。（√）

解析：成熟筛管分子是无核、无液泡的管状生活细胞。

981

在正常的环境条件下，花中的雄蕊发育不正常，而雌蕊发育正常，这种现象称为雄性不育。（√）

解析：雄蕊发育不正常而雌蕊正常的现象称为雄性不育。

982

所有的种子都是由种皮、胚和胚乳这三部分组成。（×）

解析：并非所有种子都有种皮、胚和胚乳三部分，无胚乳种子没有胚乳。

983

禾本科是被子植物中最大的科。（×）

解析：菊科是被子植物最大的科之一，禾本科不是最大。

984

植物的学名是国际统一的，具有唯一性。（√）

解析：植物学名国际统一，具有唯一性。

ANXSG

985

根毛与侧根的来源是一致的。(×)

解析：根毛是表皮细胞突出物，侧根起源于中柱鞘，来源不同。

986

低等植物生殖器官大多为单细胞结构。(√)

解析：低等植物（如藻类）的生殖器官多为单细胞，配子囊直接产生配子。

987

高等植物植物体没有根、茎、叶的分化。(×)

解析：低等植物（如藻类）的生殖器官多为单细胞，配子囊直接产生配子。

988

水生植物适应水生的环境，一般贮水组织很发达。(×)

解析：水生植物通气组织发达，不是储水组织发达。

989

维管形成层的纺锤状原始细胞与茎的长轴平行排列，发育成茎的纵向(轴向)系统。(√)

解析：纺锤状原始细胞与茎长轴平行排列，发育成纵向系统。

990

顶端分生组织经过分裂、生长、分化三个阶段产生各种成熟组织。这整个生长过程称为初生生长。初生生长过程中产生的各种成熟组织属于初生组织，由初生组织共同组成的结构即初生结构，如根的初生结构由表皮、皮层和维管柱三部分组成。(√)

解析：顶端分生组织经分裂、生长、分化产生初生结构的过程称为初生生长。

991

花药壁层外至内是由表皮，绒毡层，药室内壁，中层组成。(×)

解析：花药壁层由外至内依次是表皮、药室内壁、中层、绒毡层。

992

纺锤原始细胞经垂周分裂后可形成次生木质部和次生韧皮部。(×)

解析：纺锤原始细胞经平周分裂形成次生木质部和韧皮部，垂周分裂扩大周径。

993

心皮边缘相结合的部分叫腹缝线，心皮中间相当于叶片中脉的部分叫背缝线。背缝线和腹缝线处都有维管束，胚珠通常着生在腹缝线上。(√)

解析：心皮边缘结合处为腹缝线，中间相当于中脉处为背缝线，胚珠通常着生在腹缝线上。

994

三细胞花粉粒是指花粉粒内包含有一个营养细胞和两个生殖细胞。(×)

解析：三细胞花粉粒含一个营养细胞和两个精细胞，不是生殖细胞。

995

不定根发生位置不固定，由茎、叶、老根或胚轴上发生的根。(√)

解析：不定根发生位置不固定，由茎、叶、老根或胚轴上发生。

996

南瓜、西瓜和苹果都是由子房与花托一并发育成的果实，其供食用部分相同。(×)

解析：南瓜食用果皮（子房壁），苹果食用花托，西瓜食用胎座，三者不同。

997

双子叶植物纲植物根系常为直根系。(√)

解析：双子叶植物纲根系常为直根系。

998

侧根是由内皮层发生的。(×)

解析：侧根起源于中柱鞘，不是内皮层。

999

木质化程度低的双子叶植物，其维管形成层来源主要是束间形成层。(√)

解析：木质化程度低的双子叶植物维管形成层主要来源是束间形成层。

ANXISG

1000

蓼科植物最突出的特征之一是叶具有膜质的托叶鞘。(√)

解析：蓼科植物叶具有膜质托叶鞘是其突出特征。

1001

菌根是根与真菌共生的结构，如菌丝侵入细胞内，与细胞原生质体混生一起，在表皮和皮层中看到菌丝，称为内生菌根。(√)

解析：内生菌根中菌丝侵入细胞内与原生质体混生，在表皮和皮层中可见菌丝。

1002

根的次生生长过程中，由木栓形成层活动产生次生维管组织。(×)

解析：根次生生长中维管形成层产生次生维管组织，木栓形成层产生周皮。

1003

分泌道和分泌腔均由细胞中层溶解而形成。(×)

解析：分泌道是裂生型（中层溶解），分泌腔可以是溶生型（细胞溶解），形成方式不同。

1004

胚珠通常沿心皮的背缝线着生在子房上，着生的部位是胎座。(×)

解析：胚珠沿腹缝线着生在子房上，不是背缝线。

1005

棉花种子和花生种子都是无胚乳种子。(√)

解析：棉花和花生种子都是无胚乳种子，养料贮存在子叶中。

1006

糊粉粒是含有大量淀粉的一种颗粒结构。(×)

解析：糊粉粒是贮藏蛋白质的颗粒，不是淀粉颗粒。

1007

种子植物生活中，有二套名词并用，花相当于孢子叶球，雄蕊相当于小孢子叶，单核花粉粒相当于小孢子，成熟的三胞或二胞花粉粒相当于雄配子体，精子相当于雄配子。(√)

解析：种子植物中花相当于孢子叶球，雄蕊相当于小孢子叶等，有两套名词并用。

1008

在成熟种子中，其胚根往往位于种孔端。(√)

解析：成熟种子中胚根往往位于种孔端。

1009

髓射线是维管束间的薄壁组织，也称初生射线，由基本分生组织产生。(√)

解析：髓射线是维管束间的薄壁组织，由基本分生组织产生。

1010

多数双子叶木本植物幼茎内的维管束之间的距离很小，几乎连成完整的环。(√)

解析：多数双子叶木本植物幼茎内维管束间距小，几乎连成完整环。

1011

导管中的侵填体是邻接含后含物的薄壁细胞经纹孔而填入导管腔中形成的。(√)

解析：侵填体是邻接导管的薄壁细胞经纹孔侵入导管腔形成的。

1012

单被花的花被通常被认为是花萼。(√)

解析：单被花只有一轮花被，由于没有花瓣，其花被通常被认为是花萼。

1013

导管和筛管均属输导组织，所不同的是导管分子成熟时为具不均匀加厚细胞壁的死细胞，而筛管分子成熟后为具核和原生质的活细胞。(×)

解析：单被花只有一轮花被，由于没有花瓣，其花被通常被认为是花萼。

1014

周皮是次生保护组织，来源于木栓形成层的分裂活动，其组成包括木栓层和栓内层。(×)

解析：周皮由木栓层、木栓形成层和栓内层三种组织构成。

ANXSG

1015

水生植物储水组织很发达。(×)

解析：水生植物通气组织发达，储水组织发达的是旱生植物。

1016

线粒体的主要功能是进行细胞内物质的分解代谢。(√)

解析：线粒体主要功能是进行细胞呼吸（物质分解代谢释放能量）。

1017

植物的繁殖有三大类型:一类是营养繁殖,一类是有性生殖,另一类是无融合生殖。(×)

解析：植物繁殖三大类型是营养繁殖、有性生殖和无性生殖（孢子生殖）。

1018

心材主要是次生木质部,但无输导能力,边材则相对地保持一定的宽度。(√)

解析：心材是较早形成的次生木质部，无输导能力，边材保持一定宽度。

1019

十字花科植物的果实为荚果。(×)

解析：十字花科果实为角果，荚果是豆科的果实。

1020

定根包括主根和侧根,为发生位置固定的根。(√)

解析：定根包括主根和侧根，发生位置固定。

1021

大豆、花生子叶中贮有营养物质供种子萌发和幼苗成长时利用,小麦、蓖麻子叶也是如此。(×)

解析：小麦子叶（盾片）主要吸收转运胚乳养料，不贮藏养料。蓖麻子叶吸收胚乳养料。

1022

成熟的导管和筛管分子都是生活的细胞。(×)

解析：成熟导管是死细胞，筛管是活细胞（无核），不是两者都是活细胞。

1023

根系有两种类型即:直根系和须根系,直根系的主根发达,在其上生出大量的侧根,绝大多数双子叶植物具有直根系。(√)

解析：直根系主根发达有大量侧根，绝大多数双子叶植物具直根系。

1024

厚角组织经细胞角隅处特殊加厚后,已失去原生质体成为长形死的细胞,在植物体内起到机械支持的功能。(×)

解析：厚角组织细胞角隅处加厚但仍是活细胞，含有原生质体。

1025

棉花种子和蓖麻种子都是有胚乳种子。(×)

解析：棉花种子是无胚乳种子，蓖麻种子是有胚乳种子。

1026

所有植物都只有3个反足细胞。(×)

解析：大多数被子植物胚囊有3个反足细胞，但数目可以不同。

1027

根的中柱鞘细胞具有凯氏带。(×)

解析：凯氏带位于内皮层细胞壁上，中柱鞘细胞无凯氏带。

1028

成熟的筛管分子是无核的管状生活细胞。(√)

解析：成熟筛管分子是无核的管状生活细胞。

1029

少数木本植物在生长的后期,心材被菌类侵入而腐烂,形成空心树干,虽能生活,但易为外力折断。(√)

解析：少数木本植物心材被菌类侵入腐烂形成空心树干。

ANXSG

1030

柑桔类的果实是浆果，供食用部分是种子的表皮毛。（×）

解析：柑橘类果实是柑果，供食用部分是内果皮上的汁囊。

1031

原生质的各种化学成分中，蛋白质所占比例最大。（×）

解析：原生质中含量最多的成分是水，不是蛋白质。

1032

检索表的编制是根据林奈的二歧分类原则。（×）

解析：检索表编制根据拉马克的二歧分类原则。

1033

茎尖原套细胞只进行垂周分裂，因而原套细胞没有层数的增加。（√）

解析：原套细胞只进行垂周分裂，没有层数增加。

1034

水生植物适应水生的环境，一般通气组织很发达。（√）

解析：水生植物适应水生环境，通气组织发达。

1035

西红柿种子在果实内不能萌发是因为胚没有完全发育成熟。（×）

解析：西红柿种子在果实内不萌发是因为种子休眠（有抑制物质），不是胚未成熟。

1036

无籽果实都是因为单性结实造成的。（×）

解析：无籽果实可由单性结实或三倍体等染色体变异产生。

1037

棉花种子中的子叶不但有贮藏养料的功能，而且出土后可以进行光合作用。（√）

解析：棉花子叶有贮藏养料功能，出土后可进行光合作用。

1038

只有多细胞生物才有细胞分化现象。（√）

解析：细胞分化是多细胞生物发育的基础，单细胞生物不存在细胞分化现象。

1039

由根尖的顶端分生组织经过分裂、生长、分化的过程，称为初生生长。（√）

解析：细胞分化是多细胞生物发育的基础，单细胞生物不存在细胞分化现象。

1040

枝条与复叶的主要区别是复叶的小叶柄基本有腋芽，枝条上叶的基部无腋芽。（×）

解析：枝条上叶腋有腋芽，复叶小叶柄基部无腋芽。

1041

茎的次生生长就是产生周皮和次生维管组织的过程。（√）

解析：茎的次生生长是产生周皮和次生维管组织的过程。

1042

组织是多细胞植物体内形态结构相似、在个体发育中来源相同的细胞群。（×）

解析：组织应包括形态结构相似、来源相同、执行一定生理功能三个要素。

1043

单雌蕊子房发育的果为单果，复雌蕊子房发育的果为复果。（×）

解析：复雌蕊子房发育的果实不一定是复果，如番茄是单果。

1044

完全或仅由子房发育而形成的果实为假果，如桑葚、无花果。（×）

解析：完全或仅由子房发育的果实为真果。桑葚是聚花果。

1045

植物茎的表皮细胞是一层不含质体的死细胞构成。（×）

解析：茎表皮细胞是活细胞，可含白色体等质体。

ANXSG

1046

茎三棱，实心，无节，叶鞘闭合，叶3 列是禾本科植物的特征。（×）

解析：茎三棱、实心、无节、叶鞘闭合、叶3列是莎草科特征，不是禾本科。

1047

种子植物都产生种子，而且外面都有心皮包被。（×）

解析：裸子植物产生种子但无心皮包被，只有被子植物种子有果皮包被。

1048

蚕豆是双子叶植物有胚乳种子。（×）

解析：蚕豆是双子叶植物无胚乳种子。

1049

单子叶植物胚中的外胚叶相当于双子叶植物中的外胚乳。（×）

解析：外胚叶是单子叶植物胚的结构，与双子叶植物外胚乳来源不同。

1050

花轴肥厚膨大，中央部分下陷，呈囊状，雄花着生在囊体的内壁上部，下部是雌花者为隐头花序。（√）

解析：隐头花序花轴膨大呈囊状，雄花在上部内壁，雌花在下部。

1051

菊科植物的果实为瘦果。（√）

解析：菊科的特征果实为瘦果，由下位子房发育而成，顶端有冠毛。

1052

小麦子叶的上皮细胞具有传递细胞的功能。（√）

解析：菊科的特征果实为瘦果，由下位子房发育而成，顶端有冠毛。

1053

茎圆柱形，中空，有节，叶鞘开裂，叶2列，具叶舌和叶耳是莎草科植物的特征。（×）

解析：茎圆柱中空有节、叶鞘开裂、叶2列、具叶舌叶耳是禾本科特征。

1054

根尖在生长过程中其四个部分逐渐生长。（×）

解析：根尖四个区域不是同时生长的，根冠和分生区更新，伸长区和成熟区逐渐推移。

1055

落叶树于深秋或早夏落叶是对植物本身有利的一种正常生物学现象。（√）

解析：落叶树深秋落叶是对自身有利的正常生物学现象。

1056

子房必须通过诱导作用才能形成无子果实，则称为诱导单性结实，如香蕉。（×）

解析：不经诱导自然形成的无子果实为自然单性结实（如香蕉），需诱导的为诱导单性结实。

1057

种子萌发时先露出胚芽，进行光合作用。（×）

解析：种子萌发时先伸出胚根，不是先露出胚芽。

1058

种子具有不同的颜色是由于种皮的一些细胞中含有不同色素的缘故。（√）

解析：种子颜色不同是因为种皮细胞含不同色素。

1059

苔藓植物、蕨类植物和裸子植物都能形成颈卵器。（√）

解析：苔藓、蕨类和裸子植物都能形成颈卵器。

1060

珠被发育成种皮，子房壁发育成果实。（×）

解析：珠被发育成种皮，子房壁发育成果皮，不是果实。

1061

厚角组织、厚壁组织和石细胞都是原生质体已消失的死细胞。（×）

解析：厚角组织是活细胞，厚壁组织和石细胞是死细胞。

ANXSG

1062

禾本科植物的果实为颖果。(√)

解析：禾本科的特征果实为颖果，果皮与种皮愈合，不易分离，如小麦、水稻。

1063

花是适应于生殖的变态短枝。(√)

解析：禾本科的特征果实为颖果，果皮与种皮愈合，不易分离，如小麦、水稻。

1064

发生于器官内部组织的方式称为内起源。如起源于母根内皮层的侧根。(×)

解析：侧根起源于中柱鞘（不是内皮层），从器官内部组织发生的起源方式称为内起源。

1065

根瘤为固氮菌、放线菌侵染宿主根部细胞而形成的瘤状共生结构，只在豆科植物中出现。(×)

解析：根瘤不仅在豆科中出现，桤木、杨梅等也有。

1066

无籽果实就是经过单性结实产生的不含种子的果实。(×)

解析：无籽果实不都是单性结实产生的，三倍体等也可产生。

1067

双受精是指进入胚囊内的两个精子同时与卵受精。(×)

解析：双受精是一个精子与卵细胞融合，另一个精子与极核融合。

1068

厚角组织细胞一般为细胞壁在角隅处增厚的死细胞。(×)

解析：厚角组织细胞角隅加厚但仍是活细胞。

1069

初生木质部位于根的中央，由导管、管胞、木纤维、木薄壁细胞组成，呈辐射状，起输导水分和矿质营养作用。初生木质部成熟方式是外始式。(√)

解析：根初生木质部位于中央，呈辐射状，成熟方式为外始式。

1070

机械组织是细胞壁局部或全面增厚，在植物体内担负机械支持功能的一类组织。(√)

解析：机械组织细胞壁局部或全面加厚，担负机械支持功能。

1071

幼苗子叶出土的原因在于下胚轴伸长的速度较快。(√)

解析：子叶出土萌发是下胚轴伸长的结果。

1072

种子萌发时，所谓“出芽”就是指种子露出胚芽。(×)

解析：种子萌发出芽是指胚根突破种皮露出。

1073

无胚乳种子的养料贮存在子叶中。(√)

解析：无胚乳种子（如大豆、花生）在发育过程中胚乳被胚吸收，养料贮存在子叶中。

1074

从老根上长出的根也称不定根。(√)

解析：无胚乳种子（如大豆、花生）在发育过程中胚乳被胚吸收，养料贮存在子叶中。

1075

小麦和玉米拔节是植物顶端生长的结果。(×)

解析：从老根上长出的根称为不定根，因为它不是从主根或侧根上直接分枝产生的。

1076

种子植物的根一旦产生了菌根，其原有的根毛会逐渐消失。(√)

解析：种子植物根产生菌根后原有根毛会逐渐消失。

1077

复粒淀粉在白色体内沉积时，有2个以上脐和各自轮纹。(√)

解析：复粒淀粉在白色体内沉积时有2个以上脐和各自轮纹。

ANXSG

1078

聚合果是由数个单果组成，又称复果。（×）

解析：聚合果由一朵花中多个离生雌蕊发育的小果聚成，不是由数个单果组成。

1079

管胞是被子植物体内重要的输导组织，水、无机盐和营养物质由此不停地上下输送。（×）

解析：管胞是蕨类和裸子植物的主要输导组织，被子植物主要是导管和筛管。

1080

检验植物细胞贮藏的油类和脂肪时，通常使用化学试剂是苏丹Ⅲ。（√）

解析：检验油类和脂肪常用苏丹III试剂。

1081

生物膜的特性之一是具有选择透性。（√）

解析：生物膜（细胞膜）具有选择透过性，能选择性地允许某些物质通过，这是膜的重要功能特性。

1082

细胞有丝分裂后期无核膜。（√）

解析：生物膜（细胞膜）具有选择透过性，能选择性地允许某些物质通过，这是膜的重要功能特性。

1083

原生质是一种亲水胶体。（√）

解析：原生质是细胞内具有生命活动的物质，属于亲水胶体，能吸水膨胀。

1084

线粒体、质膜、内质网以及液泡均是由单层膜组成。（×）

解析：原生质是细胞内具有生命活动的物质，属于亲水胶体，能吸水膨胀。

1085

胞质运动是胞基质沿一个方向作循环流动。（×）

解析：胞质运动是胞基质沿多个方向流动，不是只沿一个方向。

1086

原生质体是细胞生活部分有结构的概念(名称)。（√）

解析：原生质体是细胞生活部分有结构的概念。

1087

蛋白质是原生质的主要组成物质，是生命活动的物质基础，因此蛋白质分子所占的比例也最大。（×）

解析：原生质中含量最多的是水，不是蛋白质。

1088

虎克第一次观察细胞时，因显微镜放大倍数太低，未能发现细胞核。（×）

解析：虎克第一次观察到的细胞壁和细胞核，当时能看到细胞核。

1089

减数分裂的结果总是使子细胞染色质只有母细胞的一半。（√）

解析：减数分裂使子细胞染色体数目为母细胞的一半。

1090

有丝分裂间期的细胞核可分为核膜、核仁和核质三部分。（√）

解析：有丝分裂间期细胞核分为核膜、核仁和核质三部分。

1091

糊粉粒是含有大量蛋白质的一种颗粒结构。（√）

解析：糊粉粒是含有大量蛋白质的颗粒结构。

1092

线粒体的主要功能是进行合成作用。（×）

解析：线粒体主要功能是呼吸作用（氧化分解有机物释放能量），不是合成作用。

1093

DNA分子立体结构两条螺链上的碱基是成对排列的，G对着T，A对着C。（×）

解析：DNA碱基配对是A对T、G对C，题目说反了。

ANXSG

1094

保护组织按其来源及形态结构的不同，可分为表皮和周皮。（√）

解析：保护组织按来源和形态分为表皮和周皮。

1095

茎圆柱形，中空，有节，叶鞘开裂，叶2列，具叶舌和叶耳是禾本科植物的特征。（√）

解析：茎圆柱中空有节、叶鞘开裂、叶2列、具叶舌叶耳是禾本科特征。

1096

双子叶植物茎中，射线总是产生于次生构造中。（×）

解析：双子叶植物茎中射线不仅在次生构造中，初生结构中也有髓射线。

1097

梨、桃、李等果实坚硬的“核”均有大量的石细胞组成。（√）

解析：梨、桃、李等果实坚硬的核含有大量石细胞。

1098

植物的生长在开始时缓慢，以后加速至最高峰，最后又逐渐减慢至完全停止。（√）

解析：植物生长开始缓慢，后加速至高峰，最后减慢至停止。

1099

单子叶植物纲植物的胚大多具有一片子叶。（√）

解析：单子叶植物纲胚大多具有一片子叶。

1100

在成熟的植物体内，每个细胞都应该有生命的。（×）

解析：成熟植物体中存在大量死细胞如导管、纤维等。

1101

有丝分裂的核分裂是一个复杂的连续过程，一般人为地将其分为前期、中期、后期和末期。（√）

解析：有丝分裂核分裂分为前期、中期、后期和末期。

1102

细胞有丝分裂时，染色体数目减半发生在分裂的后期。（×）

解析：有丝分裂中染色体数目减半发生在末期，后期着丝粒分裂使染色体暂时加倍。

1103

在室温、空气相对湿度为80%以上的条件下保存种子，可使种子很快地失去生活力。（√）

解析：高温高湿条件下种子很快失去生活力。

1104

合轴分枝是茎的顶芽不断向上生长，形成明显主干，腋芽发展为侧枝。（×）

解析：合轴分枝是顶芽停后腋芽替代生长，不是顶芽不断生长。

1105

双名法是由瑞典植物学家林奈创立的。（√）

解析：双名法由瑞典植物学家林奈创立。

1106

根的初生木质部成熟方式为外始式，而在茎中则为内始式。（√）

解析：根初生木质部成熟方式为外始式，茎中为内始式。

1107

年轮的夏材是在生长季早期所形成的次生木质部，此时气候温和，雨量充足，形成层活动旺盛，形成的细胞大而壁薄，材质疏松。（×）

解析：早材（春材）细胞大壁薄疏松，晚材（秋材）细胞小壁厚紧密。

1108

豌豆的闭花受精(开花之前即已完成受精)，可以避免不利环境条件对传粉受精的影响，从生物学意义上讲最优越，是最进化的传粉受精方式。（×）

解析：闭花受精不能避免所有不利影响，从遗传多样性角度不如异花传粉。

ANXSG

1109

植物的珠被层数与其种皮层数总是相同的。(×)

解析：珠被层数与种皮层数不一定相同，可能融合或退化。

1110

直根系由胚根发育产生的主根及各级侧根组成。(√)

解析：直根系由主根及各级侧根组成。

1111

贮藏的淀粉颗粒称糊粉粒。(×)

解析：贮藏淀粉的颗粒称淀粉粒，糊粉粒是蛋白质颗粒。

1112

向日葵通常在植株顶端开一朵花。(×)

解析：向日葵的花序是头状花序，由许多小花组成。

1113

“棉花纤维”不属于纤维。(√)

解析：棉花纤维是种皮表皮细胞的延伸物，不属于典型的纤维组织。

1114

种子植物的细胞壁都由中胶层(胞间层)、初生壁和次生壁三部分组成。(×)

解析：并非所有种子植物细胞壁都有三层结构。

1115

裸子植物和被子植物一样，都具有构造完善的花。(×)

解析：裸子植物没有真正的花，只有被子植物才有构造完善的花。

1116

不定根是由中柱鞘细胞恢复分裂产生的。(×)

解析：不定根可由茎、叶等处薄壁细胞恢复分裂产生，不限于中柱鞘。

1117

通道细胞是薄壁细胞。(√)

解析：通道细胞是薄壁细胞，位于内皮层木质部脊处。

1118

胚的发育从合子开始，合子形成后，通常有一个休眠期，才进行分裂，因此，胚和胚乳的发育是同步进行的。(×)

解析：胚乳发育先于胚的发育，两者不同步。

1119

双受精是种子植物的重要特征之一。(×)

解析：双受精是被子植物（不是所有种子植物）的重要特征。

1120

组成成熟种子的所有细胞都是生活细胞。(×)

解析：成熟种子中存在大量死细胞（如种皮细胞），并非所有细胞都是生活细胞。

1121

高等植物合子在母体内发育成胚，因此也被称为有胚植物。(√)

解析：高等植物合子在母体内发育成胚，被称为有胚植物。

1122

胚是幼小的植物体，它由胚芽、胚轴、子叶和胚根组成。(√)

解析：胚由胚芽、胚轴、子叶和胚根组成，是幼小的植物体。

1123

在作物的间作和套种中，往往将具须根系作物和具直根系的作物搭配种在一起。(√)

解析：间作套种中常将须根系和直根系作物搭配种植。

1124

观察茎的初生结构和次生结构都是从节处取横切面。(×)

解析：观察茎初生和次生结构应从节间取横切面，不是节处。

ANXSG

1125

酶是一种蛋白质，它能催化各种生化反应。（×）

解析：酶是蛋白质（少数是RNA），能催化生化反应。

1126

根系有两种类型即：直根系和须根系，须根系主要由不定根组成，双子叶植物具须根系。（×）

解析：须根系主要由不定根组成，但具须根系的是单子叶植物（如禾本科），双子叶植物通常具直根系。

1127

有些植物不产生花器官也能结果，如无花果。（×）

解析：无花果是有花植物，花序为隐头花序，花隐藏在花序托内。

1128

单轴分枝是茎的顶芽死亡或生长缓慢，位于其下的腋芽生长成强壮的侧枝，形成主干的一部分，以后顶芽又停止发育，又由其下的腋芽生长，形成主干的一部分。（×）

解析：单轴分枝是顶芽不断向上生长形成主干，题目描述的是合轴分枝。

1129

根瘤是根瘤菌在植物根内寄生所形成的复合体。（×）

解析：根瘤是根瘤菌与植物根共生的互利共生体，不是寄生。

1130

种子内有两个或两个以上的胚的现象叫做多胚现象。（√）

解析：种子内有两个或以上胚的现象叫多胚现象。

1131

单子叶植物内皮层细胞大多五面增厚，只有少数位于木质部脊处的内皮层细胞，保持初期发育阶段的结构，即细胞具凯氏带，但壁不增厚，这些细胞称为通道细胞。通道细胞起着皮层与维管柱间物质交流的作用。（√）

解析：单子叶植物内皮层大多五面增厚，木质部脊处的通道细胞保持凯氏带结构。

1132

一般在豆科植物根上形成瘤状突起即为根瘤，它有固氮作用，供给植物可利用的含氮化合物。（√）

解析：豆科植物根上形成根瘤，有固氮作用。

1133

植物细胞核的结构，是由核膜、核仁和核质三部分组成的。（√）

解析：植物细胞核由核膜、核仁和核质三部分组成。

1134

根毛和侧根的来源相同。（×）

解析：根毛和侧根来源不同：根毛来自表皮细胞，侧根来自中柱鞘。

1135

导管是被子植物特有的输导组织，管胞是蕨类和裸子植物特有的导水结构。（×）

解析：导管是被子植物特有，管胞存在于蕨类和裸子植物中（被子植物也有少量管胞）。

1136

分生组织是植物体内具有连续或周期性分裂能力的细胞群。（√）

解析：分生组织是具有连续或周期性分裂能力的细胞群。

1137

由心皮组成的雌蕊，只有被子植物才具有。（√）

解析：由心皮组成的雌蕊是被子植物特有的结构。

1138

离生单雌蕊也属于单雌蕊。（√）

解析：离生单雌蕊是由多个离生心皮组成的，每个心皮独立，但整体仍属于单雌蕊范畴。

1139

叶内中脉的韧皮部靠近下表皮。（√）

解析：离生单雌蕊是由多个离生心皮组成的，每个心皮独立，但整体仍属于单雌蕊范畴。

ANXISG

1140

根的次生生长是根的增粗生长过程，根的不断增粗是根的维管形成层和木栓形成层共同作用的结果。（√）

解析：叶中脉的结构中，木质部靠近上表皮，韧皮部靠近下表皮，这是叶脉的基本结构特征。

1141

高等植物植物体具有根、茎、叶的分化。（√）

解析：高等植物（苔藓、蕨类、种子植物）具有根、茎、叶的分化，这是与低等植物的主要区别。

1142

二细胞花粉是指花粉粒内包含二个精子。（×）

解析：高等植物（苔藓、蕨类、种子植物）具有根、茎、叶的分化，这是与低等植物的主要区别。

1143

自然界中，异花传粉只是少数植物，多数被子植物是进行自花传粉的。（×）

解析：自然界中异花传粉是主要方式，多数被子植物进行异花传粉。

1144

植物的排水器常存在于叶片边缘或叶尖，具有自动调节其开闭的功能。（×）

解析：排水器（水孔）不能自动调节开闭，是永久性开放结构。

1145

所有植物的种子由种皮、胚及胚乳三部分组成。（×）

解析：并非所有种子都有种皮、胚和胚乳三部分。

1146

根据花托的形状、子房的位置、心皮数和果实的特征可将蔷薇科分为绣线菊亚科、蔷薇亚科、苹果亚科和李亚科4个亚科。（√）

解析：蔷薇科根据花托、子房位置等分为绣线菊、蔷薇、苹果、李四个亚科。

1147

被子植物的孢子体极为退化，不能独立生活。（×）

解析：被子植物孢子体是植物体主体，非常发达。

1148

种皮是种子的保护结构，因此种皮都是厚而坚硬。（×）

解析：种皮有厚有薄，不是都厚而坚硬。

1149

豆科植物的果实为角果。（×）

解析：豆科植物果实为荚果，角果是十字花科的。

1150

原生质是一种半透明的非亲水胶体。（×）

解析：原生质是亲水胶体，不是非亲水胶体。

1151

早材又称春材或心材，晚材又称秋材或边材。（×）

解析：早材又称春材，晚材又称秋材。心材和边材是另外的概念。

1152

正在发芽的种子物质转化是分解大于合成，因此其鲜重显然比发芽前的种子低。（×）

解析：发芽种子因吸水鲜重增加，干重因呼吸消耗而减少。

1153

导管是被子植物维管束中一类无细胞核的，进行输导功能的活细胞。（×）

解析：导管是死细胞，不具原生质体。

1154

传递细胞是广泛分布在短途而迅速转运溶质的组织或器官中。（√）

解析：传递细胞广泛分布在短途迅速转运溶质的组织或器官中。

1155

树皮上死的外树皮即周皮。（×）

解析：树皮包括外树皮（周皮等死组织）和内树皮（韧皮部等活组织）。

ANXSG

1156

苔藓植物没有真正的根，因此被列为低等植物。（×）

解析：苔藓植物虽无真正根但有胚，被列为高等植物。

1157

茎二叉分枝比假二叉分枝原始。（√）

解析：二叉分枝是原始的分枝方式，顶芽一分为二；假二叉分枝是较进化的方式，由腋芽继续生长形成。

1158

导管是由一连串的导管分子连接形成，导管分子间的细胞横隔壁溶解为筛孔，成为被子植物中主要输导水和溶解在水中的无机盐的管状结构。（×）

解析：二叉分枝是原始的分枝方式，顶芽一分为二；假二叉分枝是较进化的方式，由腋芽继续生长形成。

1159

多数裸子植物的种子内具有两枚以上的子叶。（√）

解析：多数裸子植物种子内具有两枚以上子叶。

1160

在初生纹孔场或纹孔的纹孔膜上，以及初生壁上，都有许多胞间连丝相互沟通。（√）

解析：初生纹孔场或纹孔膜及初生壁上有胞间连丝相通。

1161

一粒稻谷就是一粒种子。（×）

解析：一粒稻谷是果实（颖果），不是一粒种子。

1162

在种子中，由珠心形成的外胚乳，功能和胚乳一样。（√）

解析：珠心形成的外胚乳功能和胚乳一样。

1163

在叶原基形成幼叶的生长过程中，首先是顶端生长使叶原基延长成柱形，接着是边缘生长形成的幼叶雏形，以后叶片的进一步长大，则主要是边缘生长的结果。（×）

解析：植物学教材 金银根主编 P162

1164

双子叶植物的种子都没有胚乳，单子叶植物的种子都有胚乳。（×）

解析：双子叶植物也有有胚乳种子（如蓖麻），单子叶也有无胚乳种子（如慈姑）。

1165

木质化程度高的双子叶植物，其维管形成层来源主要是束中形成层。（√）

解析：木质化程度高的双子叶植物维管形成层主要来源是束中形成层。

1166

所有植物的胚珠都有内外2层珠被。（×）

解析：并非所有植物胚珠都有两层珠被，有些只有一层。

1167

未受精也能形成种子的现象叫单性结实。（×）

解析：未受精也能形成种子的现象叫无融合生殖，单性结实是不经过受精子房发育成果实（不含种子）。

1168

花被是花萼和花冠的总称，有些植物的花，其花萼、花冠成为内外两轮，形状、大小、颜色不同，彼此分成明显的两轮，叫二被花。（√）

解析：花被是花萼和花冠的总称，二被花有内外两轮。

1169

食用的绿豆芽主要是由种子的胚根发育而来的。（×）

解析：绿豆芽主要由胚轴发育而来，不是胚根。

1170

电镜下质膜呈三层结构。（√）

解析：电镜下质膜呈三层结构（暗-明-暗）。

ANXSG

1171

构成生物体结构和功能的基本单位是组织。(×)

解析：构成生物体结构和功能的基本单位是细胞，不是组织。

1172

线粒体内存在有参与呼吸作用的酶，它是细胞进行呼吸作用的场所，是能量供应中心。(√)

解析：线粒体含有呼吸作用相关酶，是细胞呼吸的场所和能量供应中心。

1173

细胞内的汁液称为细胞液。(×)

解析：液泡内的液体称为细胞液，细胞内汁液不能统称细胞液。

1174

细胞减数分裂中同源染色体的配对是在偶线期进行。(√)

解析：同源染色体配对（联会）发生在偶线期。

1175

核仁是细胞的控制中心，遗传信息的载体DNA主要在其中贮藏、复制和转录，从而控制细胞和植物有机体生长、发育和繁殖。(×)

解析：细胞控制中心是细胞核，不是核仁。

1176

核酸是靠肽链连接起来的。(×)

解析：核酸由核苷酸通过磷酸二酯键连接，肽键是蛋白质的连接方式。

1177

质体是植物特有的细胞器，一切植物都具质体。(×)

解析：并非一切植物都具质体，如真菌和根部不见光的细胞不含质体。

1178

植物生长发育离不开光合作用，所以种子萌发的必要条件是需要光照。(×)

解析：种子萌发必要条件是水分、温度和氧气，光照不是所有种子必需的。

1179

植物细胞壁的生长和分化都经过初生壁阶段最后形成次生壁。(×)

解析：细胞壁不一定都经过初生壁形成次生壁，许多细胞只有初生壁。

1180

种子植物的细胞壁都由中胶层、初生壁和次生壁三部分组成。(×)

解析：只有特定成熟细胞才具有次生壁。

1181

高等植物减数分裂形成四个细胞，每个子细胞染色体数目为母细胞的一半。(√)

解析：这是减数分裂的标准定义。

1182

蚕豆十个雄蕊九个联合一个分离叫做多体雄蕊。(×)

解析：这是二体雄蕊。

1183

花是一节间缩短的枝条，是被子植物的繁殖器官。(√)

解析：花可以看作是适应生殖的短缩变态枝条。

1184

种子植物都产生种子，外面都有心皮包被。(×)

解析：裸子植物种子裸露，没有心皮包被。

1185

导管侧壁有环纹、螺纹、梯纹、网纹和纹孔等五种加厚方式。(×)

解析：应为孔纹，不是纹孔。

1186

额外形成层产生的称为三生木质部和三生直飞上升皮部。(×)

解析：应为三生韧皮部。

ANXSG

1187

植物的表皮及表皮附属物起保护植物体的作用。(√)

解析：表皮主要起保护作用。

1188

年轮可作为研究气候变迁的依据。(√)

解析：年轮宽窄与气候条件密切相关。

1189

木质化程度低的双子叶植物维管形成层来源主要是束间形成层。(×)

解析：主要来自束中形成层。

1190

厚角组织经细胞角隅处特殊加厚后，已失去原生质体成为长形死的细胞。(×)

解析：厚角组织是活细胞。

1191

玉米茎横切结构，机械组织以内为基本组织所充满，维管束分散排列于其中。(√)

解析：这是单子叶植物茎的典型特征。

1192

小麦麦穗是一个复穗状花序，基部2~3朵花能结实，上部几朵花不能结实。(√)

解析：这是小麦花序的正确描述。

1193

被子植物一个花粉母细胞产生四个小孢子并形成八个精子，一个大孢子母细胞产生四个大孢子并形成四个卵细胞。(×)

解析：大孢子母细胞最终只形成1个卵细胞。

1194

直根系的主根发达，绝大多数双子叶植物具有直根系。(√)

解析：双子叶植物通常具直根系。

1195

单轴分枝是茎的顶芽死亡或生长缓慢，位于其下的腋芽生长成强壮的侧枝。(×)

解析：题目描述的是合轴分枝。

1196

每个植物细胞都有细胞核，而且始终居于细胞中央。

解析：成熟筛管细胞无核，且细胞核不一定居中央。

1197

菌根是根与真菌共生的结构，菌丝侵入细胞内称为内生菌根。

解析：描述符合内生菌根特征。

1198

双子叶植物根初生韧皮部成熟方式是内始式。

解析：根初生韧皮部是外始式。

1199

风媒花的柱头多呈羽毛状，增加接受花粉的表面积。

解析：羽毛状柱头利于捕捉风媒花粉。

1200

韧皮射线和木射线合称维管射线，有横向输导和贮藏功能。

解析：维管射线负责横向运输和贮藏。

1201

保护组织按来源及形态结构不同，可分为表皮和周皮。

解析：表皮是初生保护组织，周皮是次生保护组织。

1202

子房由子房壁、子房室、胎座和胚珠组成。

解析：子房的结构包括子房壁、子房室、胎座和胚珠，这是子房的基本组成，描述正确。

ANXSG

1203

植物细胞核由核膜、核仁和核质三部分组成。

解析：这是细胞核的基本结构。

1204

豌豆的闭花受精是最进化的传粉受精方式。

解析：闭花受精无法利用基因重组。

1205

假二叉分枝为合轴分枝的一种，顶芽停止发育后其下两个腋芽同时发育为两个侧枝。

解析：假二叉分枝是合轴分枝的特殊形式。

1206

百合的花公式省去逗号号是更流行的写法。

解析：各部分轮数相同时可省略逗号。

1207

竹的竹鞭是根状茎，莲的藕也是根状茎。（√）

解析：竹鞭和藕都具有节和节间，属于根状茎，是地下茎的一种变态形式。

1208

花生与马铃薯(土豆)的果实均在土中发育成熟。（×）

解析：花生的果实（荚果）确实在土中发育成熟（地上开花后子房柄伸入土中），但马铃薯食用的部分是地下茎（块茎），不是果实。

1209

苔藓植物的孢子萌发形成原叶体。（×）

解析：苔藓植物的孢子萌发形成的是原丝体（protonema），而非原叶体；原叶体是蕨类植物配子体的别称。

1210

种子植物的胚乳都具有相同的功能和来源。（×）

解析：单子叶植物茎中维管束散生排列，通常缺少维管形成层，因此一般不能进行次生生长（不能增粗）。

1211

地钱的精子器和颈卵器生长在同种植物的不同植株上。（√）

解析：只有含叶绿素的绿色部位（如叶肉细胞、幼茎表皮细胞）才有叶绿体，根细胞、表皮细胞等不含叶绿体。

1212

蓝藻是最原始最古老的光合自养的原植体植物。（√）

解析：蕨类植物是最早具有真正根、茎、叶分化的维管植物，体内具有输导组织。

1213

小孢子是尚未成熟的花粉粒，是一个细胞。（√）

解析：藻类植物结构简单，为叶状体，没有真正的根、茎、叶的分化，靠体表直接吸收水分和无机盐。

1214

一般认为高等植物是从绿藻门植物发展演化而来的。（√）

解析：种子植物根据种子是否有果皮包被，分为裸子植物和被子植物两大类。

1215

葫芦藓的孢子体比地钱复杂，蒴内除了蒴轴之外，还有孢子和弹丝。（×）

解析：裸子植物的胚珠裸露在大孢子叶上，不被子房包裹，因此种子成熟后无果皮包被，是其名称的由来。

1216

食虫植物捕虫的结构是变态的叶。（√）

解析：被子植物的胚珠着生在子房内壁的胎座上，子房发育成果实，胚珠发育成种子，果皮包被种子。

1217

在被子植物的有性生殖过程中，出现一个新的重要过程，即双受精，一个精子与卵受精形成胚(2n)，另一个精子和二个极核受精形成胚乳。（√）

解析：花粉管不是裸子植物特有的，被子植物和裸子植物都具有花粉管；花粉管是种子植物（广义）的共同特征。

1218

单子叶植物胚与双子叶植物胚的结构基本相似，主要区别在于子叶的数目不同。（√）

解析：双受精指一个精子与卵细胞结合形成合子，另一个精子与两个极核结合形成胚乳，这是被子植物独有的特征。

ANXSG

1219

有些植物的珠被最内层特化其细胞形态结构、贮存物质及功能与绒毡层类似，称为珠被绒毡层。（√）

解析：根尖分生区（生长点）细胞小、排列紧密、细胞核大、细胞质浓，具有很强的分裂能力，是根生长的主要动力。

1220

地钱的叶状体腹面(下面)的假根的鳞片具有吸收养分、保存水分和固定植物体的功能。（√）

解析：导管由死细胞构成（细胞壁木质化，原生质体消失），但筛管是活细胞（虽然成熟时无细胞核，但仍具活性），两者不同。

1221

菌类是由细菌、粘菌和真菌组成。（√）

解析：维管形成层向内产生次生木质部（木材），向外产生次生韧皮部，是木本植物茎增粗的主要原因。

1222

文竹、天门冬进行光合作用的主要器官的是叶状茎。（√）

解析：叶肉细胞含有大量叶绿体，能进行光合作用制造有机物，属于营养组织（薄壁组织）。

1223

胡萝卜是变态根，主要食用其次生韧皮部。（√）

解析：双子叶植物茎的初生结构中，维管束排列成一圈（一轮），这是双子叶植物茎的典型特征。

1224

葫芦藓的孢子体包括孢蒴、蒴柄、基足和蒴帽四部分。（×）

解析：根毛由根尖成熟区表皮细胞向外突起形成，增大了根的吸收面积，是吸收水分和无机盐的主要结构。

1225

水绵的植物体为二倍体。（×）

解析：胚由胚芽、胚轴、胚根和子叶组成，是新植物的雏形，是种子中最核心的部分。

1226

蕨类植物的孢子同型或异型。（√）

解析：受精后，子房发育成果实，子房壁发育成果皮，胚珠发育成种子，受精卵发育成胚。

1227

具有核相交替的植物一定有世代交替，有世代交替的植物不一定有核相交替。（×）

解析：暗反应（卡尔文循环）发生在叶绿体基质中，类囊体膜上进行的是光反应。

1228

花按一定顺序排列在花枝上，这样的花枝叫单生花，如向日葵。（×）

解析：有氧呼吸的第二、三阶段在线粒体中进行（柠檬酸循环和电子传递链），线粒体是有氧呼吸的主要场所。

1229

被子植物的胚乳和胚同是受精的产物，有些植物的胚乳细胞在离体培养条件下，也具有器官分化的能力。（√）

解析：高等植物（苔藓、蕨类、种子植物）的细胞均具有细胞壁，主要成分为纤维素，起支持和保护作用。

1230

成熟的大蒜主要食用部分是肥大的腋芽。（√）

解析：液泡内含有细胞液，其中溶解有糖类、有机酸、色素、无机盐等多种物质，维持细胞的渗透压。

1231

由额外形成层产生的木质部和韧皮部分别称为三生木质部和三生直飞上升皮部。（√）

解析：胞间连丝穿过细胞壁，连接相邻细胞的细胞质，是物质运输和信息传递的重要通道。

1232

裸子植物比蕨类植物进化，而裸子植物的颈卵器却更为退化。（√）

解析：根的初生结构中，木质部和韧皮部沿辐射方向相间排列（间隔排列），这是根区别于茎的重要特征。

1233

裸子植物世代交替的特点是孢子体发达，并占绝对优势。其配子体十分简化，不能脱离孢子体而独立生活。（√）

解析：单子叶植物（如禾本科、百合科）的叶脉多为平行脉，而双子叶植物多为网状脉。

1234

藻类植物都含叶绿素，能进行光合作用而自养。（×）

解析：蕨类植物不产生种子，通过孢子囊中的孢子进行繁殖，属于孢子植物（隐花植物）。

1235

总状花序的特点是:花序具一长的花轴,上面着生花柄长短相等的花,开花顺序是自下而上,如油菜。(√)

解析:苔藓植物的假根由单细胞或多细胞构成,仅起固着作用,不具有吸收水分和无机盐的功能。

1236

低等植物都没有细胞核,而高等植物有细胞核。(×)

解析:裸子植物没有真正的花,其繁殖器官为孢子叶球(球花),分为雄球花和雌球花,属于单性。

1237

苔藓植物是有胚植物。(√)

解析:苔藓植物属于有胚植物(苔藓植物门、蕨类植物门、种子植物门均属于有胚植物),其受精卵在颈卵器内发育成胚。

1238

表皮,药室内壁,中层和绒毡共同组成成熟花粉粒的壁层。(×)

解析:成熟花粉粒的壁层仅包括表皮和药室内壁(纤维层)两层,中层和绒毡层在花粉粒成熟前已被吸收或退化,不构成成熟花粉粒的壁。

1239

水绵接合生殖时,从一个配子囊放出的配子与另一个配子囊放出的配子体在水中结合形成合子。(×)

解析:水绵接合生殖时,一个配子囊释放的配子与另一个配子囊释放的配子融合形成合子,但该合子不是'合子体',合子体是一个不准确的表述;更关键的是,配子结合形成的是合子,不是配子体。

1240

种子植物有花粉管产生,并且胚乳都是3倍体。(×)

解析:裸子植物有花粉管产生,但被子植物的胚乳才是3倍体;裸子植物的胚乳(雌配子体)为单倍体,且不是所有种子植物胚乳都是3倍体。

1241

胡萝卜、红(甘)薯的肉质根均由下胚轴发育而来。(×)

解析:胡萝卜的肉质根主要由主根发育而来,红(甘)薯的肉质根(块根)由不定根发育而来,二者均不是由下胚轴发育。

1242

珠心基部和珠被组织汇合一起的部位叫合点。(√)

解析:珠心基部与珠被组织汇合的部位确实是合点,此处是胚珠中维管束进入的通道。

1243

萌生苗是指树木砍伐后,在树干基部或老根上产生不定芽形成的新苗。(√)

解析:萌生苗是指树木砍伐后,从树干基部或老根上产生的不定芽形成的新苗,符合萌蘖苗的定义。

1244

一、二年生植物生长几个月后就开花,一生中能开花多次。(×)

解析:一、二年生植物一生中通常只开花一次,开花结实后即死亡,而不是一生中能开花多次。

1245

蕨类植物的孢子萌发形成配子体,即原叶体。(√)

解析:蕨类植物的孢子萌发后形成配子体,即原叶体,这是蕨类植物生活史中的正确描述。

1246

,是豆科的花公式,它表示,不整齐花,萼片5个联合,5个花瓣离生,雄蕊10个,9个联合,雌蕊一心皮一室,子房上位。(√)

解析:豆科植物的花公式为:不整齐花,萼片5个联合,花瓣5个离生,雄蕊10个(9个联合+1个离生),雌蕊一心皮一室,子房上位,描述正确。

1247

苔藓植物是一群小型的多细胞的高等植物。(√)

解析:苔藓植物是小型的多细胞高等植物,属于有胚植物(高等植物)中的非维管植物类群。

1248

褐藻门的藻体是多细胞体。(√)

解析:褐藻门的藻体均为多细胞体,没有单细胞种类,这是褐藻门的重要特征。

1249

裸子植物与被子植物的主要区别之一是前者具大孢子叶,后者具心皮。(×)

解析:裸子植物的大孢子叶(心皮)与被子植物的心皮是同源结构,裸子植物也具有心皮(即大孢子叶),两者主要区别在于被子植物心皮闭合形成果实。

1250

蓝藻的光合作用产物分散在中心质中。(×)

解析：蓝藻的光合作用产物（如蓝藻淀粉、蓝藻颗粒体等）分散在细胞质中，而非'中心质'（蓝藻无成形细胞核，只有核质区），但光合片层位于细胞质中。

1251

蓝藻细胞没有分化成载色体等细胞器。(√)

解析：蓝藻是原核生物，细胞内没有分化的细胞器如载色体（叶绿体），光合色素分散在细胞质中的光合片层上。

1252

单室复子房中，各心皮在中央联合，形成中轴，隔膜完整，胚珠着生在中轴上，即中轴胎座，如柑桔。(×)

解析：单室复子房中各心皮以边缘相连接形成一室，所有心皮都形成子房壁，胚珠着生在子房壁上（侧膜胎座），而非中轴胎座。柑橘为多心皮中轴胎座的多室子房。

1253

植物的全部生活，包括两个方面，即一方面是维持个体的生活，另一方面是种族的延续。(√)

解析：植物的全部生活确实包括两个方面：维持个体生活（营养生长）和种族的延续（生殖），这是植物生物学的基本观点。

1254

一般来讲，在植物生活史中，配子体是单倍体，孢子体是二倍体。(√)

解析：在植物生活史中，一般配子体为单倍体（n），孢子体为二倍体（2n），这是世代交替的基本规律。

1255

植物的各个器官都有发生变态的例子。(√)

解析：植物的根、茎、叶、花、果实、种子各器官都有发生变态的例子，如根的贮藏根、茎的块茎、叶的叶卷须等。

1256

蓝藻细胞都无蛋白核。(√)

解析：蓝藻是原核生物，细胞内没有蛋白核（pyrenoid），蛋白核是某些真核藻类（如绿藻）特有的结构。

1257

菟丝子的寄生属不定根。(√)

解析：菟丝子的吸器（寄生根）是由茎产生的不定根状结构，属于不定根性质的寄生器官。

1258

种子植物的开花、传粉和受精过程中，包含着无性生殖和有性生殖两个过程。(√)

解析：种子植物开花过程中，减数分裂产生小孢子和大孢子属于无性生殖，而传粉受精属于有性生殖，确实包含两个过程。

1259

蕨类植物的有性生殖器官仅为颈卵器。(×)

解析：蕨类植物的有性生殖器官包括颈卵器（产生卵细胞）和精子器（产生精子），并非仅有颈卵器。

1260

受精作用形成合子，标志着孢子体世代开始，减数分裂产生孢子，标志着配子体世代开始。(√)

解析：受精形成合子标志着孢子体世代开始（2n），减数分裂产生孢子标志着配子体世代开始（n），这是世代交替的正确描述。

1261

蕨类植物的根都为真根。(×)

解析：蕨类植物中有些种类（如松叶蕨）没有真正的根，只有假根或不定根，因此并非所有蕨类植物的根都是真根。

1262

苔藓植物的有性生殖器官是颈卵器。(×)

解析：苔藓植物的有性生殖器官包括颈卵器（雌性）和精子器（雄性）两种，并非仅有颈卵器。

1263

绿藻门植物的营养细胞均无鞭毛。(×)

解析：绿藻门中有些种类的营养细胞具有鞭毛，如衣藻的营养细胞具有两根鞭毛，因此说均无鞭毛是错误的。

1264

藻类植物与菌类植物都是低等植物，它们之间的主要不同点在于：藻类是水生的，菌类则是陆生的。(×)

解析：藻类与菌类的主要区别在于：藻类含叶绿素等光合色素能自养，菌类无光合色素为异养；且藻类并不全是水生，菌类也不全是陆生。

ANXSG

1265

裸子植物的叶均为针形或条形。(×)

解析：裸子植物的叶并非均为针形或条形，如银杏叶为扇形，苏铁叶为大型羽状复叶，形状多样。

1266

地钱的雄生殖托属于孢子体部分。(×)

解析：地钱的雄生殖托（雄器托）和雌生殖托（雌器托）都属于配子体部分，是配子体上的生殖结构，不属于孢子体。

1267

二细胞花粉粒是指花粉粒内包含有营养细胞和生殖细胞各一个。(√)

解析：二细胞花粉粒是指花粉粒内包含一个营养细胞和一个生殖细胞，这是二细胞花粉粒的正确定义。

1268

豌豆的卷须是小叶变态，属叶卷须。(√)

解析：豌豆的卷须是由小叶变态而来的叶卷须，属于叶的变态。

1269

凡子房三室或三室以上者，均为中轴胎座。(√)

解析：子房三室或三室以上不一定都是中轴胎座，也可能是侧膜胎座或其他胎座类型，需根据心皮连接方式判断。

1270

团藻的细胞为衣藻型。(√)

解析：团藻由数百至数万个衣藻型细胞组成球状群体，每个细胞形态结构类似衣藻，具有鞭毛、眼点等。

1271

藻类植物主要生长在水中。(√)

解析：藻类植物主要生长在水中（淡水或海水），这是藻类植物的基本生态特征。

1272

苔藓植物的孢子体依附在配子体上，供给配子体养料和水分。(×)

解析：苔藓植物的孢子体依附在配子体上，但养料和水分是由配子体供给孢子体，而非孢子体供给配子体。

1273

衣藻的生活史中仅产生一种二倍体的植物体。(×)

解析：衣藻的生活史中主要产生单倍体（n）的植物体，减数分裂产生配子，合子萌发前进行减数分裂，不产生二倍体植物体。

1274

南瓜和葡萄的卷须都是茎卷须。(√)

解析：南瓜和葡萄的卷须都是由茎变态而来的茎卷须，正确。

1275

地衣是细菌和藻类组成的共生复合体植物。(×)

解析：地衣是真菌和藻类（或蓝藻）组成的共生复合体，不是细菌和藻类，且地衣不属于植物。

1276

苔藓植物一般没有维管组织，输导能力很弱。(√)

解析：苔藓植物一般没有真正的维管组织（木质部和韧皮部），因此输导能力很弱，植株矮小。

1277

由一个心皮形成的子房，有多个室，称单子房，如黄瓜。(×)

解析：由一个心皮形成的子房只有一室，不可能有多室；黄瓜的子房是由多个心皮合生形成的多室子房。

1278

，是柳的雌花花公式，它表示缺少花被，二个合生心皮的雌蕊，一室，子房上位。(√)

解析：柳树雌花花公式表示缺少花被，两个合生心皮构成雌蕊，一室，子房上位，描述正确。

1279

在一些植物的叶上，往往看到被虫危害所形成的异样结构是叶子的变态现象。(×)

解析：被虫危害形成的异样结构是虫瘿，属于昆虫诱导的异常生长，不是植物本身的变态现象（变态是植物自身基因控制的正常发育变化）。

1280

由多个心皮构成的子房叫复子房，心皮彼此以边缘相连接，全部心皮都形成子房壁，只有一室，即单室复子房，如黄瓜。(√)

ANXSG

解析：黄瓜的子房确实是单室复子房：多个心皮以边缘相连接，全部心皮形成子房壁，只有一室。

1281

孢子植物就是低等植物，也称为无胚植物。（×）

解析：孢子植物（藻类、苔藓、蕨类）是按繁殖方式划分的，而低等植物（藻类、菌类）是按进化水平划分的，两者概念不完全等同；且苔藓和蕨类是高等植物。

1282

裸子植物中无草本植物。（√）

解析：裸子植物中确实没有草本植物，均为木本植物（乔木或灌木）。

1283

在蕨类植物生活史中一般是孢子体占优势，但也有少数种类是配子体占优势。（√）

解析：蕨类植物生活史中一般是孢子体占优势，但也有少数种类（如某些苔蕨类）配子体占优势，描述基本正确。

1284

嫁接是一种营养繁殖方式，通常是把一个植物的枝条接到另一个植物的枝干上，使它们彼此愈合起来，成为一个植株。接上去的枝条叫接穗，被接的植物，即保存根系的植物叫砧木。（√）

解析：嫁接是营养繁殖方式，将接穗接到砧木上，使二者愈合生长，接上去的枝条叫接穗，被接的有根系的植物叫砧木，描述正确。

1285

常见的植物体就是植物的无性世代，即孢子体世代。（×）

解析：常见的绿色植物体通常是孢子体世代（二倍体），但在苔藓植物中，我们看到的绿色植物体是配子体（单倍体），因此不能一概而论。

1286

无限花序的特点是：在开花期，花序的花轴可继续向上生长，伸长，不断产生苞片，在其中苞腋内形成花芽，开花顺序是花轴基部先开放，然后，向顶端方向开放，如花序轴缩短，各花密集，则花从中央向外依次开放。（×）

解析：无限花序的开花顺序是由基部向顶端（由外向内）开放，描述中'花序轴缩短，各花密集，则花从中央向外依次开放'描述的是头状花序的特点，但整体对无限花序的描述有误——无限花序花轴可继续生长，但开花顺序是由下向上、由外向内。

1287

蕨类植物的茎都为根状茎。（×）

解析：蕨类植物的茎多数为根状茎，但并非全部，如桫椤（树蕨）具有直立的树状茎，肾蕨等也有直立茎。

1288

苔藓植物绝大多数是陆生植物，受精过程摆脱了水的束缚。（×）

解析：苔藓植物的受精过程需要水（精子需借助水游动到颈卵器中与卵结合），并未摆脱水的束缚。

1289

二细胞花粉粒是指花粉粒内包含有一个营养细胞和一个精子。（×）

解析：二细胞花粉粒内包含一个营养细胞和一个生殖细胞，生殖细胞尚未分裂为两个精子，因此不含精子。

1290

配子体进一步退化是被子植物的一个进化特征。（√）

解析：被子植物的配子体高度退化（雄配子体仅2-3个细胞，雌配子体仅7个细胞8个核），配子体进一步退化确实是被子植物的进化特征。

1291

团藻的有性生殖为同配生殖。（×）

解析：团藻的有性生殖为卵式生殖（卵细胞大而不动，精子小而有鞭毛），不是同配生殖。

1292

从蕨类植物开始才有了真根。（√）

解析：从蕨类植物开始才出现真正的根（具有维管组织的根），苔藓植物只有假根，因此该说法正确。

1293

裸子植物无柱头、花柱。花粉不必萌发即可抵达胚珠，所以不形成花粉管。（×）

解析：裸子植物虽无柱头和花柱，但花粉到达胚珠后仍需萌发花粉管，花粉管将精子输送到卵细胞处完成受精。

1294

蕨类植物的有性生殖为卵式生殖。（√）

解析：蕨类植物的有性生殖为卵式生殖，精子器产生具鞭毛的精子，颈卵器产生卵细胞，精子游动到颈卵器中与卵结合。

1295

白杨，洋槐树周围长出大量的“幼苗”，这些枝条是由它们的根上长出的，而不是在茎上形成的，因此，也称它们为分蘖。（×）

解析：白杨、洋槐根部萌发的幼苗是从根上长出的不定芽形成的根蘖苗，而不是分蘖（分蘖是禾本科等从茎基部分枝的现象）。

1296

蕨类植物门的常见植物有石松、卷柏、木贼、问荆和苏铁等。（×）

解析：苏铁属于裸子植物门，不属于蕨类植物门；石松、卷柏、木贼、问荆才是蕨类植物。

1297

单核花粉粒经一次或二次有丝分裂后，形成成熟花粉粒，也称雄配子。（×）

解析：单核花粉粒经分裂后形成成熟花粉粒（含营养细胞和生殖细胞或两个精子），但成熟花粉粒是雄配子体，不是雄配子（雄配子是精子）。

1298

裸子植物的雄配子体只具一个精子，所以不能进行双受精。（×）

解析：裸子植物的雄配子体通常产生两个精子（少数一个），但裸子植物不存在双受精现象，双受精是被子植物的特征。

1299

穗状花序是一直立花轴，上面着生许多无柄的两性花。（√）

解析：穗状花序为一直立花轴，上面着生许多无柄的两性花，描述正确。

1300

蕨类植物既是高等的孢子植物，又是原始的维管植物。（√）

解析：蕨类植物既是高等的孢子植物（有根茎叶分化），又是原始的维管植物（具有维管组织但较原始），描述正确。

1301

蝎尾状聚伞花序和螺状伞花序均属单歧聚伞花序类，在这类花序中，顶芽下面的侧枝是左右间隔形成的花序，是螺状聚伞花序，如唐菖蒲。（×）

解析：蝎尾状聚伞花序和螺状聚伞花序都属于单歧聚伞花序，但描述中将两者混淆：螺状聚伞花序的侧枝偏向一侧如螺状（如紫草），蝎尾状聚伞花序的侧枝交替向两侧弯曲（如唐菖蒲）。

1302

植物的繁殖只有两大类型，即营养繁殖和有性生殖。（×）

解析：植物的繁殖类型包括营养繁殖、无性生殖（产生孢子）和有性生殖三种，不只是两大类型。

1303

雌蕊是由心皮构成，心皮是一个变态的叶，它是构成雌蕊的单位。（√）

解析：雌蕊由心皮构成，心皮是变态的叶，是构成雌蕊的基本单位，描述正确。

1304

平时见到绿色的具“根”、“茎”、“叶”的葫芦藓植物体，其细胞染色体数目是单倍的。（√）

解析：葫芦藓的绿色植物体是配子体，其细胞染色体数目为单倍体（n），描述正确。

1305

由一个心皮形成的子房，只有一室，叫单子房。（√）

解析：由一个心皮形成的子房只有一室，称为单子房，描述正确。

1306

精子的细胞质中，有结构简单的线粒体，少量高尔基体，内质网和单层膜小泡，因此，精子不是细胞的结构。（×）

解析：精子虽然细胞质较少、细胞器简化，但仍具有细胞膜、细胞质和核等基本结构，是完整的细胞，不能说不是细胞的结构。

1307

花是由花柄，花托，花萼，花冠，雄蕊群，雌蕊群几个部分组成的。（√）

解析：花由花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群几部分组成，描述正确。

1308

绿藻细胞中的载色体和高等植物的叶绿体结构类似。（√）

解析：绿藻细胞中的载色体（叶绿体）与高等植物的叶绿体在结构上类似，都具有双层膜和类囊体，正确。

1309

伞形花序与伞房花序的区别在于前者着生在花轴上的花，花柄长短相等，各花柄集中着生在花序轴顶端，开花顺序由外向内。（√）

解析：伞形花序中各花花柄长短相近，集中着生在花序轴顶端，开花顺序由外向内，描述正确。

1310

被子植物的胚乳是极核受精后发育而成的，含有三倍或三倍以上的染色体。外胚乳是珠心组织发育而来的，含有二倍数目的染色体。它们都是贮藏养料的组织，供给胚发育所需的养料。（√）

解析：被子植物的胚乳由受精极核（通常3n）发育而来，外胚乳由珠心组织（2n）发育而来，均为贮藏养料的组织，描述正确。

1311

在植物界中，除受精卵外，胚囊中的其它成员或珠心，珠被组织中的个别细胞，也能发育为胚状结构，并萌发成小植株。（√）

解析：除受精卵外，胚囊中的助细胞、反足细胞以及珠心、珠被细胞等个别细胞也能发育为胚状体（不定胚），并萌发成小植株，描述正确。

1312

菟丝子的根寄生属不定根。（√）


解析：菟丝子的寄生吸器是由茎产生的不定根状结构，属于不定根性质，描述正确。

ANXSG
ANXSG
ANXSG

1313

试填出下图中各符号所示的名称。


①(外果皮);
②(中果皮);
③(内果皮);
④(胚乳);
⑤(胚);
⑥(桃纵剖面图。)。



1314

下图为一部分叶片结构图,请依线条所指注出各部分结构名称。

①(注出:①上表皮);⑤(栅栏组织);⑨(叶脉(木质部));
②(气腔);⑥(气孔);⑩(下表皮)。
③(海绵组织);⑦(木质部);
④(韧皮部);⑧(维管束鞘。);




1315

将图(茎的横切面)线条所指部位注出名称。

①(表皮);
②(厚角组织);
③(皮层);
④(纤维(韧皮部));
⑤(筛管);
⑥(形成层);
⑦(木质部(导管));
⑧(髓。)。


ANXSG



1316

请将下图叶片横切面图注出各部名称。


①(注出:①、④薄壁组织);④(木质部);
②(韧皮部);⑤(下表皮);
③(上表皮。);⑥()。



1317

该图为马铃薯块茎细胞里的淀粉粒,试注明下列名称。

①(单粒);
②(半复粒);
③(复粒);
④(淀粉粒的核心(脐)。)。



1318


下图为山毛榉的枝条,请把横线处注上字。

①(顶芽);
②(腋芽);
③(节间);
④(节);
⑤(叶痕);

ANXSG


⑥(芽鳞痕);
⑦(皮孔);
⑧(束痕。)。

ANXSG
ANXSG
ANXSG




1319

右图为绿豆根的横切面，请注出划线所指部位名称。



1320

右图是绿豆根的横切面，请注出划线所指部位名称。




1321

下图为双子叶植物叶的组成，注明各部分名称。


1(注明:1叶片);2(叶柄);3(托业);
4(腋芽);5(枝条。);

ANXSG



1322


右图为玉米茎维管束切面图，写出线条所指部位名称。
①(厚壁组织(或维管束鞘))；④(筛管(或初生韧皮部))；
②(导管(或后生木质部))；⑤(导管(或原生木质部))；
③(气腔)；⑥(薄壁细胞。)。



1323

下图是玉米叶片的横切面，注明各部分名称。

①(注明：①厚壁组织)；⑤(表皮毛)；
②(泡状细胞)；⑥(木质部)；
③(韧皮部)；⑦(保卫细胞)；
④(维管束鞘)；⑧(副卫细胞。)。



1324


叶片结构图填空：①上表皮⑤叶肉⑨下表皮②栅栏组织⑥海绵组织⑩叶脉③叶肉⑦气孔④保卫细胞⑧叶脉

解析：叶片横切面结构识别。

1325


试填出下图中各符号所示名称和细胞分裂类型。①(花药壁层)；⑤(花粉母细胞)；⑨(二分体)；②(四分体)；⑥(小孢子)；⑩(双胞花粉粒⑦营养细胞)。③(生殖细胞)；⑦(减数分裂Ⅰ、Ⅱ)；④(有丝分裂。)；⑧()；

ANXSG




1326

试填出下图中各符号所示结构的名称。①(表皮);②(纤维层);③(药隔的维管束);④(药隔的薄壁组织);⑤(药室);⑥(花粉粒。)。



1327

试填出下图中各符号所示名称。①(子房);②(子房壁);③(子房室);④(胚珠);⑤(珠心);⑥(内珠被);⑦(外珠被);⑧(胎座。)。




棉花-横切面图

1328


填写双子叶植物根初生结构:

ANXSG




1329

试填出花结构图:①(花柄);⑤(花托);⑨(萼片);②(花瓣);⑥(花药);⑩(花丝)。③(柱头);⑦(花柱);④(子房);⑧(被子植物花的结构。);



1330

试填出下图中各符号所示的名称。①(外壁);②(内壁);③(营养核);④(生殖细胞。);



双胞花粉粒


ANXSG
ANXSG
ANXSG

填图选择题

共 27 题

1331


下图是小麦茎部分横切详图，请正确选择图中各数字所表示的相应结构名称。



(1) 上图中的6是(B)。
(2) 上图中的3是(D)。

1332


棉叶(中脉)及气孔与邻近细胞的横切(植物学教材 金银根主编 P164)



(1) 其中的7是(D)。
(2) 其中的3是(G)。

1333

双子叶植物叶的组成




(1) 其中的2是(B)。
(2) 其中的1是(A)。

1334

真果桃的结构


ANXSG



(1) 其中的4是(B)。
(2) 其中的1是(D)。

1335


下图是双子叶植物茎横切初生结构简图,请正确选择图中各数字所表示的相应的结构名称。



(1) 图中的6表示(G)。
(2) 上图中的2表示(E)。

1336

胚珠纵切结构简图




(1) 其中的3是(L)。
(2) 其中的8是(L)。

1337

棉叶(中脉)及气孔与邻近细胞的横切


ANXSG
ANXSG
ANXSG



(1) 其中的5是(A)。
(2) 其中的3是(G)。

1338


蚕豆幼根横切(植物学教材金银根主编 P130)



(1) 其中的3是(A)。
(2) 其中的2是(A)。

1339

水稻叶横切结构(植物学教材 金银根主编 P167)




(1) 其中的4是(D)。
(2) 其中的7是(A)。

1340

植物细胞的结构(植物学教材金银根主编 P88)


ANXSG



(1) 其中的5是(A)。
(2) 其中的2是(D)。

1341


小麦根初生结构横切(植物学教材金银根主编 P135)



(1) 其中的3是(B)。
(2) 其中的1是(B)。

1342

蚕豆种子与胚的结构




(1) 其中的4是(C)。
(2) 其中的1是(C)。

1343

小麦叶表皮(植物学教材金银根主编 P106)

ANXSG



(1) 其中的3是(C)。
(2) 其中的1是(C)。

1344

棉种子(图1)和豌豆种子(图2)萌发幼苗类型




图 1





图 2

(1) 其中的图2是(B)。
(2) 其中的图1是(A)。

1345

棉老根横切(植物学教材金银根主编 P35)




(1) 其中的7是(E)。
(2) 其中的6是(B)。

1346

棉老根横切(植物学教材金银根主编 P135)


ANXSG



(1) 其中的2是(C)。
(2) 其中的1是(G)。

1347


禾本科植物叶的组成



(1) 其中的4是(B)。
(2) 其中的2是(C)。

1348

下图是棉幼茎横切部分立体结构详图




(1) 图中的8是(B)。
(2) 上图中的7是(B)。

1349

棉茎横切部分结构(部分立体详图)

ANXSG



(1) 其中的4是(D)。
(2) 其中的1是(K)。

1350

棉叶横切其中3是( )

解析：3指向海绵组织。

1351

棉叶横切其中7是( )

解析：7位于表皮下，为厚角组织。

1352

棉幼茎横切其中3是( )

解析：3指向初生木质部。

1353

棉幼茎横切其中4是( )

解析：4指向初生韧皮部。

1354

桃果实结构其中1是( )

解析：1指向外果皮。

1355

桃果实结构其中4是( )

解析：4指向种子。

1356

棉老根横切其中3是( )

解析：3指向次生韧皮部。

1357

棉老根横切其中5是( )

解析：5指向次生韧皮部。

ANXSG
ANXSG
ANXSG