第一章单元测验

第一单元 单元测验 查看帮助

1 单选 (2分) 科学研究的基本方法包括了（ ）。

A. 选题、试验、写论文

B. 抽样调查、试验验证、形成结论

C. 试验验证、形成假说、抽样调查

D. 选题、查文献、假说、假说的检验、试验的规划与设计、统计推断等

2 单选 (2分) 开展一项生物学研究，何时开始运用生物统计学知识 （ ）。

A. 获取试验数据之后

B. 试验设计做好之后

C. 试验设计开始

D. 从计算机结果分析开始

3 单选 (2分) 3个因素间的互作称为（ ）

A. 一级互作

B. 高级互作

C. 三级互作

D. 二级互作

4 单选 (2分) 试验方案按其供试因子数多少可以区分为3类，下面哪一项不属于该分类项？

A. 多因素试验

B. 综合性试验

C. 单因素试验

D. 随机区组试验

5 单选 (2分) 将一批品种以及生长情况相同的玉米幼苗放于0Lux、5Lux、10Lux光照强度下，分别进行6种缺素4重复的试验处理包含了（ ）因素、（ ）处理、（ ）单元。

A. 1 4 24

B. 2 24 72

C. 2 18 72

D. 3 9 18

6 单选 (2分) 将一批品种以及生长情况相同的玉米幼苗放于0Lux、5Lux、10Lux光照强度下，分别进行6种激素4重复的试验处理，其中在光照因素和激素因素下的水平分别是（ ）。

A. 8 24

B. 12 24

C. 3 6

D. 4 4

7 单选 (2分) 在单因素试验中试验效应有（ ）。

A. 简单效应

B. 简单效应和互作

C. 平均效应和互作

D. 互作

8 单选 (2分) 要正确地制定一个试验方案，必须做到研究目的明确，处理水平简明合理，并必须应用（ ）原则。

A. 唯一差异

B. 设立对照

C. 相差等距或等比例

D. 全面设施

9 单选 (2分) 观测、测定中，由于偶然因素如微气流、微小的温度变化、仪器的轻微振动等所引起的误差一般称为（ ）。

A. 系统误差

B. 疏失误差

C. 可定误差

D. 随机误差

10 单选 (2分) 试验误差主要由（　　）引起的。


A. 水平

B. 环境变异

C. 唯一差异原则

D. 处理

11 单选 (2分) 下图的打靶结果，关于准确度、精确度叙述正确的是（　）。



A. 准确性和精确性均很差


B. 准确性差，而精确性较好

C. 具有最佳的准确性和精确性


D. 准确性较好，精确性很差

12 单选 (2分) 下图为打靶试验结果，其中精确性高但准确性差的是(　　)。


A.




B.



C.



D.



13 单选 (2分) 研究工作者获得的试验数据往往是含有误差的，其中找不出确切原因的微小误差，往往被归为_____。（　　）

A. 可定误差

B. 随机误差

C. 系统误差

D. 操作误差

14 单选 (2分) 用于衡量试验效果的指示性状称为（　　）。

A. 试验环境

B. 试验因素

C. 试验效应

D. 试验指标

15 判断 (2分) 农业和生物学的试验中，常将排除系统偏差和控制偶然性误差的试验设置称为试验设计。

A. ✔

B. ✘

16 判断 (2分) 单因素试验的效率常高于多因素试验。

A. ✔

B. ✘

17 判断 (2分) 试验处理是试验因素各水平的组合。

A. ✘

B. ✔

18 判断 (2分) 试验效应指试验因素对试验指标所起的作用。

A. ✔

B. ✘

19 判断 (2分) 试验方案中，一个试验单元可以接受多个处理。

A. ✘

B. ✔

20 判断 (2分) 系统偏差影响试验数据的准确性，随机误差影响试验数据的精确性。

A. ✘

B. ✔

21 判断 (2分) 试验误差可以分为随机误差和系统误差。

A. ✔

B. ✘

22 判断 (2分) 田间试验中，系统误差是由人为因素造成，无法消除。

A. ✔

B. ✘

23 判断 (2分) 多数的系统误差是特定原因引起的，所以较难控制。

A. ✔

B. ✘

24 判断 (2分) 系统误差是可以通过试验条件及试验过程的仔细操作来控制的。

A. ✘

B. ✔

25 判断 (2分) 进行大豆品种蛋白质含量测定时，若抽取100个30g的样品进行测定，但是这100个抽样测定数据有所不同，这表明存在随机误差。

A. ✘

B. ✔