

CISTELLA SEGURA · CATALUÑA

Setas *esenciales*

Las 79 setas que hay que conocer en Cataluña: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

47 COMESTIBLES · 9 MORTALES · 23 TÓXICAS

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

Sumario

Guía reglas, cómo mirar, índice, calendario, árboles *3*

Comestibles 47 especies *14*

Mortales 9 especies *61*

Tóxicas 23 especies *70*

Síndromes según cuándo aparecen los síntomas *93*

Mis hallazgos para anotar *95*

Glosario e índice palabras y todos los nombres *97*

SOS si alguien se encuentra mal *104*

CÓMO LEER UNA FICHA

COMESTIBLE CONDICIONADA — Condicionada: solo bien cocinada o con reservas.

FÁCIL — Dificultad de identificación: fácil, media o difícil.

E F M A M J J A S O N D — Meses en que sale; en claro, solo algunos años.

Coníferas, frondosas, prados o madera.

→ p. 23 — Página de la especie con que se confunde.

Aviso. Ninguna guía, foto ni aplicación certifica que una seta sea comestible. Ante la duda, consulte a un micólogo con el ejemplar entero.

Las 12 reglas

No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.** Conocer una especie significa saber reconocer todos sus rasgos decisivos y todas las especies peligrosas con las que se confunde.

2. **Extraiga el ejemplar entero.** La base del pie (volva, bulbo, micelio) es imprescindible para descartar amanitas mortales.

3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.** En un mismo corro pueden crecer mezcladas una comestible y una tóxica (por ejemplo, el cama-sec y los clitocibes blancos).

4. **No mezcle especies en la cesta** y lleve las dudosas aparte, envueltas en papel.

5. **Deseche los ejemplares viejos, agusanados, empapados, helados o muy jóvenes.** Los viejos se descomponen y pueden causar intoxicaciones aunque la especie sea comestible; los botones muy jóvenes aún no muestran los rasgos de identificación.

6. **Use una cesta rígida y ventilada**, nunca bolsas de plástico, que aceleran la descomposición.

7. **No crea en pruebas caseras.** El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.

8. **Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas.** Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.

9. **Ante cualquier duda, consulte a un micólogo** (sociedades micológicas y sus exposiciones), con el ejemplar entero y fresco, nunca solo con una foto.

10. **Cocine siempre las setas.** Muchas comestibles son tóxicas en crudo o poco hechas: colmenillas, pie azul, armilaria, amanita vinosa, mataparents.

11. **Guarde un ejemplar crudo** de cada especie en la nevera hasta el día siguiente: si alguien se encuentra mal, servirá para identificarla.

12. **Evite lugares contaminados**: cunetas de carreteras, zonas industriales, vertederos, campos tratados.

ANTES DEL NOMBRE

Cómo mirar una seta

Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.



1 Sombrero. Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

2 Debajo. Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

3 Anillo. ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

4 Pie. Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

5 Base. Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

6 Carne. Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO

Láminas — Hojas finas

Tubos — Una esponja

Pliegues — Venas gruesas

Aguijones — Púas blandas

Interior — Bola sin sombrero

LA EDAD CUENTA

Una comestible vieja o pasada también intoxica. Cójala joven y firme. (Rovelló)



Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

LO QUE EVITA LAS INTOXICACIONES GRAVES

Tres comprobaciones

Hágalas con cada ejemplar, también con las setas que cree conocer.

1 **Base del pie**

Desentierre siempre la base. Una volva en saco o un bulbo con reborde indica una amanita.

2 **Láminas blancas + anillo + volva = descarte inmediato**

Sea cual sea el color del sombrero.

3 **Setas pequeñas de láminas pardas o de color herrumbre, lepiotas pequeñas y setas pequeñas sobre madera**

No se recolectan para comer.

NO SE FÍE DE

No crea en pruebas caseras. El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.

Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas. Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.

Las comestibles

En el orden del cuaderno: las parecidas, juntas. El número es la página.

Rovelló 14

Lactarius semisanguifluus 15

Pinetell 16


Pinetell d'avet 17

Llora verda 18

Llora 19

Peu de rata de pi 20

Cep 21

Sureny fosc 22

Cep rogenc 23

Cep d'estiu 24

Molleric 25

Molleric calçat 26

Cama de perdiu 27


Rossinyol 28


Trompeta de la mort 29

Camagroc 30


Camagroc 31

Llengua de bou 32


Picornell de pi 33

Fetge de vaca 34


Orella de Judes 35


Ou de reig 36

Farinera 37

Apagallums 38

Las comestibles

Bolet de tinta 39

Camperol 40

Bola de neu 41


Pet de llop 42

Pet de llop gegant 43

Pet de llop gros 44

Fredolic 45

Fredolic gros 46

Pimpinella morada 47

Pampa 48

Moixernó 49

Llenega negra 50


Llenega blanca 51

Carlet 52


Cama-sec 53

Círgola de panical 54

Orellana 55


Moixernó blanc de tardor 56

Pollancró 57

Múrgola 58

Múrgola 59

Tòfona negra 60

Las de alerta

Mortales y tóxicas: conózcalas para no recolectarlas.

MORTAL TÓXICA NO COMESTIBLE

Paxil·le tòxic 61


Farinera borda 62

Cogomassa 63

Farinera pudent 64

Lepiota metzinosa 65

Galerina marginada 66

Inosperma erubescens 67

Cortinari metzinós 68

Bolet de greix 69

Enganyapastors de llet groga 70

Enganyapastors 71

Cabra de beç 72

Escaldabecs 73


Matagent 74

Fals rossinyol 75

Pota de cavall groga 76

Peu de rata bord 77

Amanita proxima 78

Pixacà 79

Reig bord 80

Amanita gemmata 81

Lepiota pudent 82

Bola de neu pudent 83

Verderol 84

Fredolic metzinós 85

Clitocibe blanc 86

Círgola d'olivera 87

Mycena pura 88

Fals carlet 89

Bolet de pi 90

Barret de bruixa 91

Bolet de femer 92

Calendario

Meses en que sale cada comestible y lo difícil que es identificarla.

SETA		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DIFIC.
Rovelló	14	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Lactarius semisanguifluus	15	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Pinetell	16	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Pinetell d'avet	17	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Llora verda	18	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Llora	19	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Peu de rata de pi	20	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Cep	21	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Sureny fosc	22	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Cep rogenc	23	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Cep d'estiu	24	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Molleric	25	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Molleric calçat	26	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Cama de perdiu	27	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Rossinyol	28	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Trompeta de la mort	29	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Camagroc	30	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Camagroc	31	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Llengua de bou	32	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Picornell de pi	33	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Fetge de vaca	34	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Orella de Judes	35	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Ou de reig	36	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Farinera	37	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

E F M A M J J A S O N D oscuro: temporada · claro: solo algunos años

Calendario

SETA		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DIFIC.
Apagallums	38						●	●	●	●	●	●		
Bolet de tinta	39			●	●	●				●	●	●	●	
Camperol	40	●				●	●			●	●	●		
Bola de neu	41						●	●	●	●	●	●		
Pet de llop	42								●	●	●	●	●	
Pet de llop gegant	43					●	●	●	●	●	●			
Pet de llop gros	44					●	●	●	●	●	●			
Fredolic	45	●								●	●	●	●	
Fredolic gros	46									●	●	●	●	
Pimpinella morada	47	●	●	●	●						●	●	●	
Pampa	48									●	●	●	●	
Moixernó	49			●	●	●	●				●			
Llenega negra	50	●								●	●	●	●	
Llenega blanca	51										●	●	●	
Carlet	52	●									●	●	●	
Cama-sec	53				●	●	●			●	●	●		
Círgola de panical	54				●	●					●	●	●	
Orellana	55	●	●	●							●	●	●	
Moixernó blanc de tardor	56								●	●	●	●		
Pollancró	57				●	●	●			●	●	●		
Múrgola	58		●	●	●	●								
Múrgola	59			●	●	●	●							
Tòfona negra	60	●	●	●									●	

E F M A M J J A S O N D — oscuro: temporada · claro: solo algunos años

Árboles y sus setas

Muchas setas viven unidas a las raíces de un árbol: reconocerlo es el primer paso.

Pino carrasco

pi blanc

Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido; tronco a menudo inclinado o tortuoso.

BUSQUE Rovelló *14*, *Lactarius semisanguifluus 15*, Molleric *25*, Cama de perdiu *27*, Picornell de pi *33*, Farinera *37*, Fredolic *45*, Llenega negra *50*, Llenega blanca *51*

CUIDADO *Amanita proxima 78*

Pino piñonero

pi pinyer

Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.

BUSQUE Rovelló *14*, Molleric *25*, Cama de perdiu *27*, Fredolic *45*

CUIDADO Pota de cavall groga *76*, Verderol *84*

Pino rodeno

pinastre

Pino alto de copa piramidal o irregular, de verde oscuro brillante.

BUSQUE Rovelló *14*, Pinetell *16*, Peu de rata de pi *20*, Molleric *25*, Fredolic gros *46*

CUIDADO Fals rossinyol *75*, Verderol *84*

Pino laricio

pinassa

Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.

BUSQUE Rovelló *14*, *Lactarius semisanguifluus 15*, Pinetell *16*, Peu de rata de pi *20*, Molleric *25*, Molleric calçat *26*, Cama de perdiu *27*, Camagroc *30*, Fredolic *45*, Fredolic gros *46*, Llenega negra *50*, Llenega blanca *51*

CUIDADO *Amanita gemmata 81*

Pino silvestre

pi roig

Copa irregular y alta; la parte superior del tronco y las ramas gruesas son de color naranja asalmonado, visible de…

BUSQUE Rovelló *14*, *Lactarius semisanguifluus 15*, Pinetell *16*, Peu de rata de pi *20*, Cep *21*, Cep rogenc *23*, Molleric *25*, Molleric calçat *26*, Cama de perdiu *27*, Rossinyol *28*, Camagroc *30*, Camagroc *31*, Llengua de bou *32*, Picornell de pi *33*, Fredolic *45*, Fredolic gros *46*, Llenega negra *50*, Llenega blanca *51*, Moixernó blanc de tardor *56*, Múrgola *59*

CUIDADO Escaldabecs *73*, Paxil·le tòxic *61*, Fals rossinyol *75*, Pixacà *79*, Reig bord *80*, *Amanita gemmata 81*, Verderol *84*, Fredolic metzinós *85*, Bolet de greix *69*

Pino negro

pi negre

Pino de copa estrecha y oscura de la alta montaña, a menudo en el límite del bosque.

BUSQUE Pinetell *16*, Cep rogenc *23*, Molleric calçat *26*

CUIDADO Escaldabecs *73*, Reig bord *80*, Bolet de greix *69*

Árboles y sus setas

Abeto blanco

avet

Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.

BUSQUE Pinetell d'avet *17*, Cep *21*, Rossinyol *28*, Camagroc *30*, Camagroc *31*, Llengua de bou *32*, Múrgola *59*

CUIDADO Escaldabecs *73*, Reig bord *80*, Fredolic metzinós *85*, Bolet de greix *69*

Pícea

pícea

Conífera cónica de ramas colgantes.

BUSQUE Cep *21*

Encina

alzina

Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate; en el interior a menudo en forma de mata.

BUSQUE Llora verda *18*, Llora *19*, Sureny fosc *22*, Cep d'estiu *24*, Rossinyol *28*, Trompeta de la mort *29*, Llengua de bou *32*, Picornell de pi *33*, Ou de reig *36*, Farinera *37*, Carlet *52*, Tòfona negra *60*

CUIDADO Enganyapastors de llet groga *70*, Enganyapastors *71*, Matagent *74*, Paxil·le tòxic *61*, Pota de cavall groga *76*, Farinera borda *62*, Cogomassa *63*, *Amanita proxima* *78*, Pixacà *79*, Círgola d'olivera *87*, Cortinari metzinós *68*

Alcornoque

surera

Árbol de copa amplia y verde grisácea; tronco con corcho grueso o, si se ha descorchado, de color rojo anaranjado.

BUSQUE Llora verda *18*, Llora *19*, Sureny fosc *22*, Rossinyol *28*, Ou de reig *36*

CUIDADO Enganyapastors de llet groga *70*, Pota de cavall groga *76*, Farinera borda *62*, Cogomassa *63*

Roble pubescente

roure martinenc

Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las hojas secas.

BUSQUE Llora verda *18*, Llora *19*, Sureny fosc *22*, Cep d'estiu *24*, Trompeta de la mort *29*, Llengua de bou *32*, Fetge de vaca *34*, Ou de reig *36*, Farinera *37*, Carlet *52*, Moixernó blanc de tardor *56*, Tòfona negra *60*

CUIDADO Enganyapastors de llet groga *70*, Enganyapastors *71*, Matagent *74*, Peu de rata bord *77*, Farinera borda *62*, Cogomassa *63*, Pixacà *79*, Círgola d'olivera *87*, Fals carlet *89*, Cortinari metzinós *68*

Quejigo

roure de fulla petita

Roble de porte modesto y copa clara, marcescente.

BUSQUE Carlet *52*, Tòfona negra *60*

CUIDADO Enganyapastors *71*

Roble albar

roure de fulla gran

Roble alto y de tronco recto en bosques frescos de montaña.

BUSQUE Llora *19*, Cep *21*, Cep d'estiu *24*, Rossinyol *28*, Trompeta de la mort *29*, Fetge de vaca *34*

Árboles y sus setas

Haya

faig

Árbol alto de corteza lisa y gris; bajo su copa densa apenas crece sotobosque.

BUSQUE Llora verda *18*, Llora *19*, Cep *21*, Cep rogenc *23*, Cep d'estiu *24*, Rossinyol *28*, Trompeta de la mort *29*, Camagroc *31*, Llengua de bou *32*, Orellana *55*

CUIDADO Matagent *74*, Peu de rata bord *77*, Farinera borda *62*, Farinera pudent *64*, Pixacà *79*, Fredolic metzinós *85*, Fals carlet *89*

Castaño

castanyer

Árbol grande de copa amplia; a menudo en forma de rebrotes de cepa (castañares de leña).

BUSQUE Llora verda *18*, Llora *19*, Cep *21*, Sureny fosc *22*, Cep rogenc *23*, Cep d'estiu *24*, Rossinyol *28*, Trompeta de la mort *29*, Llengua de bou *32*, Fetge de vaca *34*, Ou de reig *36*, Moixernó blanc de tardor *56*

CUIDADO Enganyapastors de llet groga *70*, Matagent *74*, Paxil·le tòxic *61*, Pota de cavall groga *76*, Peu de rata bord *77*, Farinera borda *62*, Círgola d'olivera *87*, Fals carlet *89*, Cortinari metzinós *68*

Abedul

bedoll

Árbol esbelto de tronco blanco y ramillas colgantes.

BUSQUE Llora *19*

CUIDADO Cabra de beç *72*, Paxil·le tòxic *61*, Farinera pudent *64*, Reig bord *80*

Chopo negro

pollancre

Árbol alto de ribera y de plantaciones en hileras (chopos híbridos).

BUSQUE Orellana *55*, Pollancró *57*

Álamo blanco

àlber

Copa blanquecina cuando el viento gira las hojas.

BUSQUE Pollancró *57*

Avellano

avellaner

Arbusto grande de muchos tallos.

BUSQUE Tòfona negra *60*

Olivo

olivera

Árbol de copa gris verdosa y tronco retorcido.

CUIDADO Círgola d'olivera *87*

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *esclatasang*

Rovelló

Lactarius sanguifluus · níscalo de sangre · rebollón

Comestible muy apreciado, siempre cocinado. Sus pigmentos pueden teñir la orina de rojizo: es inocuo, pero conviene saberlo para no alarmarse.

En su punto: sombrero naranja vinoso, con pocas zonas.

Láminas color vino (L. sanguifluus o L. vinosus).

De lado

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Látex rojo vino desde el primer instante, sin pasar por naranja (mírelo justo al cortar).
✓ Láminas rosa vinoso o lila vinoso, que se manchan de verde.
✓ Pie corto, hueco, del color del sombrero, con hoyuelos más oscuros.
✓ Siempre bajo pinos.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio, piñonero, silvestre y rodeno. Bordes de caminos y cortafuegos dentro del pinar, claros con hierba, taludes y zonas donde la capa de acículas es fina.

NO LA CONFUNDA CON

- **Paxil·le tòxic** MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne. → p. 61
- **Enganyapastors de llet groga** TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 70
- **Enganyapastors** TÓXICA Látex blanco inmutable y muy picante; láminas crema; no verdea; bajo planifolios. → p. 71

COMPRUEBE Presione las láminas y observe la mancha; corte en busca de látex.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Lactarius semisanguifluus

Comestible, siempre cocinado; incluido en la parte A del anexo del RD 30/2009.

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Látex naranja al cortar que se vuelve rojo vinoso en 5–10 minutos.
✓ Láminas naranja, que verdean.
✓ Pie hueco con escrobículas.
✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y carrasco. Pinares, a menudo sobre suelos calcáreos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Enganyapastors de llet groga** TÓXICA Látex blanco que amarillea en segundos; sin verdeo; bajo planifolios. → p. 70
- **Pinetell** COMESTIBLE En el pinetell el látex sigue naranja durante bastante más tiempo. → p. 16
- **Rovelló** COMESTIBLE En el rovelló el látex es rojo vino desde el primer instante. → p. 14

COMPRUEBE Látex al cortar.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *rovelló d'obaga*

Pinetell

Lactarius deliciosus · níscalo · mízcalo

Comestible apreciado, siempre cocinado. Como el rovelló, puede teñir la orina de rojizo sin consecuencias.

En su punto: naranja, con zonas bien marcadas en el sombrero.

Girelo

Los hoyuelos naranja del pie (escrobículas)...

E F M A M J J A **S** **O** **N** D Láminas Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Látex naranja zanahoria al cortar, que no se vuelve rojo vino en los primeros minutos.
✓ Láminas naranja vivo que se manchan de verde.
✓ Pie hueco, naranja, con hoyuelos (escrobículas) más oscuros.
✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio, negro y rodeno. Bordes de pistas y claros con hierba o musgo dentro del pinar, taludes y vertientes umbrías; los jóvenes, medio enterrados en la pinaza.

NO LA CONFUNDA CON

- **Paxil·le tòxic** MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas fácilmente separables. → p. 61
- **Cabra de beç** TÓXICA Margen muy peludo, látex blanco y picante; bajo abedules. → p. 72
- **Enganyapastors de llet groga** TÓXICA Látex blanco que amarillea en segundos; láminas crema; nunca verdea; bajo robles y encinas. → p. 70

COMPRUEBE Corte la carne y las láminas: sin látex, descarte el ejemplar.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

pinetell d'avetosa

Pinetell d'avet

Lactarius salmonicolor

Comestible, de menor calidad que el pinetell y el rovelló según la valoración tradicional.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Crece exclusivamente bajo abetos (Abies alba).
✓ Látex naranja que no vira a rojo vino.
✓ Pie con escrobículas, hueco.

DÓNDE Con abeto blanco. Abetales puros o mixtos con haya y pino silvestre.

NO LA CONFUNDA CON

- **Cabra de beç** TÓXICA Margen lanoso, látex blanco; bajo abedul. → p. 72
- **Pinetell** COMESTIBLE Bajo pinos y con manchas verdes abundantes. → p. 16

COMPRUEBE Margen y látex.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Llora verde

Russula virescens · gorro verde · seta del cura

La confusión que hay que descartar es con la farinera borda, de sombrero también verde.

En su punto: sombrero verde que se agrieta en mosaico.

Debajo

Joven: sombrero redondeado, verde pálido y firme.

E F M A M **J** **J** **A** **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Cutícula verde agrietada en pequeñas placas (aspecto de mosaico o de piel de lagarto), seca y mate.
- ✓ Láminas blancas o crema; sin anillo y SIN volva: desentierre la base completa para comprobarlo.
- ✓ Carne blanca, firme, quebradiza como la tiza.
- ✓ Pie blanco, cilíndrico, sin bulbo envuelto en saco.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente, castaño y haya. Bordes de caminos y claros de robledales, castañares y alcornocales, a menudo en suelo con poca hojarasca.

NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL La farinera borda tiene anillo en el pie y una volva membranosa en la base, a menudo enterrada; su sombrero es liso, satinado, con fibras radiales, no agrietado en… → p. 62
- **Llora** COMESTIBLE La carbonera tiene la cutícula lisa y brillante y láminas flexibles y grasas al tacto. → p. 19
- ***Russula heterophylla* / *R. aeruginea*** DESCONOCIDA Cutícula lisa, no agrietada.

COMPRUEBE Base del pie (desentiérrela) y parte alta del pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Llora

Russula cyanoxantha · carbonera

Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).

Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.

Carbonera (R. cyanoxantha)

E F M A M **J J A S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).

✓ Sin anillo ni volva.

✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

DÓNDE Con haya, castaño, encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 62
- ***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.
- **Cualbra morada** NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante.

COMPRUEBE Base del pie (desentiérrela) y anillo.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *greixa*

Peu de rata de pi

Sparassis crispa · seta coliflor · barba de cabra

Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.

E F M A M J J A **S O N** D · Ramificado · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.

✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.

✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y rodeno. Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

NO LA CONFUNDA CON

- **Peu de rata bord** TÓXICA Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios. → p. 77
- **Peu de rata col-i-flor** CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

COMPRUEBE Forma de las ramas.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *sureny*

Cep

Boletus edulis · boleto · hongo blanco

Deseche los ejemplares viejos, blandos o con los tubos verdes y esponjosos, que se degradan con rapidez.

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.

Jóvenes, redondos como tapones de corcho

Ceps recolectados en la cesta de mimbre.

E F M A M J J **A S O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
- ✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
- ✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

DÓNDE Con haya, castaño, roble albar, pino silvestre y abeto blanco y otros. Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

NO LA CONFUNDA CON

- **Matagent** TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente. → p. 74
- **Molleric amarg** NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.
- **Mataparent amarg** NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

COMPRUEBE Poros y pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

cep negre

Sureny fosc

Boletus aereus · boleto negro · hongo negro

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

Joven: poros blancos, como algodón; carne firme.

Adulto

Pie grueso con un retículo fino de color claro.

E F M A M **J** **J** **A** **S** **O** **N** D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero pardo muy oscuro, casi negro, seco y aterciopelado, a veces con tonos bronce.

✓ Poros blancos y luego amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

✓ Pie robusto, pardo, con retículo pardo.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bordes de camino y claros soleados de encinares y castañares, a menudo en laderas orientadas al sur tras lluvias de verano.

NO LA CONFUNDA CON

- **Matagent** TÓXICA Sombrero blanquecino, poros rojos, pie con retículo rojo. → p. 74
- **Mataparent de cama roja** CONDICIONADA Poros rojos y carne amarilla que azulea al instante.
- **Cep** COMESTIBLE Sombrero más claro y algo graso; más de montaña. → p. 21

COMPRUEBE Poros y pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Cep rogenc

Boletus pinophilus · boleto pinícola

pinophilus o B. pinicola).

Sureny fosc (B. aereus): sombrero casi negro. También excelente.



Viejo

E F M A **M** **J** J A **S** **O** N D · Tubos · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero pardo rojizo, granate o caoba.

✓ Poros blancos, luego amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

✓ Pie robusto, teñido de pardo rojizo, con retículo.

DÓNDE Con pino silvestre, negro, haya y castaño. Claros y bordes de pinares de montaña, entre arándanos y brezos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Mataparent de cama roja** CONDICIONADA Poros rojos; carne amarilla que azulea al instante.
- **Cep** COMESTIBLE Sombrero pardo claro; pie blanquecino. → p. 21

COMPRUEBE Poros y corte.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *rourenc d'estiu*

Cep d'estiu

Boletus reticulatus · boleto reticulado · boleto estival

Muy atacado por larvas en verano.

E F M A **M** **J** **J** **A** **S** O N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero pardo claro, seco, finamente aterciopelado, que se agrieta en tiempo seco.

✓ Retículo marcado que recorre el pie hasta casi la base.

✓ Poros blancos, después amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

DÓNDE Con roble pubescente, albar, castaño, haya y encina. Bordes soleados de robledales y castañares, claros con hierba.

NO LA CONFUNDA CON

- **Matagent** TÓXICA Poros rojos y pie rojo. → p. 74
- **Molleric amarg** NO COMESTIBLE Poros rosados y retículo oscuro; sabor muy amargo.
- **Cep** COMESTIBLE Sombrero algo graso, retículo limitado a la parte alta del pie. → p. 21

COMPRUEBE Poros.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

molleric granellut

Molleric

Suillus granulatus · boleto granulado

Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).

En su punto: sombrero pardo brillante, pie amarillento, en grupo bajo pinos.

Poros amarillos con gotitas blancas

Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

E F M A **M** J J A **S** **O** **N** D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre, laricio, piñonero y rodeno. Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

NO LA CONFUNDA CON

- **Molleric pebrer** NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.
- **Molleric** COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.
- **Molleric calçat** COMESTIBLE Anillo membranoso grande en el pie. → p. 26

COMPRUEBE Color de los poros.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

pinetell de calceta

Molleric calçat

Suillus luteus · boleto anillado · babosillo

Retire la cutícula viscosa, laxante para algunas personas.

Molleric calçat (*S. luteus*)

E F M A M J J A **S O N** D · Tubos · Con anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Anillo membranoso amplio en el pie, blanquecino o violáceo por debajo.
✓ Sombrero pardo chocolate muy viscoso.
✓ Poros pequeños, amarillos.
✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y negro. Bordes de pista y claros herbosos en pinares jóvenes.

NO LA CONFUNDA CON

- **Molleric** COMESTIBLE Sin anillo. → p. 25
- ***Suillus grevillei*** COMESTIBLE Sombrero amarillo anaranjado; exclusivo de alerces (plantados).

COMPRUEBE Pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

pota de perdiu

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus

Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.

En su punto: sombrero rojizo y láminas ocre que bajan por el pie.

Debajo

Carne y pie de color naranja salmón.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero. Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

NO LA CONFUNDA CON

- **Cortinari metzinós** MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 68
- **Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca. → p. 75
- **Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

COMPRUEBE Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

vaqueta

Rossinyol

Cantharellus cibarius · rebozuelo · cabrito

subpruinosus).

En su punto: todo amarillo yema, carnoso, con el margen ondulado.

Debajo

De cerca

E F M A M **J J A S O N** D — Pliegues — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DÓNDE Con encina, alcornoque, castaño, haya y roble albar y otros. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

NO LA CONFUNDA CON

- **Cortinari metzinós** MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 68
- **Círgola d'olivera** TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 87
- **Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda. → p. 75

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *trompeta*

Trompeta de la mort

Craterellus cornucopioides · trompeta de los muertos · trompeta negra

Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).

En su punto: negras, firmes y en grupo.

Mire por dentro

Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

E F M A M J J A **S O N D** Liso Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.

✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).

✓ Carne delgada y elástica.

DÓNDE Con haya, encina, castaño, roble pubescente y albar. Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

NO LA CONFUNDA CON

- **Orella de gat negra** CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.
- ***Craterellus cinereus*** COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

COMPRUEBE Forma general.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

rossinyol de pi

Camagroc

Craterellus lutescens · angula de monte · trompeta amarilla

Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).

En su punto: pies amarillos y sombreros pardos, en grupo entre el musgo.

Debajo no hay láminas

Pie amarillo y hueco.

E F M A M J J A S **O N D** — Liso — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.

✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.

✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y abeto blanco. Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

NO LA CONFUNDA CON

- **Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo. → p. 75
- **Camagroc** COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado. → p. 31

COMPRUEBE Parte inferior y pie.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *rossinyolic embudat*

Camagroc

Craterellus tubaeformis

Comestible (buena según la SCM; parte A del RD 30/2009 como Cantharellus tubaeformis).

E F M A M J J A **S** **O** **N** D Pliegues Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie hueco, amarillo pardusco o grisáceo.
✓ Pliegues bien marcados, bifurcados, gris amarillentos a gris lila.
✓ Sombrero en embudo pardo.

DÓNDE Con abeto blanco, pino silvestre y haya. Bosques húmedos de montaña sobre suelo ácido, entre musgo y madera muy descompuesta.

NO LA CONFUNDA CON

- **Camagroc** COMESTIBLE Parte inferior casi lisa y rosado anaranjada; pie naranja vivo. → p. 30

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *llémena*

Llengua de bou

Hydnum repandum · lengua de vaca · gamuza

Los ejemplares viejos amargan.

En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.

Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.

Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).

✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.

✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

DÓNDE Con encina, haya, castaño, pino silvestre y abeto blanco y otros. Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

NO LA CONFUNDA CON

- ***Hydnellum* / *Sarcodon*** NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.
- **Picornell de pi** COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie. → p. 33

COMPRUEBE Consistencia de la carne.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

llengua de bou rogenca

Picornell de pi

Hydnum rufescens

Comestible (parte A del anexo del RD 30/2009).

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Aguijones bajo el sombrero, que no descienden por el pie.

✓ Sombrero naranja rojizo, más pequeño que el de la llengua de bou.

✓ Pie central y esbelto.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco y encina. Pinares y bosques mixtos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Llengua de bou** COMESTIBLE Más grande y pálido, aguijones algo decurrentes. → p. 32

COMPRUEBE Tamaño y aguijones.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Fetge de vaca

Fistulina hepatica · hígado de buey · lengua de buey

Sabor ácido; se consume joven.

E F M A M J J **A S O N** D Tubos Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Repisa en forma de lengua o hígado, rojo sangre, sobre troncos de robles o castaños.

✓ Por debajo, tubos crema que se separan unos de otros.

✓ Carne roja jaspeada como la carne cruda, que suelta jugo rojizo.

DÓNDE Con castaño, roble pubescente y albar. Troncos y base de castaños y robles viejos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Círgola groga** CONDICIONADA Amarillo anaranjado, en grupos superpuestos.

COMPRUEBE Color.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

orella de saüquer

Orella de Judes

Auricularia auricula-judae · oreja de Judas

Comestible (aceptable para la SCM), de textura cartilaginosa.

E F M A M J J A S O N D · Gelatinoso · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Cuerpo gelatinoso, elástico, en forma de oreja, pardo rojizo.
✓ Crece sobre ramas y troncos, sobre todo de saúco.
✓ Cara externa aterciopelada, interna lisa o con venas.

DÓNDE Saúcos, sauces, robles y otros planifolios, en lugares húmedos.

NO LA CONFUNDA CON

- ***Exidia y otras gelatinosas*** SIN_INTERES Formas de cerebro o costra, negras o ámbar, sin forma de oreja.
- ***Peziza (copas pardas en el suelo)*** TÓXICA Crecen en el suelo, son quebradizas, no elásticas.

COMPRUEBE Forma.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *reig*

Ou de reig

Amanita caesarea · oronja · amanita de los césares

Comestible excelente. Los «huevos» cerrados no deben recolectarse: en ese estado se confunden con los de la farinera borda y otras amanitas mortales.

Huevo abierto: por dentro, láminas AMARILLAS y sombrero naranja.

Volva blanca grande como un saco, y láminas…

Láminas y pie amarillos. Si fueran blancos, no…

E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D — Láminas · Con anillo · **Con volva**

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).

✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.

✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.

✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 62
- **Reig bord** TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 80
- ***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

COMPRUEBE Corte longitudinal del huevo.

CONDICIONADA ●●● DIFÍCIL

cogomassa farinera

Farinera

Amanita ovoidea

verna, formas blancas de A. phalloides). Solo un micólogo experimentado puede separarlas con seguridad.

Grande, toda blanca, con una volva blanca y gruesa.

Láminas crema y pie harinoso.

Margen del sombrero con restos harinosos colgantes.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Con anillo **Con volva**

CÓMO RECONOCERLA

✓ Seta grande, enteramente blanca o crema, con restos harinosos en el margen y en el pie.

✓ Volva gruesa, membranosa, blanca con tonos ocre amarillentos.

✓ Anillo cremoso y frágil que se deshace pronto (a menudo no se ve).

✓ Láminas blancas a crema.

DÓNDE Con encina, pino carrasco y roble pubescente. Bordes de camino y claros en terreno calizo.

NO LA CONFUNDA CON

- **Cogomassa** MORTAL Más pequeña y esbelta, sin restos harinosos, anillo membranoso persistente; frecuente en primavera. → p. 63
- **Farinera borda** MORTAL Sombrero satinado con fibras radiales; anillo membranoso persistente. → p. 62
- ***Amanita proxima*** TÓXICA A. → p. 78

COMPRUEBE Tamaño, superficie y anillo.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *cogomella*

Apagallums

Macrolepiota procera · parasol · galamperna

Deseche el pie, fibroso.

En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.

Pie con dibujo de piel de serpiente

Debajo

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.
- ✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
- ✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
- ✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

DÓNDE Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

NO LA CONFUNDA CON

- **Lepiota metzinosa** MORTAL Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado. → p. 65
- **Pixacà** TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso. → p. 79
- **Apagallums** CONDICIONADA Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

COMPRUEBE Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Bolet de tinta

Coprinus comatus · barbuda · matacandil

Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.

Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado: el momento de recolectarlo.

Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por...

Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).

✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.

✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

DÓNDE Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

NO LA CONFUNDA CON

- **Bolet de femer** TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada. → p. 92
- **Coprí garsa** NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

COMPRUEBE Color y superficie del sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Camperol

Agaricus campestris · champiñón silvestre · seta de campo

Los Agaricus acumulan metales pesados: evite los de cunetas y zonas contaminadas y no los consuma en grandes cantidades de forma habitual.

En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.

Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un…



Córtelo siempre

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D Láminas Con anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
- ✓ Sin volva en la base.
- ✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
- ✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

DÓNDE Pastos con ganado, prados de siega.

NO LA CONFUNDA CON

- **Cogomassa** MORTAL Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 63
- **Bola de neu pudent** TÓXICA Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol. → p. 83
- **Fals carlet** TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques. → p. 89

COMPRUEBE Láminas y base.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Bola de neu

Agaricus arvensis · bola de nieve

Comestible bueno (SCM). Mismas precauciones sobre metales pesados que el camperol.

Sombreros blancos y láminas rosa grisáceo.

Láminas rosa grisáceo; nunca blancas en un ejemplar...

Anillo grande con una «rueda dentada» en la cara...

E F M A M **J J A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Olor a anís o almendra amarga.
- ✓ Láminas gris rosadas que pasan a pardas (nunca blancas).
- ✓ Anillo grande y doble, con la cara inferior en forma de rueda dentada.
- ✓ Amarillea ligeramente al frotarlo, pero la carne de la base del pie NO se vuelve amarillo cromo.

DÓNDE Prados y bordes de bosque.

NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL Láminas blancas y volva. → p. 62
- **Farinera pudent** MORTAL Láminas blancas y volva. → p. 64
- **Bola de neu pudent** TÓXICA Amarillo cromo inmediato en la base cortada; olor a fenol o tinta, nunca a anís. → p. 83

COMPRUEBE Láminas y base.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Pet de llop

Lycoperdon perlatum · pedo de lobo · bejín

Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.

Joven, blanco y lleno de verrugas: el momento de recolectarlo.

De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden.

Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

E F M A M J J **A S O N D** Interior Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.

✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

DÓNDE Bosques de todo tipo y sus bordes.

NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie). → p. 62
- **Pota de cavall groga** TÓXICA Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa. → p. 76

COMPRUEBE Corte longitudinal.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Pet de llop gegant

Calvatia gigantea · bejín gigante

Comestible joven con el interior blanco puro (acceptable para la SCM, como Langermannia gigantea).

Joven y blanco en medio del prado: el momento de recolectarlo.

Con la mano al lado: puede superar los 30 cm.

Cortado

E F M A **M** **J** **J** **A** **S** **O** N D · Interior · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Bola blanca enorme (10–50 cm), de piel lisa como el cuero.

✓ Interior blanco puro, compacto y uniforme en los jóvenes (córtelo entero).

DÓNDE Prados ricos en nitrógeno, huertos, bordes de bosque y de río.

NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL El huevo de amanita es mucho menor y al cortarlo muestra la silueta de una seta. → p. 62
- **Pota de cavall groga** TÓXICA Interior negro; piel gruesa amarilla escamosa; tamaño mucho menor. → p. 76

COMPRUEBE Corte.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

pet de llop de prat

Pet de llop gros

Bovistella utriformis

Comestible joven con el interior blanco (acceptable para la SCM, como Calvatia utriformis).

Joven: blanco, con la piel que empieza a formar placas.

Cortado

De cerca

E F M A **M J J A S O** N D — Interior — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Cuerpo en forma de peonza (6–15 cm), con la piel dividida en placas o verrugas piramidales.

✓ Interior blanco y compacto en los jóvenes; base estéril esponjosa.

DÓNDE Pastos de montaña y prados secos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Pota de cavall groga** TÓXICA Interior negro. → p.76

COMPRUEBE Corte.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL *negret*

Fredolic

Tricholoma terreum · negrilla · ratón

) con material italiano no encontró esos compuestos y concluye que debe considerarse comestible.

En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.

Debajo

Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.
- ✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
- ✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
- ✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero. Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

NO LA CONFUNDA CON

- **Fredolic metzinós** TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas como un dibujo de tigre; olor a harina; láminas con reflejos verde amarillentos. → p. 85
- ***Tricholoma virgatum / T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo; carne amarga o picante; láminas con arista punteada de negro en T.
- ***Inocybe (varias especies grises)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada parda), olor espermático o terroso.

COMPRUEBE Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Fredolic gros

Tricholoma portentosum · capuchina

Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009).

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris oscuro con fibras radiales negras, a menudo con tonos violáceos o amarillentos, algo viscoso.

✓ Láminas blancas con reflejos amarillo limón, escotadas.

✓ Pie blanco con tonos amarillentos; sin anillo.

✓ Olor a harina.

DÓNDE Con pino silvestre, rodeno y laricio. Pinares, a menudo con brezo o musgo.

NO LA CONFUNDA CON

- **Fredolic metzinós** TÓXICA Sombrero con escamas oscuras sobre fondo claro, no fibras radiales lisas. → p. 85
- ***Tricholoma virgatum* / *T. sciodes*** TÓXICA Sabor amargo o picante, mamelón agudo, sin tonos amarillos en láminas.
- **Verderol** TÓXICA Sombrero amarillo verdoso, láminas amarillo azufre intenso. → p. 84

COMPRUEBE Superficie del sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pimpinella morada

Lepista nuda · pie azul

Comestible, siempre bien cocinado: en crudo o poco hecho provoca trastornos digestivos (parte A del anexo del RD 30/2009).

En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.

Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.

De cerca: láminas y pie violetas.

E F M A M J J A S O N D — Láminas · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
✓ Sin cortina ni anillo.
✓ Olor afrutado o perfumado.

DÓNDE Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

NO LA CONFUNDA CON

- ***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus…)*** TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.
- **Barret de bruixa** TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas. → p. 91
- ***Mycena pura*** TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano. → p. 88

COMPRUEBE Esporada y parte alta del pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pampa

Infundibulicybe geotropa · platera · cabeza de fraile

Comestible bueno, sobre todo joven; el pie es fibroso (parte A del anexo del RD 30/2009 como Clitocybe geotropa).

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero crema ocráceo en embudo con un mamelón central marcado.
✓ Láminas decurrentes, apretadas, crema.
✓ Pie alto, grueso y fibroso, del color del sombrero.
✓ Seta grande que crece en corros amplios.

DÓNDE Claros y bordes herbosos: los corros se ven a distancia.

NO LA CONFUNDA CON

- **Paxil·le tòxic** MORTAL Se mancha de pardo y las láminas son ocre amarillentas. → p. 61
- **Pardilla** TÓXICA Sombrero gris ceniza sin mamelón y olor dulzón fuerte.
- **Clitocibe blanc** TÓXICA Pequeño (2–5 cm), blanco pruinoso, sin mamelón. → p. 86

COMPRUEBE Manchas al tacto.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

bolet de Sant Jordi

Moixernó

Calocybe gambosa · perrechico · seta de San Jorge

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

E F M **A** **M** **J** J A S **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

DÓNDE Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

NO LA CONFUNDA CON

- ***Inosperma erubescens*** MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 67
- **Cogomassa** MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 63
- **Fals carlet** TÓXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 89

COMPRUEBE Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Llenega negra

Hygrophorus latitabundus · babosa negra

latitabundus o H. limacinus). Retire el mucílago al limpiarla.

En su punto: sombrero pardo oliva, brillante y viscoso.

Láminas blancas y pie blanco con puntitos.

Joven

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.

✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.

✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.

✓ Esporada blanca.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre. Pinaza de pinares calizos; los sombreros viscosos quedan cubiertos de agujas pegadas.

NO LA CONFUNDA CON

- **Llenega borda** NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.
- **Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE Láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo intenso.
- **Llenega blanca** COMESTIBLE Sombrero blanco crema. → p. 51

COMPRUEBE Color de las láminas maduras y esporada.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Llenega blanca

Hygrophorus gliocyclus

Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009).

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Con anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero blanco crema a amarillento pálido, muy viscoso.
✓ Láminas crema, céreas, espaciadas, decurrentes.
✓ Pie con un anillo mucoso y la parte inferior viscosa.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y carrasco. Pinares calizos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Llenega negra** COMESTIBLE Sombrero oscuro. → p. 50
- **Mocosa blanca tacada** SIN_INTERES Gránulos dorados en el margen y el pie; poco viscoso.

COMPRUEBE Color.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Carlet

Hygrophorus russula

Puede amargar ligeramente.

En su punto: sombreros rosados con salpicaduras vinosas, firmes.



Debajo

Láminas algo decurrentes y pie blanco manchado.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.
✓ Bajo encinas y robles.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo. Hojarasca de encinares calizos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Fals carlet** TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia. → p. 89
- **Cualbra morada** NO COMESTIBLE Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos.

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *carrereta*

Cama-sec

Marasmius oreades · senderuela · carrerilla

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.

En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.

La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.

Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
- ✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
- ✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
- ✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

DÓNDE Corros de hierba más verde o más seca en prados.

NO LA CONFUNDA CON

- **Lepiota metzinosa** MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 65
- **Clitocibe blanc** TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 86
- ***Inocybe (especies de prado)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

COMPRUEBE Sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Gírgola de panical

Pleurotus eryngii · seta de cardo

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y láminas que bajan por el pie.

Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.

Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.

✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

DÓNDE Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

NO LA CONFUNDA CON

- **Clitocibe blanc** TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 86
- **Fals carlet** TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 89

COMPRUEBE Color y base.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *gírgola*

Orellana

Pleurotus ostreatus · seta de ostra · orellana

Prefiera ejemplares jóvenes.

Orellanas jóvenes saliendo de la corteza.

Orellana: en repisas sobre troncos cortados.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Repisas en grupos superpuestos sobre madera de planifolios (chopos, hayas, robles).
✓ Láminas blancas, decurrentes, que llegan hasta un pie lateral corto o inexistente.
✓ Sombrero en forma de concha, gris azulado a pardo.

DÓNDE Con chopo negro y haya. Troncos de planifolios, sobre todo en riberas.

NO LA CONFUNDA CON

- ***Pleurocybella porrigens*** TÓXICA Blanca pura, delgada, sobre madera de coníferas.
- **Círgola d'olivera** TÓXICA Naranja intenso. → p. 87

COMPRUEBE Color, grosor y madera.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Moixernó blanc de tardor

Clitopilus prunulus · molinera

Comestible muy bueno según la SCM, pero de identificación delicada: se confunde con los clitocibes blancos tóxicos.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas decurrentes que pasan de blancas a ROSADAS al madurar.
✓ Esporada rosada (déjela sobre papel unas horas): si es blanca, deséchela.
✓ Olor intenso a harina fresca.
✓ Sombrero blanco grisáceo con tacto de piel de guante (gamuza).

DÓNDE Con castaño, roble pubescente y pino silvestre. Bosques claros y bordes, a menudo cerca de boletos.

NO LA CONFUNDA CON

- **Clitocibe blanc** TÓXICA Láminas que siguen blancas o crema, esporada blanca, sin olor a harina intenso; en prados. → p. 86
- ***Clitocybe phyllophila*** TÓXICA Esporada blanca rosada pálida, sombrero con pruina blanca; olor débil, no harinoso.

COMPRUEBE Esporada y olor.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pollancró

Cyclocybe cylindracea · seta de chopo

Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

DÓNDE Con chopo negro y álamo blanco. Riberas, choperas y parques.

NO LA CONFUNDA CON

- **Galerina marginada** MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos. → p. 66
- **Bolet de pi** TÓXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo. → p. 90

COMPRUEBE Tamaño y árbol.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA *rabassola*

Múrgola

Morchella esculenta · colmenilla · cagarria

Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.

E F **M A M** J J A S O N D · Alvéolos · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.

✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.

✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

DÓNDE Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

NO LA CONFUNDA CON

- **Bolet de greix** MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. → p. 69
- ***Verpa bohemica*** TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.
- **Múrgola** CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica. → p. 59

COMPRUEBE Corte longitudinal.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA *arigany*

Múrgola

Morchella elata · colmenilla negra

Como la colmenilla amarilla: solo bien cocinada (tóxica en crudo) y con moderación.

E F M **A** **M** **J** J A S O N D · Alvéolos · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero cónico con costillas longitudinales oscuras, más oscuras que los alvéolos.
✓ Completamente hueca en una sola cavidad (córtela).
✓ Sombrero unido al pie por su borde.

DÓNDE Con abeto blanco y pino silvestre. Bosques de coníferas de montaña, zonas quemadas el año anterior, jardines con corteza triturada.

NO LA CONFUNDA CON

- **Bolet de greix** MORTAL Sombrero cerebriforme y varias cavidades internas. → p. 69
- **Múrgola** CONDICIONADA Costillas claras, alvéolos irregulares. → p. 58

COMPRUEBE Corte longitudinal.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Tòfona negra

Tuber melanosporum · trufa negra

Solo madura tiene aroma y valor.

E F **M** A M J J A S O N **D** · Tubérculo · Sin anillo · Sin volva

CÓMO RECONOCERLA

✓ Hongo subterráneo en forma de tubérculo de 2–8 cm.
✓ Piel negra con pequeñas verrugas piramidales.
✓ Interior negro violáceo con finas venas blancas al madurar.
✓ Aroma intenso característico.

DÓNDE Con encina, roble pubescente, quejigo y avellano. En los «quemados»: círculos de suelo casi sin hierba alrededor de árboles productores.

NO LA CONFUNDA CON

- **Pota de cavall groga** TÓXICA Superficial, piel amarilla gruesa, olor desagradable. → p. 76
- **Magenca** COMESTIBLE Interior gris con venas blancas más gruesas y espaciadas; olor diferente.

COMPRUEBE Piel y lugar.

Paxil·le tòxic

Paxillus involutus · paxilo

Potencialmente mortal.

Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia dentro.

Margen del sombrero muy enrollado.

Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.

! Sin látex.

SÍNDROME HEMOLÍTICO (PAXÍLICO) Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y fallo renal.

DÓNDE Con abedul, pino silvestre, encina y castaño. Bosques variados, también parques; prefiere suelos ácidos.

SE CONFUNDE CON

≈ **Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo. → p. 14

≈ **Pinetell** COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 16

≈ **Pampa** COMESTIBLE La pampa es crema ocrácea con mamelón y no se mancha de pardo. → p. 48

COMPRUEBE **Corte: látex o no.**

Farinera borda

Amanita phalloides · oronja verde · amanita mortal

Adulta: sombrero verde oliva, anillo como una falda y volva en la base.

Debajo: láminas BLANCAS y anillo colgante.

Láminas blancas y base con volva

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

RASGOS DE ALARMA

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos; tras una aparente mejoría, daño hepático grave a partir del segundo o tercer día, que puede requerir trasplante o causar la muerte.

DÓNDE Con encina, roble pubescente, alcornoque, castaño y haya. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Llora verde** COMESTIBLE La llora verde no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico. → p. 18
- ≈ **Llora** COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 19
- ≈ **Bola de neu** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva. → p. 41

COMPRUEBE **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Cogomassa

Amanita verna

Mortal, con las mismas toxinas que la farinera borda. Sale en primavera, cuando se busca el moixernó, y también en otoño.

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

RASGOS DE ALARMA

! Seta enteramente blanca.

! Volva blanca en saco en la base.

! Anillo membranoso blanco.

! Láminas blancas, libres.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque. Encinares y robledales mediterráneos.

SE CONFUNDE CON

≈ **Moixernó** COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina. → p. 49

≈ **Camperol** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 40

≈ **Farinera** CONDICIONADA Mayor, harinosa, de otoño en caliza. → p. 37

COMPRUEBE **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Farinera pudent

Amanita virosa

Mortal (amatoxinas).

Toda blanca, con anillo y volva.

Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría...

Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

RASGOS DE ALARMA

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.

! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.

! Volva blanca en saco.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

DÓNDE Con haya y abedul. Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

SE CONFUNDE CON

≈ **Bola de neu** COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva. → p. 41

COMPRUEBE **Láminas y base.**

MORTAL ●●○ MEDIA *palometa*

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata

Mortal: contiene amatoxinas como la farinera borda. Las lepiotas pequeñas son responsables de intoxicaciones graves en Cataluña.

Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.

Pie rosado con bandas y láminas blancas.

Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el...

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.

! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.

! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.

! Láminas blancas, libres.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

DÓNDE Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

SE CONFUNDE CON

≈ **Apagallums** COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado. → p. 38

≈ **Cama-sec** COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas. → p. 53

≈ **Camperol** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas. → p. 40

COMPRUEBE **Tamaño, anillo y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

galerina metzinosa

Galerina marginada

Galerina marginata

Mortal: contiene amatoxinas como la farinera borda.).

Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.

Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...

Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Con anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
- ! Anillo fino pardo en el pie.
- ! Esporada pardo herrumbre.
- ! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

DÓNDE Madera muerta de coníferas y planifolios.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Pollancró** COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 57
- ≈ ***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).
- ≈ **Alzinoi** CONDICIONADA Mayor, escamas oscuras, esporada blanca.

COMPRUEBE **Tamaño y árbol.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Inosperma erubescens

Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.).

Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.

Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).

E F M A **M** **J** **J** A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
- ! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
- ! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

SÍNDROME MUSCARÍNICO (GRAVE) Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión; puede ser mortal sin tratamiento.

DÓNDE Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

SE CONFUNDE CON

≈ **Moixernó** COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 49

COMPRUEBE **Sombrero, manchas rojas y olor.**

MORTAL ●●○ MEDIA

bolet de mantellina

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus

Mortal: la orellanina destruye el riñón de forma tardía e irreversible.).

Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.

Láminas color herrumbre, espaciadas.

Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
- ! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
- ! Esporada pardo herrumbre.
- ! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

SÍNDROME ORELLÁNICO (NEFROTÓXICO TARDÍO) Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida; insuficiencia renal que puede requerir diálisis o trasplante.

DÓNDE Con roble pubescente, castaño y encina. Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas. → p. 28
- ≈ **Camagroc** COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas. → p. 31
- ≈ **Cama de perdiu** COMESTIBLE Láminas decurrentes y esporada negra; bajo pinos. → p. 27

COMPRUEBE **Parte inferior.**

MORTAL ●○○ FÁCIL *murga*

Bolet de greix

Gyromitra esculenta · falsa colmenilla · bonete

Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).

E F M **A** **M** **J** J A S O N D · Liso · Sin anillo · Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

SÍNDROME GIROMITRIANO (CONVULSIVO Y HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

DÓNDE Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. Coníferas de montaña.

SE CONFUNDE CON

≈ **Múrgola** CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 58

≈ **Múrgola** CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco. → p. 59

COMPRUEBE **Corte longitudinal.**

TÓXICA ●○○ FÁCIL

pinetell bord

Enganyapastors de llet groga

Lactarius chrysorrheus

Tóxica: provoca trastornos gastrointestinales.

Enganyapastors (L. zonarius): tiene zonas como el rovelló, pero látex blanco.

Láminas crema, sin manchas verdes.



Pinetell bord

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.

! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.

! No se mancha de verde.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, en general de evolución favorable.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bosques de Quercus y castañares, también mezclados con pinos.

SE CONFUNDE CON

≈ **Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos. → p. 14

≈ **Pinetell** COMESTIBLE El pinetell tiene látex naranja y láminas naranja vivo que verdean. → p. 16

COMPRUEBE Látex.

Enganyapastors

Lactarius zonarius

Tóxica (gastrointestinal) y muy picante. Su sombrero zonado recuerda al del pinetell, de ahí «enganyapastors» (engañapastores).

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Látex blanco que no cambia de color.
- ! Láminas crema, sin manchas verdes.
- ! Bajo robles y encinas, no bajo pinos.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo. Encinares y robledales, a menudo sobre caliza.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Pinetell** COMESTIBLE Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos. → p.16
- ≈ **Rovelló** COMESTIBLE Látex rojo vino; bajo pinos. → p.14

COMPRUEBE Látex.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

lleterol de beç

Cabra de beç

Lactarius torminosus · falso níscalo

Tóxica (gastrointestinal). En algunos países del norte se consume tras tratamientos prolongados: esa práctica no la hace segura.

Bolet de cabra: sombrero rosado salmón con el margen peludo.

Debajo

El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.

! Látex blanco que no cambia.

! Siempre bajo abedules.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

DÓNDE Con abedul. Abedulares y bosques con abedul.

SE CONFUNDE CON

≈ **Pinetell** COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo pinos. → p. 16

≈ **Pinetell d'avet** COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos. → p. 17

COMPRUEBE Margen y látex.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Escaldabecs

Russula emetica · rúsula emética

Tóxica (gastrointestinal).

Sombrero rojo vivo y pie blanco, entre el musgo.

Debajo: láminas blancas. Sabor muy picante.

Joven: sombrero rojo redondeado.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas · Sin anillo · Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero rojo escarlata brillante, cutícula que se pela casi entera.
! Láminas y pie blancos puros; sin látex.
! Carne frágil y muy picante.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea, a veces intensos.

DÓNDE Con pino silvestre, negro y abeto blanco. Bosques de coníferas húmedos, entre musgo.

SE CONFUNDE CON

≈ **Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, pie hueco con hoyuelos y láminas que verdean. → p. 14

≈ **Ou de reig** COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie amarillos, anillo y gran volva blanca. → p. 36

COMPRUEBE Látex y pie.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

mataparent de Satanàs

Matagent

Rubroboletus satanas · boleto de Satanás

Tóxico: intoxicaciones gastrointestinales intensas, incluso cocinado.

Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.

Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.

De cerca: poros rojo anaranjado.

E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (A VECES INTENSO) Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal; puede requerir atención hospitalaria por deshidratación.

DÓNDE Con roble pubescente, encina, castaño y haya. Bosques claros y cálidos de planifolios.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Cep d'estiu** COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea. → p. 24
- ≈ **Sureny fosc** COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable. → p. 22

COMPRUEBE Poros y corte.

NO COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Fals rossinyol

Hygrophoropsis aurantiaca · falso rebozuelo

No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

Todo naranja, con láminas verdaderas.

Debajo

De cerca: láminas blandas naranja intenso.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Láminas verdaderas: finas, apretadas, bifurcadas varias veces, naranja vivo.

! Carne delgada y blanda, no compacta.

! Sombrero aterciopelado naranja a pardo anaranjado.

DÓNDE Con pino silvestre y rodeno. Pinares, sobre restos de madera y acículas.

SE CONFUNDE CON

≈ **Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas), carne gruesa y firme, color yema de huevo. → p. 28

≈ **Círgola d'olivera** TÓXICA Omphalotus crece en grandes ramilletes sobre madera de olivo, encina o castaño y es mucho más carnoso. → p. 87

COMPRUEBE Parte inferior: pase el dedo; los pliegues no se separan como láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

Tóxica (gastrointestinal, a veces intensa).).

Bola de piel gruesa, amarillenta y escamosa.

Cortada

Interior oscuro con vetas claras.

E F M A M J J **A S O N** D · Interior · Sin anillo · Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

DÓNDE Con alcornoque, encina, castaño y pino piñonero. Bosques sobre suelo ácido, bordes de camino.

SE CONFUNDE CON

≈ **Pet de llop** COMESTIBLE El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes. → p. 42

≈ **Pet de llop gegant** COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina. → p. 43

≈ **Tòfona negra** COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable. → p. 60

COMPRUEBE Corte longitudinal.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Peu de rata bord

Ramaria formosa

Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).

Forma de coral, ramas rosa anaranjado.

Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.

Puntas de las ramas amarillentas.

E F M A M J J **A S O N** D — Ramificado — Sin anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

DÓNDE Con haya, roble pubescente y castaño. Bosques de planifolios.

SE CONFUNDE CON

≈ **Peu de rata de pi** COMESTIBLE Lóbulos aplanados crema, en pinos. → p. 20

≈ **Peu de rata col-i-flor** CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

COMPRUEBE Forma.

TÓXICA ●●● DIFÍCIL

Amanita proxima

Tóxica: provoca insuficiencia renal aguda.

Parece una farinera, pero la volva es NARANJA herrumbre.

La clave: volva con tonos naranja o herrumbre.

Ejemplares jóvenes: todas las volvas son naranja.

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

RASGOS DE ALARMA

! Amanita blanca o crema con volva DELGADA de color naranja ocráceo a herrumbre.
! Anillo membranoso persistente.
! Láminas blancas.

SÍNDROME NEFROTÓXICO AGUDO Síntomas de 8 a 14 horas. Molestias digestivas seguidas, en uno a tres días, de insuficiencia renal aguda que suele requerir tratamiento hospitalario.

DÓNDE Con encina y pino carrasco. Encinares y pinares calizos mediterráneos.

SE CONFUNDE CON

≈ **Farinera** CONDICIONADA A. → p. 37

COMPRUEBE Volva y anillo.

Pixacà

Amanita pantherina · amanita pantera

Tóxica (neurotóxica), potencialmente grave.

Sombrero pardo con verrugas blancas, anillo y bulbo en la base.

Debajo: láminas blancas y anillo liso.

Margen del sombrero estriado y anillo colgante.

E F M A **M** J J **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.
- ! Base del pie en bulbo con un reborde (como un calcetín enrollado) y 1–2 anillos por encima.
- ! Anillo liso, sin estrías por arriba.
- ! La carne NO enrojece.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, alternancia de excitación y somnolencia; vómitos; en casos graves convulsiones y coma.

DÓNDE Con pino silvestre, roble pubescente, haya y encina. Bosques de coníferas y planifolios.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Apagallums** COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 38
- ≈ **Vinosa** CONDICIONADA En la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas, el anillo está estriado por arriba y las verrugas son grisáceas o rosadas.

COMPRUEBE Pie y base.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Reig bord

Amanita muscaria · matamoscas · falsa oronja

Tóxica (neurotóxica). Los tratamientos «para destoxificarla» no son seguros.

Sombrero rojo con verrugas blancas y pie blanco.

Debajo

Joven: cubierta de verrugas, como una bola.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero rojo con verrugas blancas (que la lluvia puede borrar).
- ! Láminas y pie BLANCOS.
- ! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia; vómitos.

DÓNDE Con pino silvestre, abedul, abeto blanco y pino negro. Bosques de montaña sobre suelo ácido.

SE CONFUNDE CON

≈ **Ou de reig** COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca. → p. 36

COMPRUEBE Láminas y pie.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Amanita gemmata

Tóxica (neurotóxica).

E F M A **M** **J** J A S **O** N D Láminas Con anillo **Con volva**

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero amarillo pálido a amarillo ocre con placas blancas.
- ! Láminas blancas.
- ! Bulbo con reborde de volva y anillo frágil.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Similar al de A.

DÓNDE Con pino silvestre y laricio. Pinares sobre suelo ácido o arenoso.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Ou de reig** COMESTIBLE Láminas y pie amarillos, volva en saco. → p. 36
- ≈ **Verderol** TÓXICA Láminas amarillas, sin volva. → p. 84

COMPRUEBE Láminas.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Lepiota pudent

Lepiota cristata

Tóxica (gastrointestinal).). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.

Lepiota cristata

L. cristata de cerca

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
- ! Olor desagradable, a goma o gas.
- ! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

DÓNDE Hojarasca, jardines y bordes de camino.

SE CONFUNDE CON

≈ **Apagallums** COMESTIBLE Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado. → p. 38

COMPRUEBE Tamaño.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

Tóxica (gastrointestinal).

Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.

Láminas rosa grisáceo de joven; se confunde...

Vieja: láminas pardo oscuro.

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.

! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

DÓNDE Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

SE CONFUNDE CON

≈ **Camperol** COMESTIBLE No amarillea y huele bien. → p. 40

≈ **Bola de neu** COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo. → p. 41

COMPRUEBE Base del pie.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Verderol

Tricholoma equestre · seta de los caballeros

Tóxica.).

Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.

Debajo: láminas amarillo azufre.

Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el...

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillo azufre intenso.

! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.

! Pie amarillo.

SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura; en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria.

DÓNDE Con pino piñonero, silvestre y rodeno. Pinares sobre suelo arenoso.

SE CONFUNDE CON

≈ **Fredolic gros** COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras. → p. 46

≈ **Farinera borda** MORTAL Láminas blancas, anillo y volva. → p. 62

COMPRUEBE Sombrero.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

Tóxico: gastroenteritis intensa.

Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.

Sombrero escamoso y pie robusto y lleno

Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).
- ! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
- ! Olor a harina.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

DÓNDE Con abeto blanco, haya y pino silvestre. Bosques de montaña.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Fredolic** COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 45
- ≈ **Fredolic gros** COMESTIBLE Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas. → p. 46

COMPRUEBE Tamaño y escamas.

TÓXICA ●●○ MEDIA *candeleta*

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa

Tóxica (muscarina).

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.

! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).

! Esporada blanca (no rosada).

SÍNDROME MUSCARÍNICO (COLINÉRGICO) Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

DÓNDE Prados, céspedes, claros herbosos.

SE CONFUNDE CON

≈ **Cama-sec** COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso. → p. 53

≈ **Moixernó blanc de tardor** COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina. → p. 56

≈ **Camperol** COMESTIBLE Láminas libres rosadas a pardas. → p. 40

COMPRUEBE Láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Gírgola d'olivera

Omphalotus olearius · seta de olivo

Tóxica: gastroenteritis intensa. Confusión frecuente con el rossinyol.

Un ramillete de setas anaranjadas sobre un tocón.



Debajo

Láminas que bajan por el pie y pies unidos en la...

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño.

! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.

! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

DÓNDE Con olivo, encina, castaño y roble pubescente. Olivares, encinares y castañares; tocones y raíces.

SE CONFUNDE CON

≈ **Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en el suelo. → p. 28

COMPRUEBE Parte inferior y crecimiento.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Mycena pura

Tóxica (muscarina).

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta (2–5 cm) lila, rosada o violácea con el margen estriado.

! Olor a rábano.

! Pie hueco, frágil.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, molestias digestivas.

DÓNDE Hojarasca y pinaza.

SE CONFUNDE CON

≈ **Pimpinella morada** COMESTIBLE Mucho mayor, carnosa, olor afrutado. → p. 47

≈ **Pimpinella morada petita** SIN_INTERES Láminas gruesas, sin olor a rábano.

COMPRUEBE Tamaño.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Fals carlet

Entoloma sinuatum

Tóxica: gastroenteritis intensa.

Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.

Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa...

Adulto

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.
! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO) Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

DÓNDE Con roble pubescente, haya y castaño. Bosques de planifolios.

SE CONFUNDE CON

≈ **Carlet** COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca. → p. 52

≈ **Moixernó** COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera. → p. 49

≈ **Pardilla** TÓXICA Láminas crema decurrentes.

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
- ! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
- ! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

DÓNDE Tocones y madera muerta.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Pollancró** COMESTIBLE Crema, anillo membranoso, en chopos. → p. 57
- ≈ **Alzinoi** CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

COMPRUEBE Color.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Barret de bruixa

Inocybe geophylla

Tóxica (muscarina).).

Sombrero con fibras radiales que se agrietan: la señal típica.

Inocybe geophylla

Las hay lilas, que pueden confundirse con la...

E F M A M J J **A S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

- ! Pequeña seta (1–4 cm) blanca sedosa (o lila en la variedad lilacina) con mamelón agudo.
- ! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.
- ! Olor terroso o espermático.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

DÓNDE Bordes de camino en bosques de todo tipo.

SE CONFUNDE CON

- ≈ **Pimpinella morada** COMESTIBLE Mucho mayor y carnosa. → p. 47
- ≈ **Cama-sec** COMESTIBLE Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema. → p. 53

COMPRUEBE Tamaño.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Bolet de femer

Coprinopsis atramentaria

Tóxica si se toma alcohol (coprina): antes, durante o hasta tres días después de comerla.

Sombreros grises en forma de campana, en grupo.

Jóvenes

Como el bolet de tinta, al envejecer ennegrece y se...

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** D Láminas Sin anillo Sin volva

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero gris, ovoide o acampanado, con estrías o pequeñas escamas en el centro (sin escamas lanosas).

! Láminas que se licúan en tinta negra.

! Crece en ramilletes, sobre madera enterrada o tocones.

SÍNDROME COPRÍNICO (TIPO DISULFIRAM) CON ALCOHOL Síntomas de minutos a 2 horas tras beber alcohol, hasta 72 horas después de comer la seta. Enrojecimiento de cara y cuello, palpitaciones, sensación de calor, dolor de cabeza, náuseas.

DÓNDE Parques, huertos, bordes de camino, tocones.

SE CONFUNDE CON

≈ **Bolet de tinta** COMESTIBLE Sombrero blanco alto con escamas lanosas; crece aislado o en grupos sueltos en el suelo. → p. 39

COMPRUEBE Color y superficie.

Síndromes

Según cuánto tardan los síntomas. Más de 6 horas es señal de alarma.

PRECOZ (MENOS DE 6 H)

Gastrointestinal

Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. La mayoría se resuelven en horas, pero algunas son intensas.

Lactarios de látex blanco, rúsulas picantes, Entoloma sinuatum, Omphalotus olearius, Tricholoma pardinum, Rubroboletus satanas, Agaricus xanthodermus, Ramaria formosa, Hypholoma fasciculare, Scleroderma, setas comestibles en mal estado

Colinérgico (muscarínico)

Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, pulso lento.

Inocybe e Inosperma, clitocibes blancos (Clitocybe rivulosa), Mycena pura

Neurológico central (panterínico)

Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia, a veces convulsiones o coma.

Amanita pantherina, A. muscaria, A. gemmata

Alucinógeno

Alteraciones de la percepción y del comportamiento.

Psilocybe, Panaeolus

Coprínico (tipo disulfiram)

Enrojecimiento, palpitaciones y malestar al beber alcohol, hasta 3 días después.

Coprinopsis atramentaria + alcohol

TARDÍA (6–24 H)

Hepatotóxico (faloidiano)

Gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave. Potencialmente mortal.

Amanita phalloides, A. verna, A. virosa, lepiotas pequeñas (Lepiota brunneoincarnata y afines), Galerina marginata

Giromitriano (convulsivo)

Síntomas digestivos, neurológicos (convulsiones) y daño hepático. Potencialmente mortal.

Cyromitra esculenta

RETARDADA (MÁS DE 24 H)

Nefrotóxico

Sed, cansancio, dolor lumbar, alteraciones de la orina; insuficiencia renal.

Cortinarius orellanus (de 2 a 15 días) y Amanita proxima (síntomas en 8–14 h, fallo renal en 1–3 días)

Rabdomiolítico

Debilidad y dolor muscular, orina oscura; afectación cardíaca en casos graves.

Tricholoma equestre (comidas repetidas)

Hemolítico

Destrucción de glóbulos rojos e insuficiencia renal.

Paxillus involutus (personas sensibilizadas)

Conservar y cocinar

Limpie las setas en el bosque (tierra, hojas) y transpórtelas frescas y separadas. En casa, consúmalas cuanto antes; como máximo, guárdelas uno o dos días en la nevera, sin lavar y en un recipiente que respire.

No guarde platos de setas cocinadas durante días ni los recaliente repetidamente.

Para secarlas, use ejemplares jóvenes y sanos, láminas finas y un lugar ventilado; para congelarlas, mejor después de saltearlas.

Con los coprinos de tinta (Coprinopsis atramentaria) el alcohol provoca una intoxicación hasta tres días después de comerlos. En general, beba con moderación cuando coma setas silvestres.

SEGURIDAD EN EL BOSQUE

Diga a alguien adónde va y cuándo piensa volver. Lleve el móvil cargado, agua, ropa de abrigo y un frontal: en otoño anochece pronto.

La temporada de setas coincide con la de caza. Respete las señales de batida, lleve ropa de colores visibles y evite las zonas donde se esté cazando.

No abandone los caminos en zonas de barrancos y cortados; buscando con la vista en el suelo es fácil desorientarse.

Revise el cuerpo al volver por si hay garrapatas.

No haga fuego y respete las restricciones de acceso por riesgo de incendio.

Emergencias: 112.

Mis hallazgos

Anótelo en el bosque: dónde, cuándo y quién lo confirmó.

FECHA	LUGAR Y BOSQUE	SETA Y NOTAS

MIS HALLAZGOS

FECHA	LUGAR Y BOSQUE	SETA Y NOTAS

Glosario

Adnata (lámina) unida al pie en todo su ancho.

Aguijones púas blandas bajo el sombrero que producen las esporas (llengua de bou).

Alvéolo celdilla del sombrero de las colmenillas.

Amatoxinas toxinas de la farinera borda, las lepiotas pequeñas y la galerina; dañan el hígado y no se destruyen con la cocción.

Anillo resto del velo parcial en el pie.

Areolada cutícula agrietada en pequeñas placas.

Bulbo marginado base del pie engrosada con un reborde neto.

Cortina velo en forma de telaraña entre sombrero y pie (Cortinarius).

Cutícula piel del sombrero.

Decurrente (lámina) que baja por el pie.

Delicuescente que se licúa al madurar (coprinos).

Ectomicorriza / micorriza asociación entre el micelio de un hongo y las raíces de una planta.

Escotada (lámina) con una muesca junto al pie.

Escrobículas hoyuelos o manchas hundidas en el pie (lactarios).

Esporada depósito de esporas que deja un sombrero sobre un papel; su color es diagnóstico.

Excéntrico (pie) no centrado bajo el sombrero.

Fasciculado en ramillete, con los pies unidos por la base.

Fibriloso cubierto de fibras finas.

Gleba masa interna fértil de los pedos de lobo y las trufas.

Herbario (pliego) ejemplar seco conservado en una colección científica; es la prueba más sólida de presencia.

Higrófano que cambia de color al perder agua.

Himenio / himenóforo superficie fértil que produce las esporas (láminas, poros, pliegues, aguijones).

Hipogeo que fructifica bajo tierra.

Látex líquido que sale al cortar los lactarios.

Lignícola que crece sobre madera.

Libre (lámina) que no toca el pie.

Mamelón abultamiento central del sombrero.

Micelio conjunto de filamentos (hifas) que forman el cuerpo del hongo; vive en el suelo o la madera todo el año.

Glosario

Muscarina toxina de Inocybe, Clitocybe y Mycena pura; provoca sudoración, salivación y bradicardia.

Nitrófilo que vive en suelos ricos en nitrógeno.

Pliegues venas gruesas, bajas y ramificadas bajo el sombrero (rebozuelos).

Poros aberturas de los tubos (boletos).

Pruina, pruinoso capa fina de polvo blanquecino.

Quemado (trufero) zona sin hierba alrededor de un árbol productor de trufa.

Reticulado (pie) con una red en relieve.

Saprófito que se alimenta de materia orgánica muerta.

Sinónimo nombre científico que designa la misma especie que el nombre aceptado.

Velo universal membrana que envuelve la seta joven; deja la volva y a veces verrugas en el sombrero.

Viscoso, glutinoso pegajoso o cubierto de mucílago.

Volva resto del velo universal en la base del pie.

Índice alfabético

En negrita, el nombre de la ficha. En gris, nombres en castellano o catalán y el científico.

A

Agaricus arvensis 41
Agaricus campestris 40
Agaricus xanthodermus 83
Amanita caesarea 36
Amanita de los césares 36
Amanita gemmata 81
Amanita mortal 62
Amanita muscaria 80
Amanita ovoidea 37
Amanita pantera 79
Amanita pantherina 79
Amanita phalloides 62
Amanita proxima 78
Amanita verna 63
Amanita virosa 64
Angula de monte 30
Apagallums 38
Arigany 59
Auricularia auricula-judae 35

B

Babosa negra 50
Babosillo 26
Barba de cabra 20
Barbuda 39
Barret de bruixa 91
Bejín 42
Bejín gigante 43
Bola de neu 41
Bola de neu pudent 83
Bola de nieve 41
Bolet d'oliu 87
Bolet de femer 92
Bolet de greix 69
Bolet de mantellina 68
Bolet de pi 90
Bolet de Sant Jordi 49
Bolet de tinta 39
Boleto 21
Boleto anillado 26
Boleto de Satanás 74
Boleto estival 24
Boleto granulado 25
Boleto negro 22
Boleto pinícola 23
Boleto reticulado 24
Boletus aereus 22
Boletus edulis 21
Boletus pinophilus 23
Boletus reticulatus 24
Bonete 69
Bovistella utriformis 44
Brunet 45
Buixó 21

C

Cabeza de fraile 48
Cabra de beç 72
Cabrito 28
Cagarria 58
Calocybe gambosa 49
Calvatia gigantea 43
Cama de perdiu 27
Cama-sec 53
Camagroc 30
Camagroc 31
Camperol 40
Candeleta 86
Cantharellus cibarius 28
Capuchina 46
Carbonera 19
Carlet 52
Carlet bord 89
Carner bord 89
Carrereta 53
Carrerilla 53
Cep 21
Cep 23
Cep d'estiu 24
Cep negre 22
Cep rogenc 23
Champiñón silvestre 40
Chroogomphus rutilus 27
Clitocibe blanc 86
Clitocybe rivulosa 86
Clitopilus prunulus 56
Cogoma 37
Cogoma borda 62
Cogoma verda 62
Cogomassa 63
Cogomassa farinera 37
Cogomella 38
Coliflor de pi 20
Colmenilla 58
Colmenilla negra 59
Coprinopsis atramentaria 92
Coprinus comatus 39
Cortinari metzinós 68
Cortinarius orellanus 68
Craterellus cornucopioides 29
Craterellus lutescens 30
Craterellus tubaeformis 31
Cualbra llora 19
Cul-blanc 37
Cyclocybe cylindracea 57

E

Enganyapastors 71
Enganyapastors d'alzina 71
Enganyapastors de llet groga 70

Índice alfabético

Entoloma sinuatum 89
Escaldabec estriat 73
Escaldabecs 73
Esclatasang 14

F

Fals camagroc 31
Fals carlet 89
Fals rossinyol 75
Falsa colmenilla 69
Falsa oronja 80
Falso níscalo 72
Falso rebozuelo 75
Farinera 37
Farinera borda 62
Farinera pudent 64
Farinot 62
Fetge de vaca 34
Fistulina hepatica 34
Fredolic 45
Fredolic gros 46
Fredolic metzinós 85

G

Galamperna 38
Galerina marginada 66
Galerina marginata 66
Galerina metzinosa 66
Gamuza 32
Gírgola 55
Gírgola d'olivera 87
Gírgola de panical 54
Gorro verde 18
Greixa 20
Groguet 84
Gyromitra esculenta 69

H

Hígado de buey 34
Hongo blanco 21
Hongo negro 22
Huevo de rey 36
Hydnum repandum 32
Hydnum rufescens 33
Hygrophoropsis aurantiaca 75
Hygrophorus gliocyclus 51
Hygrophorus latitabundus 50
Hygrophorus russula 52
Hypholoma fasciculare 90

I

Infundibulicybe geotropa 48
Inocybe geophylla 91
Inosperma erubescens 67

L

Lactarius chrysorrheus 70
Lactarius deliciosus 16
Lactarius salmonicolor 17
Lactarius sanguifluus 14
Lactarius semisanguifluus 15
Lactarius torminosus 72
Lactarius zonarius 71
Lengua de buey 34
Lengua de gato 32
Lengua de vaca 32
Lepiota brunneoincarnata 65
Lepiota cristata 82
Lepiota metzinosa 65
Lepiota pudent 82
Lepista nuda 47
Llémena 32
Llenega 50
Llenega blanca 51
Llenega negra 50
Llengua de bou 32
Llengua de bou rogenca 33
Lleterol de beç 72
Lleterola de llet groga 70
Llora 18
Llora 19
Llora clapada 18
Llora morada 19
Llora verda 18
Llorell 19
Lycoperdon perlatum 42

M

Macrolepiota procera 38
Marasmius oreades 53
Matacandil 38
Matacandil 39
Matagent 74
Matamoscas 80
Mataparent de Satanàs 74
Mízcalo 16
Moixernó 49
Moixernó blanc de tardor 56
Moixí 25
Moixí de calceta 26
Molinera 56
Molleric 25
Molleric calçat 26
Molleric granellut 25
Morchella elata 59
Morchella esculenta 58
Murga 58
Murga 69
Múrgola 58
Múrgola 59
Mycena pura 88

N

Negret 45
Negrilla 45
Níscalo 16
Níscalo de sangre 14

O

Omphalotus olearius 87

Índice alfabético

Oreja de Judas 35
Orella d'ase 29
Orella de Judes 35
Orella de saüquer 35
Orellana 55
Oronja 36
Oronja verde 62
Ou de reig 36

P

Palometa 65
Pampa 48
Parasol 38
Paxil enrotllat 61
Paxil·le tòxic 61
Paxillus involutus 61
Paxilo 61
Pedo de lobo 42
Pentinella borda 62
Perrechico 49
Pet de llop 42
Pet de llop de prat 44
Pet de llop gegant 43
Pet de llop gros 44
Peu de rata bord 77
Peu de rata de pi 20
Picornell de pi 33
Pie azul 47
Pimpinella morada 47
Pinetell 16
Pinetell 25
Pinetell bord 70
Pinetell d'avet 17
Pinetell d'avetosa 17
Pinetell de calceta 26
Pixacà 79
Platera 48
Pleurotus eryngii 54
Pleurotus ostreatus 55
Pollancró 57
Pota de cavall groga 76
Pota de perdiu 27

R

Rabassola 58
Ramaria formosa 77
Ratón 45
Rebollón 14
Rebollón 16
Rebozuelo 28
Rebozuelo anaranjado 30
Reig 36
Reig bord 80
Reig bru 79
Robellón 16
Rossinyol 28
Rossinyol ataronjat 75
Rossinyol de pi 30
Rossinyolic 30
Rossinyolic embudat 31
Rourenc 22
Rourenc d'estiu 24
Rovelló 14
Rovelló bord 70
Rovelló d'avet 17
Rovelló d'obaga 16
Rovelló de cabra 70
Rovelló de cabra 72
Rubroboletus satanas 74
Russula cyanoxantha 19
Russula emetica 73
Russula virescens 18
Rúsula emética 73

S

Scleroderma citrinum 76
Senderuela 53
Seta calabaza 21
Seta coliflor 20
Seta de campo 40
Seta de cardo 54
Seta de chopo 57
Seta de los caballeros 84
Seta de olivo 87
Seta de ostra 55
Seta de San Jorge 49
Seta del cura 18
Siurenc 22
Sparassis crispa 20
Suillus granulatus 25
Suillus luteus 26
Sureny 21
Sureny fosc 22

T

Tòfona negra 60
Tricholoma equestre 84
Tricholoma pardinum 85
Tricholoma portentosum 46
Tricholoma terreum 45
Trompeta 29
Trompeta amarilla 30
Trompeta de la mort 29
Trompeta de los muertos 29
Trompeta negra 29
Trufa negra 60
Tuber melanosporum 60

V

Vaqueta 28
Vaqueta negra 29
Verderol 84

Fotos y fuentes

Fotos de observaciones de **iNaturalist** con licencia Creative Commons; el enlace a cada original está en la guía. Muchas son CC BY-NC: este cuaderno es para uso personal o sin ánimo de lucro. Textos y datos: guía **Setas de Cataluña** (Cistella Segura) · nombres según Catalogue of Life; registros de GBIF e iNaturalist.

Portada Игорь Лебединский (CC BY 3.0)

Cómo mirar · la edad Вова Прогас (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC) · Izan Lopez Vergel (CC BY-NC)

Rovelló Quercus morisii (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · RitmeNatura (CC BY-NC)

Lactarius semisanguifluus gardatxanae (CC BY-NC) · David Marcos Vidal (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

Pinetell jl__cc (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · stoned_microscopy (CC BY-NC)

Pinetell d'avet David Marcos Vidal (CC BY-NC) · Ibai Olariaga (CC BY-NC)

Llora verda Javier Martínez Fuentes (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

Llora Antoni Sunyer (CC BY-NC) · Cándido Sos (CC BY-NC) · mussolbarrios (CC BY-NC)

Peu de rata de pi Nuria Kumari (CC BY-NC) · Roger Vila (CC BY-NC) · Xavi (CC BY-NC)

Cep Carmelo López Abad (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC) · Thomas Pruß (CC BY-SA 3.0)

Sureny fosc Quercus morisii (CC BY-NC) · Cándido Sos (CC BY-NC) · hherb (CC BY-NC)

Cep rogenc UNIRSE Llavi (CC BY-NC) · Joan Corominas Melian (CC BY-NC)

Cep d'estiu BrunadelPirineu (CC BY-NC) · marula (CC BY-NC)

Molleric Javier A. Canteros (CC BY-NC) · Sean S (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

Molleric calçat hherb (CC BY-NC) · Ibai Olariaga (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC)

Cama de perdiu Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC) · Assumpta MC (CC BY-NC) · Ikrauel (CC BY-NC)

Rossinyol jonatan_antunez (CC BY-NC) · Marc Riera (CC BY) · David Pereira (CC BY-NC)

Trompeta de la mort yaya_love (CC BY-NC) · pogon (CC BY-NC) · fenneck (CC BY-NC)

Camagroc Josep Sais i Brucet (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · polchof (CC BY-NC)

Camagroc andarubel (CC BY-NC) · Luis Ballester (CC BY-NC) · Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

Llengua de bou Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · Josep Sais i Brucet (CC BY-NC)

Picornell de pi Joseba (CC BY-NC) · Ángel Argüelles (CC BY-NC) · Luis Ballester (CC BY-NC)

Fetge de vaca Eduardo Martínez (CC BY) · tarareare (CC BY-SA) · Joan Ventura (CC BY-NC)

Orella de Judes bertogcliment (CC BY-NC) · Emily Nyenyedzi Davies (CC BY) · S. Menéndez (CC BY)

Ou de reig Quercus morisii (CC BY-NC) · Xavier de Pedro Puente (CC BY-NC) · Ikrauel (CC BY-NC)

Farinera jl__cc (CC BY-NC) · marcaluco (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

Apagallums victoriadurazo (CC BY-NC) · Oriol Sastre (CC BY) · Izan Lopez Vergel (CC BY-NC)

Bolet de tinta Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · jorditb (CC BY-NC) · Daniel Fornos Alimbau (CC BY-NC)

Camperol Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC) · Sarah and Fernando (CC BY-NC)

Bola de neu Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · jorge-prieto (CC BY-NC) · Javier Marcos Martínez (CC BY-NC)

Pet de llop gaspiralsnuvols (CC BY-NC) · victoriadurazo (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

Pet de llop gegant bargon (CC BY-NC) · Ángel Argüelles (CC BY-NC) · spacecadetkiddo (CC BY-NC)

Pet de llop gros Daniel Joaquin Aguirre Howes (CC BY-NC) · piranyeta (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

Fredolic josep65 (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY)

Fredolic gros David Marcos Vidal (CC BY-NC) · jesus_lamata (CC BY-NC)

Pimpinella morada Marc (CC BY-NC) · no rights reserved (CC0) · Guille Marín (CC BY-NC)

Pampa Josep Sais i Brucet (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · Roser Melero (CC BY-NC-SA)

Moixernó miguelayuso (CC BY-NC) · Carmelo López Abad (CC BY-NC) · esther69 (CC BY-NC)

Llenega negra jl__cc (CC BY-NC) · yossarianc (CC BY-NC)

Llenega blanca pauoc (CC BY-NC) · Luis Ballester (CC BY-NC) · Francisco Valverde (CC BY-NC)

Carlet Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

Cama-sec Izan Lopez Vergel (CC BY-NC) · Experience Matters (CC BY-NC) · yossarianc (CC BY-NC)

Gírgola de panical toniconca (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · Javier Royán Martín (CC BY-NC)

Orellana Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · Juan José de Haro (CC BY-SA)

Moixernó blanc de tardor Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC) · Cándido Sos (CC BY-NC)

Pollancró Bernat Espigulé (CC BY-NC) · martaasoler (CC BY-NC)

Múrgola rauldelamorena (CC BY-NC) · franja44 (CC BY-NC)

Múrgola Eva Palacian (CC BY-NC) · tonipons (CC BY-NC)

Tòfona negra Luis Ballester (CC BY-NC) · jorgecalamocha (CC BY-NC) · Charo Val (CC BY-NC)

Paxil·le tòxic joxepo (CC BY-NC) · jonatan_antunez (CC BY-NC) · José Luis Romero Rego (CC BY-NC)

Farinera borda J. IGNASI (CC BY-NC) · no rights reserved (CC0) · polchof (CC BY-NC)

Cogomassa Luis Ballester (CC BY-NC) · Amari García (CC BY-NC) · Fatima Carrasco (CC BY-NC)

Farinera pudent Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Jesse Kalwij (CC BY-NC) · Rene Weigelt (CC BY-NC)

Lepiota metzinosa Luis Ballester (CC BY-NC) · Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC) · Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

Galerina marginada Mario Vega Pérez (CC BY-NC) · faluke (CC BY-NC)

Inosperma erubescens Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Jose Castro (CC BY)

Cortinari metzinós Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Federico Calledda (CC BY-NC) · Ijantos (CC BY-NC)

Bolet de greix Lídia Carrera (CC BY) · M.Antònia Barros Amils (CC BY-NC) · jaap_engberts (CC BY-NC)

Enganyapastors de llet groga Jacobo Krauel (CC BY-NC)

Enganyapastors Luis Ballester (CC BY-NC) · maricel patino (CC BY-NC) · Pere Pujol Font (CC BY-NC)

Cabra de bec Alba Rovira (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC) · David Marcos Vidal (CC BY-NC)

Escaldabecs noah_siegel (CC BY-NC-SA) · Simon M Davies (CC BY-NC) · Vladimir Bryukhov (CC BY-NC)

Matagent ceslal (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

Fals rossinyol Rubén Pérez-González (CC BY-NC) · Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC)

Pota de cavall groga Oriol Sastre (CC BY) · nicomanus (CC BY-NC) · alfredoherrero (CC BY-NC)

Peu de rata bord Cordula Bernert (CC BY-NC) · Stevan Baluban (CC BY-NC) · Philippe Geniez (CC BY-NC)

Amanita proxima Luis Ballester (CC BY-NC) · Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · jorgemartin71 (CC BY-NC)

Pixacà nicomanus (CC BY-NC) · Yves Bas (CC BY) · Oriol Sastre (CC BY)

Reig bord graellsia (CC BY-NC) · Вова Протас (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

Amanita gemmata Quercus morisii (CC BY-NC) · mavero (CC BY-NC)

Lepiota pudent Jacobo Krauel (CC BY-NC) · santigibertbolets (CC BY-NC)

Bola de neu pudent joxepo (CC BY-NC) · Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Felipe Castilla Lattke (CC BY-NC)

Verderol Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Sean S (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC)

Fredolic metzinós Antton Meléndez (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC)

Clitocibe blanc Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC) · julian_alonso (CC BY-NC)

Círgola d'olivera Juan Bertrand-Figueroa (CC BY-NC) · Bernat Espigulé (CC BY-NC) · Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC)

Mycena pura Sean S (CC BY-NC) · Hannah (CC BY-NC)

Fals carlet Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Luis Ballester (CC BY-NC)

Bolet de pi Josep Sais i Brucet (CC BY-NC) · oriol3333 (CC BY-NC)

Barret de bruixa Cándido Sos (CC BY-NC) · David Marcos Vidal (CC BY-NC) · deinonyco (CC BY-NC-SA)

Bolet de femer jonatan_antunez (CC BY-NC) · diana_fuir (CC BY-NC) · ferran garcia mari (CC BY-NC)

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

Llame ahora

112

Emergencias
Diga que han comido setas silvestres y cuándo.

91 562 04 20

Toxicología · 24 h
Información de intoxicaciones.

QUÉ HACER

- → **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.
- → **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.
- → **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.
- → **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.
- → **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).

ANÓTELO ANTES DE SALIR

ALOJAMIENTO _____

CENTRO DE SALUD _____

SOCIEDAD MICOLÓGICA _____

DÓNDE APARQUÉ _____