Setas *esenciales*

de Cataluña

Las 54 que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES

Rebozuelo *10*
rossinyol · *Cantharellus cibarius*

Boleto *7*
cep · *Boletus edulis*

Níscalo *4*
pinetell · *Lactarius deliciosus*

20 TÓXICAS

Matamoscas *34*
reig bord · *Amanita muscaria*

Boleto de Satanás *30*
matagent · *Rubroboletus satanas*

Seta de olivo *31*
gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*

9 MORTALES

Oronja verde *44*
farinera borda · *Amanita phalloides*

Cogomassa *45*
Amanita verna

Cortinari metzinós *50*
Cortinarius orellanus

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.**
2. **Saque la seta entera, con la base del pie.**
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.**
4. **No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.**
5. **Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.**
6. **Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.**
7. **No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata…).**
8. **Las apps de fotos orientan, pero no deciden.**
9. **Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.**
10. **Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.**
11. **Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.**
12. **Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.**

CÓMO LEER LAS FICHAS

COMESTIBLE · TÓXICA · MORTAL	Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen.
●●○ Media	Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil.
E F M A M J J A **S O N** D	Meses en que sale; en claro, solo algunos años.
✓ ✕ ◑	Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte.
	Dónde: pinos y abetos, árboles de hoja ancha, prados, madera, altitud.
●●○ Grave	En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal.
→ *p. 12*	Página de la seta con la que se confunde.

EMPIEZAN EN LA PÁGINA **Comestibles** *4* **Tóxicas** *27* **Mortales** *43* **Árboles** *52*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.

ANTES DEL NOMBRE

Cómo mirar una seta

Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.



1 Sombrero. Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

2 Debajo. Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

3 Anillo. ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

4 Pie. Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

5 Base. Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

6 Carne. Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO



Láminas
Hojas finas, como un libro



Tubos
Una esponja de agujeritos

Pliegues
Venas gruesas, no hojas



Aguijones
Púas blandas

Interior
Una bola: córtela

LA EDAD CUENTA







Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

Níscalos

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

Lactarius sanguifluus y *L. deliciosus* · rovelló, pinetell

Casi iguales y los dos comestibles excelentes. Lo que los separa es el color del látex al cortarlos.

Níscalo de sangre

rovelló · *Lactarius sanguifluus*

Naranja vinoso, con pocas zonas.

Níscalo

pinetell · *Lactarius deliciosus*

Láminas naranja vivo y pie hasta la base.

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

0–2100 m de altitud

E F M A M J J A **S O N D**

	Níscalo de sangre	Níscalo
LÁTEX	Rojo vino desde el primer momento	Naranja zanahoria; no pasa a vino
LÁMINAS	Rosa vinoso o lila	Naranja vivo
DÓNDE	Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media	Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías

LOS DOS

✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
✓ Siempre bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Paxilo** paxil·le tòxic · *Paxillus involutus* MORTAL → p. 43
SE DISTINGUE Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne.

✗ **Enganyapastors de llet groga** *Lactarius chrysorrheus* TÓXICA → p. 27
SE DISTINGUE Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea.

COMPRUEBE Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.

Carbonera

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Russula cyanoxantha · llora · llora morada

E F M A M **J J A S O N** D

Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).

Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.

Carbonera (R. cyanoxantha)

CÓMO ES

✓ **Láminas** blancas, flexibles y grasas

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

Haya, castaño, encina y alcornoque y otros

50–1700 m; sobre todo 300–1100 m

Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).

✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Oronja verde** farinera borda · *Amanita phalloides* MORTAL → p. 44

SE PARECE Formas verdosas, láminas blancas, mismos bosques. **SE DISTINGUE** Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles.

Russula sardonia TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.

✕ **Cualbra morada** *Russula torulosa* NO COMESTIBLE → p. 29

SE PARECE Sombrero púrpura o vinoso. **SE DISTINGUE** Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante.

COMPRUEBE Base del pie (desentiérrela) y anillo.

Seta coliflor

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Sparassis crispa · peu de rata de pi · greixa

E F M A M J J A **S** **O** **N** D

Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.

Una bola como una coliflor, al pie de un pino.

De cerca: lóbulos planos y ondulados, como fideos anchos.

Crema pálido, entre la pinaza.

CÓMO ES

✕ **Láminas** lóbulos rizados, como una coliflor

● **Esporada** blanca a crema

DÓNDE

Pino silvestre, laricio y rodeno

Sobre madera

100–1800 m; sobre todo 300–1500 m

Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.

✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.

✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Peu de rata bord** *Ramaria formosa* TÓXICA → p. 33

SE PARECE Hongo ramificado en el suelo. **SE DISTINGUE** Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios.

Coliflor rosa

peu de rata col-i-flor · *Ramaria botrytis*

CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

COMPRUEBE Forma de las ramas.

Boleto

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Boletus edulis · cep · sureny

E F M A M J J A S O N D

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.

Jóvenes, redondos como tapones de corcho: los más firmes.

Boletos recolectados en la cesta de mimbre.

CÓMO ES

✓ **Tubos** blancos, luego amarillo verdosos

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE

Pino silvestre, abeto blanco y pícea

Haya, castaño y roble albar

600–2000 m; sobre todo 900–1700 m

Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.

✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).

✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

SABOR Suave, a avellana.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Boleto de Satanás** matagent · *Rubroboletus satanas* TÓXICA → p. 30

SE PARECE Boleto grande y robusto de pie bulboso. **SE DISTINGUE** Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente.

Boleto amargo
molleric amarg · *Tylopilus felleus*
NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.

Pie rojo amargo
mataparent amarg · *Caloboletus calopus*
NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

COMPRUEBE Poros y pie.

Boleto granulado

Suillus granulatus · molleric · molleric granellut

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

E F M A **M J J** A **S O N** D

En su punto

Poros amarillos con gotitas blancas

Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

CÓMO ES

✓ **Tubos** amarillos, con gotitas de jóvenes

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** pardo ocre

DÓNDE

Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero y otros

0–1800 m; sobre todo 400–1500 m

Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.

✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.

✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.

✓ Bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto picante
molleric pebrer · *Chalciporus piperatus*
NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.

Molleric
Suillus collinitus
COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.

Molleric de bou
Suillus bovinus
SIN INTERÉS Poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes; sin granulaciones.

COMPRUEBE Color de los poros.

Cama de perdiu

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Chroogomphus rutilus · pota de perdiu

E F M A M J J A **S O N D**

En su punto

Debajo: láminas gruesas, espaciadas y muy decurrentes.

Carne y pie de color naranja salmón.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** gruesas, ocre → púrpura negruzco
- ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** negra o gris negruzca

DÓNDE

Pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero

0–1800 m; sobre todo 400–1200 m

Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
- ✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
- ✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
- ✓ Bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 50
SE PARECE Tonos anaranjados y cobrizos, cortina en los jóvenes. **SE DISTINGUE** Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes.

✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 31
SE PARECE Tonos anaranjados en pinar. **SE DISTINGUE** Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca.

Cama de perdiu mucosa
Gomphidius glutinosus
COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

COMPRUEBE Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D

En su punto

Debajo

De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

CÓMO ES

✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco

Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 50
SE PARECE Tonos anaranjados en planifolios ácidos. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

✕ **Seta de olivo** gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius* TÓXICA → p. 31
SE PARECE Color anaranjado, forma de embudo, crecimiento en otoño. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas, finas y apretadas.

✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 31
SE PARECE Naranja, en embudo, en pinares. **SE DISTINGUE** Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Trompeta de los muertos

Craterellus cornucopioides · trompeta de la mort · trompeta

E F M A M J J A S O N D

Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).

En su punto: negras, firmes y en grupo.

Mire por dentro: es hueca hasta abajo, como una trompeta.

Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

CÓMO ES

✕ **Láminas** por fuera lisa, gris ceniza

● **Esporada** blanca

DÓNDE

Haya, encina, castaño y roble pubescente y otros

100–1600 m; sobre todo 200–700 m

Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.

✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).

✓ Carne delgada y elástica.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Orella de gat negra
Helvella lacunosa
CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

Craterellus cinereus
COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

COMPRUEBE Forma general.

Angula de monte

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Craterellus lutescens · camagroc · rossinyol de pi

E F M A M J J A S O N D

Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).

En su punto

Debajo no hay láminas

Pie amarillo y hueco.

CÓMO ES

✕ **Láminas** casi liso, rosado anaranjado

● **Esporada** blanca a crema

DÓNDE

Pino silvestre, laricio y abeto blanco

300–1800 m; sobre todo 600–1100 m

Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.

✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.

✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 31

SE PARECE Tonos anaranjados en pinar. **SE DISTINGUE** Láminas finas y apretadas; pie macizo.

Camagroc

Craterellus tubaeformis

COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado.

COMPRUEBE Parte inferior y pie.

Lengua de vaca

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Hydnum repandum · llengua de bou · llémena

E F M A M J J A S O N D

Los ejemplares viejos amargan.

En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.

Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.

Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

CÓMO ES

✓ **Aguijones** blandos, crema anaranjados

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco

Encina, haya, castaño y roble pubescente

0–1800 m; sobre todo 400–1000 m

Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).

✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.

✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

SABOR Suave; amargo en ejemplares viejos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Hydnellum* / *Sarcodon

NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.

Picornell de pi

Hydnum rufescens

COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie.

COMPRUEBE Consistencia de la carne.

Oronja

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Amanita caesarea · ou de reig · reig

E F M A M J J A S O N D

En su punto: sombrero naranja, pie amarillo y volva blanca.

Láminas y pie AMARILLOS; volva blanca en saco.

Joven: sale de un huevo blanco.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** amarillo dorado
- ✓ **Anillo** amarillo, colgante
- ✓ **Volva** blanca, grande, en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

Encina, alcornoque, roble pubescente y castaño

50–1100 m; sobre todo 200–700 m

Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
- ✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
- ✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
- ✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

× **Oronja verde** farinera borda · *Amanita phalloides* MORTAL → p. 44

SE PARECE Fase de huevo blanco en los mismos bosques. **SE DISTINGUE** Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso...

× **Matamoscas** reig bord · *Amanita muscaria* TÓXICA → p. 34

SE PARECE Sombrero rojo anaranjado, volva y anillo, mismos bosques. **SE DISTINGUE** Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden...

Amanita crocea CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

COMPRUEBE Corte longitudinal del huevo.

Parasol

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Macrolepiota procera · apagallums · cogomella

E F M A M J J **A S O N** D

En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.

Pie con dibujo de piel de serpiente: la marca del parasol.

Debajo: láminas blancas y anillo grueso que se desplaza.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas a crema
- ✓ **Anillo** doble, se desliza
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados

0–1800 m; sobre todo 200–1100 m

Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.

✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).

✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.

✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

OLOR Agradable, a avellana.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Lepiota metzinosa** *Lepiota brunneoincarnata* MORTAL → p. 47

SE PARECE Aspecto de pequeño parasol con escamas. **SE DISTINGUE** Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado.

✗ **Amanita pantera** pixacà · *Amanita pantherina* TÓXICA → p. 34

SE DISTINGUE Volva en la base y anillo fijo; pie liso.

Apagallums
Chlorophyllum rhacodes
CONDICIONADA Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

COMPRUEBE Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

Barbuda

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Coprinus comatus · bolet de tinta

E F M A M J J A S O N D

Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.

Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado

Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por dentro.

Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas → rosadas → negras
- ✓ **Anillo** fino, se desliza
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** negra

DÓNDE

En prados

0–1500 m; sobre todo 200–1000 m

Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).
- ✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
- ✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Bolet de femer
Coprinopsis atramentaria
TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada.

Coprí garsa
Coprinopsis picacea
NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

COMPRUEBE Color y superficie del sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Champiñón silvestre

Agaricus campestris · camperol

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.

Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un...

Gírelo siempre: láminas rosadas y pie blanco sin volva.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** rosa vivo → pardo chocolate
- ✓ **Anillo** fino, se pierde pronto
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** pardo chocolate

DÓNDE

En prados

0–2000 m; sobre todo 200–1000 m

Pastos con ganado, prados de siega.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
- ✓ Sin volva en la base.
- ✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
- ✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ✗ **Cogomassa** *Amanita verna* MORTAL → p. 45
  SE PARECE Seta blanca. **SE DISTINGUE** Láminas siempre blancas y volva en saco.
- ✗ **Bola de neu pudent** *Agaricus xanthodermus* TÓXICA → p. 36
  SE PARECE Champiñón blanco de láminas rosadas a pardas. **SE DISTINGUE** Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol.
- ✗ **Fals carlet** *Entoloma sinuatum* TÓXICA → p. 40
  SE PARECE Láminas rosadas. **SE DISTINGUE** Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques.

COMPRUEBE Láminas y base.

Pedo de lobo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Lycoperdon perlatum · pet de llop

E F M A M J J **A S O N D**

Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.

Joven, blanco y lleno de verrugas

De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden.

Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

CÓMO ES

✕ **Láminas** una bola: por dentro, blanca y firme

DÓNDE

En prados

0–2000 m; sobre todo 400–1100 m

Bosques de todo tipo y sus bordes.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.

✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Oronja verde** farinera borda · *Amanita phalloides* MORTAL → p. 44

SE PARECE Fase de huevo blanco de algunas amanitas. **SE DISTINGUE** Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie).

✕ **Pota de cavall groga** *Scleroderma citrinum* TÓXICA → p. 32

SE PARECE Bola en el suelo. **SE DISTINGUE** Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

Negrilla

Tricholoma terreum · fredolic · negret

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

E F M A M J J A S O N D

En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.

Debajo: láminas blanquecinas o grisáceas y pie blanco.

Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas a gris pálido
- ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero

0–1800 m; sobre todo 300–1000 m

Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.
- ✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
- ✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
- ✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

OLOR Débil, no harinoso.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Fredolic metzinós** *Tricholoma pardinum* TÓXICA → p. 38

SE PARECE Tricolomas grises bajo coníferas. **SE DISTINGUE** Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas...

Tricholoma virgatum / T. sciodes TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo.

Inocybe (varias especies grises) TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente.

COMPRUEBE Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

Pie azul

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Lepista nuda · pimpinella morada

E F M A M J J A S O N D

En su punto

Debajo

De cerca: láminas y pie violetas.

CÓMO ES

✓ **Láminas** violeta lila

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** rosada pálida

DÓNDE

En prados

0–1800 m; sobre todo 300–1000 m

Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.

✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).

✓ Sin cortina ni anillo.

✓ Olor afrutado o perfumado.

OLOR Afrutado, perfumado.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)

TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.

✕ **Barret de bruixa** *Inocybe geophylla* TÓXICA → p. 42

SE PARECE La forma lila de I. **SE DISTINGUE** Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas.

✕ ***Mycena pura*** TÓXICA → p. 42

SE PARECE Tonos lila. **SE DISTINGUE** Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano.

COMPRUEBE Esporada y parte alta del pie.

Perrechico

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Calocybe gambosa · moixernó · bolet de Sant Jordi

E F M **A** **M** **J** J A S **O** N D

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

CÓMO ES

✓ **Láminas** blancas a crema, muy juntas

✗ **Anillo** ✗ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados

400–2000 m; sobre todo 500–1200 m

Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.

✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.

✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.

✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

OLOR Intenso a harina fresca.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ ***Inosperma erubescens*** MORTAL → p. 49

SE PARECE Seta blanquecina de primavera en los mismos lugares. **SE DISTINGUE** Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina.

✗ **Cogomassa** *Amanita verna* MORTAL → p. 45

SE PARECE Seta blanca de primavera. **SE DISTINGUE** Anillo y volva en saco; láminas libres.

✗ **Fals carlet** *Entoloma sinuatum* TÓXICA → p. 40

SE PARECE Seta grande blanquecina con olor a harina. **SE DISTINGUE** Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño.

COMPRUEBE Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

Babosa negra y carlet

Hygrophorus latitabundus y *H. russula* · llenega negra

Babosa negra

llenega negra · *Hygrophorus latitabundus*

Oscura, brillante y viscosa.

Carlet

Hygrophorus russula

Rosa con manchas vinosas.

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva** ▲ 0–1500 m de altitud

E F M A M J J A S **O N D**

	Babosa negra	Carlet
SOMBRERO	Pardo oscuro a casi negro, con mucha baba	Rosa vinoso con manchas, poco viscoso
LÁMINAS	Blancas, espaciadas	Blancas, se manchan de vinoso
PIE	Abajo, con una funda de baba gris	Robusto, con manchas vinosas
DÓNDE	Bajo pinos, en suelo calizo	Bajo encinas y robles

LOS DOS

✓ Láminas blancas, gruesas y céreas: como de cera al tocarlas.
✓ Esporada blanca.
✓ Salen tarde: de octubre a diciembre.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Fals carlet** *Entoloma sinuatum* TÓXICA → p. 40

SE PARECE Seta grande de encinar y robledal en otoño. **SE DISTINGUE** Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia.

Llenega borda
Cortinarius trivialis

NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.

Senderuela

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Marasmius oreades · cama-sec · carrereta

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D

En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.

La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.

Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

CÓMO ES

✓ **Láminas** crema, muy separadas

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados

0–2200 m; sobre todo 200–1400 m

Corros de hierba más verde o más seca en prados.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.

✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.

✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.

✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

OLOR Débil, a almendra amarga.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ **Lepiota metzinosa** *Lepiota brunneoincarnata* MORTAL → p. 47

SE PARECE Pequeña seta de prado. **SE DISTINGUE** Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas.

✕ **Clitocibe blanc** *Clitocybe rivulosa* TÓXICA → p. 39

SE PARECE Pequeña seta de prado que crece en los mismos corros. **SE DISTINGUE** Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso.

Inocybe (especies de prado) TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

COMPRUEBE Sombrero.

Seta de cardo

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pleurotus eryngii · gírgola de panical

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D**

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

En su punto

Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.

Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

CÓMO ES

✓ **Láminas** blanquecinas, bajan por el pie

✗ **Anillo** ✗ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados

0–1200 m de altitud

Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

CÓMO RECONOCERLA

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.

✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Clitocibe blanc** *Clitocybe rivulosa* TÓXICA → p. 39

SE PARECE Seta de prado de láminas decurrentes. **SE DISTINGUE** Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo.

✗ **Fals carlet** *Entoloma sinuatum* TÓXICA → p. 40

SE PARECE Seta grisácea carnosa. **SE DISTINGUE** Láminas rosa salmón, en bosque.

COMPRUEBE Color y base.

Seta de chopo

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Cyclocybe cylindracea · pollancró

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D

Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** crema → pardo tabaco
- ✓ **Anillo** membranoso
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** pardo tabaco

DÓNDE

- Chopo negro y álamo blanco
- En prados
- Sobre madera
- 0–1200 m; sobre todo por debajo de 300 m

Riberas, choperas y parques.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
- ✓ Anillo membranoso en el pie.
- ✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
- ✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Galerina marginada** *Galerina marginata* MORTAL → p. 48

SE PARECE Seta parda sobre madera con anillo. **SE DISTINGUE** Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos.

✗ **Bolet de pi** *Hypholoma fasciculare* TÓXICA → p. 41

SE PARECE Ramilletes sobre tocones. **SE DISTINGUE** Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo.

COMPRUEBE Tamaño y árbol.

Colmenilla

CONDICIONADA ●●○ MEDIA

Morchella esculenta · múrgola · rabassola

E F **M A M** J J A S O N D

Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.

CÓMO ES

✕ **Láminas** sombrero con alvéolos, como un panal

● **Esporada** crema ocrácea

DÓNDE

En prados

0–1600 m; sobre todo 200–1200 m

Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.

✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.

✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

≈ **Falsa colmenilla** bolet de greix · *Gyromitra esculenta* MORTAL → p. 51

SE PARECE Seta de primavera con sombrero arrugado pardo. **SE DISTINGUE** Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco.

Verpa bohemica TÓXICA
Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.

Colmenilla negra
múrgola · *Morchella elata*
CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

Enganyapastors

TÓXICAS ●○○ FÁCIL

Lactarius zonarius y *L. chrysorrheus* · pinetell bord, rovelló bord

Parecen níscalos, pero su látex es blanco. Los dos son tóxicos.

Enganyapastors
Lactarius zonarius
Zonas como el níscalo.

De llet groga
Lactarius chrysorrheus
Látex blanco que amarillea.

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex** 0–1300 m de altitud

E F M A M J J **A S O N D**

	Enganyapastors	De llet groga
LÁTEX	Blanco, no cambia; muy picante	Blanco que amarillea en segundos
SOMBRERO	Crema a naranja pálido, con zonas	Ocre salmón pálido, con zonas

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Látex BLANCO al cortar (en los níscalos es rojo vino o naranja).
! Láminas crema que no se manchan de verde.
! Bajo encinas, alcornoques y robles; no bajo pinos.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

SE CONFUNDE CON

≈ **Níscalo** pinetell · *Lactarius deliciosus* COMESTIBLE → p. 4
SE DISTINGUE Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos.

≈ **Níscalo de sangre** rovelló · *Lactarius sanguifluus* COMESTIBLE → p. 4
SE PARECE Sombrero anaranjado. **SE DISTINGUE** Látex rojo vino; bajo pinos.

COMPRUEBE Corte el pie: si el látex es blanco, descártela.

Falso níscalo

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Lactarius torminosus · cabra de beç · lleterol de beç

E F M A M J J A S O N D

Bolet de cabra: sombrero rosado salmón con el margen peludo.

Debajo: láminas pálidas y margen lanoso. El látex es blanco.

El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** crema rosado
- ✗ **Anillo** ✗ **Volva**
- ✓ **Látex** blanco
- ● **Esporada** crema

DÓNDE

Abedul

500–1900 m; sobre todo por debajo de 1600 m

Abedulares y bosques con abedul.

RASGOS DE ALARMA

- ! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
- ! Látex blanco que no cambia.
- ! Siempre bajo abedules.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

SE CONFUNDE CON

≈ **Níscalo** pinetell · *Lactarius deliciosus* COMESTIBLE → p. 4

SE PARECE Sombrero anaranjado con zonas. **SE DISTINGUE** Margen liso, látex naranja; bajo pinos.

Pinetell d'avet

Lactarius salmonicolor

COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos.

COMPRUEBE Margen y látex.

Cualbra morada

NO COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Russula torulosa · escaldabec vinós

E F M A M J J A S O N D

No comestible por su sabor muy picante; la SCM la sitúa entre las especies «a refusar».

Sombrero púrpura oscuro y pie teñido de púrpura, bajo pinos.

Debajo: láminas crema y pie rosa púrpura.

De lado: pie teñido de púrpura.

CÓMO ES

✓ **Láminas** crema pálido, frágiles

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** crema

DÓNDE

Pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero

0–1600 m; sobre todo 300–900 m

Pinares mediterráneos y de montaña media.

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.

! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.

! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.

! Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

SABOR Muy picante (no la pruebe).

GRAVEDAD ●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

SE CONFUNDE CON

≈ **Níscalo de sangre** rovelló · *Lactarius sanguifluus* COMESTIBLE → p. 4

SE PARECE Pinares calizos, tonos vinosos, época. **SE DISTINGUE** El rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que verdean y pie hueco con hoyuelos.

≈ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 5

SE PARECE Sombrero púrpura. **SE DISTINGUE** La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas, sabor suave y crece bajo planifolios.

COMPRUEBE Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.

Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs

E F M A M J **J A S O** N D

Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.

Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.

De cerca: poros rojo anaranjado.

TÓXICAS

CÓMO ES

✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos

✗ **Anillo** ✗ **Volva**

● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE

Roble pubescente, encina, castaño y haya

100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).

! Poros rojos o rojo anaranjados.

! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.

! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON

Boleto reticulado
cep d'estiu · *Boletus reticulatus*
COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.

Boleto negro
sureny fosc · *Boletus aereus*
COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

Falsos rebozuelos

TÓXICAS ●○○ FÁCIL

Hygrophoropsis aurantiaca y *Omphalotus olearius* · fals rossinyol, gírgola d'olivera

Naranjas como el rebozuelo, pero con láminas finas de verdad.

Falso rebozuelo

fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*

Pequeño y todo naranja.

Seta de olivo

gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*

En ramillete sobre un tocón.

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** 0–1800 m de altitud

E F M A M J J A **S O N D**

	Falso rebozuelo	Seta de olivo
TAMAÑO	Pequeño (2–8 cm), carne delgada y blanda	Grande (5–15 cm) y carnoso
CÓMO SALE	Suelto, en la pinaza o sobre madera podrida de pino	En ramilletes de pies unidos, sobre tocones y raíces de olivo, encina o castaño

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Láminas verdaderas: finas, apretadas y que bajan por el pie.
! Todo naranja: sombrero, láminas y pie.
! Pase el dedo por debajo: las láminas se separan; los pliegues del rebozuelo, no.

SETA DE OLIVO ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

FALSO REBOZUELO ●○○ **Leve.** No comestible: puede sentar mal.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

SE CONFUNDE CON

≈ **Rebozuelo** rossinyol · *Cantharellus cibarius* COMESTIBLE → p. 10

SE DISTINGUE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas).

COMPRUEBE Debajo del sombrero: láminas finas, falso; pliegues gruesos y romos, rebozuelo.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

E F M A M J J **A S O N** D

Bola de piel gruesa

Cortada

Interior oscuro con vetas claras.

CÓMO ES

✕ **Láminas** una bola: por dentro, negra violácea

DÓNDE

Pino piñonero

Alcornoque, encina y castaño

0–1200 m; sobre todo 200–1000 m

Bosques sobre suelo ácido, bordes de camino.

RASGOS DE ALARMA

! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

SE CONFUNDE CON

≈ **Pedo de lobo** pet de llop · *Lycoperdon perlatum* COMESTIBLE → p. 18

SE PARECE Bola sin pie claro. **SE DISTINGUE** El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes.

Bejín gigante
pet de llop gegant · *Calvatia gigantea*
COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina.

Trufa negra
tòfona negra · *Tuber melanosporum*
COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

Peu de rata bord

TÓXICA ●●○ MEDIA

Ramaria formosa

E F M A M J J A S O N D

Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).

Forma de coral, ramas rosa anaranjado.

Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.

Puntas de las ramas amarillentas.

CÓMO ES

✕ **Láminas** ramas, como un coral

● **Esporada** ocre

DÓNDE

Haya, roble pubescente y castaño

200–1600 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios.

RASGOS DE ALARMA

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

SABOR Algo amargo (no la pruebe).

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

SE CONFUNDE CON

≈ **Seta coliflor** peu de rata de pi · *Sparassis crispa* COMESTIBLE → p. 6

SE PARECE Masa ramificada. **SE DISTINGUE** Lóbulos aplanados crema, en pinos.

Coliflor rosa

peu de rata col-i-flor · *Ramaria botrytis*

CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

COMPRUEBE Forma.

TÓXICAS ●●○ MEDIA

Amanita pantera y matamoscas

Amanita pantherina y *A. muscaria* · pixacà, reig bord

Amanita pantera

pixacà · *Amanita pantherina*

Parda con verrugas blancas.

Matamoscas

reig bord · *Amanita muscaria*

Rojo con verrugas blancas.

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva** 0–2200 m de altitud

E F M A M J J **A S O N** D

	Amanita pantera	Matamoscas
SOMBRERO	Pardo; verrugas blanco puro, en círculos	Rojo o naranja, más grande
BASE	Bulbo con reborde, como un calcetín	Bulbo con anillos de volva
DÓNDE	Pinares, robledales, hayedos, encinares	Pinares y abedulares de montaña

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Verrugas blancas en el sombrero (la lluvia puede borrarlas).

! Láminas y pie blancos; bulbo en la base.

GRAVEDAD ●●○ Grave. Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones y somnolencia; vómitos.

SE CONFUNDE CON

≈ **Parasol** apagallums · *Macrolepiota procera* COMESTIBLE → p. 15
SE PARECE Sombrero pardo con escamas. **SE DISTINGUE** Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado.

≈ **Oronja** ou de reig · *Amanita caesarea* COMESTIBLE → p. 14
SE DISTINGUE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca.

COMPRUEBE Láminas blancas, anillo y volva: descártela (la oronja las tiene amarillas).

Lepiota pudent

Lepiota cristata

TÓXICA ●●○ MEDIA

E F M A M J J **A S O N** D

Tóxica (gastrointestinal). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.

Lepiota cristata

L. cristata de cerca

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** fino, frágil
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados

0–1600 m; sobre todo 300–1000 m

Hojarasca, jardines y bordes de camino.

RASGOS DE ALARMA

- ! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
- ! Olor desagradable, a goma o gas.
- ! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

SE CONFUNDE CON

≈ **Parasol** apagallums · *Macrolepiota procera* **COMESTIBLE** → p. 15

SE PARECE Parasol en miniatura. **SE DISTINGUE** Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado.

COMPRUEBE Tamaño.

Bola de neu pudent

TÓXICA ●○○ **FÁCIL**

Agaricus xanthodermus

E F M A **M J** J A **S O N** D

Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.

Láminas rosa grisáceo de joven; se confunde fácilmente con...

Vieja: láminas pardo oscuro.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** rosadas → pardas
- ✓ **Anillo** grueso
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo chocolate

DÓNDE

En prados

0–1500 m; sobre todo 200–500 m

Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

RASGOS DE ALARMA

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.

! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

OLOR Desagradable (tinta, fenol).

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON

≈ **Champiñón silvestre** camperol · *Agaricus campestris* **COMESTIBLE** → p. 17

SE PARECE Champiñón blanco. **SE DISTINGUE** No amarillea y huele bien.

Bola de nieve

bola de neu · *Agaricus arvensis*

COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo.

COMPRUEBE Base del pie.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Seta de los caballeros

Tricholoma equestre · verderol · groguet

E F M A M J J A S **O** **N** **D**

Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.

Debajo: láminas amarillo azufre.

Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el centro.

CÓMO ES

✓ **Láminas** amarillo azufre

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

Pino piñonero, silvestre y rodeno

En prados

0–1700 m; sobre todo 400–1500 m

Pinares sobre suelo arenoso.

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillo azufre intenso.

! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.

! Pie amarillo.

OLOR A harina débil.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura.

SE CONFUNDE CON

Capuchina

fredolic gros · *Tricholoma portentosum*

COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras.

≈ **Oronja verde** farinera borda · *Amanita phalloides* MORTAL → p. 44

SE PARECE Sombrero amarillo verdoso. **SE DISTINGUE** Láminas blancas, anillo y volva.

COMPRUEBE Sombrero.

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

TÓXICA ●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O** N D

Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.

Sombrero escamoso y pie robusto y lleno

Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

CÓMO ES

✓ **Láminas** blanquecinas, reflejo verdoso

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

Abeto blanco y pino silvestre

Haya

800–2000 m de altitud

Bosques de montaña.

RASGOS DE ALARMA

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).

! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.

! Olor a harina.

OLOR A harina.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

SE CONFUNDE CON

≈ **Negrilla** fredolic · *Tricholoma terreum* **COMESTIBLE** → p. 19

SE PARECE Tricoloma gris. **SE DISTINGUE** El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina.

Capuchina

fredolic gros · *Tricholoma portentosum*

COMESTIBLE Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

COMPRUEBE Tamaño y escamas.

Clitocibe blanc

TÓXICA ●●○ MEDIA

Clitocybe rivulosa · candeleta

E F M A M J J A **S O N D**

CÓMO ES

✓ **Láminas** blancas a crema, bajan por el pie

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados

0–2000 m; sobre todo 300–1000 m

Prados, céspedes, claros herbosos.

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.

! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).

! Esporada blanca (no rosada).

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

SE CONFUNDE CON

≈ **Senderuela** cama-sec · *Marasmius oreades* COMESTIBLE → p. 23

SE PARECE Pequeña seta de prado en corros. **SE DISTINGUE** El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso.

Molinera

moixernó blanc de tardor · *Clitopilus prunulus*

COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina.

≈ **Champiñón silvestre** camperol · *Agaricus campestris* COMESTIBLE → p. 17

SE PARECE Seta blanca de prado. **SE DISTINGUE** Láminas libres rosadas a pardas.

COMPRUEBE Láminas.

Fals carlet

TÓXICA ●●○ MEDIA

Entoloma sinuatum · carlet bord

E F M A M J J A **S** **O** **N** D

Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.

Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa salmón.

Adulto

CÓMO ES

✓ **Láminas** amarillentas → rosa salmón

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** rosada

DÓNDE

Roble pubescente, haya y castaño

100–1500 m; sobre todo 200–800 m

Bosques de planifolios.

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.

! Esporada rosada.

! Olor a harina rancia.

! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

OLOR A harina rancia.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

SE CONFUNDE CON

≈ **Carlet** *Hygrophorus russula* COMESTIBLE → p. 22

SE PARECE Seta grande y carnosa de bosque de robles en otoño. **SE DISTINGUE** El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca.

≈ **Perrechico** moixernó · *Calocybe gambosa* COMESTIBLE → p. 21

SE PARECE Seta blanquecina carnosa con olor a harina. **SE DISTINGUE** Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera.

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas.

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

TÓXICA ●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A S O N D

Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.

CÓMO ES

✓ **Láminas** amarillas → verdosas
✕ **Anillo** ✕ **Volva**
● **Esporada** pardo violácea

DÓNDE

En prados
Sobre madera
0–2000 m; sobre todo 400–1100 m
Tocones y madera muerta.

RASGOS DE ALARMA

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

SE CONFUNDE CON

≈ **Seta de chopo** pollancró · *Cyclocybe cylindracea* **COMESTIBLE** → p. 25
SE PARECE Ramilletes. **SE DISTINGUE** Crema, anillo membranoso, en chopos.

Armilaria
alzinoi · *Armillaria mellea*
CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

COMPRUEBE Color.

TÓXICAS ●●○ MEDIA

Pequeñas con muscarina

Inocybe geophylla y *Mycena pura*

E F M A M J J **A S O N D**

Pequeñas, blancas o lilas; las lilas se confunden con el pie azul.

Barret de bruixa

Inocybe geophylla

Blanco, con un pico en el centro.

Mycena pura

Lila, borde con rayas.

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ▲ 0–2000 m de altitud

	Barret de bruixa	Mycena pura
COLOR	Blanco sedoso, a veces lila	Lila o rosado; borde con rayas
FORMA	Cónico, con pico; fibras que se agrietan	Acampanado; pie hueco y frágil
OLOR	A tierra	A rábano

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Pequeñas: de 1 a 5 cm.

! En la hojarasca de pinares, hayedos y bosques mixtos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

SE CONFUNDE CON

≈ **Pie azul** pimpinella morada · *Lepista nuda* COMESTIBLE → p. 20
SE PARECE Tonos lila. **SE DISTINGUE** Mucho mayor y carnosa.

≈ **Senderuela** cama-sec · *Marasmius oreades* COMESTIBLE → p. 23
SE DISTINGUE Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema.

COMPRUEBE Tamaño: el pie azul es grande, carnoso y huele a fruta.

Paxilo

MORTAL ●●○ MEDIA

Paxillus involutus · paxil·le tòxic · paxil enrotllat

E F M A M J J **A S O N** D

Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia...

Margen del sombrero muy enrollado.

Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

CÓMO ES

✓ **Láminas** ocre, se manchan de pardo

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** pardo ocre

DÓNDE

Pino silvestre

Abedul, encina y castaño

0–1900 m; sobre todo 400–1400 m

RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.

! Sin látex.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

SÍNDROME HEMOLÍTICO Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y...

SE CONFUNDE CON

≈ **Níscalo de sangre** rovelló · *Lactarius sanguifluus* COMESTIBLE → p. 4
SE PARECE Margen enrollado, tonos pardo rojizos en ejemplares viejos. **SE DISTINGUE** El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo.

≈ **Níscalo** pinetell · *Lactarius deliciosus* COMESTIBLE → p. 4
SE PARECE Margen enrollado; tonos anaranjados en pinar. **SE DISTINGUE** Látex naranja y manchas verdes en el pinetell.

COMPRUEBE **Corte: látex o no.**

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

MORTAL ●●○ MEDIA

E F M A M J J **A S O N** D

Adulta

Debajo

Láminas blancas y base con volva

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE

- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde
llora verda · *Russula virescens*
COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...

≈ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* **COMESTIBLE** → p. 5
SE DISTINGUE Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE **Base y pie.**

Cogomassa

Amanita verna

MORTAL ●●○ MEDIA

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

Encina, roble pubescente y alcornoque

0–900 m de altitud

Encinares y robledales mediterráneos.

RASGOS DE ALARMA

- ! Seta enteramente blanca.
- ! Volva blanca en saco en la base.
- ! Anillo membranoso blanco.
- ! Láminas blancas, libres.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

SE CONFUNDE CON

≈ **Perrechico** moixernó · *Calocybe gambosa* COMESTIBLE → p. 21
SE PARECE Seta blanca de primavera. **SE DISTINGUE** El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina.

≈ **Champiñón silvestre** camperol · *Agaricus campestris* COMESTIBLE → p. 17
SE PARECE Seta blanca de prado o borde de bosque. **SE DISTINGUE** Láminas rosadas y luego pardas; sin volva.

COMPRUEBE **Base y pie.**

Farinera pudent

Amanita virosa

Mortal (amatoxinas).

MORTAL ●●○ MEDIA

E F M A M J J **A** **S** **O** N D

Toda blanca, con anillo y volva.

Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría rosas o...

Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, frágil
- ✓ **Volva** en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

Haya y abedul

500–1800 m de altitud

Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

RASGOS DE ALARMA

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.

! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.

! Volva blanca en saco.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

SE CONFUNDE CON

Bola de nieve
bola de neu · *Agaricus arvensis*

COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva.

COMPRUEBE **Láminas y base.**

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata · palometa

MORTAL ●●○ MEDIA

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.

Pie rosado con bandas y láminas blancas.

Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el centro.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas a crema
- ◑ **Anillo** solo una zona algodonosa
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados

0–900 m; sobre todo por debajo de 300 m

Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

RASGOS DE ALARMA

- ! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
- ! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
- ! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
- ! Láminas blancas, libres.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

SE CONFUNDE CON

≈ **Parasol** apagallums · *Macrolepiota procera* COMESTIBLE → p. 15

SE PARECE Aspecto de parasol con escamas. **SE DISTINGUE** El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado.

≈ **Senderuela** cama-sec · *Marasmius oreades* COMESTIBLE → p. 23

SE PARECE Pequeña seta de prado en otoño. **SE DISTINGUE** El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas.

COMPRUEBE **Tamaño, anillo y pie.**

Galerina marginada

Galerina marginata · galerina metzinosa

MORTAL ●●○ MEDIA

E F M A M J J A **S O N D**

Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.

Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...

Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** amarillentas → pardo herrumbre
- ✓ **Anillo** fino
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** pardo herrumbre

DÓNDE

Sobre madera

0–2000 m; sobre todo 400–1300 m

Madera muerta de coníferas y planifolios.

RASGOS DE ALARMA

- ! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
- ! Anillo fino pardo en el pie.
- ! Esporada pardo herrumbre.
- ! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

SE CONFUNDE CON

≈ **Seta de chopo** pollancró · *Cyclocybe cylindracea* **COMESTIBLE** → p. 25

SE PARECE Pardo con anillo sobre madera. **SE DISTINGUE** Mayor y sobre chopos.

Kuehneromyces mutabilis
COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

COMPRUEBE **Tamaño y árbol.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Inosperma erubescens

E F M A **M J J** A S O N D

Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.

Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.

Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blanquecinas → pardas, manchas rojas
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** parda

DÓNDE

En prados

0–1500 m de altitud

Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
- ! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
- ! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión.

SE CONFUNDE CON

≈ **Perrechico** moixernó · *Calocybe gambosa* COMESTIBLE → p. 21

SE PARECE Seta blanquecina de primavera. **SE DISTINGUE** El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece.

COMPRUEBE **Sombrero, manchas rojas y olor.**

Cortinari metzinós

MORTAL ●●○ MEDIA

Cortinarius orellanus · bolet de mantellina

E F M A M J J A **S** **O** **N** D

Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.

Láminas color herrumbre, espaciadas.

Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** amarillo anaranjadas → herrumbre
- ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
- ✕ **Volva**

DÓNDE

Roble pubescente, castaño y encina

100–1500 m de altitud

Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
- ! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
- ! Esporada pardo herrumbre.
- ! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

OLOR Débil a rábano.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

SÍNDROME ORELLÁNICO Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida.

SE CONFUNDE CON

≈ **Rebozuelo** rossinyol · *Cantharellus cibarius* **COMESTIBLE** → p. 10

SE DISTINGUE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas.

Camagroc

Craterellus tubaeformis

COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

COMPRUEBE **Parte inferior.**

Falsa colmenilla

MORTAL ●○○ **FÁCIL**

Gyromitra esculenta · bolet de greix · murga

E F M **A** **M** **J** J A S O N D

Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).

CÓMO ES

✕ **Láminas** sombrero arrugado, como un cerebro

DÓNDE

Pino silvestre, abeto blanco y pino negro

Sobre madera

600–2200 m; sobre todo 1000–1800 m

Coníferas de montaña.

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

SÍNDROME GIROMITRIANO Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

SE CONFUNDE CON

≈ **Colmenilla** múrgola · *Morchella esculenta* **CONDICIONADA** → p. 26

SE PARECE Primavera, aspecto arrugado. **SE DISTINGUE** La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad.

Colmenilla negra
múrgola · *Morchella elata*

CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco.

COMPRUEBE **Corte longitudinal.**

Árboles y sus setas

Reconocer el árbol por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.


HOJA

TRONCO

Pino carrasco

pi blanc · *Pinus halepensis*

Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido.

BUSQUE Níscalos *4*, Boleto granulado *8*, Cama de perdiu *9*, Negrilla *19*, Babosa negra y carlet *22*

CUIDADO Cualbra morada *29*

HOJA

TRONCO

Pino piñonero

pi pinyer · *Pinus pinea*

Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.

BUSQUE Níscalos *4*, Boleto granulado *8*, Cama de perdiu *9*, Negrilla *19*

CUIDADO Pota de cavall groga *32*, Seta de los caballeros *37*, Cualbra morada *29*


HOJA

TRONCO

Pino laricio

pinassa · *Pinus nigra subsp. salzmannii*

Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.

BUSQUE Níscalos *4*, Seta coliflor *6*, Boleto granulado *8*, Cama de perdiu *9*, Angula de monte *12*, Negrilla *19*

CUIDADO Cualbra morada *29*

HOJA

TRONCO

Pino silvestre

pi roig · *Pinus sylvestris*

Copa irregular y alta.

BUSQUE Níscalos *4*, Seta coliflor *6*, Boleto *7*, Boleto granulado *8*, Cama de perdiu *9*, Rebozuelo *10*

CUIDADO Paxilo *43*, Falsa colmenilla *51*, Amanita pantera y matamoscas *34*, Seta de los caballeros *37*, Fredolic metzinós *38*, Cualbra morada *29*

HOJA

TRONCO

Encina

alzina · *Quercus ilex*

Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate.

BUSQUE Carbonera *5*, Rebozuelo *10*, Trompeta de los muertos *11*, Lengua de vaca *13*, Oronja *14*, Babosa negra y carlet *22*

CUIDADO Paxilo *43*, Oronja verde *44*, Cogomassa *45*, Cortinari metzinós *50*, Enganyapastors *27*, Boleto de Satanás *30*

Árboles y sus setas

Abeto blanco

avet · *Abies alba*

Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.

BUSQUE Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Angula de monte *12*, Lengua de vaca *13*

CUIDADO Falsa colmenilla *51*, Amanita pantera y matamoscas *34*, Fredolic metzinós *38*



Alcornoque

surera · *Quercus suber*

Árbol de copa amplia y verde grisácea.

BUSQUE Carbonera *5*, Rebozuelo *10*, Oronja *14*

CUIDADO Oronja verde *44*, Cogomassa *45*, Enganyapastors *27*, Pota de cavall groga *32*

Roble pubescente

roure martinenc · *Quercus pubescens*

Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las...

BUSQUE Carbonera *5*, Trompeta de los muertos *11*, Lengua de vaca *13*, Oronja *14*, Babosa negra y carlet *22*

CUIDADO Oronja verde *44*, Cogomassa *45*, Cortinari metzinós *50*, Enganyapastors *27*, Boleto de Satanás *30*, Peu de rata bord *33*



Haya

faig · *Fagus sylvatica*

Árbol alto de corteza lisa y gris.

BUSQUE Carbonera *5*, Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Trompeta de los muertos *11*, Lengua de vaca *13*

CUIDADO Oronja verde *44*, Farinera pudent *46*, Boleto de Satanás *30*, Peu de rata bord *33*, Amanita pantera y matamoscas *34*, Fredolic metzinós *38*

Castaño

castanyer · *Castanea sativa*

Árbol grande de copa amplia.

BUSQUE Carbonera *5*, Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Trompeta de los muertos *11*, Lengua de vaca *13*, Oronja *14*

CUIDADO Paxilo *43*, Oronja verde *44*, Cortinari metzinós *50*, Enganyapastors *27*, Boleto de Satanás *30*, Pota de cavall groga *32*

NOTAS

NOTAS

NOTAS