NO COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

escaldabec vinós

Cualbra morada

Russula torulosa


Sombrero púrpura oscuro y pie teñido de púrpura, bajo pinos.


Debajo: láminas crema y pie rosa púrpura.


De lado: pie teñido de púrpura.

E F M A M J J A S **O N D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1600 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.
- ! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
- ! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.
- ! Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

SABOR Muy picante (no la pruebe).

GRAVEDAD ●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero. Pinares mediterráneos y de montaña media.

SE CONFUNDE CON



Rovelló COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que verdean y pie hueco con hoyuelos. → p. 4



Llora COMESTIBLE La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas, sabor suave y crece bajo planifolios. → p. 5

COMPRUEBE Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.

Setas *esenciales*

de Cataluña

Las 54 que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES


Rossinyol *10*


Cep *7*


Pinetell *4*

20 TÓXICAS


Reig bord *33*


Matagent *29*


Gírgola d'olivera *30*

9 MORTALES


Farinera borda *43*


Cogomassa *44*


Cortinari metzinós *49*

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.**
2. **Saque la seta entera, con la base del pie.**
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.**
4. **No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.**
5. **Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.**
6. **Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.**
7. **No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata…).**
8. **Las apps de fotos orientan, pero no deciden.**
9. **Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.**
10. **Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.**
11. **Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.**
12. **Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.**

CÓMO LEER LAS FICHAS

COMESTIBLE TÓXICA MORTAL	Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen.
●●○ Media	Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil.
E F M A M J J A **S O N** D	Meses en que sale; en claro, solo algunos años.
●●○ Grave	En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal.
→ *p. 12*	Página de la seta con la que se confunde.

EMPIEZAN EN LA PÁGINA ■ Comestibles *4* ■ Tóxicas *26* ■ Mortales *42* ■ Árboles *51*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura**. Uso personal o sin ánimo de lucro.

Para montarlo: imprime a doble cara volteando por el **borde corto**, a tamaño real; ordena las hojas por su número pequeño (un montón con las A y otro con las B), dobla cada montón por la mitad y grapa por el pliegue.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

lleterol de beç

Cabra de beç

Lactarius torminosus · falso níscalo

Tóxica (gastrointestinal). En algunos países del norte se consume tras tratamientos prolongados: esa práctica no la hace segura.



Bolet de cabra: sombrero rosado salmón con el margen peludo.



Debajo



El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

E F M A M J J **A S O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 500–1900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

- ! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
- ! Látex blanco que no cambia.
- ! Siempre bajo abedules.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

DÓNDE Con abedul. Abedulares y bosques con abedul.

SE CONFUNDE CON



Pinetell COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo pinos. → p. 4



Pinetell d'avet COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos.

COMPRUEBE Margen y látex.

TÓXICAS ●○○ FÁCIL

pinetell bord · rovelló bord


Enganyapastors

Lactarius zonarius y *L. chrysorrheus* (enganyapastors de llet groga)

Parecen pinetells, pero su látex es blanco. Los dos son tóxicos.



Enganyapastors: zonas como el pinetell.



De llet groga: látex blanco que amarillea.



Láminas crema, nunca verdes.

E F M A M J J **A S O N D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1300 m de altitud

	Enganyapastors	De llet groga
LÁTEX	Blanco, no cambia; muy picante	Blanco que amarillea en segundos
SOMBRERO	Crema a naranja pálido, con zonas	Ocre salmón pálido, con zonas

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Látex BLANCO al cortar (rovelló: rojo vino; pinetell: naranja).
! Láminas crema que no se manchan de verde.
! Bajo encinas, alcornoques y robles; no bajo pinos.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

SE CONFUNDE CON



Pinetell COMESTIBLE Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos. → p. 4




Rovelló COMESTIBLE Látex rojo vino; bajo pinos. → p. 4

COMPRUEBE Corte el pie: si el látex es blanco, descártela.

ANTES DEL NOMBRE

Cómo mirar una seta

Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.



1 **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

2 **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

3 **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

4 **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

5 **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

6 **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO



Láminas
Hojas finas, como un libro



Tubos
Una esponja de agujeritos



Pliegues
Venas gruesas, no hojas



Aguijones
Púas blandas



Interior
Una bola: córtela


LA EDAD CUENTA




✓ Joven



✓ En su punto



✕ Viejo



✕ Pasado

Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

esclatasang · rovelló d'obaga

Rovelló y pinetell

Lactarius sanguifluus y *L. deliciosus* · níscalos, rebollones

Casi iguales y los dos comestibles excelentes. Lo que los separa es el color del látex al cortarlos.



Rovelló: naranja vinoso, con pocas zonas.



Pinetell: zonas bien marcadas.



Pinetell: láminas naranja vivo.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva **Bajo pinos**

0–2100 m de altitud

	Rovelló	Pinetell
LÁTEX	Rojo vino desde el primer momento	Naranja zanahoria; no pasa a vino
LÁMINAS	Rosa vinoso o lila	Naranja vivo
DÓNDE	Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media	Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías

LOS DOS

- ✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
- ✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
- ✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
- ✓ Siempre bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Paxil·le tòxic MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne. → p. 42



Enganyapastors de llet groga TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 26

COMPRUEBE Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA

rabassola

Múrgola

Morchella esculenta · colmenilla · cagarria

Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.







E F **M A M** J J A S O N D Alvéolos Sin anillo Sin volva **0–1600 m de altitud**

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
- ✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.
- ✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

DÓNDE **En prados.** Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Bolet de greix MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. → p. 50

- ***Verpa bohemica*** TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.



Múrgola CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pollancró

Cyclocybe cylindracea · seta de chopo

Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).







E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1200 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

DÓNDE Con chopo negro y álamo blanco. **En prados y sobre madera.** Riberas, choperas y parques.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Galerina marginada MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos. → p. 47



Bolet de pi TÓXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo. → p. 40

COMPRUEBE Tamaño y árbol.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *llora morada*

Llora

Russula cyanoxantha · carbonera

Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).




Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.


Carbonera (R. cyanoxantha)

E F M A M **J** **J** **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 50–1700 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).
✓ Sin anillo ni volva.
✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

DÓNDE Con haya, castaño, encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Farinera borda MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 43

- ***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.



Cualbra morada NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante. → p. 28

COMPRUEBE Base del pie (desentiérrela) y anillo.

COMESTIBLES

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *greixa*

Peu de rata de pi

Sparassis crispa · seta coliflor · barba de cabra

Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.


Una bola como una coliflor, al pie de un pino.


De cerca


Crema pálido, entre la pinaza.

E F M A M J J A **S O N** D · Ramificado · Sin anillo · Sin volva · 100–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.
- ✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.
- ✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y rodeno. **Sobre madera.** Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Peu de rata bord TÓXICA Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios. → p. 32


Peu de rata col-i-flor CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

COMPRUEBE Forma de las ramas.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Gírgola de panical

Pleurotus eryngii · seta de cardo

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).


En su punto: sombrero pardo, carnoso, y láminas que bajan por el pie.


Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.


Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

E F M **A M** J J A S **O N D** · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1200 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.
- ✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
- ✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

DÓNDE **En prados.** Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Clitocibe blanc TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 38


Fals carlet TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 39

COMPRUEBE Color y base.

COMESTIBLES

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *carrereta*

Cama-sec

Marasmius oreades · senderuela · carrerilla

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.


En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.


La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.


Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–2200 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

OLOR Débil, a almendra amarga.

DÓNDE **En prados.** Corros de hierba más verde o más seca en prados.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Lepiota metzinosa MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 46


Clitocibe blanc TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 38

- ***Inocybe (especies de prado)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

COMPRUEBE Sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *sureny*

Cep

Boletus edulis · boleto · hongo blanco


En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.


Jóvenes, redondos como tapones de corcho


Ceps recolectados en la cesta de mimbre.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva — 600–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

SABOR Suave, a avellana.

DÓNDE Con haya, castaño, roble albar, pino silvestre y abeto blanco y otros. Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Matagent TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente. → p. 29


Molleric amarg NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.


Mataparent amarg NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

COMPRUEBE Poros y pie.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *molleric granellut*

Molleric

Suillus granulatus · boleto granulado

Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).


En su punto: sombrero pardo brillante, pie amarillento, en grupo bajo pinos.


Poros amarillos con gotitas blancas


Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

E F M A **M** J J A **S** **O** **N** D · Tubos · Sin anillo · Sin volva · **0–1800 m de altitud**

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre, laricio, piñonero y rodeno. Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Molleric pebrer NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.


Molleric de bou SIN INTERÉS Poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes; sin granulaciones.


Molleric COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.

COMPRUEBE Color de los poros.

COMESTIBLES ●●○ MEDIA *llenega*

Llenega negra y carlet

Hygrophorus latitabundus y *H. russula* · babosa negra

Del mismo grupo y las dos muy buenas: láminas blancas, como de cera.


Llenega negra: oscura, brillante y viscosa.


Carlet: rosa con manchas vinosas.


Láminas blancas, espaciadas, como de cera.

E F M A M J J A S **O** **N** **D** · Láminas · Sin anillo · Sin volva · **0–1500 m de altitud**

	Llenega negra	Carlet
SOMBRERO	Pardo oscuro a casi negro, con mucha baba	Rosa vinoso con manchas, poco viscoso
LÁMINAS	Blancas, espaciadas	Blancas, se manchan de vinoso
PIE	Abajo, con una funda de baba gris	Robusto, con manchas vinosas
DÓNDE	Bajo pinos, en suelo calizo	Bajo encinas y robles

LOS DOS

✓ Láminas blancas, gruesas y céreas: como de cera al tocarlas.
✓ Esporada blanca.
✓ Salen tarde: de octubre a diciembre.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Fals carlet TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia. → p. 39


Llenega borda NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.

COMPRUEBE Láminas blancas: si con la edad se vuelven rosa salmón o pardo herrumbre, no es ninguna de las dos.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

bolet de Sant Jordi

Moixernó

Calocybe gambosa · perrechico · seta de San Jorge







E F M **A** **M** **J** J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 400–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

OLOR Intenso a harina fresca.

DÓNDE **En prados.** Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Inosperma erubescens MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 48



Cogomassa MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 44



Fals carlet TÓXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 39

COMPRUEBE Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

pota de perdiu


Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus

Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.


En su punto: sombrero rojizo y láminas ocre que bajan por el pie.


Debajo


Carne y pie de color naranja salmón.

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero. Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 49



Fals rossinyol NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca. → p. 30



Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

COMPRUEBE Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *vaqueta*

Rossinyol

Cantharellus cibarius · rebozuelo · cabrito


En su punto: todo amarillo yema, carnoso, con el margen ondulado.


Debajo


De cerca

E F M A M **J J A S O N** D Pliegues Sin anillo Sin volva **50–1800 m de altitud**

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

DÓNDE Con encina, alcornoque, castaño, haya y roble albar y otros. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 49



Gírgola d'olivera TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 30



Fals rossinyol NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda. → p. 30

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pimpinella morada

Lepista nuda · pie azul


En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.


Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.


De cerca: láminas y pie violetas.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva **0–1800 m de altitud**

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
✓ Sin cortina ni anillo.
✓ Olor afrutado o perfumado.

OLOR Afrutado, perfumado.

DÓNDE **En prados.** Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)*** TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.



Barret de bruixa TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas. → p. 41



Mycena pura TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano. → p. 41

COMPRUEBE Esporada y parte alta del pie.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL *negret*

Fredolic

Tricholoma terreum · negrilla · ratón


En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.


Debajo


Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.
- ✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
- ✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
- ✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

OLOR Débil, no harinoso.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero. Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Fredolic metzinós TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas como un dibujo de tigre; olor a harina; láminas con reflejos verde amarillentos. → p. 37

- ***Tricholoma virgatum / T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo; carne amarga o picante; láminas con arista punteada de negro en T.
- ***Inocybe (varias especies grises)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada parda), olor espermático o terroso.

COMPRUEBE Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

COMESTIBLES ●○○ FÁCIL *trompeta · rossinyol de pi*

Trompeta de la mort y camagroc

Craterellus cornucopioides y *C. lutescens* · trompeta de los muertos, angula de monte

Huecas, en embudo y sin láminas; las dos, muy apreciadas.


Trompeta de la mort: negra, en grupo.


Camagroc: pie amarillo y sombrero pardo.


Por debajo, liso o con venas bajas.

E F M A M J J A **S O N D** Liso Sin anillo Sin volva 100–1800 m de altitud

	Trompeta de la mort	Camagroc
COLOR	Negra o gris muy oscuro, toda ella	Sombrero pardo; pie amarillo anaranjado vivo
POR DEBAJO	Gris ceniza, liso o apenas arrugado	Rosado anaranjado o amarillo, con venas muy bajas
DÓNDE	Hojarasca húmeda de hayedos, encinares y castañares	Musgo húmedo de pinares y abetales, cerca del agua

LOS DOS

- ✓ Sin láminas: por debajo, lisas o con venas muy bajas.
- ✓ Huecas hasta abajo, en forma de embudo o trompeta.
- ✓ Carne delgada y elástica.
- ✓ Salen en grupo, a menudo muchas juntas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Fals rossinyol NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo. → p. 30



Orella de gat negra CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

COMPRUEBE Mire por debajo: si tiene láminas finas y apretadas, no es ninguna de las dos.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *llémena*

Llengua de bou

Hydnum repandum · lengua de vaca · gamuza

Los ejemplares viejos amargan.


En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.


Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.


Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

SABOR Suave; amargo en ejemplares viejos.

DÓNDE Con encina, haya, castaño, pino silvestre y abeto blanco y otros. Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Hydnellum / Sarcodon*** NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.



Picornell de pi COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie.

COMPRUEBE Consistencia de la carne.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Pet de llop

Lycoperdon perlatum · pedo de lobo · bejín

Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.


Joven, blanco y lleno de verrugas: el momento de recolectarlo.


De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden.


Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

E F M A M J J **A S O N D** Interior Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.
✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.
✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

DÓNDE **En prados.** Bosques de todo tipo y sus bordes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Farinera borda MORTAL Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie). → p. 43



Pota de cavall groga TÓXICA Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa. → p. 31

COMPRUEBE Corte longitudinal.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Camperol

Agaricus campestris · champiñón silvestre · seta de campo


En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.


Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un...


Gírelo siempre

E F M A **M J** J A **S O N** D · Láminas · Con anillo · Sin volva · 0–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
✓ Sin volva en la base.
✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

DÓNDE **En prados.** Pastos con ganado, prados de siega.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Cogomassa MORTAL Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 44


Bola de neu pudent TÓXICA Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol. → p. 35


Fals carlet TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques. → p. 39

COMPRUEBE Láminas y base.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Ou de reig

Amanita caesarea · oronja · amanita de los césares

Comestible excelente. Los «huevos» cerrados no deben recolectarse: en ese estado se confunden con los de la farinera borda y otras amanitas mortales.


En su punto: sombrero naranja, pie amarillo y volva blanca.


Láminas y pie AMARILLOS; volva blanca en saco.


Joven: sale de un huevo blanco.

E F M A M J **J A S O** N D · Láminas · Con anillo · **Con volva** · 50–1100 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Farinera borda MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 43


Reig bord TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 33

- ***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

COMPRUEBE Corte longitudinal del huevo.

COMESTIBLES

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *cogomella*

Apagallums

Macrolepiota procera · parasol · galamperna


En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.


Pie con dibujo de piel de serpiente


Debajo

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.
- ✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
- ✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
- ✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

OLOR Agradable, a avellana.

DÓNDE **En prados.** Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Lepiota metzinosa MORTAL Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado. → p. 46


Pixacà TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso. → p. 33


Apagallums CONDICIONADA Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

COMPRUEBE Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Bolet de tinta

Coprinus comatus · barbuda · matacandil

Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.


Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado: el momento de recolectarlo.


Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por...


Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

E F **M A M** J J A **S O N D** — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1500 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).
- ✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
- ✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

DÓNDE **En prados.** Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Bolet de femer TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada.


Coprí garsa NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

COMPRUEBE Color y superficie del sombrero.

Árboles y sus setas


HOJA

TRONCO

Abeto blanco — avet

Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.

BUSQUE Cep *7*, Rossinyol *10*, Trompeta de la mort y camagroc *11*, Llengua de bou *12*

CUIDADO Bolet de greix *50*, Pixacà y reig bord *33*, Fredolic metzinós *37*


HOJA

TRONCO

Alcornoque — surera

Árbol de copa amplia y verde grisácea.

BUSQUE Llora *5*, Rossinyol *10*, Ou de reig *13*

CUIDADO Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Enganyapastors *26*, Pota de cavall groga *31*


HOJA

TRONCO

Roble pubescente — roure martinenc

Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las...

BUSQUE Llora *5*, Trompeta de la mort y camagroc *11*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*, Llenega negra y carlet *21*

CUIDADO Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*, Peu de rata bord *32*


HOJA

TRONCO

Haya — faig

Árbol alto de corteza lisa y gris.

BUSQUE Llora *5*, Cep *7*, Rossinyol *10*, Trompeta de la mort y camagroc *11*, Llengua de bou *12*

CUIDADO Farinera borda *43*, Farinera pudent *45*, Matagent *29*, Peu de rata bord *32*, Pixacà y reig bord *33*, Fredolic metzinós *37*


HOJA

TRONCO

Castaño — castanyer

Árbol grande de copa amplia.

BUSQUE Llora *5*, Cep *7*, Rossinyol *10*, Trompeta de la mort y camagroc *11*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*

CUIDADO Paxil·le tòxic *42*, Farinera borda *43*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*, Pota de cavall groga *31*

TÓXICA ●○○ FÁCIL

mataparent de Satanàs

Matagent

Rubroboletus satanas · boleto de Satanás


Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.


Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.


De cerca: poros rojo anaranjado.

E F M A M J **J A S O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva — **100–1300 m de altitud**

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (A VECES INTENSO) Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal; puede requerir atención hospitalaria por deshidratación.

DÓNDE Con roble pubescente, encina, castaño y haya. Bosques claros y cálidos de planifolios.

SE CONFUNDE CON



Cep d'estiu COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.



Sureny fosc COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

TÓXICAS ●○○ FÁCIL

rossinyol ataronjat · bolet d'oliu

Falsos rossinyols

Hygrophoropsis aurantiaca y *Omphalotus olearius* · falso rebozuelo, seta de olivo

Naranjas como el rossinyol, pero con láminas finas de verdad.



Gírgola d'olivera: en ramillete sobre un tocón.



Fals rossinyol: pequeño y todo naranja.



Láminas finas, apretadas y ramificadas.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva **0–1800 m de altitud**

	Fals rossinyol	Gírgola d'olivera
TAMAÑO	Pequeño (2–8 cm), carne delgada y blanda	Grande (5–15 cm) y carnoso
CÓMO SALE	Suelto, en la pinaza o sobre madera podrida de pino	En ramilletes de pies unidos, sobre tocones y raíces de olivo, encina o castaño

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Láminas verdaderas: finas, apretadas y que bajan por el pie.
! Todo naranja: sombrero, láminas y pie.
! Pase el dedo por debajo: las láminas se separan; los pliegues del rossinyol, no.

GÍRGOLA D'OLIVERA ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

FALS ROSSINYOL ●○○ **Leve.** No comestible: puede sentar mal.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

SE CONFUNDE CON



Rossinyol COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas), carne gruesa y firme, color yema de huevo. → p. 10

COMPRUEBE Debajo del sombrero: láminas finas, falso; pliegues gruesos y romos, rossinyol.

DÓNDE BUSCAR

Árboles y sus setas

Reconocer el árbol por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.



HOJA



TRONCO

Pino carrasco — pi blanc

Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido.

BUSQUE Rovelló y pinetell *4*, Molleric *8*, Cama de perdiu *9*, Fredolic *18*, Llenega negra y carlet *21*

CUIDADO Cualbra morada *28*



HOJA



TRONCO

Pino piñonero — pi pinyer

Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.

BUSQUE Rovelló y pinetell *4*, Molleric *8*, Cama de perdiu *9*, Fredolic *18*

CUIDADO Pota de cavall groga *31*, Verderol *36*, Cualbra morada *28*



HOJA



TRONCO

Pino laricio — pinassa

Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.

BUSQUE Rovelló y pinetell *4*, Peu de rata de pi *6*, Molleric *8*, Cama de perdiu *9*, Trompeta de la mort y camagroc *11*, Fredolic *18*

CUIDADO Cualbra morada *28*



HOJA



TRONCO

Pino silvestre — pi roig

Copa irregular y alta.

BUSQUE Rovelló y pinetell *4*, Peu de rata de pi *6*, Cep *7*, Molleric *8*, Cama de perdiu *9*, Rossinyol *10*

CUIDADO Paxil·le tòxic *42*, Bolet de greix *50*, Pixacà y reig bord *33*, Verderol *36*, Fredolic metzinós *37*, Cualbra morada *28*



HOJA



TRONCO

Encina — alzina

Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate.

BUSQUE Llora *5*, Rossinyol *10*, Trompeta de la mort y camagroc *11*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*, Llenega negra y carlet *21*

CUIDADO Paxil·le tòxic *42*, Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*

MORTAL ●○○ FÁCIL

murga

Bolet de greix

Gyromitra esculenta · falsa colmenilla · bonete

Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).







E F M **A** **M** **J** J A S O N D — Liso — Sin anillo — Sin volva — 600–2200 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

SÍNDROME GIROMITRIANO (CONVULSIVO Y HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

DÓNDE Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. **Sobre madera.** Coníferas de montaña.

SE CONFUNDE CON



Múrgola CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 25



Múrgola CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco.

COMPRUEBE **Corte longitudinal.**

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum



Bola de piel gruesa, amarillenta y escamosa.



Cortada



Interior oscuro con vetas claras.

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D — Interior — Sin anillo — Sin volva — 0–1200 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

GRAVEDAD ●●○ Grave. Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

DÓNDE Con alcornoque, encina, castaño y pino piñonero.

SE CONFUNDE CON



Pet de llop COMESTIBLE El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes. → p. 17



Pet de llop gegant COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina.



Tòfona negra COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Peu de rata bord

Ramaria formosa

Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).


Forma de coral, ramas rosa anaranjado.


Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.


Puntas de las ramas amarillentas.

E F M A M J J **A S O N** D · Ramificado · Sin anillo · Sin volva · 200–1600 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

SABOR Algo amargo (no la pruebe).

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

DÓNDE Con haya, roble pubescente y castaño. Bosques de planifolios.

SE CONFUNDE CON



Peu de rata de pi COMESTIBLE Lóbulos aplanados crema, en pinos. → p. 6



Peu de rata col-i-flor CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

COMPRUEBE Forma.


MORTAL ●●○ MEDIA

bolet de mantellina

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus


Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.


Láminas color herrumbre, espaciadas.


Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

E F M A M J J A **S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 100–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.

! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.

! Esporada pardo herrumbre.

! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

OLOR Débil a rábano.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

SÍNDROME ORELLÁNICO (NEFROTÓXICO TARDÍO) Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida; insuficiencia renal que puede requerir diálisis o trasplante.

DÓNDE Con roble pubescente, castaño y encina. Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

SE CONFUNDE CON



Rossinyol COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas. → p. 10



Camagroc COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

MORTAL ●●○ MEDIA

Inosperma erubescens

Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.



Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.



Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).



E F M A **M J J** A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

GRAVEDAD ●●● Mortal. Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO (GRAVE) Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión; puede ser mortal sin tratamiento.

DÓNDE **En prados.** Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

SE CONFUNDE CON



Moixernó COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 20

COMPRUEBE **Sombrero, manchas rojas y olor.**

TÓXICAS ●●○ MEDIA *reig bru*

Pixacà y reig bord

Amanita pantherina y *A. muscaria* · amanita pantera, matamoscas



Reig bord: rojo con verrugas blancas.



Pixacà: pardo con verrugas blancas.



Pixacà: bulbo con reborde, como un calcetín.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 0–2200 m de altitud

	Pixacà	Reig bord
SOMBRERO	Pardo; verrugas blanco puro, en círculos	Rojo o naranja, más grande
BASE	Bulbo con reborde, como un calcetín	Bulbo con anillos de volva
DÓNDE	Pinares, robledales, hayedos, encinares	Pinares y abedulares de montaña

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Verrugas blancas en el sombrero (la lluvia puede borrarlas).
! Láminas y pie blancos; bulbo en la base.

GRAVEDAD ●●○ Grave. Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones y somnolencia; vómitos.

SE CONFUNDE CON



Apagallums COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 14



Ou de reig COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca. → p. 13

COMPRUEBE Láminas blancas, anillo y volva: descártela. El ou de reig tiene láminas y pie amarillos.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Lepiota pudent

Lepiota cristata

Tóxica (gastrointestinal). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.




Lepiota cristata


L. cristata de cerca

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1600 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
! Olor desagradable, a goma o gas.
! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

DÓNDE **En prados.** Hojarasca, jardines y bordes de camino.

SE CONFUNDE CON


Apagallums COMESTIBLE Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado. → p. 14

COMPRUEBE Tamaño.

MORTAL ●●○ MEDIA

galerina metzinosa

Galerina marginada

Galerina marginata


Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.


Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...


Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

E F M A M J J A **S O N D** — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
! Anillo fino pardo en el pie.
! Esporada pardo herrumbre.
! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

DÓNDE **Sobre madera.** Madera muerta de coníferas y planifolios.

SE CONFUNDE CON


Pollancró COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 24

≈ ***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

COMPRUEBE **Tamaño y árbol.**

MORTAL ●●○ MEDIA *palometa*

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata


Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.


Pie rosado con bandas y láminas blancas.


Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el...

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
! Láminas blancas, libres.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

DÓNDE **En prados.** Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino.

SE CONFUNDE CON


Apagallums COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado. → p. 14


Cama-sec COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas. → p. 22

COMPRUEBE **Tamaño, anillo y pie.**

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

Tóxica (gastrointestinal).


Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.


Láminas rosa grisáceo de joven; se confunde...


Vieja: láminas pardo oscuro.

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D Láminas Con anillo Sin volva 0–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.
! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.
! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

OLOR Desagradable (tinta, fenol).

GRAVEDAD ●○○ Moderada. Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

DÓNDE **En prados.** Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

SE CONFUNDE CON


Camperol COMESTIBLE No amarillea y huele bien. → p. 16


Bola de neu COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo.

COMPRUEBE Base del pie.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

groguet

Verderol

Tricholoma equestre · seta de los caballeros


Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.


Debajo: láminas amarillo azufre.


Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el...

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1700 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillo azufre intenso.
! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.
! Pie amarillo.

OLOR A harina débil.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura; en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria.

DÓNDE Con pino piñonero, silvestre y rodeno. **En prados.** Pinares sobre suelo arenoso.

SE CONFUNDE CON


Fredolic gros COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras.


Farinera borda MORTAL Láminas blancas, anillo y volva. → p. 43

COMPRUEBE Sombrero.

MORTAL ●●○ MEDIA

Farinera pudent

Amanita virosa

Mortal (amatoxinas).


Toda blanca, con anillo y volva.


Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría...


Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

E F M A M J J **A S O** N D Láminas Con anillo **Con volva** 500–1800 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
! Volva blanca en saco.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

DÓNDE Con haya y abedul. Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

SE CONFUNDE CON


Bola de neu COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva.

COMPRUEBE **Láminas y base.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Cogomassa

Amanita verna







E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D Láminas Con anillo **Con volva** 0–900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta enteramente blanca.
! Volva blanca en saco en la base.
! Anillo membranoso blanco.
! Láminas blancas, libres.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque. Encinares y robledales mediterráneos.

SE CONFUNDE CON



Moixernó COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina. → p. 20



Camperol COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 16

COMPRUEBE **Base y pie.**

TÓXICA ●●○ MEDIA

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum


Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.


Sombrero escamoso y pie robusto y lleno


Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D Láminas Sin anillo Sin volva 800–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).
! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
! Olor a harina.


OLOR A harina.

GRAVEDAD ●●○ Grave. Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

DÓNDE Con abeto blanco, haya y pino silvestre. Bosques de montaña.

SE CONFUNDE CON



Fredolic COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 18



Fredolic gros COMESTIBLE Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

COMPRUEBE Tamaño y escamas.

TÓXICA ●●○ MEDIA *candeleta*

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa







E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.

! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).

! Esporada blanca (no rosada).

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO (COLINÉRGICO) Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

DÓNDE **En prados.** Prados, céspedes, claros herbosos.

SE CONFUNDE CON



Cama-sec COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso. → p. 22



Moixernó blanc de tardor COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina.

COMPRUEBE Láminas.

MORTAL ●●○ MEDIA *cogoma borda*

Farinera borda

Amanita phalloides · oronja verde · amanita mortal







E F M A M J J **A S O N** D Láminas Con anillo **Con volva** 0–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).

! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

! Láminas BLANCAS, libres.

! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos; tras una aparente mejoría, daño hepático grave a partir del segundo o tercer día, que puede requerir trasplante o causar la muerte.

DÓNDE Con encina, roble pubescente, alcornoque, castaño y haya. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

SE CONFUNDE CON



Llora verda COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.



Llora COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 5

MORTAL ●●○ MEDIA

paxil enrotllat

Paxil·le tòxic

Paxillus involutus · paxilo



Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia dentro.



Margen del sombrero muy enrollado.



Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.
! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.
! Sin látex.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

SÍNDROME HEMOLÍTICO (PAXÍLICO) Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y fallo renal.

DÓNDE Con abedul, pino silvestre, encina y castaño. Bosques variados, también parques; prefiere suelos ácidos.

SE CONFUNDE CON



Rovelló COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo. → p. 4



Pinetell COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 4

TÓXICA ●●○ MEDIA

carlet bord

Fals carlet

Entoloma sinuatum



Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.



Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa...



Adulto

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 100–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.
! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

OLOR A harina rancia.

GRAVEDAD ●●○ Grave. Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO) Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

DÓNDE Con roble pubescente, haya y castaño. Bosques de planifolios.

SE CONFUNDE CON



Carlet COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca. → p. 21



Moixernó COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera. → p. 20

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.







E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

DÓNDE **En prados y sobre madera.** Tocones y madera muerta.

SE CONFUNDE CON



Pollancró COMESTIBLE Crema, anillo membranoso, en chopos. → p. 24



Alzinoi CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

COMPRUEBE Color.


TÓXICAS ●●○ MEDIA

Pequeñas con muscarina

Inocybe geophylla y Mycena pura



Barret de bruixa: blanco, con un pico en el centro.



Mycena pura: lila, borde con rayas.



Mycena pura, entre la pinaza.

E F M A M J J **A S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

	Barret de bruixa	Mycena pura
COLOR	Blanco sedoso, a veces lila	Lila o rosado; borde con rayas
FORMA	Cónico, con pico; fibras que se agrietan	Acampanado; pie hueco y frágil
OLOR	A tierra	A rábano

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Pequeñas: de 1 a 5 cm.
! En la hojarasca de pinares, hayedos y bosques mixtos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

SE CONFUNDE CON



Pimpinella morada COMESTIBLE Mucho mayor y carnosa. → p. 19



Cama-sec COMESTIBLE Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema. → p. 22

COMPRUEBE Tamaño: la pimpinella morada es grande, carnosa y huele a fruta.