

CISTELLA SEGURA · CATALUÑA

# Setas *esenciales*

Las 79 setas que hay que conocer en Cataluña: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

47 COMESTIBLES · 9 MORTALES · 23 TÓXICAS

**Ante la duda, no la recolecte.**

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

# Sumario


**Guía** reglas, cómo mirar, índice, calendario, árboles *3*

**Comestibles** 47 especies *16*

**Confusiones** las mortales, lado a lado *63*

**Mortales** 9 especies *67*

**Tóxicas** 23 especies *76*

**Síndromes** según cuándo aparecen los síntomas *99*

**Mis hallazgos** para anotar *101*

**Glosario e índice** palabras y todos los nombres *105*

**SOS** si alguien se encuentra mal *112*


## CÓMO LEER UNA FICHA

COMESTIBLE | CONDICIONADA — Condicionada: solo bien cocinada o con reservas.

●○○ FÁCIL — Dificultad de identificación: fácil, media o difícil.

E F M A M J J A **S O N** D — Meses en que sale; en claro, solo algunos años.

Coníferas, frondosas, prados o madera.

→ p. 23 — Página de la especie con que se confunde.

**Aviso.** Ninguna guía, foto ni aplicación certifica que una seta sea comestible. Ante la duda, consulte a un micólogo con el ejemplar entero.

# Las 12 reglas

*No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.*



1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.** Conocer una especie significa saber reconocer todos sus rasgos decisivos y todas las especies peligrosas con las que se confunde.

2. **Extraiga el ejemplar entero.** La base del pie (volva, bulbo, micelio) es imprescindible para descartar amanitas mortales.

3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.** En un mismo corro pueden crecer mezcladas una comestible y una tóxica (por ejemplo, el cama-sec y los clitocibes blancos).

4. **No mezcle especies en la cesta** y lleve las dudosas aparte, envueltas en papel.

5. **Deseche los ejemplares viejos, agusanados, empapados, helados o muy jóvenes.** Los viejos se descomponen y pueden causar intoxicaciones aunque la especie sea comestible; los botones muy jóvenes aún no muestran los rasgos de identificación.

6. **Use una cesta rígida y ventilada**, nunca bolsas de plástico, que aceleran la descomposición.

7. **No crea en pruebas caseras.** El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.

8. **Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas.** Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.

9. **Ante cualquier duda, consulte a un micólogo** (sociedades micológicas y sus exposiciones), con el ejemplar entero y fresco, nunca solo con una foto.

10. **Cocine siempre las setas.** Muchas comestibles son tóxicas en crudo o poco hechas: colmenillas, pie azul, armilaria, amanita vinosa, mataparents.

11. **Guarde un ejemplar crudo** de cada especie en la nevera hasta el día siguiente: si alguien se encuentra mal, servirá para identificarla.

12. **Evite lugares contaminados**: cunetas de carreteras, zonas industriales, vertederos, campos tratados.

ANTES DEL NOMBRE

# Cómo mirar una seta

*Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.*




**1 Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

**2 Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

**3 Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

**4 Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

**5 Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

**6 Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

## QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO

**Láminas** — Hojas finas

**Tubos** — Una esponja

**Pliegues** — Venas gruesas

**Aguijones** — Púas blandas

**Interior** — Bola sin sombrero

## LA EDAD CUENTA

*Una comestible vieja o pasada también intoxica. Cójala joven y firme. (Rovelló)*




**Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE**

LO QUE EVITA LAS INTOXICACIONES GRAVES

# Tres comprobaciones

*Hágalas con cada ejemplar, también con las setas que cree conocer.*

**1** **Base del pie**

Desentierre siempre la base. Una volva en saco o un bulbo con reborde indica una amanita.

**2** **Láminas blancas + anillo + volva = descarte inmediato**

Sea cual sea el color del sombrero.

**3** **Setas pequeñas de láminas pardas o de color herrumbre, lepiotas pequeñas y setas pequeñas sobre madera**

No se recolectan para comer.

## NO SE FÍE DE

**No crea en pruebas caseras.** El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.

**Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas.** Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.

# Las comestibles

*En el orden del cuaderno: las parecidas, juntas. El número es la página.*

Rovelló 16


*Lactarius semisanguifluus* 17

Pinetell 18


Pinetell d'avet 19

Llora verda 20

Llora 21

Peu de rata de pi 22

Cep 23

Sureny fosc 24

Cep rogenc 25

Cep d'estiu 26

Molleric 27

Molleric calçat 28

Cama de perdiu 29


Rossinyol 30

Trompeta de la mort 31

Camagroc 32


Camagroc 33

Llengua de bou 34


Picornell de pi 35

Fetge de vaca 36


Orella de Judes 37


Ou de reig 38

Farinera 39

Apagallums 40

# Las comestibles

Bolet de tinta 41

Camperol 42

Bola de neu 43


Pet de llop 44

Pet de llop gegant 45

Pet de llop gros 46

Fredolic 47

Fredolic gros 48

Pimpinella morada 49

Pampa 50

Moixernó 51

Llenega negra 52


Llenega blanca 53

Carlet 54


Cama-sec 55

Círgola de panical 56

Orellana 57


Moixernó blanc de tardor 58

Pollancró 59

Múrgola 60

Múrgola 61

Tòfona negra 62

# Las de alerta

*Mortales y tóxicas: conózcalas para no recolectarlas.*

MORTAL TÓXICA NO COMESTIBLE

Paxil·le tòxic 67


Farinera borda 68

Cogomassa 69

Farinera pudent 70

Lepiota metzinosa 71

Galerina marginada 72

*Inosperma erubescens* 73

Cortinari metzinós 74

Bolet de greix 75

Enganyapastors de llet groga 76

Enganyapastors 77

Cabra de beç 78

Escaldabecs 79


Matagent 80

Fals rossinyol 81

Pota de cavall groga 82

Peu de rata bord 83

*Amanita proxima* 84

Pixacà 85

Reig bord 86

*Amanita gemmata* 87

Lepiota pudent 88

Bola de neu pudent 89

Verderol 90

Fredolic metzinós 91

Clitocibe blanc 92

Círgola d'olivera 93

*Mycena pura* 94

Fals carlet 95

Bolet de pi 96

Barret de bruixa 97


Bolet de femer 98

CUÁNDO SALIR

# Calendario

*Meses en que sale cada comestible y lo difícil que es identificarla.*

| SETA | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIFIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovelló | 16 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| *Lactarius semisanguifluus* | 17 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pinetell | 18 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pinetell d'avet | 19 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Llora verda | 20 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Llora | 21 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Peu de rata de pi | 22 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Cep | 23 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sureny fosc | 24 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Cep rogenc | 25 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Cep d'estiu | 26 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Molleric | 27 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Molleric calçat | 28 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Cama de perdiu | 29 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Rossinyol | 30 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Trompeta de la mort | 31 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Camagroc | 32 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Camagroc | 33 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Llengua de bou | 34 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Picornell de pi | 35 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Fetge de vaca | 36 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Orella de Judes | 37 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Ou de reig | 38 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Farinera | 39 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |

E F M A M J J A S O N D oscuro: temporada · claro: solo algunos años

# Calendario

| SETA | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | DIFIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apagallums | 40 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Bolet de tinta | 41 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Camperol | 42 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Bola de neu | 43 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pet de llop | 44 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pet de llop gegant | 45 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pet de llop gros | 46 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Fredolic | 47 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Fredolic gros | 48 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pimpinella morada | 49 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pampa | 50 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Moixernó | 51 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Llenega negra | 52 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Llenega blanca | 53 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Carlet | 54 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Cama-sec | 55 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Círgola de panical | 56 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Orellana | 57 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Moixernó blanc de tardor | 58 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Pollancró | 59 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Múrgola | 60 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Múrgola | 61 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Tòfona negra | 62 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |

E F M A M J J A S O N D oscuro: temporada · claro: solo algunos años

DÓNDE BUSCAR

# Árboles y sus setas

*Muchas setas viven unidas a las raíces de un árbol: reconocerlo por la hoja y el tronco es el primer paso.*

HOJA

TRONCO

## Pino carrasco

pi blanc

*Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido; tronco a menudo inclinado o tortuoso.*

**BUSQUE** Rovelló *16*, *Lactarius semisanguifluus 17*, Molleric *27*, Cama de perdiu *29*, Picornell de pi *35*, Farinera *39*, Fredolic *47*, Llenega negra *52*, Llenega blanca *53*

**CUIDADO** *Amanita proxima 84*

HOJA

TRONCO

## Pino piñonero

pi pinyer

*Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.*

**BUSQUE** Rovelló *16*, Molleric *27*, Cama de perdiu *29*, Fredolic *47*

**CUIDADO** Pota de cavall groga *82*, Verderol *90*

HOJA

TRONCO

## Pino rodeno

pinastre

*Pino alto de copa piramidal o irregular, de verde oscuro brillante.*

**BUSQUE** Rovelló *16*, Pinetell *18*, Peu de rata de pi *22*, Molleric *27*, Fredolic gros *48*

**CUIDADO** Fals rossinyol *81*, Verderol *90*

HOJA

TRONCO

## Pino laricio

pinassa

*Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.*

**BUSQUE** Rovelló *16*, *Lactarius semisanguifluus 17*, Pinetell *18*, Peu de rata de pi *22*, Molleric *27*, Molleric calçat *28*, Cama de perdiu *29*, Camagroc *32*, Fredolic *47*, Fredolic gros *48*, Llenega negra *52*, Llenega blanca *53*

**CUIDADO** *Amanita gemmata 87*

# Árboles y sus setas

HOJA


TRONCO

## Pino silvestre

pi roig

*Copa irregular y alta; la parte superior del tronco y las ramas gruesas son de color naranja asalmonado, visible de...*

**BUSQUE** Rovelló *16*, *Lactarius semisanguifluus 17*, Pinetell *18*, Peu de rata de pi *22*, Cep *23*, Cep rogenc *25*, Molleric *27*, Molleric calçat *28*, Cama de perdiu *29*, Rossinyol *30*, Camagroc *32*, Camagroc *33*, Llengua de bou *34*, Picornell de pi *35*, Fredolic *47*, Fredolic gros *48*, Llenega negra *52*, Llenega blanca *53*, Moixernó blanc de tardor *58*, Múrgola *61*

**CUIDADO** Escaldabecs *79*, Paxil·le tòxic *67*, Fals rossinyol *81*, Pixacà *85*, Reig bord *86*, *Amanita gemmata 87*, Verderol *90*, Fredolic metzinós *91*, Bolet de greix *75*

HOJA

TRONCO

## Pino negro

pi negre

*Pino de copa estrecha y oscura de la alta montaña, a menudo en el límite del bosque.*

**BUSQUE** Pinetell *18*, Cep rogenc *25*, Molleric calçat *28*

**CUIDADO** Escaldabecs *79*, Reig bord *86*, Bolet de greix *75*

HOJA

TRONCO

## Abeto blanco

avet

*Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.*

**BUSQUE** Pinetell d'avet *19*, Cep *23*, Rossinyol *30*, Camagroc *32*, Camagroc *33*, Llengua de bou *34*, Múrgola *61*

**CUIDADO** Escaldabecs *79*, Reig bord *86*, Fredolic metzinós *91*, Bolet de greix *75*

HOJA

TRONCO

## Pícea

pícea

*Conífera cónica de ramas colgantes.*

**BUSQUE** Cep *23*

# Árboles y sus setas

HOJA

TRONCO

## Encina

alzina

*Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate; en el interior a menudo en forma de mata.*

**BUSQUE** Llora verda *20*, Llora *21*, Sureny fosc *24*, Cep d'estiu *26*, Rossinyol *30*, Trompeta de la mort *31*, Llengua de bou *34*, Picornell de pi *35*, Ou de reig *38*, Farinera *39*, Carlet *54*, Tòfona negra *62*

**CUIDADO** Enganyapastors de llet groga *76*, Enganyapastors *77*, Matagent *80*, Paxil·le tòxic *67*, Pota de cavall groga *82*, Farinera borda *68*, Cogomassa *69*, *Amanita proxima* *84*, Pixacà *85*, Círgola d'olivera *93*, Cortinari metzinós *74*

HOJA

TRONCO

## Alcornoque

surera

*Árbol de copa amplia y verde grisácea; tronco con corcho grueso o, si se ha descorchado, de color rojo anaranjado.*

**BUSQUE** Llora verda *20*, Llora *21*, Sureny fosc *24*, Rossinyol *30*, Ou de reig *38*

**CUIDADO** Enganyapastors de llet groga *76*, Pota de cavall groga *82*, Farinera borda *68*, Cogomassa *69*

HOJA

TRONCO

## Roble pubescente

roure martinenc

*Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las hojas secas.*

**BUSQUE** Llora verda *20*, Llora *21*, Sureny fosc *24*, Cep d'estiu *26*, Trompeta de la mort *31*, Llengua de bou *34*, Fetge de vaca *36*, Ou de reig *38*, Farinera *39*, Carlet *54*, Moixernó blanc de tardor *58*, Tòfona negra *62*

**CUIDADO** Enganyapastors de llet groga *76*, Enganyapastors *77*, Matagent *80*, Peu de rata bord *83*, Farinera borda *68*, Cogomassa *69*, Pixacà *85*, Círgola d'olivera *93*, Fals carlet *95*, Cortinari metzinós *74*

HOJA

TRONCO

## Quejigo

roure de fulla petita

*Roble de porte modesto y copa clara, marcescente.*

**BUSQUE** Carlet *54*, Tòfona negra *62*

**CUIDADO** Enganyapastors *77*

# Árboles y sus setas

HOJA

TRONCO

## Roble albar

roure de fulla gran

*Roble alto y de tronco recto en bosques frescos de montaña.*

**BUSQUE** Llora *21*, Cep *23*, Cep d'estiu *26*, Rossinyol *30*, Trompeta de la mort *31*, Fetge de vaca *36*


HOJA

TRONCO

## Haya

faig

*Árbol alto de corteza lisa y gris; bajo su copa densa apenas crece sotobosque.*

**BUSQUE** Llora verda *20*, Llora *21*, Cep *23*, Cep rogenc *25*, Cep d'estiu *26*, Rossinyol *30*, Trompeta de la mort *31*, Camagroc *33*, Llengua de bou *34*, Orellana *57*

**CUIDADO** Matagent *80*, Peu de rata bord *83*, Farinera borda *68*, Farinera pudent *70*, Pixacà *85*, Fredolic metzinós *91*, Fals carlet *95*

HOJA

TRONCO

## Castaño

castanyer

*Árbol grande de copa amplia; a menudo en forma de rebrotes de cepa (castañares de leña).*

**BUSQUE** Llora verda *20*, Llora *21*, Cep *23*, Sureny fosc *24*, Cep rogenc *25*, Cep d'estiu *26*, Rossinyol *30*, Trompeta de la mort *31*, Llengua de bou *34*, Fetge de vaca *36*, Ou de reig *38*, Moixernó blanc de tardor *58*

**CUIDADO** Enganyapastors de llet groga *76*, Matagent *80*, Paxil·le tòxic *67*, Pota de cavall groga *82*, Peu de rata bord *83*, Farinera borda *68*, Círgola d'olivera *93*, Fals carlet *95*, Cortinari metzinós *74*

HOJA

TRONCO

## Abedul

bedoll

*Árbol esbelto de tronco blanco y ramillas colgantes.*

**BUSQUE** Llora *21*

**CUIDADO** Cabra de beç *78*, Paxil·le tòxic *67*, Farinera pudent *70*, Reig bord *86*

HOJA

TRONCO

## Chopo negro

pollancre

*Árbol alto de ribera y de plantaciones en hileras (chopos híbridos).*

**BUSQUE** Orellana *57*, Pollancró *59*

# Árboles y sus setas

HOJA

TRONCO

## Álamo blanco

àlber

*Copa blanquecina cuando el viento gira las hojas.*

**BUSQUE** Pollancró *59*

HOJA

TRONCO

## Avellano

avellaner

*Arbusto grande de muchos tallos.*

**BUSQUE** Tòfona negra *62*

HOJA

TRONCO

## Olivo

olivera

*Árbol de copa gris verdosa y tronco retorcido.*

**CUIDADO** Círgola d'olivera *93*

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *esclatasang*

# Rovelló

*Lactarius sanguifluus* · níscalo de sangre · rebollón

*Comestible muy apreciado, siempre cocinado. Sus pigmentos pueden teñir la orina de rojizo: es inocuo, pero conviene saberlo para no alarmarse.*

En su punto: sombrero naranja vinoso, con pocas zonas.

Láminas color vino (L. sanguifluus o L. vinosus).

De lado

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Látex rojo vino desde el primer instante, sin pasar por naranja (mírelo justo al cortar).
✓ Láminas rosa vinoso o lila vinoso, que se manchan de verde.
✓ Pie corto, hueco, del color del sombrero, con hoyuelos más oscuros.
✓ Siempre bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino carrasco, laricio, piñonero, silvestre y rodeno. Bordes de caminos y cortafuegos dentro del pinar, claros con hierba, taludes y zonas donde la capa de acículas es fina.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Paxil·le tòxic** MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne. → p. 67
- **Enganyapastors de llet groga** TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 76
- **Enganyapastors** TÓXICA Látex blanco inmutable y muy picante; láminas crema; no verdea; bajo planifolios. → p. 77

**COMPRUEBE** Presione las láminas y observe la mancha; corte en busca de látex.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

# *Lactarius semisanguifluus*

*Comestible, siempre cocinado; incluido en la parte A del anexo del RD 30/2009.*

E F M A M J J A **S O N** D Láminas Sin anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Látex naranja al cortar que se vuelve rojo vinoso en 5–10 minutos.
✓ Láminas naranja, que verdean.
✓ Pie hueco con escrobículas.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y carrasco. Pinares, a menudo sobre suelos calcáreos.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Enganyapastors de llet groga** TÓXICA Látex blanco que amarillea en segundos; sin verdeo; bajo planifolios. → p. 76
- **Pinetell** COMESTIBLE En el pinetell el látex sigue naranja durante bastante más tiempo. → p. 18
- **Rovelló** COMESTIBLE En el rovelló el látex es rojo vino desde el primer instante. → p. 16

**COMPRUEBE** Látex al cortar.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *rovelló d'obaga*

# Pinetell

*Lactarius deliciosus* · níscalo · mízcalo

*Comestible apreciado, siempre cocinado. Como el rovelló, puede teñir la orina de rojizo sin consecuencias.*

En su punto: naranja, con zonas bien marcadas en el sombrero.

Girelo

Los hoyuelos naranja del pie (escrobículas)...

E F M A M J J A **S** **O** **N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Látex naranja zanahoria al cortar, que no se vuelve rojo vino en los primeros minutos.
✓ Láminas naranja vivo que se manchan de verde.
✓ Pie hueco, naranja, con hoyuelos (escrobículas) más oscuros.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio, negro y rodeno. Bordes de pistas y claros con hierba o musgo dentro del pinar, taludes y vertientes umbrías; los jóvenes, medio enterrados en la pinaza.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Paxil·le tòxic** MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas fácilmente separables. → p. 67
- **Cabra de beç** TÓXICA Margen muy peludo, látex blanco y picante; bajo abedules. → p. 78
- **Enganyapastors de llet groga** TÓXICA Látex blanco que amarillea en segundos; láminas crema; nunca verdea; bajo robles y encinas. → p. 76

**COMPRUEBE** Corte la carne y las láminas: sin látex, descarte el ejemplar.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*pinetell d'avetosa*

# Pinetell d'avet

*Lactarius salmonicolor*

*Comestible, de menor calidad que el pinetell y el rovelló según la valoración tradicional.*

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Crece exclusivamente bajo abetos (Abies alba).
✓ Látex naranja que no vira a rojo vino.
✓ Pie con escrobículas, hueco.

**DÓNDE** Con abeto blanco. Abetales puros o mixtos con haya y pino silvestre.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Cabra de beç** TÓXICA Margen lanoso, látex blanco; bajo abedul. → p. 78
- **Pinetell** COMESTIBLE Bajo pinos y con manchas verdes abundantes. → p. 18

**COMPRUEBE** Margen y látex.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA



# Llora verde

*Russula virescens* · gorro verde · seta del cura

*La confusión que hay que descartar es con la farinera borda, de sombrero también verde.*

En su punto: sombrero verde que se agrieta en mosaico.

Debajo

Joven: sombrero redondeado, verde pálido y firme.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Cutícula verde agrietada en pequeñas placas (aspecto de mosaico o de piel de lagarto), seca y mate.
- ✓ Láminas blancas o crema; sin anillo y SIN volva: desentierre la base completa para comprobarlo.
- ✓ Carne blanca, firme, quebradiza como la tiza.
- ✓ Pie blanco, cilíndrico, sin bulbo envuelto en saco.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente, castaño y haya. Bordes de caminos y claros de robledales, castañares y alcornocales, a menudo en suelo con poca hojarasca.

## NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL La farinera borda tiene anillo en el pie y una volva membranosa en la base, a menudo enterrada; su sombrero es liso, satinado, con fibras radiales, no agrietado en… → p. 68
- **Llora** COMESTIBLE La carbonera tiene la cutícula lisa y brillante y láminas flexibles y grasas al tacto. → p. 21
- ***Russula heterophylla* / *R. aeruginea*** DESCONOCIDA Cutícula lisa, no agrietada.

**COMPRUEBE** Base del pie (desentiérrela) y parte alta del pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA



# Llora

*Russula cyanoxantha* · carbonera

*Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).*

Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.

Carbonera (R. cyanoxantha)

E F M A M **J J A S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).
- ✓ Sin anillo ni volva.
- ✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

**DÓNDE** Con haya, castaño, encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 68
- ***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.
- **Cualbra morada** NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante.

**COMPRUEBE** Base del pie (desentiérrela) y anillo.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *greixa*

# Peu de rata de pi

*Sparassis crispa* · seta coliflor · barba de cabra

*Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.*

E F M A M J J A **S O N** D

Ramificado Sin anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.

✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.

✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y rodeno. Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Peu de rata bord** TÓXICA Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios. → p. 83
- **Peu de rata col-i-flor** CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

**COMPRUEBE** Forma de las ramas.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *sureny*

# Cep

*Boletus edulis* · boleto · hongo blanco

***Deseche los ejemplares viejos, blandos o con los tubos verdes y esponjosos, que se degradan con rapidez.***

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.

Jóvenes, redondos como tapones de corcho

Ceps recolectados en la cesta de mimbre.

E F M A M J J **A S O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
- ✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
- ✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

**DÓNDE** Con haya, castaño, roble albar, pino silvestre y abeto blanco y otros. Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Matagent** TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente. → p. 80
- **Molleric amarg** NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.
- **Mataparent amarg** NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

**COMPRUEBE** Poros y pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*cep negre*

# Sureny fosc

*Boletus aereus* · boleto negro · hongo negro

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*

Joven: poros blancos, como algodón; carne firme.

Adulto

Pie grueso con un retículo fino de color claro.

E F M A M **J** **J** **A** **S** **O** **N** D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero pardo muy oscuro, casi negro, seco y aterciopelado, a veces con tonos bronce.

✓ Poros blancos y luego amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

✓ Pie robusto, pardo, con retículo pardo.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bordes de camino y claros soleados de encinares y castañares, a menudo en laderas orientadas al sur tras lluvias de verano.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Matagent** TÓXICA Sombrero blanquecino, poros rojos, pie con retículo rojo. → p. 80
- **Mataparent de cama roja** CONDICIONADA Poros rojos y carne amarilla que azulea al instante.
- **Cep** COMESTIBLE Sombrero más claro y algo graso; más de montaña. → p. 23

**COMPRUEBE** Poros y pie.

# Cep rogenc

*Boletus pinophilus* · boleto pinícola

*pinophilus o B. pinicola).*

Sureny fosc (B. aereus): sombrero casi negro. También excelente.



Viejo

E F M A **M** **J** J A **S** **O** N D · Tubos · Sin anillo · Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero pardo rojizo, granate o caoba.

✓ Poros blancos, luego amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

✓ Pie robusto, teñido de pardo rojizo, con retículo.

**DÓNDE** Con pino silvestre, negro, haya y castaño. Claros y bordes de pinares de montaña, entre arándanos y brezos.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Mataparent de cama roja** CONDICIONADA Poros rojos; carne amarilla que azulea al instante.
- **Cep** COMESTIBLE Sombrero pardo claro; pie blanquecino. → p. 23

**COMPRUEBE** Poros y corte.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *rourenc d'estiu*

# Cep d'estiu

*Boletus reticulatus* · boleto reticulado · boleto estival

*Muy atacado por larvas en verano.*

E F M A **M** **J** **J** **A** **S** O N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero pardo claro, seco, finamente aterciopelado, que se agrieta en tiempo seco.

✓ Retículo marcado que recorre el pie hasta casi la base.

✓ Poros blancos, después amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

**DÓNDE** Con roble pubescente, albar, castaño, haya y encina. Bordes soleados de robledales y castañares, claros con hierba.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Matagent** TÓXICA Poros rojos y pie rojo. → p. 80
- **Molleric amarg** NO COMESTIBLE Poros rosados y retículo oscuro; sabor muy amargo.
- **Cep** COMESTIBLE Sombrero algo graso, retículo limitado a la parte alta del pie. → p. 23

**COMPRUEBE** Poros.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*molleric granellut*

# Molleric

*Suillus granulatus* · boleto granulado

*Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).*

En su punto: sombrero pardo brillante, pie amarillento, en grupo bajo pinos.

Poros amarillos con gotitas blancas

Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

E F M A **M** J J A **S** **O** **N** D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino carrasco, silvestre, laricio, piñonero y rodeno. Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Molleric pebrer** NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.
- **Molleric** COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.
- **Molleric calçat** COMESTIBLE Anillo membranoso grande en el pie. → p. 28

**COMPRUEBE** Color de los poros.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*pinetell de calceta*

# Molleric calçat

*Suillus luteus* · boleto anillado · babosillo

*Retire la cutícula viscosa, laxante para algunas personas.*

Molleric calçat (*S. luteus*)

E F M A M J J A **S O N** D · Tubos · Con anillo · Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Anillo membranoso amplio en el pie, blanquecino o violáceo por debajo.
✓ Sombrero pardo chocolate muy viscoso.
✓ Poros pequeños, amarillos.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y negro. Bordes de pista y claros herbosos en pinares jóvenes.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Molleric** COMESTIBLE Sin anillo. → p. 27
- ***Suillus grevillei*** COMESTIBLE Sombrero amarillo anaranjado; exclusivo de alerces (plantados).

**COMPRUEBE** Pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*pota de perdiu*

# Cama de perdiu

*Chroogomphus rutilus*

*Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.*

En su punto: sombrero rojizo y láminas ocre que bajan por el pie.

Debajo

Carne y pie de color naranja salmón.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero. Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Cortinari metzinós** MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 74
- **Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca. → p. 81
- **Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

**COMPRUEBE** Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *vaqueta*

# Rossinyol

*Cantharellus cibarius* · rebozuelo · cabrito

*subpruinosus).*

En su punto: todo amarillo yema, carnoso, con el margen ondulado.

Debajo

De cerca

E F M A M **J J A S O N** D Pliegues Sin anillo Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, castaño, haya y roble albar y otros. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Cortinari metzinós** MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 74
- **Círgola d'olivera** TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 93
- **Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda. → p. 81

**COMPRUEBE** Parte inferior.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *trompeta*

# Trompeta de la mort

*Craterellus cornucopioides* · trompeta de los muertos · trompeta negra

*Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto: negras, firmes y en grupo.

Mire por dentro

Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

E F M A M J J A **S O N D** Liso Sin anillo Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.

✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).

✓ Carne delgada y elástica.

**DÓNDE** Con haya, encina, castaño, roble pubescente y albar. Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

## NO LA CONFUNDA CON

- **Orella de gat negra** CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.
- ***Craterellus cinereus*** COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

**COMPRUEBE** Forma general.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*rossinyol de pi*

# Camagroc

*Craterellus lutescens* · angula de monte · trompeta amarilla

*Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).*

En su punto: pies amarillos y sombreros pardos, en grupo entre el musgo.

Debajo no hay láminas

Pie amarillo y hueco.

E F M A M J J A S **O N D** Liso Sin anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.

✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.

✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y abeto blanco. Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo. → p. 81
- **Camagroc** COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado. → p. 33

**COMPRUEBE** Parte inferior y pie.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *rossinyolic embudat*

# Camagroc

*Craterellus tubaeformis*

*Comestible (buena según la SCM; parte A del RD 30/2009 como Cantharellus tubaeformis).*

E F M A M J J A **S O N** D Pliegues Sin anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Pie hueco, amarillo pardusco o grisáceo.
✓ Pliegues bien marcados, bifurcados, gris amarillentos a gris lila.
✓ Sombrero en embudo pardo.

**DÓNDE** Con abeto blanco, pino silvestre y haya. Bosques húmedos de montaña sobre suelo ácido, entre musgo y madera muy descompuesta.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Camagroc** COMESTIBLE Parte inferior casi lisa y rosado anaranjada; pie naranja vivo. → p. 32

**COMPRUEBE** Parte inferior.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *llémena*

# Llengua de bou

*Hydnum repandum* · lengua de vaca · gamuza

*Los ejemplares viejos amargan.*

En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.

Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.

Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).

✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.

✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

**DÓNDE** Con encina, haya, castaño, pino silvestre y abeto blanco y otros. Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

### NO LA CONFUNDA CON

- ***Hydnellum* / *Sarcodon*** NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.
- **Picornell de pi** COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie. → p. 35

**COMPRUEBE** Consistencia de la carne.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*llengua de bou rogenca*

# Picornell de pi

*Hydnum rufescens*

*Comestible (parte A del anexo del RD 30/2009).*

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Aguijones bajo el sombrero, que no descienden por el pie.

✓ Sombrero naranja rojizo, más pequeño que el de la llengua de bou.

✓ Pie central y esbelto.

**DÓNDE** Con pino silvestre, carrasco y encina. Pinares y bosques mixtos.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Llengua de bou** COMESTIBLE Más grande y pálido, aguijones algo decurrentes. → p. 34

**COMPRUEBE** Tamaño y aguijones.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Fetge de vaca

*Fistulina hepatica* · hígado de buey · lengua de buey

*Sabor ácido; se consume joven.*

E F M A M J J **A S O N** D  Tubos  Sin anillo  Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Repisa en forma de lengua o hígado, rojo sangre, sobre troncos de robles o castaños.

✓ Por debajo, tubos crema que se separan unos de otros.

✓ Carne roja jaspeada como la carne cruda, que suelta jugo rojizo.

**DÓNDE** Con castaño, roble pubescente y albar. Troncos y base de castaños y robles viejos.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Círgola groga** CONDICIONADA Amarillo anaranjado, en grupos superpuestos.

**COMPRUEBE** Color.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*orella de saüquer*

# Orella de Judes

*Auricularia auricula-judae* · oreja de Judas

*Comestible (aceptable para la SCM), de textura cartilaginosa.*

E F M A M J J A S O N D

Gelatinoso Sin anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Cuerpo gelatinoso, elástico, en forma de oreja, pardo rojizo.
✓ Crece sobre ramas y troncos, sobre todo de saúco.
✓ Cara externa aterciopelada, interna lisa o con venas.

**DÓNDE** Saúcos, sauces, robles y otros planifolios, en lugares húmedos.

**NO LA CONFUNDA CON**

- ***Exidia y otras gelatinosas*** SIN_INTERES Formas de cerebro o costra, negras o ámbar, sin forma de oreja.
- ***Peziza (copas pardas en el suelo)*** TÓXICA Crecen en el suelo, son quebradizas, no elásticas.

**COMPRUEBE** Forma.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA



# Ou de reig

*Amanita caesarea* · oronja · amanita de los césares

***Comestible excelente. Los «huevos» cerrados no deben recolectarse: en ese estado se confunden con los de la farinera borda y otras amanitas mortales.***

Huevo abierto: por dentro, láminas AMARILLAS y sombrero naranja.

Volva blanca grande como un saco, y láminas…

Láminas y pie amarillos. Si fueran blancos, no…

E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D  Láminas  Con anillo  **Con volva**

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).

✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.

✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.

✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

## NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 68
- **Reig bord** TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 86
- ***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal del huevo.

CONDICIONADA ●●● DIFÍCIL

*cogomassa farinera*

# Farinera

*Amanita ovoidea*

*verna, formas blancas de A. phalloides). Solo un micólogo experimentado puede separarlas con seguridad.*

Grande, toda blanca, con una volva blanca y gruesa.

Láminas crema y pie harinoso.

Margen del sombrero con restos harinosos colgantes.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Con anillo **Con volva**

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Seta grande, enteramente blanca o crema, con restos harinosos en el margen y en el pie.

✓ Volva gruesa, membranosa, blanca con tonos ocre amarillentos.

✓ Anillo cremoso y frágil que se deshace pronto (a menudo no se ve).

✓ Láminas blancas a crema.

**DÓNDE** Con encina, pino carrasco y roble pubescente. Bordes de camino y claros en terreno calizo.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Cogomassa** MORTAL Más pequeña y esbelta, sin restos harinosos, anillo membranoso persistente; frecuente en primavera. → p. 69
- **Farinera borda** MORTAL Sombrero satinado con fibras radiales; anillo membranoso persistente. → p. 68
- ***Amanita proxima*** TÓXICA A. → p. 84

**COMPRUEBE** Tamaño, superficie y anillo.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *cogomella*

# Apagallums

*Macrolepiota procera* · parasol · galamperna

*Deseche el pie, fibroso.*

En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.

Pie con dibujo de piel de serpiente

Debajo

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.

✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).

✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.

✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

**DÓNDE** Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

## NO LA CONFUNDA CON

- **Lepiota metzinosa** MORTAL Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado. → p. 71
- **Pixacà** TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso. → p. 85
- **Apagallums** CONDICIONADA Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

**COMPRUEBE** Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Bolet de tinta

*Coprinus comatus* · barbuda · matacandil

*Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.*

Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado: el momento de recolectarlo.

Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por...

Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).

✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.

✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

**DÓNDE** Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Bolet de femer** TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada. → p. 98
- **Coprí garsa** NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

**COMPRUEBE** Color y superficie del sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Camperol

*Agaricus campestris* · champiñón silvestre · seta de campo

***Los Agaricus acumulan metales pesados: evite los de cunetas y zonas contaminadas y no los consuma en grandes cantidades de forma habitual.***

En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.

Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un...



Córelo siempre

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
- ✓ Sin volva en la base.
- ✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
- ✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

**DÓNDE** Pastos con ganado, prados de siega.

## NO LA CONFUNDA CON

- **Cogomassa** MORTAL Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 69
- **Bola de neu pudent** TÓXICA Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol. → p. 89
- **Fals carlet** TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques. → p. 95

**COMPRUEBE** Láminas y base.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Bola de neu

*Agaricus arvensis* · bola de nieve

***Comestible bueno (SCM). Mismas precauciones sobre metales pesados que el camperol.***

Sombreros blancos y láminas rosa grisáceo.

Láminas rosa grisáceo; nunca blancas en un ejemplar...

Anillo grande con una «rueda dentada» en la cara...

E F M A M **J J A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Olor a anís o almendra amarga.
- ✓ Láminas gris rosadas que pasan a pardas (nunca blancas).
- ✓ Anillo grande y doble, con la cara inferior en forma de rueda dentada.
- ✓ Amarillea ligeramente al frotarlo, pero la carne de la base del pie NO se vuelve amarillo cromo.

**DÓNDE** Prados y bordes de bosque.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL Láminas blancas y volva. → p. 68
- **Farinera pudent** MORTAL Láminas blancas y volva. → p. 70
- **Bola de neu pudent** TÓXICA Amarillo cromo inmediato en la base cortada; olor a fenol o tinta, nunca a anís. → p. 89

**COMPRUEBE** Láminas y base.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Pet de llop

*Lycoperdon perlatum* · pedo de lobo · bejín

*Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.*

Joven, blanco y lleno de verrugas: el momento de recolectarlo.

De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden.

Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

E F M A M J J **A S O N D** Interior Sin anillo Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.

✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

**DÓNDE** Bosques de todo tipo y sus bordes.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie). → p. 68
- **Pota de cavall groga** TÓXICA Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa. → p. 82

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Pet de llop gegant

*Calvatia gigantea* · bejín gigante

*Comestible joven con el interior blanco puro (acceptable para la SCM, como Langermannia gigantea).*

Joven y blanco en medio del prado: el momento de recolectarlo.

Con la mano al lado: puede superar los 30 cm.

Cortado

E F M A **M** **J** **J** **A** **S** **O** N D

Interior · Sin anillo · Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Bola blanca enorme (10–50 cm), de piel lisa como el cuero.

✓ Interior blanco puro, compacto y uniforme en los jóvenes (córtelo entero).

**DÓNDE** Prados ricos en nitrógeno, huertos, bordes de bosque y de río.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Farinera borda** MORTAL El huevo de amanita es mucho menor y al cortarlo muestra la silueta de una seta. → p. 68
- **Pota de cavall groga** TÓXICA Interior negro; piel gruesa amarilla escamosa; tamaño mucho menor. → p. 82

**COMPRUEBE** Corte.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*pet de llop de prat*

# Pet de llop gros

*Bovistella utriformis*

*Comestible joven con el interior blanco (acceptable para la SCM, como Calvatia utriformis).*

Joven: blanco, con la piel que empieza a formar placas.

Cortado

De cerca

E F M A **M J J A S O** N D — Interior — Sin anillo — Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Cuerpo en forma de peonza (6–15 cm), con la piel dividida en placas o verrugas piramidales.

✓ Interior blanco y compacto en los jóvenes; base estéril esponjosa.

**DÓNDE** Pastos de montaña y prados secos.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Pota de cavall groga** TÓXICA Interior negro. → p. 82

**COMPRUEBE** Corte.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL *negret*

# Fredolic

*Tricholoma terreum* · negrilla · ratón

*) con material italiano no encontró esos compuestos y concluye que debe considerarse comestible.*

En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.

Debajo

Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.
- ✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
- ✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
- ✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

**DÓNDE** Con pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero. Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Fredolic metzinós** TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas como un dibujo de tigre; olor a harina; láminas con reflejos verde amarillentos. → p. 91
- ***Tricholoma virgatum* / *T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo; carne amarga o picante; láminas con arista punteada de negro en T.
- ***Inocybe* (varias especies grises)** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada parda), olor espermático o terroso.

**COMPRUEBE** Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

# Fredolic gros

*Tricholoma portentosum* · capuchina

*Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009).*

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Sombrero gris oscuro con fibras radiales negras, a menudo con tonos violáceos o amarillentos, algo viscoso.
- ✓ Láminas blancas con reflejos amarillo limón, escotadas.
- ✓ Pie blanco con tonos amarillentos; sin anillo.
- ✓ Olor a harina.

**DÓNDE** Con pino silvestre, rodeno y laricio. Pinares, a menudo con brezo o musgo.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Fredolic metzinós** TÓXICA Sombrero con escamas oscuras sobre fondo claro, no fibras radiales lisas. → p. 91
- ***Tricholoma virgatum* / *T. sciodes*** TÓXICA Sabor amargo o picante, mamelón agudo, sin tonos amarillos en láminas.
- **Verderol** TÓXICA Sombrero amarillo verdoso, láminas amarillo azufre intenso. → p. 90

**COMPRUEBE** Superficie del sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Pimpinella morada

*Lepista nuda* · pie azul

*Comestible, siempre bien cocinado: en crudo o poco hecho provoca trastornos digestivos (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.

Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.

De cerca: láminas y pie violetas.

E F M A M J J A S O N D — Láminas · Sin anillo · Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
✓ Sin cortina ni anillo.
✓ Olor afrutado o perfumado.

**DÓNDE** Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

## NO LA CONFUNDA CON

- ***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus…)*** TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.
- **Barret de bruixa** TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas. → p. 97
- ***Mycena pura*** TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano. → p. 94

**COMPRUEBE** Esporada y parte alta del pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Pampa

*Infundibulicybe geotropa* · platera · cabeza de fraile

*Comestible bueno, sobre todo joven; el pie es fibroso (parte A del anexo del RD 30/2009 como Clitocybe geotropa).*

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero crema ocráceo en embudo con un mamelón central marcado.
✓ Láminas decurrentes, apretadas, crema.
✓ Pie alto, grueso y fibroso, del color del sombrero.
✓ Seta grande que crece en corros amplios.

**DÓNDE** Claros y bordes herbosos: los corros se ven a distancia.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Paxil·le tòxic** MORTAL Se mancha de pardo y las láminas son ocre amarillentas. → p. 67
- **Pardilla** TÓXICA Sombrero gris ceniza sin mamelón y olor dulzón fuerte.
- **Clitocibe blanc** TÓXICA Pequeño (2–5 cm), blanco pruinoso, sin mamelón. → p. 92

**COMPRUEBE** Manchas al tacto.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*bolet de Sant Jordi*

# Moixernó

*Calocybe gambosa* · perrechico · seta de San Jorge

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*

E F M **A** **M** **J** J A S **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

**DÓNDE** Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

## NO LA CONFUNDA CON

- ***Inosperma erubescens*** MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 73
- **Cogomassa** MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 69
- **Fals carlet** TÓXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 95

**COMPRUEBE** Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA



# Llenega negra

*Hygrophorus latitabundus* · babosa negra

*latitabundus o H. limacinus). Retire el mucílago al limpiarla.*

En su punto: sombrero pardo oliva, brillante y viscoso.

Láminas blancas y pie blanco con puntitos.

Joven

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.

✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.

✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.

✓ Esporada blanca.

**DÓNDE** Con pino carrasco, laricio y silvestre. Pinaza de pinares calizos; los sombreros viscosos quedan cubiertos de agujas pegadas.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Llenega borda** NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.
- **Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE Láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo intenso.
- **Llenega blanca** COMESTIBLE Sombrero blanco crema. → p. 53

**COMPRUEBE** Color de las láminas maduras y esporada.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Llenega blanca

*Hygrophorus gliocyclus*

*Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009).*

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Con anillo Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero blanco crema a amarillento pálido, muy viscoso.
✓ Láminas crema, céreas, espaciadas, decurrentes.
✓ Pie con un anillo mucoso y la parte inferior viscosa.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y carrasco. Pinares calizos.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Llenega negra** COMESTIBLE Sombrero oscuro. → p. 52
- **Mocosa blanca tacada** SIN_INTERES Gránulos dorados en el margen y el pie; poco viscoso.

**COMPRUEBE** Color.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Carlet

*Hygrophorus russula*

*Puede amargar ligeramente.*

En su punto: sombreros rosados con salpicaduras vinosas, firmes.



Debajo

Láminas algo decurrentes y pie blanco manchado.

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.
✓ Bajo encinas y robles.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y quejigo. Hojarasca de encinares calizos.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Fals carlet** TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia. → p. 95
- **Cualbra morada** NO COMESTIBLE Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos.

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *carrereta*

# Cama-sec

*Marasmius oreades* · senderuela · carrerilla

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.*

En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.

La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.

Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
- ✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
- ✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
- ✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

**DÓNDE** Corros de hierba más verde o más seca en prados.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Lepiota metzinosa** MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 71
- **Clitocibe blanc** TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 92
- ***Inocybe (especies de prado)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

**COMPRUEBE** Sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Gírgola de panical

*Pleurotus eryngii* · seta de cardo

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y láminas que bajan por el pie.

Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.

Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.

✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

**DÓNDE** Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Clitocibe blanc** TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 92
- **Fals carlet** TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 95

**COMPRUEBE** Color y base.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *gírgola*

# Orellana

*Pleurotus ostreatus* · seta de ostra · orellana

*Prefiera ejemplares jóvenes.*

Orellanas jóvenes saliendo de la corteza.

Orellana: en repisas sobre troncos cortados.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Repisas en grupos superpuestos sobre madera de planifolios (chopos, hayas, robles).
✓ Láminas blancas, decurrentes, que llegan hasta un pie lateral corto o inexistente.
✓ Sombrero en forma de concha, gris azulado a pardo.

**DÓNDE** Con chopo negro y haya. Troncos de planifolios, sobre todo en riberas.

**NO LA CONFUNDA CON**

- ***Pleurocybella porrigens*** TÓXICA Blanca pura, delgada, sobre madera de coníferas.
- **Círgola d'olivera** TÓXICA Naranja intenso. → p. 93

**COMPRUEBE** Color, grosor y madera.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

# Moixernó blanc de tardor

*Clitopilus prunulus* · molinera

*Comestible muy bueno según la SCM, pero de identificación delicada: se confunde con los clitocibes blancos tóxicos.*

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas decurrentes que pasan de blancas a ROSADAS al madurar.
✓ Esporada rosada (déjela sobre papel unas horas): si es blanca, deséchela.
✓ Olor intenso a harina fresca.
✓ Sombrero blanco grisáceo con tacto de piel de guante (gamuza).

**DÓNDE** Con castaño, roble pubescente y pino silvestre. Bosques claros y bordes, a menudo cerca de boletos.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Clitocibe blanc** TÓXICA Láminas que siguen blancas o crema, esporada blanca, sin olor a harina intenso; en prados. → p. 92
- ***Clitocybe phyllophila*** TÓXICA Esporada blanca rosada pálida, sombrero con pruina blanca; olor débil, no harinoso.

**COMPRUEBE** Esporada y olor.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Pollancró

*Cyclocybe cylindracea* · seta de chopo

*Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).*

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

**DÓNDE** Con chopo negro y álamo blanco. Riberas, choperas y parques.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Galerina marginada** MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos. → p. 72
- **Bolet de pi** TÓXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo. → p. 96

**COMPRUEBE** Tamaño y árbol.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA *rabassola*

# Múrgola

*Morchella esculenta* · colmenilla · cagarria

***Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.***

E F **M A M** J J A S O N D  Alvéolos  Sin anillo  Sin volva

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.

✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.

✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

**DÓNDE** Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

## NO LA CONFUNDA CON

- **Bolet de greix** MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. → p. 75
- ***Verpa bohemica*** TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.
- **Múrgola** CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica. → p. 61

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA *arigany*

# Múrgola

*Morchella elata* · colmenilla negra

*Como la colmenilla amarilla: solo bien cocinada (tóxica en crudo) y con moderación.*

E F M **A** **M** **J** J A S O N D · Alvéolos · Sin anillo · Sin volva

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero cónico con costillas longitudinales oscuras, más oscuras que los alvéolos.
✓ Completamente hueca en una sola cavidad (córtela).
✓ Sombrero unido al pie por su borde.

**DÓNDE** Con abeto blanco y pino silvestre. Bosques de coníferas de montaña, zonas quemadas el año anterior, jardines con corteza triturada.

**NO LA CONFUNDA CON**

- **Bolet de greix** MORTAL Sombrero cerebriforme y varias cavidades internas. → p. 75
- **Múrgola** CONDICIONADA Costillas claras, alvéolos irregulares. → p. 60

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Tòfona negra

*Tuber melanosporum* · trufa negra

*Solo madura tiene aroma y valor.*

E F **M** A M J J A S O N **D** · Tubérculo · Sin anillo · Sin volva

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Hongo subterráneo en forma de tubérculo de 2–8 cm.
✓ Piel negra con pequeñas verrugas piramidales.
✓ Interior negro violáceo con finas venas blancas al madurar.
✓ Aroma intenso característico.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente, quejigo y avellano. En los «quemados»: círculos de suelo casi sin hierba alrededor de árboles productores.

### NO LA CONFUNDA CON

- **Pota de cavall groga** TÓXICA Superficial, piel amarilla gruesa, olor desagradable. → p. 82
- **Magenca** COMESTIBLE Interior gris con venas blancas más gruesas y espaciadas; olor diferente.

**COMPRUEBE** Piel y lugar.

# Las confusiones mortales

*A la izquierda, la comestible; a la derecha, la mortal con la que se confunde. Apréndase la diferencia antes de salir.*

**Rovelló** *16* o **Paxil·le tòxic** *67*

Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne.

**MÍRELO:** Presione las láminas y observe la mancha; corte en busca de látex.




**Pinetell** *18* o **Paxil·le tòxic** *67*

Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas fácilmente separables.

**MÍRELO:** Corte la carne y las láminas: sin látex, descarte el ejemplar.




**Pampa** *50* o **Paxil·le tòxic** *67*

Se mancha de pardo y las láminas son ocre amarillentas.

**MÍRELO:** Manchas al tacto.

**Llora verda** *20* o **Farinera borda** *68*

La farinera borda tiene anillo en el pie y una volva membranosa en la base, a menudo enterrada; su sombrero es liso, satinado, con fibras radiales, no agrietado en mosaico.

**MÍRELO:** Base del pie (desentiérrela) y parte alta del pie.

**Llora** *21* o **Farinera borda** *68*

Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles.

**MÍRELO:** Base del pie (desentiérrela) y anillo.

**Ou de reig** *38* o **Farinera borda** *68*

Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas.

**MÍRELO:** Corte longitudinal del huevo.

# Las confusiones mortales

**Farinera** *39* o **Farinera borda** *68*

Sombrero satinado con fibras radiales; anillo membranoso persistente.

**MÍRELO:** Sombrero y anillo.

**Bola de neu** *43* o **Farinera borda** *68*

Láminas blancas y volva.

**MÍRELO:** Láminas y base.

**Pet de llop** *44* o **Farinera borda** *68*

Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie).

**MÍRELO:** Corte longitudinal.

**Pet de llop gegant** *45* o **Farinera borda** *68*

El huevo de amanita es mucho menor y al cortarlo muestra la silueta de una seta.

**MÍRELO:** Corte.

**Farinera** *39* o **Cogomassa** *69*

Más pequeña y esbelta, sin restos harinosos, anillo membranoso persistente; frecuente en primavera.

**MÍRELO:** Tamaño, superficie y anillo.




**Camperol** *42* o **Cogomassa** *69*

Láminas siempre blancas y volva en saco.

**MÍRELO:** Láminas y base.




**Moixernó** *51* o **Cogomassa** *69*

Anillo y volva en saco; láminas libres.

**MÍRELO:** Base del pie.

# Las confusiones mortales

**Bola de neu** *43* o **Farinera pudent** *70*

Láminas blancas y volva.

**MÍRELO:** Láminas y base.

**Apagallums** *40* o **Lepiota metzinosa** *71*

Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado.

**MÍRELO:** Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

**Cama-sec** *55* o **Lepiota metzinosa** *71*

Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas.

**MÍRELO:** Sombrero.




**Pollancró** *59* o **Galerina marginada** *72*

Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos.

**MÍRELO:** Tamaño y árbol.

**Moixernó** *51* o ***Inosperma erubescens*** *73*

Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina.

**MÍRELO:** Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

**Cama de perdiu** *29* o **Cortinari metzinós** *74*

Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido.

**MÍRELO:** Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

**Rossinyol** *30* o **Cortinari metzinós** *74*

Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

**MÍRELO:** Parte inferior.

# Las confusiones mortales

## Múrgola *60* o Bolet de greix *75*

Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco.

**MÍRELO:** Corte longitudinal.

## Múrgola *61* o Bolet de greix *75*

Sombrero cerebriforme y varias cavidades internas.

**MÍRELO:** Corte longitudinal.

# Paxil·le tòxic

*Paxillus involutus* · paxilo

*Potencialmente mortal.*

Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia dentro.

Margen del sombrero muy enrollado.

Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

## RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.

! Sin látex.

**SÍNDROME HEMOLÍTICO (PAXÍLICO)** Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y fallo renal.

**DÓNDE** Con abedul, pino silvestre, encina y castaño. Bosques variados, también parques; prefiere suelos ácidos.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo. → p. 16

≈ **Pinetell** COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 18

≈ **Pampa** COMESTIBLE La pampa es crema ocrácea con mamelón y no se mancha de pardo. → p. 50

**COMPRUEBE** **Corte: látex o no.**

MORTAL ●●○ MEDIA

*cogoma borda*

# Farinera borda

*Amanita phalloides* · oronja verde · amanita mortal

Adulta: sombrero verde oliva, anillo como una falda y volva en la base.

Debajo: láminas BLANCAS y anillo colgante.

Láminas blancas y base con volva

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

## RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).

! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

! Láminas BLANCAS, libres.

! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos; tras una aparente mejoría, daño hepático grave a partir del segundo o tercer día, que puede requerir trasplante o causar la muerte.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente, alcornoque, castaño y haya. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

## SE CONFUNDE CON

≈ **Llora verde** COMESTIBLE La llora verde no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico. → p. 20

≈ **Llora** COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 21

≈ **Bola de neu** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva. → p. 43

**COMPRUEBE** **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

# Cogomassa

*Amanita verna*

*Mortal, con las mismas toxinas que la farinera borda. Sale en primavera, cuando se busca el moixernó, y también en otoño.*

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D  Láminas  Con anillo  **Con volva**

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Seta enteramente blanca.
- ! Volva blanca en saco en la base.
- ! Anillo membranoso blanco.
- ! Láminas blancas, libres.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y alcornoque. Encinares y robledales mediterráneos.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Moixernó** COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina. → p. 51
- ≈ **Camperol** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 42
- ≈ **Farinera** CONDICIONADA Mayor, harinosa, de otoño en caliza. → p. 39

**COMPRUEBE** **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

# Farinera pudent

*Amanita virosa*

*Mortal (amatoxinas).*

Toda blanca, con anillo y volva.

Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría...

Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
- ! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
- ! Volva blanca en saco.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

**DÓNDE** Con haya y abedul. Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Bola de neu** COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva. → p. 43

**COMPRUEBE** **Láminas y base.**

MORTAL ●●○ MEDIA

*palometa*

# Lepiota metzinosa

*Lepiota brunneoincarnata*

*Mortal: contiene amatoxinas como la farinera borda. Las lepiotas pequeñas son responsables de intoxicaciones graves en Cataluña.*

Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.

Pie rosado con bandas y láminas blancas.

Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el...

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

## RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.

! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.

! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.

! Láminas blancas, libres.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**DÓNDE** Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

## SE CONFUNDE CON

≈ **Apagallums** COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado. → p. 40

≈ **Cama-sec** COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas. → p. 55

≈ **Camperol** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas. → p. 42

**COMPRUEBE** **Tamaño, anillo y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

*galerina metzinosa*

# Galerina marginada

*Galerina marginata*

*Mortal: contiene amatoxinas como la farinera borda. ).*

Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.

Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...

Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Con anillo Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.

! Anillo fino pardo en el pie.

! Esporada pardo herrumbre.

! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**DÓNDE** Madera muerta de coníferas y planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Pollancró** COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 59

≈ ***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

≈ **Alzinoi** CONDICIONADA Mayor, escamas oscuras, esporada blanca.

**COMPRUEBE** **Tamaño y árbol.**

MORTAL ●●○ MEDIA

# *Inosperma erubescens*

*Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina. ).*

Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.

Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).

E F M A **M** **J** **J** A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
- ! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
- ! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

**SÍNDROME MUSCARÍNICO (GRAVE)** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión; puede ser mortal sin tratamiento.

**DÓNDE** Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Moixernó** COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 51

**COMPRUEBE** **Sombrero, manchas rojas y olor.**

MORTAL ●●○ MEDIA

*bolet de mantellina*

# Cortinari metzinós

*Cortinarius orellanus*

*Mortal: la orellanina destruye el riñón de forma tardía e irreversible. ).*

Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.

Láminas color herrumbre, espaciadas.

Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
- ! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
- ! Esporada pardo herrumbre.
- ! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

**SÍNDROME ORELLÁNICO (NEFROTÓXICO TARDÍO)** Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida; insuficiencia renal que puede requerir diálisis o trasplante.

**DÓNDE** Con roble pubescente, castaño y encina. Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas. → p. 30
- ≈ **Camagroc** COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas. → p. 33
- ≈ **Cama de perdiu** COMESTIBLE Láminas decurrentes y esporada negra; bajo pinos. → p. 29

**COMPRUEBE** **Parte inferior.**

MORTAL ●○○ FÁCIL *murga*

# Bolet de greix

*Gyromitra esculenta* · falsa colmenilla · bonete

*Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).*

E F M **A** **M** **J** J A S O N D · Liso · Sin anillo · Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

**SÍNDROME GIROMITRIANO (CONVULSIVO Y HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

**DÓNDE** Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. Coníferas de montaña.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Múrgola** CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 60

≈ **Múrgola** CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco. → p. 61

**COMPRUEBE** **Corte longitudinal.**

TÓXICA ●○○ FÁCIL *pinetell bord*

# Enganyapastors de llet groga

*Lactarius chrysorrheus*

*Tóxica: provoca trastornos gastrointestinales.*

Enganyapastors (L. zonarius): tiene zonas como el rovelló, pero látex blanco.

Láminas crema, sin manchas verdes.



Pinetell bord

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.

! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.

! No se mancha de verde.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, en general de evolución favorable.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bosques de Quercus y castañares, también mezclados con pinos.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos. → p. 16

≈ **Pinetell** COMESTIBLE El pinetell tiene látex naranja y láminas naranja vivo que verdean. → p. 18

**COMPRUEBE** Látex.

# Enganyapastors

*Lactarius zonarius*

*Tóxica (gastrointestinal) y muy picante. Su sombrero zonado recuerda al del pinetell, de ahí «enganyapastors» (engañapastores).*

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Látex blanco que no cambia de color.
- ! Láminas crema, sin manchas verdes.
- ! Bajo robles y encinas, no bajo pinos.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y quejigo. Encinares y robledales, a menudo sobre caliza.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Pinetell** COMESTIBLE Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos. → p.18
- ≈ **Rovelló** COMESTIBLE Látex rojo vino; bajo pinos. → p.16

**COMPRUEBE** Látex.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*lleterol de beç*

# Cabra de beç

*Lactarius torminosus* · falso níscalo

*Tóxica (gastrointestinal). En algunos países del norte se consume tras tratamientos prolongados: esa práctica no la hace segura.*

Bolet de cabra: sombrero rosado salmón con el margen peludo.

Debajo

El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.

! Látex blanco que no cambia.

! Siempre bajo abedules.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

**DÓNDE** Con abedul. Abedulares y bosques con abedul.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Pinetell** COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo pinos. → p. 18

≈ **Pinetell d'avet** COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos. → p. 19

**COMPRUEBE** Margen y látex.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Escaldabecs

*Russula emetica* · rúsula emética

*Tóxica (gastrointestinal).*

Sombrero rojo vivo y pie blanco, entre el musgo.

Debajo: láminas blancas. Sabor muy picante.

Joven: sombrero rojo redondeado.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas · Sin anillo · Sin volva

### RASGOS DE ALARMA

! Sombrero rojo escarlata brillante, cutícula que se pela casi entera.
! Láminas y pie blancos puros; sin látex.
! Carne frágil y muy picante.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea, a veces intensos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, negro y abeto blanco. Bosques de coníferas húmedos, entre musgo.

### SE CONFUNDE CON

≈ **Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, pie hueco con hoyuelos y láminas que verdean. → p. 16

≈ **Ou de reig** COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie amarillos, anillo y gran volva blanca. → p. 38

**COMPRUEBE** Látex y pie.

# Matagent

*Rubroboletus satanas* · boleto de Satanás

*Tóxico: intoxicaciones gastrointestinales intensas, incluso cocinado.*

Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.

Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.

De cerca: poros rojo anaranjado.

E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva



**RASGOS DE ALARMA**

- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (A VECES INTENSO)** Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal; puede requerir atención hospitalaria por deshidratación.

**DÓNDE** Con roble pubescente, encina, castaño y haya. Bosques claros y cálidos de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Cep d'estiu** COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea. → p. 26
- ≈ **Sureny fosc** COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable. → p. 24

**COMPRUEBE** Poros y corte.

NO COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Fals rossinyol

*Hygrophoropsis aurantiaca* · falso rebozuelo

*No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.*

Todo naranja, con láminas verdaderas.

Debajo

De cerca: láminas blandas naranja intenso.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

! Láminas verdaderas: finas, apretadas, bifurcadas varias veces, naranja vivo.

! Carne delgada y blanda, no compacta.

! Sombrero aterciopelado naranja a pardo anaranjado.

**DÓNDE** Con pino silvestre y rodeno. Pinares, sobre restos de madera y acículas.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas), carne gruesa y firme, color yema de huevo. → p. 30

≈ **Círgola d'olivera** TÓXICA Omphalotus crece en grandes ramilletes sobre madera de olivo, encina o castaño y es mucho más carnoso. → p. 93

**COMPRUEBE** Parte inferior: pase el dedo; los pliegues no se separan como láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Pota de cavall groga

*Scleroderma citrinum*

*Tóxica (gastrointestinal, a veces intensa). ).*

Bola de piel gruesa, amarillenta y escamosa.

Cortada

Interior oscuro con vetas claras.

E F M A M J J **A S O N** D · Interior · Sin anillo · Sin volva



**RASGOS DE ALARMA**

! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

**DÓNDE** Con alcornoque, encina, castaño y pino piñonero. Bosques sobre suelo ácido, bordes de camino.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Pet de llop** COMESTIBLE El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes. → p. 44

≈ **Pet de llop gegant** COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina. → p. 45

≈ **Tòfona negra** COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable. → p. 62

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Peu de rata bord

*Ramaria formosa*

*Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).*

Forma de coral, ramas rosa anaranjado.

Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.

Puntas de las ramas amarillentas.

E F M A M J J **A S O N** D — Ramificado — Sin anillo — Sin volva

## RASGOS DE ALARMA

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

**DÓNDE** Con haya, roble pubescente y castaño. Bosques de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Peu de rata de pi** COMESTIBLE Lóbulos aplanados crema, en pinos. → p. 22

≈ **Peu de rata col-i-flor** CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

**COMPRUEBE** Forma.

TÓXICA ●●● DIFÍCIL

# *Amanita proxima*

*Tóxica: provoca insuficiencia renal aguda.*

Parece una farinera, pero la volva es NARANJA herrumbre.

La clave: volva con tonos naranja o herrumbre.

Ejemplares jóvenes: todas las volvas son naranja.

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

**RASGOS DE ALARMA**

! Amanita blanca o crema con volva DELGADA de color naranja ocráceo a herrumbre.
! Anillo membranoso persistente.
! Láminas blancas.

**SÍNDROME NEFROTÓXICO AGUDO** Síntomas de 8 a 14 horas. Molestias digestivas seguidas, en uno a tres días, de insuficiencia renal aguda que suele requerir tratamiento hospitalario.

**DÓNDE** Con encina y pino carrasco. Encinares y pinares calizos mediterráneos.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Farinera** CONDICIONADA A. → p. 39

**COMPRUEBE** Volva y anillo.

# Pixacà

*Amanita pantherina* · amanita pantera

***Tóxica (neurotóxica), potencialmente grave.***

Sombrero pardo con verrugas blancas, anillo y bulbo en la base.

Debajo: láminas blancas y anillo liso.

Margen del sombrero estriado y anillo colgante.

E F M A **M** J J **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.
- ! Base del pie en bulbo con un reborde (como un calcetín enrollado) y 1–2 anillos por encima.
- ! Anillo liso, sin estrías por arriba.
- ! La carne NO enrojece.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, alternancia de excitación y somnolencia; vómitos; en casos graves convulsiones y coma.

**DÓNDE** Con pino silvestre, roble pubescente, haya y encina. Bosques de coníferas y planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Apagallums** COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 40
- ≈ **Vinosa** CONDICIONADA En la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas, el anillo está estriado por arriba y las verrugas son grisáceas o rosadas.

**COMPRUEBE** Pie y base.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Reig bord

*Amanita muscaria* · matamoscas · falsa oronja

*Tóxica (neurotóxica). Los tratamientos «para destoxificarla» no son seguros.*

Sombrero rojo con verrugas blancas y pie blanco.

Debajo

Joven: cubierta de verrugas, como una bola.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**



### RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero rojo con verrugas blancas (que la lluvia puede borrar).
- ! Láminas y pie BLANCOS.
- ! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia; vómitos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, abedul, abeto blanco y pino negro. Bosques de montaña sobre suelo ácido.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Ou de reig** COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca. → p. 38

**COMPRUEBE** Láminas y pie.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# *Amanita gemmata*

*Tóxica (neurotóxica).*

E F M A **M** **J** J A S **O** N D  Láminas  Con anillo  **Con volva**

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero amarillo pálido a amarillo ocre con placas blancas.
! Láminas blancas.
! Bulbo con reborde de volva y anillo frágil.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Similar al de A.

**DÓNDE** Con pino silvestre y laricio. Pinares sobre suelo ácido o arenoso.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Ou de reig** COMESTIBLE Láminas y pie amarillos, volva en saco. → p. 38
≈ **Verderol** TÓXICA Láminas amarillas, sin volva. → p. 90

**COMPRUEBE** Láminas.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Lepiota pudent

*Lepiota cristata*

*Tóxica (gastrointestinal). ). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.*

Lepiota cristata

L. cristata de cerca

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
- ! Olor desagradable, a goma o gas.
- ! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

**DÓNDE** Hojarasca, jardines y bordes de camino.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Apagallums** COMESTIBLE Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado. → p. 40

**COMPRUEBE** Tamaño.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Bola de neu pudent

*Agaricus xanthodermus*

*Tóxica (gastrointestinal).*

Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.

Láminas rosa grisáceo de joven; se confunde...

Vieja: láminas pardo oscuro.

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.
- ! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.
- ! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

**DÓNDE** Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Camperol** COMESTIBLE No amarillea y huele bien. → p. 42
- ≈ **Bola de neu** COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo. → p. 43

**COMPRUEBE** Base del pie.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Verderol

*Tricholoma equestre* · seta de los caballeros

*Tóxica. ).*

Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.

Debajo: láminas amarillo azufre.

Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el...



E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

## RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillo azufre intenso.

! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.

! Pie amarillo.

**SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO** Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura; en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria.

**DÓNDE** Con pino piñonero, silvestre y rodeno. Pinares sobre suelo arenoso.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Fredolic gros** COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras. → p. 48

≈ **Farinera borda** MORTAL Láminas blancas, anillo y volva. → p. 68

**COMPRUEBE** Sombrero.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Fredolic metzinós

*Tricholoma pardinum*

*Tóxico: gastroenteritis intensa.*

Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.

Sombrero escamoso y pie robusto y lleno

Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).
- ! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
- ! Olor a harina.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

**DÓNDE** Con abeto blanco, haya y pino silvestre. Bosques de montaña.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Fredolic** COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 47
- ≈ **Fredolic gros** COMESTIBLE Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas. → p. 48

**COMPRUEBE** Tamaño y escamas.

TÓXICA ●●○ MEDIA *candeleta*

# Clitocibe blanc

*Clitocybe rivulosa*

*Tóxica (muscarina).*

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.

! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).

! Esporada blanca (no rosada).

**SÍNDROME MUSCARÍNICO (COLINÉRGICO)** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

**DÓNDE** Prados, céspedes, claros herbosos.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Cama-sec** COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso. → p. 55

≈ **Moixernó blanc de tardor** COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina. → p. 58

≈ **Camperol** COMESTIBLE Láminas libres rosadas a pardas. → p. 42

**COMPRUEBE** Láminas.

# Gírgola d'olivera

*Omphalotus olearius* · seta de olivo

*Tóxica: gastroenteritis intensa. Confusión frecuente con el rossinyol.*

Un ramillete de setas anaranjadas sobre un tocón.



Debajo

Láminas que bajan por el pie y pies unidos en la...

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño.
- ! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.
- ! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

**DÓNDE** Con olivo, encina, castaño y roble pubescente. Olivares, encinares y castañares; tocones y raíces.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en el suelo. → p. 30

**COMPRUEBE** Parte inferior y crecimiento.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# *Mycena pura*

*Tóxica (muscarina).*

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

! Pequeña seta (2–5 cm) lila, rosada o violácea con el margen estriado.

! Olor a rábano.

! Pie hueco, frágil.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, molestias digestivas.

**DÓNDE** Hojarasca y pinaza.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Pimpinella morada** COMESTIBLE Mucho mayor, carnosa, olor afrutado. → p. 49

≈ **Pimpinella morada petita** SIN_INTERES Láminas gruesas, sin olor a rábano.

**COMPRUEBE** Tamaño.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Fals carlet

*Entoloma sinuatum*

*Tóxica: gastroenteritis intensa.*

Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.

Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa...

Adulto

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
- ! Esporada rosada.
- ! Olor a harina rancia.
- ! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO)** Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

**DÓNDE** Con roble pubescente, haya y castaño. Bosques de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Carlet** COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca. → p. 54
- ≈ **Moixernó** COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera. → p. 51
- ≈ **Pardilla** TÓXICA Láminas crema decurrentes.

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Bolet de pi

*Hypholoma fasciculare*

*Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.*

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
- ! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
- ! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

**DÓNDE** Tocones y madera muerta.

**SE CONFUNDE CON**

- ≈ **Pollancró** COMESTIBLE Crema, anillo membranoso, en chopos. → p. 59
- ≈ **Alzinoi** CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

**COMPRUEBE** Color.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Barret de bruixa

*Inocybe geophylla*

*Tóxica (muscarina). ).*

Sombrero con fibras radiales que se agrietan: la señal típica.

Inocybe geophylla

Las hay lilas, que pueden confundirse con la...

E F M A M J J **A S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

**RASGOS DE ALARMA**

! Pequeña seta (1–4 cm) blanca sedosa (o lila en la variedad lilacina) con mamelón agudo.

! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.

! Olor terroso o espermático.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

**DÓNDE** Bordes de camino en bosques de todo tipo.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Pimpinella morada** COMESTIBLE Mucho mayor y carnosa. → p. 49

≈ **Cama-sec** COMESTIBLE Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema. → p. 55

**COMPRUEBE** Tamaño.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Bolet de femer

*Coprinopsis atramentaria*

*Tóxica si se toma alcohol (coprina): antes, durante o hasta tres días después de comerla.*

Sombreros grises en forma de campana, en grupo.

Jóvenes

Como el bolet de tinta, al envejecer ennegrece y se...

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** D Láminas Sin anillo Sin volva

## RASGOS DE ALARMA

! Sombrero gris, ovoide o acampanado, con estrías o pequeñas escamas en el centro (sin escamas lanosas).

! Láminas que se licúan en tinta negra.

! Crece en ramilletes, sobre madera enterrada o tocones.

**SÍNDROME COPRÍNICO (TIPO DISULFIRAM) CON ALCOHOL** Síntomas de minutos a 2 horas tras beber alcohol, hasta 72 horas después de comer la seta. Enrojecimiento de cara y cuello, palpitaciones, sensación de calor, dolor de cabeza, náuseas.

**DÓNDE** Parques, huertos, bordes de camino, tocones.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Bolet de tinta** COMESTIBLE Sombrero blanco alto con escamas lanosas; crece aislado o en grupos sueltos en el suelo. → p. 41

**COMPRUEBE** Color y superficie.

# Síndromes

*Según cuánto tardan los síntomas. Más de 6 horas es señal de alarma.*

## PRECOZ (MENOS DE 6 H)

### Gastrointestinal

Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. La mayoría se resuelven en horas, pero algunas son intensas.

*Lactarios de látex blanco, rúsulas picantes, Entoloma sinuatum, Omphalotus olearius, Tricholoma pardinum, Rubroboletus satanas, Agaricus xanthodermus, Ramaria formosa, Hypholoma fasciculare, Scleroderma, setas comestibles en mal estado*

### Colinérgico (muscarínico)

Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, pulso lento.

*Inocybe e Inosperma, clitocibes blancos (Clitocybe rivulosa), Mycena pura*

### Neurológico central (panterínico)

Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia, a veces convulsiones o coma.

*Amanita pantherina, A. muscaria, A. gemmata*

### Alucinógeno

Alteraciones de la percepción y del comportamiento.

*Psilocybe, Panaeolus*

### Coprínico (tipo disulfiram)

Enrojecimiento, palpitaciones y malestar al beber alcohol, hasta 3 días después.

*Coprinopsis atramentaria + alcohol*

## TARDÍA (6–24 H)

### Hepatotóxico (faloidiano)

Gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave. Potencialmente mortal.

*Amanita phalloides, A. verna, A. virosa, lepiotas pequeñas (Lepiota brunneoincarnata y afines), Galerina marginata*

### Giromitriano (convulsivo)

Síntomas digestivos, neurológicos (convulsiones) y daño hepático. Potencialmente mortal.

*Cyromitra esculenta*

## RETARDADA (MÁS DE 24 H)

### Nefrotóxico

Sed, cansancio, dolor lumbar, alteraciones de la orina; insuficiencia renal.

*Cortinarius orellanus (de 2 a 15 días) y Amanita proxima (síntomas en 8–14 h, fallo renal en 1–3 días)*

### Rabdomiolítico

Debilidad y dolor muscular, orina oscura; afectación cardíaca en casos graves.

*Tricholoma equestre (comidas repetidas)*

### Hemolítico

Destrucción de glóbulos rojos e insuficiencia renal.

*Paxillus involutus (personas sensibilizadas)*

# Conservar y cocinar

Limpie las setas en el bosque (tierra, hojas) y transpórtelas frescas y separadas. En casa, consúmalas cuanto antes; como máximo, guárdelas uno o dos días en la nevera, sin lavar y en un recipiente que respire.

No guarde platos de setas cocinadas durante días ni los recaliente repetidamente.

Para secarlas, use ejemplares jóvenes y sanos, láminas finas y un lugar ventilado; para congelarlas, mejor después de saltearlas.

Con los coprinos de tinta (Coprinopsis atramentaria) el alcohol provoca una intoxicación hasta tres días después de comerlos. En general, beba con moderación cuando coma setas silvestres.

## SEGURIDAD EN EL BOSQUE

Diga a alguien adónde va y cuándo piensa volver. Lleve el móvil cargado, agua, ropa de abrigo y un frontal: en otoño anochece pronto.

La temporada de setas coincide con la de caza. Respete las señales de batida, lleve ropa de colores visibles y evite las zonas donde se esté cazando.

No abandone los caminos en zonas de barrancos y cortados; buscando con la vista en el suelo es fácil desorientarse.

Revise el cuerpo al volver por si hay garrapatas.

No haga fuego y respete las restricciones de acceso por riesgo de incendio.

Emergencias: 112.

# Mis hallazgos

*Anótelo en el bosque: dónde, cuándo y quién lo confirmó.*

| FECHA | LUGAR Y BOSQUE | SETA Y NOTAS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## MIS HALLAZGOS

| FECHA | LUGAR Y BOSQUE | SETA Y NOTAS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## MIS HALLAZGOS

| FECHA | LUGAR Y BOSQUE | SETA Y NOTAS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## MIS HALLAZGOS

| FECHA | LUGAR Y BOSQUE | SETA Y NOTAS |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# Glosario

**Adnata (lámina)** unida al pie en todo su ancho.

**Aguijones** púas blandas bajo el sombrero que producen las esporas (llengua de bou).

**Alvéolo** celdilla del sombrero de las colmenillas.

**Amatoxinas** toxinas de la farinera borda, las lepiotas pequeñas y la galerina; dañan el hígado y no se destruyen con la cocción.

**Anillo** resto del velo parcial en el pie.

**Areolada** cutícula agrietada en pequeñas placas.

**Bulbo marginado** base del pie engrosada con un reborde neto.

**Cortina** velo en forma de telaraña entre sombrero y pie (Cortinarius).

**Cutícula** piel del sombrero.

**Decurrente (lámina)** que baja por el pie.

**Delicuescente** que se licúa al madurar (coprinos).

**Ectomicorriza / micorriza** asociación entre el micelio de un hongo y las raíces de una planta.

**Escotada (lámina)** con una muesca junto al pie.

**Escrobículas** hoyuelos o manchas hundidas en el pie (lactarios).

**Esporada** depósito de esporas que deja un sombrero sobre un papel; su color es diagnóstico.

**Excéntrico (pie)** no centrado bajo el sombrero.

**Fasciculado** en ramillete, con los pies unidos por la base.

**Fibriloso** cubierto de fibras finas.

**Gleba** masa interna fértil de los pedos de lobo y las trufas.

**Herbario (pliego)** ejemplar seco conservado en una colección científica; es la prueba más sólida de presencia.

**Higrófano** que cambia de color al perder agua.

**Himenio / himenóforo** superficie fértil que produce las esporas (láminas, poros, pliegues, aguijones).

**Hipogeo** que fructifica bajo tierra.

**Látex** líquido que sale al cortar los lactarios.

**Lignícola** que crece sobre madera.

**Libre (lámina)** que no toca el pie.

**Mamelón** abultamiento central del sombrero.

**Micelio** conjunto de filamentos (hifas) que forman el cuerpo del hongo; vive en el suelo o la madera todo el año.

# Glosario

**Muscarina** toxina de Inocybe, Clitocybe y Mycena pura; provoca sudoración, salivación y bradicardia.

**Nitrófilo** que vive en suelos ricos en nitrógeno.

**Pliegues** venas gruesas, bajas y ramificadas bajo el sombrero (rebozuelos).

**Poros** aberturas de los tubos (boletos).

**Pruina, pruinoso** capa fina de polvo blanquecino.

**Quemado (trufero)** zona sin hierba alrededor de un árbol productor de trufa.

**Reticulado (pie)** con una red en relieve.

**Saprófito** que se alimenta de materia orgánica muerta.

**Sinónimo** nombre científico que designa la misma especie que el nombre aceptado.

**Velo universal** membrana que envuelve la seta joven; deja la volva y a veces verrugas en el sombrero.

**Viscoso, glutinoso** pegajoso o cubierto de mucílago.

**Volva** resto del velo universal en la base del pie.

# Índice alfabético

*En negrita, el nombre de la ficha. En gris, nombres en castellano o catalán y el científico.*


## A

*Agaricus arvensis* 43
*Agaricus campestris* 42
*Agaricus xanthodermus* 89
*Amanita caesarea* 38
*Amanita de los césares* 38
*Amanita gemmata* 87
*Amanita mortal* 68
*Amanita muscaria* 86
*Amanita ovoidea* 39
*Amanita pantera* 85
*Amanita pantherina* 85
*Amanita phalloides* 68
*Amanita proxima* 84
*Amanita verna* 69
*Amanita virosa* 70
*Angula de monte* 32
**Apagallums** 40
*Arigany* 61
*Auricularia auricula-judae* 37

## B

*Babosa negra* 52
*Babosillo* 28
*Barba de cabra* 22
*Barbuda* 41
**Barret de bruixa** 97
*Bejín* 44
*Bejín gigante* 45
**Bola de neu** 43
**Bola de neu pudent** 89
*Bola de nieve* 43
*Bolet d'oliu* 93
**Bolet de femer** 98
**Bolet de greix** 75
*Bolet de mantellina* 74
**Bolet de pi** 96
*Bolet de Sant Jordi* 51
**Bolet de tinta** 41
*Boleto* 23
*Boleto anillado* 28
*Boleto de Satanás* 80
*Boleto estival* 26
*Boleto granulado* 27
*Boleto negro* 24
*Boleto pinícola* 25
*Boleto reticulado* 26
*Boletus aereus* 24
*Boletus edulis* 23
*Boletus pinophilus* 25
*Boletus reticulatus* 26
*Bonete* 75
*Bovistella utriformis* 46
*Brunet* 47
*Buixó* 23

## C

*Cabeza de fraile* 50
**Cabra de beç** 78
*Cabrito* 30
*Cagarria* 60
*Calocybe gambosa* 51
*Calvatia gigantea* 45
**Cama de perdiu** 29
**Cama-sec** 55
**Camagroc** 32
**Camagroc** 33
**Camperol** 42
*Candeleta* 92
*Cantharellus cibarius* 30
*Capuchina* 48
*Carbonera* 21
**Carlet** 54
*Carlet bord* 95
*Carner bord* 95
*Carrereta* 55
*Carrerilla* 55
**Cep** 23
*Cep* 25
**Cep d'estiu** 26
*Cep negre* 24
**Cep rogenc** 25
*Champiñón silvestre* 42
*Chroogomphus rutilus* 29
**Clitocibe blanc** 92
*Clitocybe rivulosa* 92
*Clitopilus prunulus* 58
*Cogoma* 39
*Cogoma borda* 68
*Cogoma verda* 68
**Cogomassa** 69
*Cogomassa farinera* 39
*Cogomella* 40
*Coliflor de pi* 22
*Colmenilla* 60
*Colmenilla negra* 61
*Coprinopsis atramentaria* 98
*Coprinus comatus* 41
**Cortinari metzinós** 74
*Cortinarius orellanus* 74
*Craterellus cornucopioides* 31
*Craterellus lutescens* 32
*Craterellus tubaeformis* 33
*Cualbra llora* 21
*Cul-blanc* 39
*Cyclocybe cylindracea* 59

## E

**Enganyapastors** 77
*Enganyapastors d'alzina* 77
**Enganyapastors de llet groga** 76

# Índice alfabético


*Entoloma sinuatum* 95
*Escaldabec estriat* 79
● **Escaldabecs** 79
*Esclatasang* 16

## F

*Fals camagroc* 33
● **Fals carlet** 95
● **Fals rossinyol** 81
*Falsa colmenilla* 75
*Falsa oronja* 86
*Falso níscalo* 78
*Falso rebozuelo* 81
● **Farinera** 39
● **Farinera borda** 68
● **Farinera pudent** 70
*Farinot* 68
● **Fetge de vaca** 36
*Fistulina hepatica* 36
● **Fredolic** 47
● **Fredolic gros** 48
● **Fredolic metzinós** 91

## G

*Galamperna* 40
● **Galerina marginada** 72
*Galerina marginata* 72
*Galerina metzinosa* 72
*Gamuza* 34
*Gírgola* 57
● **Gírgola d'olivera** 93
● **Gírgola de panical** 56
*Gorro verde* 20
*Greixa* 22
*Groguet* 90
*Gyromitra esculenta* 75

## H

*Hígado de buey* 36
*Hongo blanco* 23
*Hongo negro* 24
*Huevo de rey* 38
*Hydnum repandum* 34
*Hydnum rufescens* 35
*Hygrophoropsis aurantiaca* 81
*Hygrophorus gliocyclus* 53
*Hygrophorus latitabundus* 52
*Hygrophorus russula* 54
*Hypholoma fasciculare* 96

## I

*Infundibulicybe geotropa* 50
*Inocybe geophylla* 97
*Inosperma erubescens* 73

## L

*Lactarius chrysorrheus* 76
*Lactarius deliciosus* 18
*Lactarius salmonicolor* 19
*Lactarius sanguifluus* 16
*Lactarius semisanguifluus* 17
*Lactarius torminosus* 78
*Lactarius zonarius* 77
*Lengua de buey* 36
*Lengua de gato* 34
*Lengua de vaca* 34
*Lepiota brunneoincarnata* 71
*Lepiota cristata* 88
● **Lepiota metzinosa** 71
● **Lepiota pudent** 88
*Lepista nuda* 49
*Llémena* 34
*Llenega* 52
● **Llenega blanca** 53
● **Llenega negra** 52
● **Llengua de bou** 34
*Llengua de bou rogenca* 35
*Lleterol de beç* 78
*Lleterola de llet groga* 76
*Llora* 20
● **Llora** 21
*Llora clapada* 20
*Llora morada* 21
● **Llora verda** 20
*Llorell* 21
*Lycoperdon perlatum* 44

## M

*Macrolepiota procera* 40
*Marasmius oreades* 55
*Matacandil* 40
*Matacandil* 41
● **Matagent** 80
*Matamoscas* 86
*Mataparent de Satanàs* 80
*Mízcalo* 18
● **Moixernó** 51
● **Moixernó blanc de tardor** 58
*Moixí* 27
*Moixí de calceta* 28
*Molinera* 58
● **Molleric** 27
● **Molleric calçat** 28
*Molleric granellut* 27
*Morchella elata* 61
*Morchella esculenta* 60
*Murga* 60
*Murga* 75
● **Múrgola** 60
● **Múrgola** 61
*Mycena pura* 94

## N

*Negret* 47
*Negrilla* 47
*Níscalo* 18
*Níscalo de sangre* 16

## O

*Omphalotus olearius* 93


ANEXO

# Índice alfabético


*Oreja de Judas* 37
*Orella d'ase* 31
**Orella de Judes** 37
*Orella de saüquer* 37
**Orellana** 57
*Oronja* 38
*Oronja verde* 68
**Ou de reig** 38

## P

*Palometa* 71
**Pampa** 50
*Parasol* 40
*Paxil enrotllat* 67
**Paxil·le tòxic** 67
*Paxillus involutus* 67
*Paxilo* 67
*Pedo de lobo* 44
*Pentinella borda* 68
*Perrechico* 51
**Pet de llop** 44
*Pet de llop de prat* 46
**Pet de llop gegant** 45
**Pet de llop gros** 46
**Peu de rata bord** 83
**Peu de rata de pi** 22
**Picornell de pi** 35
*Pie azul* 49
**Pimpinella morada** 49
**Pinetell** 18
*Pinetell* 27
*Pinetell bord* 76
**Pinetell d'avet** 19
*Pinetell d'avetosa* 19
*Pinetell de calceta* 28
**Pixacà** 85
*Platera* 50
*Pleurotus eryngii* 56
*Pleurotus ostreatus* 57
**Pollancró** 59
**Pota de cavall groga** 82
*Pota de perdiu* 29

## R

*Rabassola* 60
*Ramaria formosa* 83
*Ratón* 47
*Rebollón* 16
*Rebollón* 18
*Rebozuelo* 30
*Rebozuelo anaranjado* 32
*Reig* 38
**Reig bord** 86
*Reig bru* 85
*Robellón* 18
**Rossinyol** 30
*Rossinyol ataronjat* 81
*Rossinyol de pi* 32
*Rossinyolic* 32
*Rossinyolic embudat* 33
*Rourenc* 24
*Rourenc d'estiu* 26
**Rovelló** 16
*Rovelló bord* 76
*Rovelló d'avet* 19
*Rovelló d'obaga* 18
*Rovelló de cabra* 76
*Rovelló de cabra* 78
*Rubroboletus satanas* 80
*Russula cyanoxantha* 21
*Russula emetica* 79
*Russula virescens* 20
*Rúsula emética* 79

## S

*Scleroderma citrinum* 82
*Senderuela* 55
*Seta calabaza* 23
*Seta coliflor* 22
*Seta de campo* 42
*Seta de cardo* 56
*Seta de chopo* 59
*Seta de los caballeros* 90
*Seta de olivo* 93
*Seta de ostra* 57
*Seta de San Jorge* 51
*Seta del cura* 20
*Siurenc* 24
*Sparassis crispa* 22
*Suillus granulatus* 27
*Suillus luteus* 28
*Sureny* 23
**Sureny fosc** 24

## T

**Tòfona negra** 62
*Tricholoma equestre* 90
*Tricholoma pardinum* 91
*Tricholoma portentosum* 48
*Tricholoma terreum* 47
*Trompeta* 31
*Trompeta amarilla* 32
**Trompeta de la mort** 31
*Trompeta de los muertos* 31
*Trompeta negra* 31
*Trufa negra* 62
*Tuber melanosporum* 62

## V

*Vaqueta* 30
*Vaqueta negra* 31
**Verderol** 90

# Fotos y fuentes

Fotos de observaciones de **iNaturalist** y de **Wikimedia Commons** con licencia Creative Commons o de dominio público; el enlace a cada original está en la web. Muchas son CC BY-NC: este cuaderno es para uso personal o sin ánimo de lucro. Textos y datos: guía **Setas de Cataluña** (Cistella Segura) · nombres según Catalogue of Life; registros de GBIF e iNaturalist.

**Portada** Игорь Лебединский (CC BY 3.0)

**Cómo mirar · la edad** Вова Пропас (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC) · Izan Lopez Vergel (CC BY-NC)

**Árboles** Alba Rovira (CC BY-NC) · dbmhartley (CC0) · Tom W (CC BY) · mariacazcarraperez (CC BY-NC) · JMK (CC BY-SA 3.0) · Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · Daniel Espejo Fraga (CC BY-NC) · Josep Gesti (CC BY-SA) · Quercus morisii (CC BY-NC) · Quentin Groom (CC0) · Agnieszka Kwiecień, Nova (CC BY-SA 4.0) · Manolo (CC BY-NC) · mmaterezaa (CC BY-NC) · jl__cc (CC BY-NC) · kionez15 (CC BY-NC) · Arnau Comajuan (CC BY-NC) · merisolano (CC BY-NC) · Awinch1001 (CC0) · Vojtěch Zavadil (CC BY-SA 3.0) · ocell (CC BY-NC) · Stefan.lefnaer (CC BY-SA 4.0) · Jugrü (Public domain) · Josemiriarte (CC BY-SA 3.0) · Jordi Bassols Garcia (CC BY-NC) · Lluïsabisbe (CC BY-NC) · Christian Fischer (CC BY-SA 3.0) · Ayotte, Gilles, 1948- (CC BY-SA 4.0) · Marc Riera (CC BY) · Hladac (CC BY-SA 4.0) · adriamanrique (CC BY-NC) · Dietmar Rabich (CC BY-SA 4.0)

**Rovelló** Quercus morisii (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · RitmeNatura (CC BY-NC)

***Lactarius semisanguifluus*** gardatxanae (CC BY-NC) · David Marcos Vidal (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

**Pinetell** jl__cc (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · stoned_microscopy (CC BY-NC)

**Pinetell d'avet** David Marcos Vidal (CC BY-NC) · Ibai Olariaga (CC BY-NC)

**Llora verda** Javier Martínez Fuentes (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

**Llora** Antoni Sunyer (CC BY-NC) · Cándido Sos (CC BY-NC) · mussolbarrios (CC BY-NC)

**Peu de rata de pi** Nuria Kumari (CC BY-NC) · Roger Vila (CC BY-NC) · Xavi (CC BY-NC)

**Cep** Carmelo López Abad (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC) · Thomas Pruß (CC BY-SA 3.0)

**Sureny fosc** Quercus morisii (CC BY-NC) · Cándido Sos (CC BY-NC) · hherb (CC BY-NC)

**Cep rogenc** UNIRSE Llavi (CC BY-NC) · Joan Corominas Melian (CC BY-NC)

**Cep d'estiu** BrunadelPirineu (CC BY-NC) · marula (CC BY-NC)

**Molleric** Javier A. Canteros (CC BY-NC) · Sean S (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

**Molleric calçat** hherb (CC BY-NC) · Ibai Olariaga (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC)

**Cama de perdiu** Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC) · Assumpta MC (CC BY-NC) · Ikrauel (CC BY-NC)

**Rossinyol** jonatan_antunez (CC BY-NC) · Marc Riera (CC BY) · David Pereira (CC BY-NC)

**Trompeta de la mort** yaya_love (CC BY-NC) · pogon (CC BY-NC) · fenneck (CC BY-NC)

**Camagroc** Josep Sais i Brucet (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · polchof (CC BY-NC)

**Camagroc** andarubel (CC BY-NC) · Luis Ballester (CC BY-NC) · Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

**Llengua de bou** Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · Josep Sais i Brucet (CC BY-NC)

**Picornell de pi** Joseba (CC BY-NC) · Ángel Argüelles (CC BY-NC) · Luis Ballester (CC BY-NC)

**Fetge de vaca** Eduardo Martínez (CC BY) · tarareare (CC BY-SA) · Joan Ventura (CC BY-NC)

**Orella de Judes** bertogcliment (CC BY-NC) · Emily Nyenyedzi Davies (CC BY) · S. Menéndez (CC BY)

**Ou de reig** Quercus morisii (CC BY-NC) · Xavier de Pedro Puente (CC BY-NC) · Ikrauel (CC BY-NC)

**Farinera** jl__cc (CC BY-NC) · marcaluco (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

**Apagallums** victoriadurazo (CC BY-NC) · Oriol Sastre (CC BY) · Izan Lopez Vergel (CC BY-NC)

**Bolet de tinta** Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · jorditb (CC BY-NC) · Daniel Fornos Alimbau (CC BY-NC)

**Camperol** Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC) · Sarah and Fernando (CC BY-NC)

**Bola de neu** Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · jorge-prieto (CC BY-NC) · Javier Marcos Martínez (CC BY-NC)

**Pet de llop** guspiralsnuvols (CC BY-NC) · victoriadurazo (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

**Pet de llop gegant** bargon (CC BY-NC) · Ángel Argüelles (CC BY-NC) · spacecadetkiddo (CC BY-NC)

**Pet de llop gros** Daniel Joaquin Aguirre Howes (CC BY-NC) · piranyeta (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

**Fredolic** josep65 (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY)

**Fredolic gros** David Marcos Vidal (CC BY-NC) · jesus_lamata (CC BY-NC)

**Pimpinella morada** Marc (CC BY-NC) · no rights reserved (CC0) · Guille Marín (CC BY-NC)

**Pampa** Josep Sais i Brucet (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · Roser Melero (CC BY-NC-SA)

**Moixernó** miguelayuso (CC BY-NC) · Carmelo López Abad (CC BY-NC) · esther69 (CC BY-NC)

**Llenega negra** jl__cc (CC BY-NC) · yossarianc (CC BY-NC)

**Llenega blanca** pauoc (CC BY-NC) · Luis Ballester (CC BY-NC) · Francisco Valverde (CC BY-NC)

**Carlet** Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

**Cama-sec** Izan Lopez Vergel (CC BY-NC) · Experience Matters (CC BY-NC) · yossarianc (CC BY-NC)

**Círgola de panical** toniconca (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · Javier Royán Martín (CC BY-NC)

**Orellana** Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · Juan José de Haro (CC BY-SA)

**Moixernó blanc de tardor** Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC) · Cándido Sos (CC BY-NC)

**Pollancró** Bernat Espigulé (CC BY-NC) · martaasoler (CC BY-NC)

**Múrgola** rauldelamorena (CC BY-NC) · franja44 (CC BY-NC)

**Múrgola** Eva Palacian (CC BY-NC) · tonipons (CC BY-NC)

**Tòfona negra** Luis Ballester (CC BY-NC) · jorgecalamocha (CC BY-NC) · Charo Val (CC BY-NC)

**Paxil-le tòxic** joxepo (CC BY-NC) · jonatan_antunez (CC BY-NC) · José Luis Romero Rego (CC BY-NC)

**Farinera borda** ]. IGNASI (CC BY-NC) · no rights reserved (CC0) · polchof (CC BY-NC)

**Cogomassa** Luis Ballester (CC BY-NC) · Amari García (CC BY-NC) · Fatima Carrasco (CC BY-NC)

**Farinera pudent** Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Jesse Kalwij (CC BY-NC) · Rene Weigelt (CC BY-NC)

**Lepiota metzinosa** Luis Ballester (CC BY-NC) · Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC) · Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

**Galerina marginada** Mario Vega Pérez (CC BY-NC) · faluke (CC BY-NC)

***Inosperma erubescens*** Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Jose Castro (CC BY)

**Cortinari metzinós** Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Federico Calledda (CC BY-NC) · Ijantos (CC BY-NC)

**Bolet de greix** Lídia Carrera (CC BY) · M.Antònia Barros Amils (CC BY-NC) · jaap_engberts (CC BY-NC)

**Enganyapastors de llet groga** Jacobo Krauel (CC BY-NC)

**Enganyapastors** Luis Ballester (CC BY-NC) · maricel patino (CC BY-NC) · Pere Pujol Font (CC BY-NC)

**Cabra de beç** Alba Rovira (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC) · David Marcos Vidal (CC BY-NC)

**Escaldabecs** noah_siegel (CC BY-NC-SA) · Simon M Davies (CC BY-NC) · Vladimir Bryukhov (CC BY-NC)

**Matagent** ceslal (CC BY-NC) · ]. IGNASI (CC BY-NC)

**Fals rossinyol** Rubén Pérez-González (CC BY-NC) · Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC)

**Pota de cavall groga** Oriol Sastre (CC BY) · nicomanus (CC BY-NC) · alfredoherrero (CC BY-NC)

**Peu de rata bord** Cordula Bernert (CC BY-NC) · Stevan Baluban (CC BY-NC) · Philippe Geniez (CC BY-NC)

***Amanita proxima*** Luis Ballester (CC BY-NC) · Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · jorgemartin71 (CC BY-NC)

**Pixacà** nicomanus (CC BY-NC) · Yves Bas (CC BY) · Oriol Sastre (CC BY)

**Reig bord** graellsia (CC BY-NC) · Вова Прорас (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

***Amanita gemmata*** Quercus morisii (CC BY-NC) · mavero (CC BY-NC)

**Lepiota pudent** Jacobo Krauel (CC BY-NC) · santigibertbolets (CC BY-NC)

**Bola de neu pudent** joxepo (CC BY-NC) · Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Felipe Castilla Lattke (CC BY-NC)

**Verderol** Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Sean S (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC)

**Fredolic metzinós** Antton Meléndez (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC)

**Clitocibe blanc** Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC) · julian_alonso (CC BY-NC)

**Círgola d'olivera** Juan Bertrand-Figueroa (CC BY-NC) · Bernat Espigulé (CC BY-NC) · Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC)

***Mycena pura*** Sean S (CC BY-NC) · Hannah (CC BY-NC)

**Fals carlet** Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Luis Ballester (CC BY-NC)

**Bolet de pi** Josep Sais i Brucet (CC BY-NC) · oriol3333 (CC BY-NC)

**Barret de bruixa** Cándido Sos (CC BY-NC) · David Marcos Vidal (CC BY-NC) · deinonyco (CC BY-NC-SA)

**Bolet de femer** jonatan_antunez (CC BY-NC) · diana_fuir (CC BY-NC) · ferran garcia mari (CC BY-NC)

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

# Llame ahora

**112**

**Emergencias**
Diga que han comido setas silvestres y cuándo.

**91 562 04 20**

**Toxicología · 24 h**
Información de intoxicaciones.

## QUÉ HACER

- → **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.
- → **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.
- → **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.
- → **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.
- → **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

**Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).**

## ANÓTELO ANTES DE SALIR

ALOJAMIENTO _____

CENTRO DE SALUD _____

SOCIEDAD MICOLÓGICA _____

DÓNDE APARQUÉ _____