SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

Llame ahora

112

Emergencias
Diga que han comido setas silvestres y cuándo.

91 562 04 20

Toxicología · 24 h
Información de intoxicaciones.

QUÉ HACER

- → **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.
- → **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.
- → **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.
- → **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.
- → **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).

ANÓTELO ANTES DE SALIR


ALOJAMIENTO

CENTRO DE SALUD

SOCIEDAD MICOLÓGICA

DÓNDE APARQUÉ

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura**. Uso personal o sin ánimo de lucro.



CISTELLA SEGURA · CATALUÑA

Setas *esenciales*

Las 41 setas que hay que conocer en Cataluña: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

● 23 COMESTIBLES ● 9 MORTALES ● 9 TÓXICAS

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.** Conocer una especie significa saber reconocer todos sus rasgos decisivos y todas las especies peligrosas con las que se confunde.
2. **Extraiga el ejemplar entero.** La base del pie (volva, bulbo, micelio) es imprescindible para descartar amanitas mortales.
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.** En un mismo corro pueden crecer mezcladas una comestible y una tóxica (por ejemplo, el cama-sec y los clitocibes blancos).
4. **No mezcle especies en la cesta** y lleve las dudosas aparte, envueltas en papel.
5. **Deseche los ejemplares viejos, agusanados, empapados, helados o muy jóvenes.** Los viejos se descomponen y pueden causar intoxicaciones aunque la especie sea comestible; los botones muy jóvenes aún no muestran los rasgos de identificación.
6. **Use una cesta rígida y ventilada**, nunca bolsas de plástico, que aceleran la descomposición.
7. **No crea en pruebas caseras.** El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.
8. **Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas.** Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.
9. **Ante cualquier duda, consulte a un micólogo** (sociedades micológicas y sus exposiciones), con el ejemplar entero y fresco, nunca solo con una foto.
10. **Cocine siempre las setas.** Muchas comestibles son tóxicas en crudo o poco hechas: colmenillas, pie azul, armilaria, amanita vinosa, mataparents.
11. **Guarde un ejemplar crudo** de cada especie en la nevera hasta el día siguiente: si alguien se encuentra mal, servirá para identificarla.
12. **Evite lugares contaminados**: cunetas de carreteras, zonas industriales, vertederos, campos tratados.

Para montarlo: imprime a doble cara volteando por el **borde corto**, a tamaño real; ordena las hojas por su número pequeño, dobla el montón por la mitad y grapa por el pliegue.

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

Síndromes

Según cuánto tardan los síntomas. Más de 6 horas es señal de alarma.

PRECOZ (MENOS DE 6 H)

Gastrointestinal
Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. La mayoría se resuelven en horas, pero algunas son intensas.

Lactarios de látex blanco, rúsulas picantes, Entoloma sinuatum, Omphalotus olearius, Tricholoma pardinum, Rubroboletus satanas, Agaricus xanthodermus, Ramaria formosa, Hypholoma fasciculare, Scleroderma, setas comestibles en mal estado

Colinérgico (muscarínico)
Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, pulso lento.

Inocybe e Inosperma, clitocibes blancos (Clitocybe rivulosa), Mycena pura

Neurológico central (panterínico)
Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia, a veces convulsiones o coma.

Amanita pantherina, A. muscaria, A. gemmata

Alucinógeno
Alteraciones de la percepción y del comportamiento.

Psilocybe, Panaeolus

Coprínico (tipo disulfiram)
Enrojecimiento, palpitaciones y malestar al beber alcohol, hasta 3 días después.

Coprinopsis atramentaria + alcohol

TARDÍA (6–24 H)

Hepatotóxico (faloidiano)
Gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave. Potencialmente mortal.

Amanita phalloides, A. verna, A. virosa, lepiotas pequeñas (Lepiota brunneoincarnata y afines), Galerina marginata

Giromitriano (convulsivo)
Síntomas digestivos, neurológicos (convulsiones) y daño hepático. Potencialmente mortal.

Gyromitra esculenta

RETARDADA (MÁS DE 24 H)

Nefrotóxico
Sed, cansancio, dolor lumbar, alteraciones de la orina; insuficiencia renal.

Cortinarius orellanus (de 2 a 15 días) y Amanita proxima (síntomas en 8–14 h, fallo renal en 1–3 días)

Rabdomiolítico
Debilidad y dolor muscular, orina oscura; afectación cardíaca en casos graves.

Tricholoma equestre (comidas repetidas)

Hemolítico
Destrucción de glóbulos rojos e insuficiencia renal.

Paxillus involutus (personas sensibilizadas)

TÓXICA ●●○ MEDIA

carlet bord

Fals carlet

Entoloma sinuatum


Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.


Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa...


Adulto

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 100–1500 m

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.
! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO) Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

DÓNDE Con roble pubescente, haya y castaño. Bosques de planifolios.

SE CONFUNDE CON



Carlet COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca. → p. 24



Moixernó COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera. → p. 22




Pardilla TÓXICA Láminas crema decurrentes.

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas.

ANTES DEL NOMBRE

Cómo mirar una seta

Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.



1 Sombrero. Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

2 Debajo. Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

3 Anillo. ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

4 Pie. Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

5 Base. Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

6 Carne. Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO


Láminas
Hojas finas


Tubos
Una esponja


Pliegues
Venas gruesas


Aguijones
Púas blandas


Interior
Bola sin sombrero

LA EDAD CUENTA

Una comestible vieja o pasada también intoxica. Cójala joven y firme. (Rovelló)


✓ Joven


✓ En su punto


✕ Viejo


✕ Pasado

Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

DÓNDE BUSCAR

Árboles y sus setas

Muchas setas viven unidas a las raíces de un árbol: reconocerlo por la hoja y el tronco es el primer paso.





Pino carrasco

pi blanc

Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido; tronco a menudo inclinado o tortuoso.

BUSQUE Rovelló *6*, Molleric *10*, Cama de perdiu *11*, Fredolic *20*, Llenega negra *23*





Pino piñonero

pi pinyer

Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.

BUSQUE Rovelló *6*, Molleric *10*, Cama de perdiu *11*, Fredolic *20*

CUIDADO Verderol *42*





Pino laricio

pinassa

Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.

BUSQUE Rovelló *6*, Pinetell *7*, Molleric *10*, Cama de perdiu *11*, Camagroc *14*, Fredolic *20*, Llenega negra *23*





Pino silvestre

pi roig

Copa irregular y alta; la parte superior del tronco y las ramas gruesas son de color naranja asalmonado, visible de...

BUSQUE Rovelló *6*, Pinetell *7*, Cep *9*, Molleric *10*, Cama de perdiu *11*, Rossinyol *12*, Camagroc *14*, Llengua de bou *15*, Fredolic *20*, Llenega negra *23*

CUIDADO Paxil·le tòxic *29*, Pixacà *40*, Reig bord *41*, Verderol *42*, Fredolic metzinós *43*, Bolet de greix *37*





Encina

alzina

Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate; en el interior a menudo en forma de mata.

BUSQUE Llora *8*, Rossinyol *12*, Trompeta de la mort *13*, Llengua de bou *15*, Ou de reig *16*, Carlet *24*

CUIDADO Enganyapastors de llet groga *38*, Matagent *39*, Paxil·le tòxic *29*, Farinera borda *30*, Cogomassa *31*, Pixacà *40*, Gírgola d'olivera *45*, Cortinari metzinós *36*

TÓXICA ●○○ FÁCIL

bolet d'oliu

Gírgola d'olivera

Omphalotus olearius · seta de olivo

Tóxica: gastroenteritis intensa. Confusión frecuente con el rossinyol.


Un ramillete de setas anaranjadas sobre un tocón.


Debajo


Láminas que bajan por el pie y pies unidos en la...

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1000 m

RASGOS DE ALARMA

- ! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño.
- ! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.
- ! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

DÓNDE Con olivo, encina, castaño y roble pubescente. Olivares, encinares y castañares; tocones y raíces.

SE CONFUNDE CON



Rossinyol COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en el suelo. → p. 12

COMPRUEBE Parte inferior y crecimiento.

TÓXICA ●●○ MEDIA *candeleta*

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa





E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.
! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).
! Esporada blanca (no rosada).

SÍNDROME MUSCARÍNICO (COLINÉRGICO) Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

DÓNDE Prados, céspedes, claros herbosos.

SE CONFUNDE CON


Cama-sec COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso. → p. 25


Moixernó blanc de tardor COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina.


Camperol COMESTIBLE Láminas libres rosadas a pardas. → p. 19

COMPRUEBE Láminas.

Árboles y sus setas





Roble pubescente — roure martinenc

Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las hojas secas.

BUSQUE Llora *8*, Trompeta de la mort *13*, Llengua de bou *15*, Ou de reig *16*, Carlet *24*

CUIDADO Enganyapastors de llet groga *38*, Matagent *39*, Farinera borda *30*, Cogomassa *31*, Pixacà *40*, Círgola d'olivera *45*, Fals carlet *46*, Cortinari metzinós *36*





Haya — faig

Árbol alto de corteza lisa y gris; bajo su copa densa apenas crece sotobosque.

BUSQUE Llora *8*, Cep *9*, Rossinyol *12*, Trompeta de la mort *13*, Llengua de bou *15*

CUIDADO Matagent *39*, Farinera borda *30*, Farinera pudent *32*, Pixacà *40*, Fredolic metzinós *43*, Fals carlet *46*





Castaño — castanyer

Árbol grande de copa amplia; a menudo en forma de rebrotes de cepa (castañares de leña).

BUSQUE Llora *8*, Cep *9*, Rossinyol *12*, Trompeta de la mort *13*, Llengua de bou *15*, Ou de reig *16*

CUIDADO Enganyapastors de llet groga *38*, Matagent *39*, Paxil·le tòxic *29*, Farinera borda *30*, Círgola d'olivera *45*, Fals carlet *46*, Cortinari metzinós *36*


COMESTIBLE ●●○ MEDIA

esclatasang

Rovelló

Lactarius sanguifluus · níscalo de sangre · rebollón


En su punto: sombrero naranja vinoso, con pocas zonas.


Láminas color vino (L. sanguifluus o L. vinosus).


De lado

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1400 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Látex rojo vino desde el primer instante, sin pasar por naranja (mírelo justo al cortar).
✓ Láminas rosa vinoso o lila vinoso, que se manchan de verde.
✓ Pie corto, hueco, del color del sombrero, con hoyuelos más oscuros.
✓ Siempre bajo pinos.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio, piñonero, silvestre y rodeno. Bordes de caminos y cortafuegos dentro del pinar, claros con hierba, taludes y zonas donde la capa de acículas es fina.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Paxil·le tòxic MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne. → p. 29



Enganyapastors de llet groga TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 38



Enganyapastors TÓXICA Látex blanco inmutable y muy picante; láminas crema; no verdea; bajo planifolios.

COMPRUEBE Presione las láminas y observe la mancha; corte en busca de látex.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

Tóxico: gastroenteritis intensa.


Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.


Sombrero escamoso y pie robusto y lleno


Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 800–2000 m

RASGOS DE ALARMA

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).
! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
! Olor a harina.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

DÓNDE Con abeto blanco, haya y pino silvestre. Bosques de montaña.

SE CONFUNDE CON



Fredolic COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 20



Fredolic gros COMESTIBLE Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

COMPRUEBE Tamaño y escamas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

groguet

Verderol

Tricholoma equestre · seta de los caballeros

Tóxica.).


Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.


Debajo: láminas amarillo azufre.


Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el...

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1700 m

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillo azufre intenso.

! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.

! Pie amarillo.

SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura; en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria.

DÓNDE Con pino piñonero, silvestre y rodeno. Pinares sobre suelo arenoso.

SE CONFUNDE CON



Fredolic gros COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras.



Farinera borda MORTAL Láminas blancas, anillo y volva. → p. 30

COMPRUEBE Sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

rovelló d'obaga

Pinetell

Lactarius deliciosus · níscalo · mízcalo


En su punto: naranja, con zonas bien marcadas en el sombrero.


Gírelo


Los hoyuelos naranja del pie (escrobículas)...

E F M A M J J **A S O N** D Láminas Sin anillo Sin volva 300–2100 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Látex naranja zanahoria al cortar, que no se vuelve rojo vino en los primeros minutos.

✓ Láminas naranja vivo que se manchan de verde.

✓ Pie hueco, naranja, con hoyuelos (escrobículas) más oscuros.

✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio, negro y rodeno. Bordes de pistas y claros con hierba o musgo dentro del pinar, taludes y vertientes umbrías; los jóvenes, medio enterrados en la pinaza.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Paxil·le tòxic MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas fácilmente separables. → p. 29



Cabra de beç TÓXICA Margen muy peludo, látex blanco y picante; bajo abedules.



Enganyapastors de llet groga TÓXICA Látex blanco que amarillea en segundos; láminas crema; nunca verdea; bajo robles y encinas. → p. 38

COMPRUEBE Corte la carne y las láminas: sin látex, descarte el ejemplar.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

llora morada

Llora

Russula cyanoxantha · carbonera

Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).





Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.



Carbonera (R. cyanoxantha)

E F M A M **J J A S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 50–1700 m

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).
- ✓ Sin anillo ni volva.
- ✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

DÓNDE Con haya, castaño, encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Farinera borda MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 30

- ***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.



Cualbra morada NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante.

COMPRUEBE Base del pie (desentiérrela) y anillo.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Reig bord

Amanita muscaria · matamoscas · falsa oronja

Tóxica (neurotóxica). Los tratamientos «para destoxificarla» no son seguros.



Sombrero rojo con verrugas blancas y pie blanco.



Debajo



Joven: cubierta de verrugas, como una bola.

E F M A M J J **A S O N** D · Láminas · Con anillo · **Con volva** · 300–2200 m

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero rojo con verrugas blancas (que la lluvia puede borrar).
- ! Láminas y pie BLANCOS.
- ! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia; vómitos.

DÓNDE Con pino silvestre, abedul, abeto blanco y pino negro. Bosques de montaña sobre suelo ácido.

SE CONFUNDE CON



Ou de reig COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca. → p. 16

COMPRUEBE Láminas y pie.

TÓXICA ●●○ MEDIA

reig bru

Pixacà

Amanita pantherina · amanita pantera

Tóxica (neurotóxica), potencialmente grave.



Sombrero pardo con verrugas blancas, anillo y bulbo en la base.



Debajo: láminas blancas y anillo liso.



Margen del sombrero estriado y anillo colgante.

E F M A **M J** J **A S O N** D · Láminas · Con anillo · **Con volva** · 0–1900 m

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.
- ! Base del pie en bulbo con un reborde (como un calcetín enrollado) y 1–2 anillos por encima.
- ! Anillo liso, sin estrías por arriba.
- ! La carne NO enrojece.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, alternancia de excitación y somnolencia; vómitos; en casos graves convulsiones y coma.

DÓNDE Con pino silvestre, roble pubescente, haya y encina. Bosques de coníferas y planifolios.

SE CONFUNDE CON



Apagallums COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 17



Vinosa CONDICIONADA En la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas, el anillo está estriado por arriba y las verrugas son grisáceas o rosadas.

COMPRUEBE Pie y base.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

sureny

Cep

Boletus edulis · boleto · hongo blanco



En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.



Jóvenes, redondos como tapones de corcho



Ceps recolectados en la cesta de mimbre.

E F M A M **J J A S O** N D · Tubos · Sin anillo · Sin volva · 600–2000 m

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
- ✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
- ✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

DÓNDE Con haya, castaño, roble albar, pino silvestre y abeto blanco y otros. Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Matagent TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente. → p. 39



Molleric amarg NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.



Mataparent amarg NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

COMPRUEBE Poros y pie.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

molleric granellut

Molleric

Suillus granulatus · boleto granulado

Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).



En su punto: sombrero pardo brillante, pie amarillento, en grupo bajo pinos.



Poros amarillos con gotitas blancas



Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

E F M A **M J J** A **S O N** D · Tubos · Sin anillo · Sin volva · 0–1800 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre, laricio, piñonero y rodeno. Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Molleric pebrer NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.



Molleric COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.



Molleric calçat COMESTIBLE Anillo membranoso grande en el pie.

COMPRUEBE Color de los poros.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

mataparent de Satanàs

Matagent

Rubroboletus satanas · boleto de Satanás

Tóxico: intoxicaciones gastrointestinales intensas, incluso cocinado.



Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.



Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.



De cerca: poros rojo anaranjado.

E F M A M J **J A S O** N D · Tubos · Sin anillo · Sin volva · 100–1300 m

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
! Poros rojos o rojo anaranjados.
! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
! La carne azulea débilmente al corte.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (A VECES INTENSO) Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal; puede requerir atención hospitalaria por deshidratación.

DÓNDE Con roble pubescente, encina, castaño y haya. Bosques claros y cálidos de planifolios.

SE CONFUNDE CON



Cep d'estiu COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.



Sureny fosc COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

pinetell bord

Enganyapastors de llet groga

Lactarius chrysorrheus


Tóxica: provoca trastornos gastrointestinales.



Enganyapastors (L. zonarius): tiene zonas como el rovelló, pero látex blanco.



Láminas crema, sin manchas verdes.



Pinetell bord

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1300 m

RASGOS DE ALARMA

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.

! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.

! No se mancha de verde.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, en general de evolución favorable.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bosques de Quercus y castañares, también mezclados con pinos.

SE CONFUNDE CON



Rovelló COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos. → p. 6



Pinetell COMESTIBLE El pinetell tiene látex naranja y láminas naranja vivo que verdean. → p. 7

COMPRUEBE Látex.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

pota de perdiu

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus


Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.



En su punto: sombrero rojizo y láminas ocre que bajan por el pie.



Debajo



Carne y pie de color naranja salmón.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.

✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).

✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.

✓ Bajo pinos.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero. Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 36



Fals rossinyol NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca.



Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

COMPRUEBE Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *vaqueta*

Rossinyol

Cantharellus cibarius · rebozuelo · cabrito


En su punto: todo amarillo yema, carnoso, con el margen ondulado.


Debajo


De cerca

E F M A M **J J A S O N** D · Pliegues · Sin anillo · Sin volva · 50–1800 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DÓNDE Con encina, alcornoque, castaño, haya y roble albar y otros. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 36



Círgola d'olivera TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 45



Fals rossinyol NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

MORTAL ●○○ FÁCIL *murga*

Bolet de greix

Gyromitra esculenta · falsa colmenilla · bonete

Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).







E F **M A M J** J A S O N D · Liso · Sin anillo · Sin volva · 600–2200 m

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

SÍNDROME GIROMITRIANO (CONVULSIVO Y HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

DÓNDE Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. Coníferas de montaña.

SE CONFUNDE CON



Múrgola CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 28



Múrgola CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco.

COMPRUEBE **Corte longitudinal.**

MORTAL ●●○ MEDIA

bolet de mantellina

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus


Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.


Láminas color herrumbre, espaciadas.


Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

E F M A M J J A **S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 100–1500 m

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
! Esporada pardo herrumbre.
! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

SÍNDROME ORELLÁNICO (NEFROTÓXICO TARDÍO) Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida; insuficiencia renal que puede requerir diálisis o trasplante.

DÓNDE Con roble pubescente, castaño y encina. Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

SE CONFUNDE CON


Rossinyol COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas.
→ p. 12


Camagroc COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

COMPRUEBE **Parte inferior.**

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

trompeta

Trompeta de la mort

Craterellus cornucopioides · trompeta de los muertos · trompeta negra

Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).


En su punto: negras, firmes y en grupo.


Mire por dentro


Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

E F M A M J J A **S O N D** · Liso · Sin anillo · Sin volva · 100–1600 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.
✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).
✓ Carne delgada y elástica.

DÓNDE Con haya, encina, castaño, roble pubescente y albar. Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Orella de gat negra CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

- ***Craterellus cinereus*** COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

COMPRUEBE Forma general.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

rossinyol de pi

Camagroc

Craterellus lutescens · angula de monte · trompeta amarilla

Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).



En su punto: pies amarillos y sombreros pardos, en grupo entre el musgo.



Debajo no hay láminas



Pie amarillo y hueco.

E F M A M J J A S **O N D** · Liso · Sin anillo · Sin volva · 300–1800 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y abeto blanco. Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Fals rossinyol NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo.



Camagroc COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado.

COMPRUEBE Parte inferior y pie.

MORTAL ●●○ MEDIA

Inosperma erubescens

Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.).



Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.



Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).



E F M A **M J J** A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1500 m

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

SÍNDROME MUSCARÍNICO (GRAVE) Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión; puede ser mortal sin tratamiento.

DÓNDE Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

SE CONFUNDE CON



Moixernó COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 22

COMPRUEBE **Sombrero, manchas rojas y olor.**

MORTAL ●●○ MEDIA

galerina metzinosa

Galerina marginada

Galerina marginata



Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.



Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...



Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas · Con anillo · Sin volva · 0–2000 m

RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
! Anillo fino pardo en el pie.
! Esporada pardo herrumbre.
! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

DÓNDE Madera muerta de coníferas y planifolios.

SE CONFUNDE CON



Pollancró COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 27

≈ ***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).



Alzinoi CONDICIONADA Mayor, escamas oscuras, esporada blanca.

COMPRUEBE **Tamaño y árbol.**

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

llémena

Llengua de bou

Hydnum repandum · lengua de vaca · gamuza

Los ejemplares viejos amargan.



En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.



Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.



Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones · Sin anillo · Sin volva · 0–1800 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

DÓNDE Con encina, haya, castaño, pino silvestre y abeto blanco y otros. Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Hydnellum / Sarcodon*** NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.



Picornell de pi COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie.

COMPRUEBE Consistencia de la carne.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *reig*

Ou de reig

Amanita caesarea · oronja · amanita de los césares

Comestible excelente. Los «huevos» cerrados no deben recolectarse: en ese estado se confunden con los de la farinera borda y otras amanitas mortales.


Huevo abierto: por dentro, láminas AMARILLAS y sombrero naranja.


Volva blanca grande como un saco, y láminas...


Láminas y pie amarillos. Si fueran blancos, no...

E F M A M J J **A S O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 50–1100 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Farinera borda MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 30



Reig bord TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 41

- ***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

COMPRUEBE Corte longitudinal del huevo.

MORTAL ●●○ MEDIA *palometa*

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata


Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.


Pie rosado con bandas y láminas blancas.


Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el...

E F M **A M** J J A **S O N D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–900 m

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
! Láminas blancas, libres.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

DÓNDE Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

SE CONFUNDE CON



Apagallums COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado. → p. 17



Cama-sec COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas. → p. 25

COMPRUEBE **Tamaño, anillo y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Farinera pudent

Amanita virosa

Mortal (amatoxinas).


Toda blanca, con anillo y volva.


Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría...


Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

E F M A M J J **A S O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 500–1800 m

RASGOS DE ALARMA

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.

! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.

! Volva blanca en saco.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

DÓNDE Con haya y abedul. Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

SE CONFUNDE CON



Bola de neu COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva.

COMPRUEBE **Láminas y base.**

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *cogomella*

Apagallums

Macrolepiota procera · parasol · galamperna

Deseche el pie, fibroso.


En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.


Pie con dibujo de piel de serpiente


Debajo

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1800 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.

✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).

✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.

✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

DÓNDE Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Lepiota metzinosa MORTAL Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado. → p. 33



Pixacà TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso. → p. 40



Apagallums CONDICIONADA Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

COMPRUEBE Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Bolet de tinta

Coprinus comatus · barbuda · matacandil

Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.



Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado: el momento de recolectarlo.



Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por...



Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D** · Láminas · Con anillo · Sin volva · 0–1500 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).

✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.

✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

DÓNDE Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Bolet de femer TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada.



Coprí garsa NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

COMPRUEBE Color y superficie del sombrero.

MORTAL ●●○ MEDIA

Cogomassa

Amanita verna







E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D · Láminas · Con anillo · **Con volva** · 0–900 m

RASGOS DE ALARMA

! Seta enteramente blanca.

! Volva blanca en saco en la base.

! Anillo membranoso blanco.

! Láminas blancas, libres.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque. Encinares y robledales mediterráneos.

SE CONFUNDE CON



Moixernó COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina. → p. 22



Camperol COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 19

COMPRUEBE **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

cogoma borda

Farinera borda

Amanita phalloides · oronja verde · amanita mortal


Adulta: sombrero verde oliva, anillo como una falda y volva en la base.


Debajo: láminas BLANCAS y anillo colgante.


Láminas blancas y base con volva

E F M A M J J **A S O N D** Láminas Con anillo **Con volva** 0–1500 m

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
! Láminas BLANCAS, libres.
! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos; tras una aparente mejoría, daño hepático grave a partir del segundo o tercer día, que puede requerir trasplante o causar la muerte.

DÓNDE Con encina, roble pubescente, alcornoque, castaño y haya. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

SE CONFUNDE CON


Llora verde COMESTIBLE La llora verde no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.


Llora COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 8

COMPRUEBE **Base y pie.**

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Camperol

Agaricus campestris · champiñón silvestre · seta de campo


En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.


Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un...


Gírelo siempre

E F M A **M J** J A **S O N D** Láminas Con anillo Sin volva 0–2000 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
✓ Sin volva en la base.
✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

DÓNDE Pastos con ganado, prados de siega.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


Cogomassa MORTAL Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 31


Bola de neu pudent TÓXICA Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol.


Fals carlet TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques. → p. 46

COMPRUEBE Láminas y base.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL *negret*

Fredolic

Tricholoma terreum · negrilla · ratón


En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.


Debajo


Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.

✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.

✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.

✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero. Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Fredolic metzinós TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas como un dibujo de tigre; olor a harina; láminas con reflejos verde amarillentos. → p. 43

- ***Tricholoma virgatum* / *T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo; carne amarga o picante; láminas con arista punteada de negro en T.
- ***Inocybe* (varias especies grises)** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada parda), olor espermático o terroso.

COMPRUEBE Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

MORTAL ●●○ MEDIA *paxil enrotllat*

Paxil·le tòxic

Paxillus involutus · paxilo


Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia dentro.


Margen del sombrero muy enrollado.


Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D Láminas Sin anillo Sin volva 0–1900 m

RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.

! Sin látex.

SÍNDROME HEMOLÍTICO (PAXÍLICO) Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y fallo renal.

DÓNDE Con abedul, pino silvestre, encina y castaño. Bosques variados, también parques; prefiere suelos ácidos.

SE CONFUNDE CON



Rovelló COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo. → p. 6



Pinetell COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 7

COMPRUEBE **Corte: látex o no.**

CONDICIONADA ●●○ MEDIA

rabassola

Múrgola

Morchella esculenta · colmenilla · cagarria

Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.







E F M A M J J A S O N D — Alvéolos — Sin anillo — Sin volva — 0–1600 m

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
- ✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.
- ✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

DÓNDE Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Bolet de greix MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. → p. 37

- ***Verpa bohemica*** TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.



Múrgola CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pimpinella morada

Lepista nuda · pie azul

Comestible, siempre bien cocinado: en crudo o poco hecho provoca trastornos digestivos (parte A del anexo del RD 30/2009).



En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.



Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.



De cerca: láminas y pie violetas.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1800 m

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
- ✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
- ✓ Sin cortina ni anillo.
- ✓ Olor afrutado o perfumado.

DÓNDE Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)*** TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.



Barret de bruixa TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas.



Mycena pura TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano.

COMPRUEBE Esporada y parte alta del pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

bolet de Sant Jordi

Moixernó

Calocybe gambosa · perrechico · seta de San Jorge

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).







E F M **A** **M** **J** J A S **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 400–2000 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

DÓNDE Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Inosperma erubescens MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 35



Cogomassa MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 31



Fals carlet TÒXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 46

COMPRUEBE Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pollancró

Cyclocybe cylindracea · seta de chopo

Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).







E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1200 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

DÓNDE Con chopo negro y álamo blanco. Riberas, choperas y parques.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Galerina marginada MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos. → p. 34



Bolet de pi TÒXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo.

COMPRUEBE Tamaño y árbol.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Gírgola de panical

Pleurotus eryngii · seta de cardo

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).


En su punto: sombrero pardo, carnoso, y láminas que bajan por el pie.


Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.


Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1200 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.
✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

DÓNDE Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Clitocibe blanc TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 44



Fals carlet TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 46

COMPRUEBE Color y base.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Llenega negra

Hygrophorus latitabundus · babosa negra

latitabundus o H. limacinus). Retire el mucílago al limpiarla.


En su punto: sombrero pardo oliva, brillante y viscoso.


Láminas blancas y pie blanco con puntitos.


Joven

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 100–1500 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.
✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.
✓ Esporada blanca.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre. Pinaza de pinares calizos; los sombreros viscosos quedan cubiertos de agujas pegadas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Llenega borda NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.



Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE Láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo intenso.



Llenega blanca COMESTIBLE Sombrero blanco crema.

COMPRUEBE Color de las láminas maduras y esporada.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Carlet

Hygrophorus russula

Puede amargar ligeramente.


En su punto: sombreros rosados con salpicaduras vinosas, firmes.


Debajo


Láminas algo decurrentes y pie blanco manchado.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1300 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.
✓ Bajo encinas y robles.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo. Hojarasca de encinares calizos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Fals carlet TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia. → p. 46



Cualbra morada NO COMESTIBLE Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos.

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *carrereta*

Cama-sec

Marasmius oreades · senderuela · carrerilla

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.


En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.


La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.


Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

E F M **A M J** J A **S O N** D Láminas Sin anillo Sin volva 0–2200 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

DÓNDE Corros de hierba más verde o más seca en prados.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Lepiota metzinosa MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 33



Clitocibe blanc TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 44

- ***Inocybe (especies de prado)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

COMPRUEBE Sombrero.