# 1

TERCERA RONDA · LA F CON ICONOS

## Rebozuelo: las cuatro maquetas

La misma ficha (comestibles) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

### F Foto alta




### F1 Foto alta con iconos




### F2 Tira de fotos




### F3 Columna de iconos



# F1

## Foto alta con iconos

*Fotos pequeñas grandes y fila de iconos*

La F con las dos fotos pequeñas mucho más grandes. Los rasgos pasan a iconos (láminas, anillo, volva, látex, esporada) con una marca verde o roja; dónde, altitud y olor, cada uno con su icono; las parecidas, con foto.

### A FAVOR

- Se ve de un vistazo si tiene anillo o volva.
- Casi nada de texto seguido: frases cortas, una por línea.

### EN CONTRA

- Hay que aprender los iconos (van en la página de «Antes de salir»).
- Algo menos de detalle que la F.








Lámina 2 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 5.

# F2

## Tira de fotos

*Las tres fotos grandes y ficha técnica*


La foto grande arriba y, debajo, las otras dos a todo el ancho, igual de grandes entre sí. Luego una ficha técnica en dos columnas: los rasgos en iconos a la izquierda y dónde y cuándo a la derecha.

### A FAVOR

- Las fotos pequeñas, las más grandes de todas las propuestas.
- Ficha ordenada como una tabla.

### EN CONTRA

- Las fotos ocupan media página larga: menos sitio para las parecidas.
- En las fichas largas se quita el detalle de las diferencias.



COMESTIBLE

**Rebozuelo**

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta





●○○ FÁCIL

E F M A M **J J A S O N** D

**Pliegues**
gruesos, del color del sombrero

**Sin anillo**

**Sin volva**

**Esporada**
crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco

Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

- Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.
- Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**



**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.



**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

**Compruebe:** Parte inferior.





MORTAL

**Oronja verde**

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda





●●○ MEDIA

E F M A M J J **A S O N** D

**Láminas**
blancas

**Anillo**
blanco, colgante

**Volva**
blanca, en saco

**Esporada**
blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**Mortal** ●●● síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**
Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- Láminas BLANCAS, libres.

**SE CONFUNDE CON**



**Gorro verde** COMESTIBLE



**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4

**Compruebe:** Base y pie.



Lámina 3 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 5.

# F3

## Columna de iconos

*Tres fotos arriba y los rasgos al lado*

Las tres fotos juntas arriba, a sangre (la grande y dos a su lado). Debajo, una columna estrecha con los rasgos en iconos, uno debajo de otro, y al lado el resto: dónde, cómo reconocerla, peligro y parecidas.

### A FAVOR

- Los rasgos siempre en el mismo sitio, como una tabla para repasar.
- Las tres fotos se ven a la vez.

### EN CONTRA

- La columna de texto es más estrecha.
- Foto principal algo más estrecha que en F1.







COMESTIBLE

**Rebozuelo**

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL

E F M A M **J J A S O N** D

**Pliegues** gruesos, del color del sombrero

**Sin anillo**

**Sin volva**

**Esporada** crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco

Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

**Compruebe:** Parte inferior.









MORTAL

**Oronja verde**

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA

E F M A M J J **A S O N** D

**Láminas** blancas

**Anillo** blanco, colgante

**Volva** blanca, en saco

**Esporada** blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

●●● Mortal síntomas a las 6–24 h
Síndrome faloidiano

⚠ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).

⚠ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

⚠ Láminas BLANCAS, libres.

SE CONFUNDE CON

**Gorro verde** COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está…

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**Compruebe:** Base y pie.



Lámina 4 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 5.

5

TERCERA RONDA · LA F CON ICONOS

# Boleto de Satanás: las cuatro maquetas

La misma ficha (tóxicas) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

## F Foto alta




## F1 Foto alta con iconos




## F2 Tira de fotos




## F3 Columna de iconos



6

TERCERA RONDA · LA F CON ICONOS

# Oronja verde: las cuatro maquetas

La misma ficha (mortales) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

## F Foto alta




## F1 Foto alta con iconos




## F2 Tira de fotos




## F3 Columna de iconos



7

SEGUNDA RONDA · FOTO GRANDE

# Rebozuelo: las seis maquetas

La misma ficha (comestibles) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

**F** Foto alta




**G** Marco clásico




**H** Arco y medallones





**I** Álbum de campo




**J** Modernista




**K** Foto de fondo



# F

## Foto alta

*Foto grande y texto en dos columnas*

Media página de foto a sangre, con el nombre encima y las otras dos fotos montadas sobre el borde. Debajo, todo el texto seguido y apretado, en dos columnas.

**A FAVOR**

- La foto más grande con casi todo el texto.
- Sencilla: sirve igual para todas las setas.

**EN CONTRA**

- Texto pequeño y seguido, sin listas.
- Gasta tinta (foto a sangre).




COMESTIBLE

**Rebozuelo**

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta





●○○ FÁCIL E F M A M **J J A S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

**DÓNDE** Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CÓMO RECONOCERLA** ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.





MORTAL

**Oronja verde**

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda





●●○ MEDIA E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

**DÓNDE** Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**RASGOS DE ALARMA** ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla. **SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**COMPRUEBE** Base y pie.



Lámina 8 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 14.

# G

## Marco clásico

*Doble filete con esquinas*

Como una lámina de libro antiguo: un marco de doble filete con las esquinas hacia dentro y un rizo en cada una, el nombre centrado con una orla y las fotos con paspartú.

### A FAVOR

- Elegante, de libro de verdad.
- El marco no gasta casi tinta.

### EN CONTRA

- El marco quita unos milímetros a cada lado.
- Algo menos de texto que F.

COMESTIBLE · ●○○ FÁCIL

### Rebozuelo

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta







E F M A M **J J A S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

**DÓNDE** Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CÓMO RECONOCERLA** ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.

— 9 —

MORTAL · ●●○ MEDIA

### Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda







E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

**DÓNDE** Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**RASGOS DE ALARMA** ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla. **SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**COMPRUEBE** Base y pie.

— 43 —

Lámina 9 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 14.

# H

## Arco y medallones

*Lámina de botánica*

La foto principal dentro de un arco con doble filo de color y las otras dos en medallones redondos sobre las esquinas. Nombre centrado con orla y el texto en una columna.

### A FAVOR

- Muy decorativa sin recargar.
- La foto grande se ve entera.

### EN CONTRA

- El arco recorta las esquinas de la foto.
- Una sola columna: líneas largas.



### Rebozuelo

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL E F M A M **J J A S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

**DÓNDE** Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m.

**CÓMO RECONOCERLA** ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.





### Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

MORTAL ●●○ MEDIA E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

**DÓNDE** Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m.

**RASGOS DE ALARMA** ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla. **SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**COMPRUEBE** Base y pie.



Lámina 10 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 14.

# I

# Álbum de campo

*Esquineros, cinta y notas a mano*

Como un álbum de fotos o un diario de campo: la foto grande un poco torcida con esquineros, las otras dos pegadas con cinta y notas escritas a mano.

### A FAVOR

- Cercana y divertida; parece hecha a mano.
- Fotos grandes.

### EN CONTRA

- Las fotos torcidas tapan un poco las otras.
- Menos seria para un libro de seguridad.

## Rebozuelo

COMESTIBLE

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

*fácil · junio–noviembre*



↑ *en su punto*

**CÓMO ES** ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

**DÓNDE** Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CÓMO RECONOCERLA** ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.



## Oronja verde

MORTAL

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

*media · agosto–noviembre*



↑ *adulta*

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

**DÓNDE** Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**RASGOS DE ALARMA** ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla. **SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**COMPRUEBE** Base y pie.



Lámina 11 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 14.

# J
# Modernista

*Esquinas con hojas y cinta*

Esquinas con latigazos, hojas y bayas del color del grupo (verde, naranja o rojo), la foto con las esquinas de arriba redondeadas y el nombre en una cinta con picos.

**A FAVOR**

- La más adornada: muy vistosa.
- El color del grupo en el marco avisa sin leer.

**EN CONTRA**

- Mucho adorno en una página pequeña.
- El texto queda más estrecho.



## Rebozuelo

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL — E F M A M **J J A S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ Anillo ✕ Volva **Esporada** crema rosada pálida

**DÓNDE** Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CÓMO RECONOCERLA** ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque.
**SABOR** Suave o algo picante.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.

9



## Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

MORTAL ●●○ MEDIA — E F M A M J J **A S O N D**

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

**DÓNDE** Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**RASGOS DE ALARMA** ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.
**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**COMPRUEBE** Base y pie.

43

Lámina 12 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 14.

# K

## Foto de fondo

*Toda la página es la foto*

La foto ocupa la página entera; el nombre va arriba, sobre la foto, y el texto en un panel blanco abajo, con las otras dos fotos asomando por encima.

**A FAVOR**

- La foto más grande posible.
- Muy llamativa al hojear.

**EN CONTRA**

- Gasta mucha tinta.
- Según la foto, el panel tapa parte de la seta.







Lámina 13 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 14.

14

SEGUNDA RONDA · FOTO GRANDE

# Boleto de Satanás: las seis maquetas

La misma ficha (tóxicas) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

## F Foto alta




## G Marco clásico




## H Arco y medallones





## I Álbum de campo




## J Modernista




## K Foto de fondo



15

SEGUNDA RONDA · FOTO GRANDE

# Oronja verde: las seis maquetas

La misma ficha (mortales) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

**F** Foto alta




**G** Marco clásico




**H** Arco y medallones




**I** Álbum de campo




**J** Modernista




**K** Foto de fondo



16

PRIMERA RONDA

# Rebozuelo: las seis maquetas

La misma ficha (comestibles) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

## Ahora Ficha completa

**Rebozuelo**

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

E F M A M J J A S O N D



En su punto | Debajo | De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

COMESTIBLES

CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.


OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON
- ✕ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 49
  SE PARECE Tonos anaranjados en planifolios ácidos. SE DISTINGUE Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.
- ✕ **Seta de olivo** gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius* TÓXICA → p. 30
  SE PARECE Color anaranjado, forma de embudo, crecimiento en otoño. SE DISTINGUE Láminas verdaderas, finas y apretadas.
- ✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 30
  SE PARECE Naranja, en embudo, en pinares. SE DISTINGUE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

## A Foto protagonista



COMESTIBLE

**Rebozuelo**

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON
- **Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
  Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.
- **Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
  Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...
- **Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30
  Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

## B Guía de campo

**Rebozuelo**

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

E F M A M J J A S O N D De junio a noviembre



En su punto



Debajo



De cerca

CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

CUIDADO CON
- **Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
  Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.
- **Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
  Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...
- **Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30
  Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

## C Tarjetas

**Rebozuelo**

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL



CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ Anillo
- ✕ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

CUÁNDO



De junio a noviembre

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies...

COMESTIBLES 9

## D Sí o no

**Rebozuelo**

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta



E F M A M J J A S O N D

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

ES ELLA SI...
- ☐ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ☐ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ☐ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DESCÁRTELA SI...
- ☐ Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre. → **Cortinari metzinós**
- ☐ Láminas verdaderas, finas y apretadas. → **Seta de olivo**
- ☐ Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo. → **Falso rebozuelo**

NO LA CONFUNDA



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49 ≠ Seta de olivo TÓXICA → p. 30

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Parte inferior.

COMESTIBLES 9

## E Infografía


COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

**Rebozuelo**

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

E F M A M J J A S O N D






DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

ESPORADA
- Crema rosada pálida

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.



**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

COMESTIBLES 9

# Ahora

## Ficha completa

*La que hay ahora, sin cambios*

Cabecera con nombre y meses, tres fotos iguales en fila, «Cómo es / Dónde» en dos columnas y debajo, en texto seguido, cómo reconocerla y las confusiones.

### A FAVOR

- Lo dice todo: es la más completa.
- Muy ordenada y regular: todas las fichas se parecen.

### EN CONTRA

- Mucho texto pequeño; cuesta encontrar algo de un vistazo.
- Las fotos son pequeñas para A6.

## Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D



En su punto



Debajo



De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

COMESTIBLES

**CÓMO ES**

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

**DÓNDE**

- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

- ✕ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 49
  **SE PARECE** Tonos anaranjados en planifolios ácidos. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.
- ✕ **Seta de olivo** gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius* TÓXICA → p. 30
  **SE PARECE** Color anaranjado, forma de embudo, crecimiento en otoño. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas, finas y apretadas.
- ✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 30
  **SE PARECE** Naranja, en embudo, en pinares. **SE DISTINGUE** Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.



## Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J **A S O N** D



Adulta



Debajo



Láminas blancas y base con volva

MORTALES

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

**DÓNDE**

- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**



**Gorro verde**
llora verda · *Russula virescens*
COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está…

≈ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 4
**SE DISTINGUE** Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**COMPRUEBE** Base y pie.



Lámina 17 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 23.

# A

## Foto protagonista

*Como una revista*

Una foto grande a sangre arriba, con el nombre encima; dos fotos pequeñas en la esquina. Una banda de color con la dificultad y los meses, y el texto debajo, más corto.

### A FAVOR

- Se reconoce la seta al pasar las páginas.
- Muy atractiva; el color del grupo se ve enseguida.

### EN CONTRA

- Cabe menos texto: se quitan detalles si no caben.
- Gasta más tinta (foto a sangre).



COMESTIBLE

**Rebozuelo**

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL — E F M A M **J J A S O N** D

**CÓMO ES**

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ Anillo
- ✗ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

**DÓNDE**

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre…

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.





MORTAL

**Oronja verde**

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA — E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

**DÓNDE**

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**COMPRUEBE** Base y pie.



Lámina 18 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 23.

# B

## Guía de campo

*Columna de fotos*

Como las guías de campo clásicas: las tres fotos en una columna a la izquierda, con su pie y dónde sale; a la derecha, todo el texto en una columna estrecha, fácil de leer.

### A FAVOR

- Líneas cortas: se lee más rápido.
- Las fotos van con su explicación al lado del texto.

### EN CONTRA

- Fotos más pequeñas que en A.
- La columna de texto se llena antes en las fichas largas.

## Rebozuelo

COMESTIBLE
●○○ FÁCIL

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D De junio a noviembre


En su punto


Debajo


De cerca

**CÓMO ES**

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ Anillo
- ✗ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

**DÓNDE**

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**CUIDADO CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.



## Oronja verde

MORTAL
●●○ MEDIA

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J **A S O N** D De agosto a noviembre


Adulta


Debajo


Láminas blancas y base con volva

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**COMPRUEBE** Base y pie.



Lámina 19 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm).
Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 23.

# C

## Tarjetas

*Cada cosa en su caja*

Cabecera de color y cada bloque en una tarjeta: cómo es, cuándo (rueda de meses), dónde, cómo reconocerla y las confusiones con su foto redonda.

### A FAVOR

- Se encuentra cada dato enseguida, siempre en el mismo sitio.
- Las confusiones llevan foto.

### EN CONTRA

- Las cajas ocupan sitio: menos texto.
- Más «de app» que de libro.

## Rebozuelo

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE
●○○ FÁCIL







**CÓMO ES**

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ Anillo
- ✗ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

**CUÁNDO**




De junio a noviembre

**DÓNDE**

Pino silvestre y abeto blanco
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**



**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies...



## Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

MORTAL
●●○ MEDIA







**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

**CUÁNDO**




De agosto a noviembre

**DÓNDE**

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SE CONFUNDE CON**



**Gorro verde** COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.



**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.



Lámina 20 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 23.

# D

## Sí o no

*Lista para el monte*

Pensada para usarla con la seta en la mano: casillas para marcar lo que se ve (es ella si… / descártela si…), las parecidas foto contra foto y lo que hay que comprobar antes de cogerla.

### A FAVOR

- Obliga a mirar cada rasgo: la más segura.
- Las confusiones, foto contra foto.

### EN CONTRA

- Menos descripción (sombrero, pie…).
- En las tóxicas cambia la columna de la derecha: «Si se come…».

## Rebozuelo

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE
●○○ FÁCIL







E F M A M **J J A S O N** D

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

**ES ELLA SI…**

- ☐ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ☐ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ☐ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**DESCÁRTELA SI…**

- ☐ Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre. → **Cortinari metzinós**
- ☐ Láminas verdaderas, finas y apretadas. → **Seta de olivo**
- ☐ Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo. → **Falso rebozuelo**

**NO LA CONFUNDA**



≠



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49



≠



Seta de olivo TÓXICA → p. 30

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Parte inferior.



## Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

MORTAL
●●○ MEDIA







E F M A M J J **A S O N** D

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

**SEÑALES DE ALARMA**

- ☐ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ☐ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ☐ Láminas BLANCAS, libres.
- ☐ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**SI SE COME…**

●●● **Mortal**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**Síndrome faloidiano.** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12).

**NO LA CONFUNDA**



≠



Gorro verde COMESTIBLE



≠



Carbonera COMESTIBLE → p. 4

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Base y pie.



Lámina 21 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm).
Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 23.

# E

# Infografía

*Dibujo con flechas*

Un dibujo de la seta con flechas a sus partes (sombrero, debajo, anillo, pie, volva), una tira de fotos, la rueda de meses y las confusiones en tres columnas con foto.

### A FAVOR

- Enseña a mirar las partes: muy didáctica.
- Anillo y volva saltan a la vista (o que no los tiene).

### EN CONTRA


- El dibujo es esquemático: no sirve para las setas con formas raras (bolas, corales, colmenillas).
- Menos texto de reconocimiento.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Rebozuelo

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta






**DÓNDE**

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

**ESPORADA**

Crema rosada pálida

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**



**Cortinari metzinós**
MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



**Seta de olivo**
TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.



**Falso rebozuelo**
NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.




MORTAL ●●○ MEDIA

## Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda






**DÓNDE**

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

**ESPORADA**

Blanca

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**RASGOS DE ALARMA**

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

**SE CONFUNDE CON**



**Gorro verde**
COMESTIBLE



**Carbonera**
COMESTIBLE → p. 4



**Bola de nieve**
COMESTIBLE



Lámina 22 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm).
Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 23.

**23**

PRIMERA RONDA

# Boleto de Satanás: las seis maquetas

La misma ficha (tóxicas) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

## Ahora Ficha completa

### Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs

E F M A M J **J A S O** N D



Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo. | Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo. | Al cortarla o tocarla, la carne azulea.

CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON



**Boleto reticulado** cep d'estiu · *Boletus reticulatus* COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.



**Boleto negro** sureny fosc · *Boletus aereus* COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

TÓXICAS 29

TÓXICAS

## A Foto protagonista



TÓXICA

### Boleto de Satanás

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs

●○○ FÁCIL E F M A M J **J A S O** N D

CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON

**Boleto reticulado** COMESTIBLE
El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.

**Boleto negro** COMESTIBLE
Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

TÓXICAS 29

## B Guía de campo

### Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs

E F M A M J **J A S O** N D De julio a octubre



Sombrero blanquecino y pie hinchado...



Debajo



Al cortarla o tocarla, la carne azulea.

CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON

**Boleto reticulado** COMESTIBLE
El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.

**Boleto negro** COMESTIBLE
Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

TÓXICAS 29

## C Tarjetas

### Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs



CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

CUÁNDO



De julio a octubre

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SE CONFUNDE CON



**Boleto reticulado** COMESTIBLE
El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.



**Boleto negro** COMESTIBLE
Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

TÓXICAS 29

## D Sí o no

### Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs



E F M A M J **J A S O** N D Roble pubescente, encina, castaño y haya

SEÑALES DE ALARMA
- ☐ Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ☐ Poros rojos o rojo anaranjados.
- ☐ Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ☐ La carne azulea débilmente al corte.


SI SE COME...

●●○ Grave

Irrita el estómago y el intestino.

**Síndrome gastrointestinal.** Síntomas entre 30 minutos y 6 horas.

NO LA CONFUNDA



Boleto reticulado COMESTIBLE ≠ Boleto negro COMESTIBLE

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Poros y corte.

TÓXICAS 29


## E Infografía

TÓXICA ●○○ FÁCIL

### Boleto de Satanás

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs






DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

ESPORADA
- Pardo oliva

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.

SE CONFUNDE CON



**Boleto reticulado** COMESTIBLE



**Boleto negro** COMESTIBLE

TÓXICAS 29

**24**

PRIMERA RONDA

# Oronja verde: las seis maquetas

La misma ficha (mortales) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

## Ahora Ficha completa

### Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J A S O N D



Adulta · Debajo · Láminas blancas y base con volva

**CÓMO ES**
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

**DÓNDE**
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

**RASGOS DE ALARMA**
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**



**Gorro verde** *Russula virescens* — COMESTIBLE — La llora verde no tiene volva ni anillo y su cutícula está…

≠ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 4
**SE DISTINGUE** Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**COMPRUEBE** Base y pie.

MORTALES 43

## A Foto protagonista



MORTAL

### Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA — E F M A M J J A S O N D

**CÓMO ES**
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

**DÓNDE**
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**RASGOS DE ALARMA**
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE
La llora verde no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**COMPRUEBE** Base y pie.

MORTALES 43


## B Guía de campo

### Oronja verde


MORTAL ●●○ MEDIA

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J A S O N D — De agosto a noviembre



Adulta



Debajo



Láminas blancas y base con volva

**CÓMO ES**
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

**DÓNDE**
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**RASGOS DE ALARMA**
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE
La llora verde no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**COMPRUEBE** Base y pie.

MORTALES 43

## C Tarjetas

### Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda



**CÓMO ES**
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

**CUÁNDO**



De agosto a noviembre

**DÓNDE**
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

**RASGOS DE ALARMA**
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE
La llora verde no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

MORTALES 43

## D Sí o no

### Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda



E F M A M J J A S O N D — Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

**SEÑALES DE ALARMA**
- ☐ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ☐ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ☐ Láminas BLANCAS, libres.
- ☐ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**SI SE COME…**

●●● **Mortal**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**Síndrome faloidiano.** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12).

**NO LA CONFUNDA**



Gorro verde COMESTIBLE · Carbonera COMESTIBLE → p. 4

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Base y pie.

MORTALES 43


## E Infografía

MORTAL ●●○ MEDIA

### Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda






**DÓNDE**
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

**ESPORADA**
○ Blanca

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**RASGOS DE ALARMA**
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

**SE CONFUNDE CON**



Gorro verde COMESTIBLE · Carbonera COMESTIBLE → p. 4 · Bola de nieve COMESTIBLE

MORTALES 43