ENCICLOPÈDIA DE CAMP · CATALUNYA · TARDOR

# Cistella *Segura*

Els bolets dels boscos catalans: com es reconeixen, on i quan surten, i amb quin bessó perillós no els has de confondre.

**Si dubtes, no te'l mengis.** Emergències: **112**

Informació Toxicològica (24 h): **91 562 04 20**

*Enciclopèdia*

# Els bolets

Una fitxa per bolet, amb fotos de cada edat. Toca un nom per anar a la seva fitxa.

## *Els clàssics*

**Rovelló** **Pinetell** **Trompeta de la mort** **Camagroc** **Cep** **Rossinyol**

## *Altres fàcils*

**Llengua de bou** **Molleric** **Bolet de tinta**

## *Compte, que tenen bessó*

**Fredolic** **Llenega negra** **Carlet** **Cama-sec** **Apagallums** **Gírgoles**

**Cama de perdiu** **Pet de llop** **Pet de llop gegant** **Pet de llop de prat**

## *Només amb experts*

**Ou de reig** **Llora i carbonera** **Pimpinella morada** **Camperol** **Bola de neu**

**Farinera**

## *Els mortals*

**Farinera borda** **Farinera pudent** **Lepiotes petites** **Galerina marginada**

**Cortinari metzinós** **Paxil enrotllat**

## *Els tòxics*

**Reig bord** **Pixacà** **Amanita proxima** **Fredolic metzinós** **Fals carlet**

**Gírgola d'olivera** **Lactaris de llet blanca** **Matagent** **Escleroderma**

**Clitocibes blancs** **Inocybe** **Verderol** **Bola de neu pudent** **Bolet de femer**

**Peu de rata bord** **Escaldabecs**


## *No valen la pena*

**Rossinyol ataronjat** **Molleric amarg** **Paloma vermellosa**

*Primer de tot*

# Les parts d'un bolet

Abans de mirar si és bo, aprèn com es diu cada part. Són les pistes de totes les pàgines.




### Barret

La part de dalt. Mira'n el color, la pell (llisa, escatosa, llefiscosa, amb berrugues) i la vora.

### Sota el barret

Làmines (fulles fines), porus (una esponja), plecs (venes gruixudes) o agullons (punxetes). El color hi diu molt.

### Anell

Una faldilla al peu: és la resta del vel que tapava les làmines quan era jove.

### Cortina

Una teranyina entre la vora del barret i el peu. La tenen els cortinaris, alguns mortals.

### Peu

Mira'n el color, si és ple o buit, si té dibuixos (xarxa, pell de serp) i com es trenca.

### Volva

Un sac o uns anells a la base del peu, sovint enterrats. És el senyal de les amanites.

### Carn i llet

Talla'l: canvia de color? Treu llet? De quin color? Quina olor fa?

### Esporada

La pols que deixa el barret sobre un paper en unes hores. El color ajuda a distingir bessons.

## Què té sota el barret?



**Làmines**
Fulles primes



**Porus**
Una esponja



**Plecs o llis**
Venes o res



**Agullons**
Punxetes




**Bola o corall**
Sense barret

*Primer de tot*

# Senyals de perill

Si el bolet té **un sol** d'aquests senyals, no va a la cistella. Passar-los tots no vol dir que sigui bo: només que pots continuar mirant la seva pàgina.




**La combinació mortal:** làmines blanques, anell i volva. És una amanita.

### Té volva: un sac a la base

Amanites, entre elles les mortals. Arrenca'l sencer per veure-ho.

**Fitxa: Farinera borda →**

### Làmines blanques i anell

La combinació de les amanites mortals.

**Fitxa: Farinera pudent →**

### Porus vermells o carn que es torna blava

Matagent i parents.

**Fitxa: Matagent →**

### Un lactari amb llet blanca

Només el grup del rovelló té llet taronja o vermella.

**Fitxa: Lactaris de llet blanca →**

### Bolet marró petit sobre fusta

Pot ser la galerina marginada, mortal.

**Fitxa: Galerina marginada →**

### Cortina o làmines color rovell

Cortinaris: alguns destrueixen els ronyons.

**Fitxa: Cortinari metzinós →**

### Bolet blanc i petit de prat

Clitocibes i lepiotes blanques. Massa risc.

**Fitxa: Clitocibes blancs →**

### Un «apagallums» de menys de 15 cm

Pot ser una lepiota mortal.

**Fitxa: Lepiotes petites →**

### Una bola que per dins no és blanca

Escleroderma, o un ou d'amanita si hi veus un bolet dibuixat.

**Fitxa: Escleroderma →**

**Cap truc casolà funciona.** Ni la moneda de plata, ni l'all, ni els cargols. Només una identificació segura. I si dubtes, no te'l mengis.


*Capítol I*

# Els clàssics

Els sis bolets que tothom busca als boscos catalans: rovelló, pinetell, cep, rossinyol, trompeta de la mort i camagroc. Aprèn-te'ls bé, amb els seus bessons.









Rovelló · 6 Pinetell · 7 Trompeta de la mort · 8 Camagroc · 9

RUSSULALS

*Lactarius sanguifluus · L. vinosus*



En el seu punt: barret taronja vinós, amb pocs cercles.

# Rovelló

També: rovelló de llet vermella, esclata-sang

★ CLÀSSIC · ● COMESTIBLE · EXCEL·LENT · ●○○ Nivell 1 · Fàcil

| Primavera | Estiu | **Tardor** | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

*El bolet més buscat de Catalunya. Surt sota els pins després de les pluges d'octubre: si en tallar-lo surt una llet de color vi, ja el tens.*

> **TRUC CLAU**
> Talla'l: la llet és vermell vi des del primer moment. Si és blanca, fora.

## COMPROVA-HO ABANS DE COLLIR-LO

1. Trenca'l o talla'l: ha de sortir llet de color (vermell vi o taronja), mai blanca.
2. Espera uns minuts: la zona tallada es torna verda.
3. Mira el peu: buit per dins i sovint amb clotets més foscos.
4. Mira les làmines: taronja o color vi, mai blanques ni crema.
5. Mira on és: sota pins, sempre.

**Després de la pluja:** surt entre 10 i 18 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 14.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–12 cm, convex i després en embut, taronja vinós. Sovint té pocs cercles o cap. Es taca de verd. |
| **A sota** | Làmines atapeïdes de color vi o rosat vinós, que es taquen de verd. |
| **Peu** | Curt i gruixut, buit, taronja vinós, sovint amb clotets més foscos. |
| **Carn** | Trencadissa com un guix. Treu llet vermell vi, com sang, que verdeja. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA





**Jove**

Jove: làmines de color vi i barret encara corbat.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret taronja vinós, amb pocs cercles.




**Vell**

Vell: tot tacat de verd i rovell, tou. Deixa'l.




**Passat**

Passat i descompost: ni el toquis.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Làmines de color vi: rovelló de llet vermella (L. sanguifluus o L. vinosus).



**DE PROP**

De costat: làmines de color vi i peu amb clotets més foscos.



**CANVI DE COLOR**

Taques verdes al barret: és normal, no vol dir que estigui fet malbé.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Pinetell: llet taronja pastanaga i cercles més marcats. També és bo.
**Fitxa: Pinetell →**



Lactaris de llet blanca (bolet de cabra, pinetell bord, enganyapastors): llet blanca. L'enganyapastors (L. zonarius) té cercles com el rovelló. Tòxics.
**Fitxa: Lactaris de llet blanca →**



Rússules taronges o vermelles: no fan llet, tenen el peu blanc i llis i es trenquen com un guix. Es confonen amb un rovelló sense cercles.
**Fitxa: Escaldabecs →**



Paxil enrotllat: no fa llet i es taca de marró. Perillós.
**Fitxa: Paxil enrotllat →**

## ON VIU




97 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes de pi blanc i pi pinyer, sovint en terres calcàries, de la costa a la muntanya mitjana.

## D'ON VE EL NOM

*Lactarius, de lac (llet): treu llet en tallar-lo. Sanguifluus, que vessa sang, per la llet vermella.*

**CONSELL**

Si no compleix les cinc comprovacions, no te l'enduguis: els cercles del barret no serveixen per decidir. El nom canvia segons la comarca: a molts llocs en diuen rovelló al rovelló i al pinetell. Pot tenyir l'orina de vermell: és normal i no fa mal.

RUSSULALS

*Lactarius deliciosus*



En el seu punt: taronja, amb cercles ben marcats al barret.

# Pinetell

També: rovelló (a moltes comarques)

★ CLÀSSIC · ● COMESTIBLE · MOLT BO · ●○○ Nivell 1 · Fàcil

| Primavera | Estiu | **Tardor** | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

**Pinedes** · **Unit als arbres** · **Sota: Làmines**

*El germà del rovelló: més taronja, amb cercles ben marcats al barret i una llet taronja com el suc de pastanaga.*

> **TRUC CLAU**
> Talla'l: la llet és taronja pastanaga. Si és blanca, fora.

## COMPROVA-HO ABANS DE COLLIR-LO

1. Trenca'l o talla'l: ha de sortir llet de color (vermell vi o taronja), mai blanca.
2. Espera uns minuts: la zona tallada es torna verda.
3. Mira el peu: buit per dins i sovint amb clotets més foscos.
4. Mira les làmines: taronja o color vi, mai blanques ni crema.
5. Mira on és: sota pins, sempre.

**Després de la pluja:** surt entre 10 i 18 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 14.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–15 cm, convex i després en embut, taronja amb cercles concèntrics més foscos ben marcats. Es taca de verd. |
| **A sota** | Làmines atapeïdes, taronja viu, que es taquen de verd. |
| **Peu** | Curt i buit, taronja, amb clotets més foscos. |
| **Carn** | Blanquinosa amb vetes taronja. Treu llet taronja pastanaga que al cap d'una estona verdeja. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA





**Jove**

Jove i ferm, amb la vora encara corbada cap avall.




**En el seu punt**

En el seu punt: taronja, amb cercles ben marcats al barret.




**Vell**

Vell: tot tacat de verd i tou. Deixa'l.

## JA COLLIT, A LA CISTELLA



Una cistella de pinetells: tallats nets, sense terra.




Pinetells a la Boqueria de Barcelona, en plena temporada.

## MIRA'L DE PROP



DE PROP

Gira'l: làmines taronja viu i peu amb clotets més foscos.



DE PROP

Els clotets taronja del peu (escrobícules), típics del pinetell.



DE PROP

Tallat: gotes de llet taronja pastanaga. Si fos blanca, fora.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Rovelló: llet vermell vi i làmines color vi. També és bo.
**Fitxa: Rovelló →**



Lactaris de llet blanca: el bolet de cabra té la vora peluda i l'enganyapastors té cercles com el pinetell. Llet blanca: tòxics.
**Fitxa: Lactaris de llet blanca →**



Paxil enrotllat: no fa llet i es taca de marró. Perillós.
**Fitxa: Paxil enrotllat →**

## ON VIU




178 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes de pi roig i pi pinyer, sovint en terres àcides, sobretot a la muntanya mitjana.

## D'ON VE EL NOM


*Lactarius, de lac (llet); deliciosus, deliciós.*

## CONSELL

Cuina'l igual que el rovelló: a la brasa o a la planxa, amb all i julivert.

CANTHAREL·LALS

*Craterellus cornucopioides*



En el seu punt: negres, ferms i en grup.

# Trompeta de la mort

També: trompeta negra, orella d'ase

★ CLÀSSIC · ● COMESTIBLE · MOLT BO · ●○○ Nivell 1 · Fàcil

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Plecs o llis

*Negra com el carbó i amagada entre les fulles seques. Costa de veure la primera; quan la trobes, mira al voltant, perquè mai va sola.*

**TRUC CLAU**

Un embut negre i buit sense làmines: cap bolet tòxic s'hi assembla.

**Després de la pluja:** surt entre 15 i 25 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 20.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | Trompeta o embut de 3–10 cm, buit fins a la base, negre o gris fosc, amb la vora ondulada. |
| **A sota** | Per fora és llisa o una mica arrugada, gris cendra. Sense làmines. |
| **Peu** | No en té de diferenciat: tot el bolet és un tub buit que s'estreny cap a baix. |
| **Carn** | Prima, elàstica i fosca, amb olor agradable. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Joves entre la molsa, amb la vora encara regular.




**En el seu punt**

En el seu punt: negres, ferms i en grup.




**Vell**

Vella: es torna marró grisenca, tova i esquinçada.



Una bona collita a la cistella de vímet.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Mira per dins: és buida fins a baix, com una trompeta.



**DE PROP**

Per fora és grisa i llisa, sense làmines.



**ON VIU**

Així la trobaràs: camuflada entre les fulles seques.

## CONFUSIONS PERILLOSES

Trompeta grisa (Craterellus cinereus): té plecs per fora. També comestible.

## ON VIU




54 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Rouredes, castanyedes i fagedes humides, entre la fullaraca.

## D'ON VE EL NOM

*Craterellus, petita copa; cornucopioides, en forma de corn de l'abundància.*

## CONSELL

S'asseca molt bé i en pols perfuma arrossos i salses.

CANTHAREL·LALS

*Craterellus lutescens*



En el seu punt: peus grocs i barrets marrons, en grup entre la molsa.

# Camagroc

★ CLÀSSIC · ● COMESTIBLE · MOLT BO · ●○○ Nivell 1 · Fàcil

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: oct–des

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Plecs o llis

*Quan les pinedes es tornen humides i fredes, el terra s'omple de peus grocs. On n'hi ha un, n'hi ha cent.*

**TRUC CLAU**

Peu groc i buit + barret marró en embut + sense làmines = camagroc.

**Després de la pluja:** surt entre 15 i 25 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 20.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 2–6 cm, en embut, marró fosc i amb la vora ondulada. |
| **A sota** | Llisa o amb plecs suaus i baixos, de color salmó groguenc. Sense làmines. |
| **Peu** | Groc taronja intens, buit i sovint aplanat. |
| **Carn** | Prima i elàstica. Olor afruitada. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA





**Jove**

Jove: barret petit i arrodonit, peu groc intens.




**En el seu punt**

En el seu punt: peus grocs i barrets marrons, en grup entre la molsa.




**Vell**

Vell: barret fosc, tou i arrugat. Deixa'l.



Camagrocs a la cistella.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota no té làmines: és llis o amb plecs suaus i pàl·lids.



**DE PROP**

Peu groc i buit per dins.



**ON VIU**

Surt en colònies grans a les pinedes humides.

## CONFUSIONS PERILLOSES

Camagroc gris (Craterellus tubaeformis): plecs més marcats i peu més apagat. També comestible.



Rossinyol ataronjat: té làmines de veritat i és tot taronja.
**Fitxa: Rossinyol ataronjat →**

## ON VIU




77 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes humides amb molsa, sovint a prop de rierols i a l'obaga. Surt en colònies grans.

## D'ON VE EL NOM

*Craterellus, petita copa; lutescens, que tira a groc, pel color del peu.*

## CONSELL

És dels millors per assecar.

BOLETALS

*Boletus edulis · B. aereus · B. pinophilus*



En el seu punt: barret marró, carnós, i peu gruixut i clar.

# Cep

També: sureny, sureny fosc (B. aereus)

★ CLÀSSIC · ● COMESTIBLE · EXCEL·LENT · ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Porus

*El tresor de les fagedes i rouredes: gros, carnós i perfumat. Abans de collir-lo, gira'l i mira el color dels porus.*

> **TRUC CLAU**
> Porus blancs o grocs + carn blanca que no blaveja + xarxa clara al peu.

**Després de la pluja:** surt entre 8 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 10.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 8–25 cm, marró (de crema a gairebé negre), carnós i llis. |
| **A sota** | Porus blancs de jove, després grocs i finalment verd oliva. No canvien de color en tocar-los. |
| **Peu** | Molt gruixut i panxut, clar, amb una xarxa fina blanquinosa a dalt. |
| **Carn** | Blanca i ferma, no canvia en tallar-la. Gust de nou. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Joves, rodons com taps de suro: són els més ferms i els millors.





**En el seu punt**

En el seu punt: barret marró, carnós, i peu gruixut i clar.




**Vell**

Vell: porus verd oliva i tous com una esponja. Deixa'l al bosc.




**Passat**

Rosegat i amb forats: dins hi haurà cucs.



Ceps collits a la cistella de vímet.



Ceps nets a casa: peu blanc i ferm, sense cucs.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Jove: porus blancs, com cotó. Carn ferma.



**DE PROP**

Adult: els porus ja són groguencs. Encara és bo si està ferm.



**DE PROP**

Peu gruixut amb una xarxa fina de color clar.



**DE PROP**

Sureny fosc (B. aereus): barret gairebé negre. També excel·lent.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Molleric amarg: porus rosats i xarxa fosca al peu. Molt amarg.

**Fitxa: Molleric amarg →**



Matagent: porus vermells i carn que blaveja. Tòxic.

**Fitxa: Matagent →**

## ON VIU




118 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Fagedes, rouredes, castanyedes, suredes i pinedes de muntanya.

## D'ON VE EL NOM

*Boletus, nom llatí dels bolets més apreciats; edulis, comestible; aereus, color de bronze.*

## CONSELL

És el bolet amb més cucs: talla'l allà mateix i deixa els corcats.

CANTHAREL·LALS

*Cantharellus cibarius*



En el seu punt: tot groc rovell d'ou, carnós, amb la vora ondulada.

# Rossinyol

★ CLÀSSIC · ● COMESTIBLE · EXCEL·LENT · ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: juny–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Plecs o llis

*Groc com un rovell d'ou i amb olor d'albercoc. El secret és passar-hi el dit per sota: no té làmines, té plecs.*

**TRUC CLAU**

Passa-hi el dit: els plecs del rossinyol són gruixuts i arrodonits, no làmines fines com pàgines d'un llibre.

**Després de la pluja:** surt entre 10 i 18 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 13.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 3–10 cm, groc rovell d'ou, primer convex i després en embut, amb la vora ondulada. |
| **A sota** | Plecs gruixuts, baixos i bifurcats, del mateix color, que baixen pel peu. No són làmines. |
| **Peu** | Ple, ferm, del mateix groc, que s'aprima cap a baix. |
| **Carn** | Blanca o groguenca, ferma, s'esfila com el pollastre. Olor d'albercoc. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove: petit, ferm i encara amb el barret arrodonit.




**En el seu punt**

En el seu punt: tot groc rovell d'ou, carnós, amb la vora ondulada.




**Vell**

Vell: taques fosques i vora esquinçada. Millor deixar-lo.



Una cistella de rossinyols: plecs taronja i peu ple.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: plecs gruixuts i bifurcats que baixen pel peu. No són làmines.



**DE PROP**

De prop: els plecs són baixos i arrodonits, com venes.



**DE PROP**

De perfil: forma d'embut i plecs fins al peu.



**ON VIU**

Creix a terra, entre la molsa i la fullaraca. Mai sobre fusta.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Gírgola d'olivera: taronja intens, làmines fines, en grups sobre soques. Tòxica.

**Fitxa: Gírgola d'olivera →**



Rossinyol ataronjat: làmines fines i toves, carn tova.

**Fitxa: Rossinyol ataronjat →**

## ON VIU




52 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes en sòls àcids; també pinedes. Sempre a terra.

## D'ON VE EL NOM

*Cantharellus, de kantharos (copa); cibarius, bo per menjar.*

*Capítol II*

# Altres fàcils

Nivell 1. Bolets amb un tret inconfusible i sense bessons perillosos.







Llengua de bou · 13 · Molleric · 14 · Bolet de tinta · 15

CANTHAREL·LALS

*Hydnum repandum*



En el seu punt: barret crema, carnós i irregular.

# Llengua de bou

També: llémena

● COMESTIBLE · BO ●○○ Nivell 1 · Fàcil

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–des

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Agullons

*Gira'l i sorpresa: en lloc de làmines té punxetes toves, com la llengua d'un gat. És dels més fàcils de reconèixer.*

**TRUC CLAU**

Gira'l: si a sota hi ha punxetes, és de la família de la llengua de bou. Cap bolet amb agullons és mortal.

**Després de la pluja:** surt entre 10 i 20 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 14.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 4–12 cm, irregular i gruixut, color crema, carn o ataronjat pàl·lid. |
| **A sota** | Agullons tous i fràgils, del mateix color, que baixen una mica pel peu. |
| **Peu** | Curt, gruixut, blanquinós, sovint descentrat. |
| **Carn** | Blanca, ferma i trencadissa. Amarga en els exemplars vells. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove: petit, ferm i blanquinós.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret crema, carnós i irregular.




**Vell**

Gran i vell: es taca de groc taronja i amarga.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota té agullons (punxetes toves), no làmines.



**DE PROP**

Agullons i peu blanc, curt i gruixut.



**ON VIU**

També surt a les pinedes, entre la pinassa.

## CONFUSIONS PERILLOSES

Sarcodon i Hydnellum (barret escatós o surat): amargs i durs, no comestibles.

## ON VIU




21 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Alzinars, rouredes, fagedes i pinedes. Sovint en rotllanes.

## D'ON VE EL NOM

*Hydnum, nom grec d'un bolet comestible; repandum, amb la vora ondulada i girada.*

## CONSELL

La llengua de bou blanca (Hydnum albidum) també és comestible. Els exemplars grans amarguen: cull-los joves.



En el seu punt: barret marró brillant, peu groguenc, en grup sota els pins.

# Molleric

També: pinetell de calceta (S. luteus)

● COMESTIBLE · ACCEPTABLE ●○○ Nivell 1 · Fàcil

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Porus

*Un bolet de pineda amb una esponja groga a sota i el barret enganxós. No és el més fi, però és fàcil i abundant.*

**TRUC CLAU**

Bolet amb esponja groga a sota i barret enganxós, sota pins.

**Després de la pluja:** surt entre 7 i 12 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 9.

## DESCRIPCIÓ


| | |
|---|---|
| **Barret** | 4–10 cm, marró groguenc o rogenc, llefiscós i brillant quan és humit; la pell es pela. |
| **A sota** | Porus petits i grocs que en els joves deixen anar gotetes blanques. |
| **Peu** | Groc pàl·lid amb granulacions; sense anell (el pinetell de calceta en té). |
| **Carn** | Groga pàl·lida i tova, no canvia de color. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove: barret arrodonit i ferm. El millor moment.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret marró brillant, peu groguenc, en grup sota els pins.




**Vell**

Vell: porus grans, verdosos i tous com una esponja mullada.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Porus grocs amb gotetes blanques: típic del molleric jove.



**DE PROP**

A sota té porus (com una esponja), no làmines.



**DE PROP**

Pinetell de calceta (S. luteus): té un anell al peu.



**ON VIU**

Sempre a prop de pins: aquí, al costat d'una pinya.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Boletus de porus vermells (matagent): descarta'ls tots.

**Fitxa: Matagent →**



Molleric amarg: porus rosats i gust molt amarg.

**Fitxa: Molleric amarg →**

## ON VIU




86 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes, sovint en grans quantitats després de les pluges.

## D'ON VE EL NOM

*Suillus, de sus (porc), per la textura greixosa; granulatus, amb granets al peu.*

## CONSELL

Pela el barret i treu els porus. A algunes persones els fa efecte laxant.

AGARICALS

*Coprinus comatus*



Jove, blanc i tancat com un ou allargat: és el moment de collir-lo.

# Bolet de tinta

● COMESTIBLE · MOLT BO (JOVE)  ●○○ Nivell 1 · Fàcil

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: abr–maig i set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*Surt blanc com un ou allargat i en poques hores es desfà en tinta negra. Cal ser ràpid: només és bo quan està ben blanc.*

**TRUC CLAU**

Cull-lo només amb les làmines totalment blanques i cuina'l el mateix dia.

**Després de la pluja:** surt entre 3 i 6 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 4.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–15 cm d'alt, cilíndric com un ou allargat, blanc amb escates llanoses; la vora es torna negra. |
| **A sota** | Làmines molt atapeïdes, blanques, després rosades i finalment negres i líquides. |
| **Peu** | Alt, blanc i buit, amb un anell petit que es mou. |
| **Carn** | Blanca i tendra; es desfà en tinta en poques hores. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA





**Jove**

Dos exemplars joves a la fullaraca. Làmines encara blanques per dins.




**En el seu punt**

Jove, blanc i tancat com un ou allargat: és el moment de collir-lo.




**Vell**

Comença a obrir-se i la vora es torna negra: ja no el cullis.




**Vell**

Barret obert amb la vora negra: s'està desfent en tinta.




**Passat**

Del tot desfet en una pasta negra. Així acaba sempre, en poques hores.

## MIRA'L DE PROP



**CANVI DE COLOR**

Al costat: un de vell (negre) i un de jove (blanc). La diferència d'un sol dia.



**ON VIU**

Surt en prats, marges i clarianes, sovint en grups.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Bolet de femer: gris i sense escates. Tòxic amb alcohol.

**Fitxa: Bolet de femer →**

## ON VIU




166 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats, marges de camins i terres remogudes, sovint en grups.

## D'ON VE EL NOM

*Coprinus, de kopros (fems), perquè surt en llocs adobats; comatus, amb cabellera, per les escates.*

## CONSELL

Es fa malbé en poques hores: no aguanta ni a la nevera.

*Capítol III*

# Compte, que tenen bessó

Nivell 2. Bolets bons amb un bessó tòxic. Cada exemplar s'ha de comprovar amb dos o tres trets.









Fredolic · 17 | Llenega negra · 18 | Carlet · 19 | Cama-sec · 20 | A

AGARICALS

*Tricholoma terreum*



En el seu punt: grisos, petits i en grup sota els pins.

# Fredolic

També: negret, brunet

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: oct–des

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Arriba amb el fred, quan ja no surt gairebé res: petits, grisos i a dotzenes sota els pins. Mira'ls un per un.*

**TRUC CLAU**

Petit, gris, sec al tacte, sense olor i a dotzenes sota els pins quan fa fred.

**Després de la pluja:** surt entre 12 i 20 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 15.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 3–7 cm, cònic i després pla amb un mamelló, gris ratolí, sec i fibrós com un feltre. |
| **A sota** | Làmines blanquinoses o grisenques, separades, amb una osca a tocar del peu. |
| **Peu** | Blanc, prim, fràgil i buit, sense anell. |
| **Carn** | Prima, blanca o grisenca, gairebé sense olor ni gust. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove i petit: cap a la cistella sencer.




**En el seu punt**

En el seu punt: grisos, petits i en grup sota els pins.




**Vell**

Vell: barret pla, esquinçat i ennegrit. Deixa'l.




**Passat**

Tou, brut i descompost: no el cullis.



Una cistella de fredolics a la pineda, a Santa Perpètua de Gaià.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines blanquinoses o grisenques i peu blanc.



**DE PROP**

Barret gris ratolí, sec i com de feltre.



**ON VIU**

Entre la pinassa, quan comença a fer fred.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Fredolic metzinós: més gros, escates en cercles, olor de farina, peu ple. Tòxic.

**Fitxa: Fredolic metzinós →**



Inocybe grisos: barret cònic i esquerdat. Tòxics.

**Fitxa: Inocybe →**

## ON VIU




68 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes, en grups molt nombrosos. Surt tard, amb les primeres glaçades.

## D'ON VE EL NOM

*Tricholoma, de thrix (pèl) i loma (vora), per la vora fibrosa; terreum, color de terra.*

## CONSELL

Com que se'n cullen molts de cop, és fàcil que se n'hi coli un d'una altra espècie. Els fredolics amargs (T. virgatum) tenen el barret punxegut i ratllat.

*Hygrophorus latitabundus*



En el seu punt: barret marró oliva, brillant i llefiscós.

# Llenega negra

També: mocosa, bavós

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Llefiscosa com un sabó i amb làmines blanques com la cera. Cada any torna a sortir al mateix racó de la pineda.*

**TRUC CLAU**

Si et rellisca dels dits com un sabó i té làmines blanques i ceroses, és una llenega.

**Després de la pluja:** surt entre 15 i 25 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 20.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 6–12 cm, marró oliva fosc, més fosc al centre, cobert d'una mucositat molt llefiscosa. |
| **A sota** | Làmines blanques, gruixudes, separades i ceroses, que baixen una mica pel peu. |
| **Peu** | Gruixut, blanc a dalt i llefiscós a la part de baix. |
| **Carn** | Blanca i ferma, amb olor suau. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove: barret arrodonit i ferm, ple de mucositat.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret marró oliva, brillant i llefiscós.




**Vell**

Vell: barret pla, tou i amb taques. Deixa'l.



Llenegues tallades a la cistella: el peu net, sense terra.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines blanques, gruixudes i separades, com de cera.



**DE PROP**

Làmines blanques i peu blanc amb puntets.



**ON VIU**

Sota la pinassa, sovint a la mateixa rodona cada any.

## CONFUSIONS PERILLOSES

Llenega blanca (Hygrophorus eburneus): tota blanca i llefiscosa. Es pot confondre amb bolets blancs tòxics.



Cortinaris: cortina i làmines color rovell.

**Fitxa: Cortinari metzinós →**

## ON VIU




43 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes, sobretot de pinassa i pi roig, en sòls calcaris.

## D'ON VE EL NOM

*Hygrophorus, que porta humitat; latitabundus, que s'amaga, perquè surt mig colgat.*

## CONSELL

Treu-li la pell del barret: és indigesta i pot amargar.

AGARICALS

*Hygrophorus russula*



En el seu punt: barrets rosats amb esquitxos de vi, ferms.

# Carlet

També: escarlet

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: oct–des

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Tacat de vi i molt ferm, surt en grups grans sota les alzines quan la tardor ja va de baixada.*

**TRUC CLAU**

Làmines blanques tacades de vi + bosc d'alzines a finals de tardor.

**Després de la pluja:** surt entre 10 i 16 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 12.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–12 cm, carnós, rosat vinós amb esquitxos més foscos. |
| **A sota** | Làmines blanques que es taquen de vi, gruixudes, que baixen una mica pel peu. |
| **Peu** | Gruixut, ple, blanc tacat de vinós. |
| **Carn** | Blanca, molt compacta, una mica amarga. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Joves: més pàl·lids, amb la vora corbada.




**En el seu punt**

En el seu punt: barrets rosats amb esquitxos de vi, ferms.




**Vell**

Vell: trencat, tou i ple de taques. Deixa'l.



Un carlet acabat de collir: sencer i net.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines blanques que es taquen de rosa vi.



**DE PROP**

Làmines que baixen una mica pel peu, i peu blanc tacat.



**DE PROP**

Barret amb esquitxos vinosos, més fosc al centre.



**ON VIU**

Surt en grups ('escarleteres') sota alzines i roures.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Fals carlet: làmines rosades i olor de farina rància. Tòxic fort.

**Fitxa: Fals carlet →**

## ON VIU




18 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Alzinars i rouredes, en grups grans ('escarleteres') i rotllanes.

## D'ON VE EL NOM

*Russula, vermellós:* s'*assembla a una rússula vermella.*

## CONSELL

Tradicionalment es conserva en sal, vinagre o oli.

*Marasmius oreades*



En el seu punt: color cuir, ferms, en grup entre l'herba.

# Cama-sec

També: carrereta

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: abr–juny i set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*Un bolet petit de prat que fa rotllanes. El seu truc: el peu es retorça com un cordill sense trencar-se.*

**TRUC CLAU**

Retorça el peu dues voltes: el cama-sec no es trenca. Després mira que les làmines siguin molt separades.

**Després de la pluja:** surt entre 3 i 7 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 5.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 2–5 cm, color cuir o crema, amb un mamelló; s'aclareix en assecar-se. |
| **A sota** | Làmines molt separades, crema, que no baixen pel peu. |
| **Peu** | Prim, dur i elàstic: es retorça sense trencar-se. |
| **Carn** | Prima i blanca, olor suau d'ametlla amarga. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Joves: barret arrodonit amb mamelló.




**En el seu punt**

En el seu punt: color cuir, ferms, en grup entre l'herba.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

La clau: làmines MOLT separades, color crema.



**DE PROP**

Làmines separades que no baixen pel peu.



**DE PROP**

Peu prim, dur i elàstic: es retorça sense trencar-se.



**ON VIU**

Surt als prats, sovint formant rotllanes.



**CANVI DE COLOR**

S'asseca sol i es reviu amb l'aigua:
d'aquí el nom de cama-sec.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Clitocibes blancs: làmines atapeïdes que baixen pel peu.
Tòxics, i surten als mateixos prats.
**Fitxa: Clitocibes blancs →**



Inocybe: barret còmic i esquerdat. Tòxics.
**Fitxa: Inocybe →**

## ON VIU




66 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats, pastures i marges de camins.

### D'ON VE EL NOM

*Marasmius, de marasmos (assecar-se), perquè s'asseca i reviu; oreades, les nimfes de les muntanyes.*

### CONSELL

Cull-los d'un en un i revisa cada exemplar. Menja només el barret.

*Macrolepiota procera*



En el seu punt: barret obert i gran, peu alt i prim.

# Apagallums

També: paloma, cogomassa

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Prats · Bosc de fulla · Pinedes

Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*El gegant dels marges i les clarianes: un para-sol amb el peu de pell de serp. Només el culliràs si és ben gran.*

**TRUC CLAU**

Regla dels 15 cm: si el barret obert no fa almenys 15 cm, no el cullis.

**Després de la pluja:** surt entre 5 i 10 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 7.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 15–30 cm, primer com una baqueta de timbal i després obert com un para-sol, amb escates marrons i un mamelló fosc. |
| **A sota** | Làmines blanques, lliures i atapeïdes. |
| **Peu** | Alt, prim i buit, amb dibuix de pell de serp i base bulbosa sense volva. Anell doble que llisca. |
| **Carn** | Blanca, tendra al barret i fibrosa al peu. Olor de nou. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove i tancat (baqueta de timbal): espera que s'obri per comprovar la mida.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret obert i gran, peu alt i prim.




**Vell**

Vell: barret girat cap amunt, tou i fosc. Deixa'l.

## JA COLLIT, A LA CISTELLA



Una cistella d'apagallums: barrets grans i escatosos.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Peu amb dibuix de pell de serp: la marca de l'apagallums.



**DE PROP**

A sota: làmines blanques i anell gruixut que es mou.



**DE PROP**

Compara la mida amb la moneda: com a mínim 15 cm.



**ON VIU**

Clarianes i marges de camins, sobre la fullaraca.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Lepiotes petites: menys de 8 cm, anell fràgil. MORTALS.

**Fitxa: Lepiotes petites →**



Paloma vermellosa: peu llis i carn que es torna vermella.

**Fitxa: Paloma vermellosa →**

## ON VIU




333 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Clarianes, marges de camins, prats i boscos aclarits.

## D'ON VE EL NOM

*Macrolepiota, lepiota gran (lepis, escata); procera, alta i esvelta.*

## CONSELL

Menja només el barret, sempre ben cuinat.

AGARICALS

*Pleurotus eryngii · P. ostreatus*



Gírgola de panical en el seu punt: barret marró, carnós, i làmines que baixen pel peu.

# Gírgoles

Gírgola de panical i orellana o gírgola de soca

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: oct–des

Prats · Sobre fusta · Viu sobre plantes o bolets

Sota: Làmines

*La de panical neix als camps, enganxada a les arrels d'un card sec. La de soca, en pisos sobre els troncs.*

> **TRUC CLAU**
> La de panical neix de les arrels d'un panical; la de soca creix sobre fusta i mai és taronja.

**Després de la pluja:** surt entre 7 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 10.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 4–12 cm, marró grisenc (panical) o gris en forma d'ostra (soca), carnós, amb la vora enrotllada. |
| **A sota** | Làmines blanquinoses que baixen molt pel peu. |
| **Peu** | Curt, sovint descentrat o lateral, blanc. |
| **Carn** | Blanca, ferma i olorosa. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove, entre l'herba d'un camp.




**Jove**

Gírgoles de soca joves, sortint de l'escorça.




**En el seu punt**

Gírgola de panical en el seu punt: barret marró, carnós, i làmines que baixen pel peu.




**Vell**

Vella: esquinçada i tova. Deixa-la.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines blanquinoses que baixen molt pel peu.



**DE PROP**

Barret i làmines: el peu sovint surt descentrat.



**ON VIU**

Gírgola de soca (orellana): en pisos sobre troncs tallats.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Gírgola d'olivera: taronja intens, sobre oliveres. Tòxica.

**Fitxa: Gírgola d'olivera →**



Clitocibes de prat: blancs i no surten del panical.

**Fitxa: Clitocibes blancs →**

## ON VIU




47 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

La de panical, en camps i ermots, sobre les arrels del panical. La de soca, sobre troncs de plàtans, pollancres o faigs.

## D'ON VE EL NOM

*Pleurotus, de pleuron (costat) i ous (orella): peu lateral i forma d'orella; eryngii, de l'Eryngium (panical).*

*Chroogomphus rutilus*



Cama de perdiu en el seu punt: barret vermellós i làmines ocre que baixen pel peu.

# Cama de perdiu

● COMESTIBLE · BO  ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–des

Pinedes  Viu sobre plantes o bolets  Sota: Làmines

*A les pinedes de tardor, un bolet color de coure amb les làmines gruixudes. Quan el cuines, tenyeix el plat de color vi.*

**TRUC CLAU**


Làmines gruixudes que baixen pel peu + carn taronja + sota pins = cama de perdiu.

**Després de la pluja:** surt entre 10 i 20 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 14.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 4–10 cm, vermell coure o marró vinós, amb un mamelló punxegut; llefiscós quan és humit. |
| **A sota** | Làmines gruixudes i separades, ocre, que baixen molt pel peu i s'enfosqueixen fins a negre violaci. |
| **Peu** | Del color del barret, groguenc a la base, que s'aprima cap a baix. |
| **Carn** | Taronja salmó que es torna vinosa en coure-la. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**En el seu punt**

Cama de perdiu en el seu punt: barret vermellós i làmines ocre que baixen pel peu.




**Vell**

Vella: làmines fosques per les espores negres. Deixa-la.

## JA COLLIT, A LA CISTELLA



A la cistella amb altres bolets de pineda.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines gruixudes, separades, que baixen molt pel peu.



**DE PROP**

Carn i peu de color taronja salmó.



**ON VIU**

Sempre sota pins, entre la pinassa.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Cortinari metzinós: làmines color rovell que no baixen pel peu, sota roures i castanyers. MORTAL.

**Fitxa: Cortinari metzinós →**



Rossinyol ataronjat: làmines fines i toves, carn prima.

**Fitxa: Rossinyol ataronjat →**

## ON VIU




29 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes. Viu associada als pins i a les arrels dels mollerics.

## D'ON VE EL NOM

*Chroogomphus, de chroa (color) i gomphos (clau), per la forma de clau; rutilus, vermell brillant.*

## CONSELL

Les espores són negres i embruten els altres bolets: porta-la a part a la cistella.

AGARICALS

*Lycoperdon perlatum*



Jove, blanc i ple de berrugues: és el moment de collir-lo.

# Pet de llop

● COMESTIBLE · ACCEPTABLE (JOVE)  ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: jul–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Prats

Descompon matèria morta · Sota: Bola o corall

*Una bola blanca coberta de perletes. Jove és bona; vella, quan la trepitges fa un núvol de pols.*

**TRUC CLAU**

Talla'l de dalt a baix: només és bo si per dins és blanc pur i uniforme. Si hi veus la silueta d'un bolet, és un ou d'amanita. Si és negre o violaci, és un escleroderma.

**Després de la pluja:** surt entre 5 i 9 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 7.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | Cos en forma de pera, 3–8 cm, blanc i cobert de berrugues petites com perles que es desprenen. |
| **A sota** | No té làmines ni porus: per dins és una massa blanca i compacta que es torna groga, verdosa i finalment pols marró. |
| **Peu** | Curt i ample, fa part del mateix cos. |
| **Carn** | Blanca i tova de jove; després esponjosa i en pols. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Grup de joves, blancs i ferms.





**En el seu punt**

Jove, blanc i ple de berrugues: és el moment de collir-lo.




**Vell**

Obert per dalt: ja treu les espores com un fum.




**Vell**

Vell: per dins s'ha tornat marró i en pols.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Talla'l de dalt a baix: per dins ha de ser BLANC i compacte.



**DE PROP**

Tallat: blanc i uniforme, sense cap silueta de bolet a dins.



**DE PROP**

De prop: berrugues com perletes que es desprenen.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Escleroderma: pell gruixuda i dura, per dins negre violaci. Tòxic.

**Fitxa: Escleroderma →**



Ou d'amanita: tallat, es veu el dibuix d'un bolet a dins. Pot ser MORTAL.

**Fitxa: Farinera borda →**

## ON VIU




63 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Tota mena de boscos, sovint entre la fullaraca i la molsa.

## D'ON VE EL NOM

*Lycoperdon, de lykos (llop) i perdon (pet), per la pols que treu en esclafar-lo; perlatum, ple de perles.*

## CONSELL

No en respiris la pols: les espores poden irritar els pulmons.

*Calvatia gigantea*



Jove i blanc enmig del prat: és el moment de collir-lo.

# Pet de llop gegant

També: bufa de llop

● COMESTIBLE · BO (MOLT JOVE) ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: jul–oct

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Bola o corall

*Una bola blanca com una pilota de futbol enmig del prat. Per la mida costa de confondre, però només es menja mentre per dins és blanca i ferma com un formatge fresc.*

**TRUC CLAU**

Talla'l pel mig: només és bo si és blanc pur i homogeni. Si groguegeja, és tou o fa olor forta, ja és vell.

**Després de la pluja:** surt entre 7 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 10.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | Bola de 20–50 cm (de vegades més), blanca, llisa i suau com el cuir, sense berrugues. |
| **A sota** | No té làmines: per dins és una massa blanca i compacta que es torna groga, verdosa i al final pols marró oliva. |
| **Peu** | Sense peu: només un cordó d'arrels a la base. |
| **Carn** | Blanca i ferma, com un formatge fresc, quan és jove. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA



**Jove**

Encara petit, de la mida d'un ou: talla'l sempre per descartar un ou d'amanita.




**En el seu punt**

Jove i blanc enmig del prat: és el moment de collir-lo.




**Vell**

Vell: per dins s'ha tornat groc i tou. Ja no es menja.




**Passat**

Molt vell: marró, sec i ple de pols d'espores.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Amb la mà al costat: pot fer més de 30 cm.



**DE PROP**

Tallat: blanc pur i ferm, com un formatge fresc. Així es pot menjar.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Ou d'amanita: quan el pet de llop és petit (menys de 10 cm) s'hi pot assemblar. Tallat, l'ou té la silueta d'un bolet a dins. MORTAL.

**Fitxa: Farinera borda →**



Escleroderma: pell gruixuda i escatosa, i per dins negre violaci. Tòxic.

**Fitxa: Escleroderma →**

## ON VIU




Només 4 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats rics, marges de camps, vores de rius i jardins, sobretot a muntanya. A Catalunya és poc freqüent.

## D'ON VE EL NOM

*Calvatia, de calvus (calb), per la pell llisa; gigantea, gegant.*

## CONSELL

Talla'l a llesques com si fos pa i cuina'l el mateix dia: es fa malbé de pressa.

AGARICALS

*Calvatia utriformis*



Jove: blanc, amb la pell que comença a fer plaques.

# Pet de llop de prat

● COMESTIBLE · ACCEPTABLE (MOLT JOVE) ●●○ Nivell 2 · Compte

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: juny–oct

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Bola o corall

*Una bola blanca i grossa als prats de pastura de muntanya. La pell s'esquerda en plaques com un mosaic i, de vell, queda una copa marró plena de pols que aguanta mesos.*

**TRUC CLAU**

Talla'l de dalt a baix: ha de ser blanc pur, sense cap dibuix. Si hi veus un bolet en miniatura, és un ou d'amanita.

**Després de la pluja:** surt entre 7 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 10.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | Bola o pera de 8–20 cm, blanca i aplanada per dalt; la pell s'esquerda en plaques poligonals. |
| **A sota** | Per dins, blanca i compacta de jove; després groc oliva i pols marró. |
| **Peu** | Base ampla i arrugada, sense peu de debò. De vell queda una copa buida. |
| **Carn** | Blanca i tova de jove, esponjosa després. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Petit i blanc en un prat de muntanya.




**En el seu punt**

Jove: blanc, amb la pell que comença a fer plaques.




**Vell**

Al costat d'un de jove, un de vell: groc, esquerdat i obert.




**Passat**

La copa vella i buida que queda al prat durant mesos.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Tallat: blanc i uniforme per dins, sense cap silueta. Així és bo.



**DE PROP**

De prop: la pell s'esquerda en plaques, com un mosaic.

## CONFUSIONS PERILLOSES




Pet de llop gegant: encara més gros i amb la pell llisa, sense plaques. També comestible de jove.

**Fitxa: Pet de llop gegant →**



Ou d'amanita: tallat, té la silueta d'un bolet a dins. MORTAL.

**Fitxa: Farinera borda →**



Escleroderma: negre per dins i pell gruixuda. Tòxic.

**Fitxa: Escleroderma →**

## ON VIU




34 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats de pastura i clarianes de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu.

## D'ON VE EL NOM

*Calvatia, de calvus (calb); utriformis, en forma d'odre (utre).*

## CONSELL


Les copes velles i buides es veuen de lluny: si en trobes, torna-hi l'any següent a principi d'estiu.

*Capítol IV*

# Només amb experts

Nivell 3. Bolets que es poden confondre amb bolets mortals. Aprèn-los, però no te'ls mengis sense una persona experta al costat.






Ou de reig · 28 | Llora i carbonera · 29 | Pimpinella morada · 30 | C

*Amanita caesarea*



En el seu punt: barret taronja, peu groc i volva blanca a la base.

# Ou de reig

També: reig, reig ver

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●●● Nivell 3 · Expert

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–oct

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*El bolet dels emperadors romans: taronja, groc i preciós. També és el que més s'assembla a un bolet mortal quan encara és un ou.*

**TRUC CLAU**

Groc, groc, groc: làmines, anell i peu han de ser grocs. Si alguna part és blanca, llença'l.

**Després de la pluja:** surt entre 8 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 11.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 8–20 cm, taronja vermell intens, llis, sovint amb un tros de volva blanca. |
| **A sota** | Làmines GROGUES i lliures. |
| **Peu** | Groc, amb anell groc penjant i una volva blanca en forma de sac. |
| **Carn** | Blanca, groga sota la pell. Olor suau. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

L'ou s'obre i mostra el taronja. Només un expert el pot collir així.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret taronja, peu groc i volva blanca a la base.




**Vell**

Vell: barret pla i descolorit. Ja no és segur identificar-lo bé.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Ou obert: per dins, làmines GROGUES i barret taronja.



**DE PROP**

Volva blanca gran com un sac, i làmines grogues.



**DE PROP**

Làmines i peu grocs. Si fossin blancs, no seria un reig.



**ON VIU**

Alzinars i rouredes assolellats, a final d'estiu i principi de tardor.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Reig bord: làmines i peu BLANCS. Tòxic.

**Fitxa: Reig bord →**



Farinera borda en fase d'ou: per fora és idèntica. MORTAL.

**Fitxa: Farinera borda →**

## ON VIU




61 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Alzinars, suredes, rouredes i castanyedes assolellats.

## D'ON VE EL NOM

*Amanita, nom grec d'uns bolets del mont Amanus; caesarea, dels cèsars, que el tenien per un menjar d'emperador.*

## CONSELL

No cullis mai ous tancats. Només amb una persona experta al costat.

RUSSULALS

*Russula virescens · R. cyanoxantha*



Llora en el seu punt: barret verd que s'esquerda en mosaic.

# Llora i carbonera

També: llora verda, llores

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●● Nivell 3 · Expert

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: juny–oct

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Verda i esquerdada com un mosaic. És bona, però és verda com la farinera borda: només per a qui ja la coneix bé.*

**TRUC CLAU**

Arrenca-la sencera: sense anell, sense volva i trencament com de guix. Si dubtes d'un sol tret, deixa-la.

**Després de la pluja:** surt entre 7 i 12 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 9.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 6–14 cm, verd clapat i esquerdat en mosaic (llora) o violeta, blau i verd (carbonera). |
| **A sota** | Làmines blanques i atapeïdes; en la carbonera són flexibles i no es trenquen. |
| **Peu** | Blanc i ferm, SENSE anell i SENSE volva. |
| **Carn** | Blanca, es trenca com un guix. Gust suau. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove: barret arrodonit, verd pàl·lid i ferm.




**En el seu punt**

Llora en el seu punt: barret verd que s'esquerda en mosaic.




**Vell**

Vella i rosegada: deixa-la.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines blanques i peu blanc. Ni anell ni volva.



**DE PROP**

Peu blanc i llis fins a baix, sense sac a la base.



**DE PROP**

Carbonera (R. cyanoxantha): barret violeta grisós amb tons verds.



**ON VIU**

Alzinars, rouredes i fagedes, entre la fullaraca.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Farinera borda: barret verd oliva, anell i volva. MORTAL.

**Fitxa: Farinera borda →**



Escaldabecs: barret vermell i gust molt picant.

**Fitxa: Escaldabecs →**

## ON VIU




27 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes.

## D'ON VE EL NOM

*Russula, vermellós (moltes ho són); virescens, que verdeja; cyanoxantha, blava i groga.*



En el seu punt: tota violeta, carnosa i amb el peu gruixut.

# Pimpinella morada

● COMESTIBLE · BO (SEMPRE CUINADA) ●●● Nivell 3 · Expert

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: oct–des

Pinedes · Bosc de fulla · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*Tota violeta i amb olor de fruita, apareix a final de tardor entre les fulles. Sempre cuinada, i amb l'esporada feta.*

**TRUC CLAU**

Fes l'esporada: deixa el barret unes hores sobre paper. Rosa pàl·lid = pimpinella; marró rovell = cortinari.

**Després de la pluja:** surt entre 15 i 25 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 20.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 6–15 cm, violeta que passa a marró lilós, llis i humit. |
| **A sota** | Làmines atapeïdes, violetes, que es tornen terroses amb l'edat. |
| **Peu** | Gruixut, violeta i fibrós, sense anell ni cortina. |
| **Carn** | Lilosa i tendra, olor afruitada. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




### Jove

Jove: barret violeta intens i vora corbada.




### En el seu punt

En el seu punt: tota violeta, carnosa i amb el peu gruixut.




### Vell

Vella i descolorida: ja no es reconeix bé. Deixa-la.




### Passat

Passada, tova i esquinçada.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines violetes i atapeïdes. Sense cortina.



**DE PROP**

De prop: làmines i peu violetes.



**CANVI DE COLOR**

Amb l'edat el barret perd el violeta i es torna marró rosat.



**ON VIU**

Pinedes i fullaraca acumulada, a finals de tardor.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Cortinaris violetes: cortina i esporada marró rovell. Alguns molt tòxics.

**Fitxa: Cortinari metzinós →**



Inocybe de tons lila: petites i amb barret cònic.

**Fitxa: Inocybe →**

## ON VIU




38 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes, alzinars, fullaraca acumulada i compost.

## D'ON VE EL NOM

*Lepista, de lepastē (copa); nuda, nua, sense vel.*

## CONSELL

Crua és tòxica: cuina-la sempre bé.

AGARICALS

*Agaricus campestris*



En el seu punt: barret blanc i làmines rosades.

# Camperol

Xampinyó silvestre

● COMESTIBLE · BO ●●● Nivell 3 · Expert

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: maig–juny i set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*El xampinyó dels prats. És bo i conegut, però té bessons blancs mortals: mira'n sempre les làmines i la base.*

**TRUC CLAU**

Rasca la base del peu: si es torna groc canari, fora. Si les làmines són blanques, fora.

**Després de la pluja:** surt entre 4 i 8 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 6.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 4–10 cm, blanc sedós, primer rodó i després convex. |
| **A sota** | Làmines lliures, rosa viu de jove i marró xocolata de vell. Mai blanques en un exemplar obert. |
| **Peu** | Curt i blanc, amb un anell fi que desapareix. Sense volva. |
| **Carn** | Blanca que roseja en tallar-la. Olor agradable. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove: rodó i blanc, entre l'herba del prat. Gira'l per veure les làmines.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret blanc i làmines rosades.




**Vell**

Vell: làmines marró xocolata, gairebé negres, i carn tova. Deixa'l.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Làmines ROSA i anell senzill. Mai blanques en un exemplar obert.



**DE PROP**

Gira'l sempre: làmines rosades i peu blanc sense volva.



**ON VIU**

Prats i pastures, sovint on hi pastura bestiar.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Bola de neu pudent: groc en rascar-lo i olor de tinta.

**Fitxa: Bola de neu pudent →**



Farinera pudent: tota blanca, làmines blanques i volva. MORTAL.

**Fitxa: Farinera pudent →**

## ON VIU




23 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats i pastures, sovint on hi ha bestiar.

## D'ON VE EL NOM

*Agaricus, del grec agarikon; campestris, dels camps.*

AGARICALS

*Agaricus arvensis*



Bola de neu: barrets blancs i làmines rosa grisenc.

# Bola de neu

Xampinyó d'anís

● COMESTIBLE · BO ●●● Nivell 3 · Expert

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: juny–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*Gran i blanca com una bola de neu, fa olor d'anís. Però té bessons blancs que fan mal, i un que mata.*

**TRUC CLAU**

Olor d'anís + groc suau en fregar el barret. Si la base del peu es torna groc intens i fa olor de tinta, és la bola de neu pudent.

**Després de la pluja:** surt entre 7 i 12 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 9.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 8–20 cm, blanc, que es torna una mica groguenc en fregar-lo; rodó i després convex. |
| **A sota** | Làmines lliures, blanc grisenc, després rosa grisenc i finalment marró xocolata. |
| **Peu** | Blanc i robust, amb un anell gran que a sota té una roda dentada. |
| **Carn** | Blanca, olor d'anís o d'ametlla amarga. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA




**Jove**

Jove: rodona i blanca com una bola de neu.




**En el seu punt**

Bola de neu: barrets blancs i làmines rosa grisenc.




**Vell**

Vella: làmines marró xocolata. Deixa-la.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Làmines rosa grisenc. Mai blanques en un exemplar obert.



**DE PROP**

Anell gran amb una roda dentada a la cara de sota.



**ON VIU**

Prats i pastures, sovint en grups.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Bola de neu pudent: groc canari a la base i olor de tinta. Tòxic.

**Fitxa: Bola de neu pudent →**



Farinera pudent: làmines sempre blanques i volva. MORTAL.

**Fitxa: Farinera pudent →**

## ON VIU




Només 1 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats, pastures i marges.

## D'ON VE EL NOM

*Agaricus, del grec agarikon; arvensis, dels camps de conreu.*

## CONSELL

Arrenca-la sencera: si a la base hi ha un sac (volva), no és un xampinyó.



Farinera: gran, tota blanca, amb una volva blanca i gruixuda.

# Farinera

També: cul blanc

● COMESTIBLE · ACCEPTABLE · NO RECOMANABLE ●●● Nivell 3 · Expert

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Una amanita blanca i grossa dels boscos calcaris. En alguns pobles es menja, però s'assembla massa a dues amanites que fan mal.*

**TRUC CLAU**

La volva ha de ser BLANCA. Si té tons taronja o rovell, és Amanita proxima.

**Després de la pluja:** surt entre 7 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 10.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 10–25 cm, blanc, gruixut, amb la vora coberta de restes farinoses que pengen. |
| **A sota** | Làmines lliures, blanques o crema. |
| **Peu** | Robust, blanc i farinós, amb un anell cremós que es desfà. Volva blanca, gruixuda i gran. |
| **Carn** | Blanca i ferma, olor feble. |

## AL LLARG DE LA SEVA VIDA



**Jove**

Jove: surt de terra com un ou blanc. Així no es pot identificar.



**En el seu punt**

Farinera: gran, tota blanca, amb una volva blanca i gruixuda.

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Làmines crema i peu farinós.



**DE PROP**

Vora del barret amb restes farinoses que pengen.



**DE PROP**

Anell cremós que es desfà i volva gran.



**ON VIU**

Pinedes i alzinars de terra calcària.

## CONFUSIONS PERILLOSES



Amanita proxima: volva taronja rovellada i anell membranós. Danya els ronyons.

**Fitxa: Amanita proxima →**



Farinera pudent: més esvelta, tota blanca. MORTAL.

**Fitxa: Farinera pudent →**

## ON VIU




87 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes i alzinars de terra calcària.

## D'ON VE EL NOM

*Amanita, nom grec d'uns bolets del mont Amanus; ovoidea, en forma d'ou, pel barret jove.*

## CONSELL

Els micòlegs desaconsellen collir-la si no tens molta experiència.

*Capítol V*

# Els mortals

Aprèn-te aquests abans que cap comestible. Els seus símptomes triguen hores o dies, i quan arriben el fetge o els ronyons ja estan danyats.









Farinera borda · 35 · Farinera pudent · 36 · Lepiotes petites · 37 · G



Farinera borda adulta: barret verd oliva, anell com una faldilla i volva a la base.

# Farinera borda

També: cogoma borda, pentinella borda

● MORTAL

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

*La responsable de gairebé totes les morts per bolets. No fa olor estranya ni té mal gust, i per això és tan perillosa.*

**Què fa:** Un sol exemplar pot matar un adult. Els símptomes triguen de 6 a 24 hores; després hi ha una millora falsa mentre el fetge falla.

**COM EVITAR-LO**

Làmines blanques + anell + volva = fora. Renta't les mans després de tocar-la.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–15 cm, verd oliva, groguenc o blanquinós, amb fibres radials fosques; sense berrugues. |
| **A sota** | Làmines BLANQUES, lliures i atapeïdes. |
| **Peu** | Blanc amb taques en zig-zag, anell blanc com una faldilla i VOLVA blanca en forma de sac. |
| **Carn** | Blanca; olor dolça que amb l'edat es torna desagradable. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Sortint de l'ou: el sac blanc (volva) embolica la base.



**JOVE**

Jove: barret arrodonit i volva gran. Ja és mortal.



**DE PROP**

A sota: làmines BLANQUES i anell penjant.



**DE PROP**

Làmines blanques i la base amb volva: la combinació que mata.



**VARIACIÓ**

El barret pot ser groc verdós...



**VARIACIÓ**

...gairebé blanc o beix...



**VARIACIÓ**

...o verd pàl·lid. El color no serveix per descartar-la.

## ES CONFON AMB



Llora i carbonera (sense anell ni volva).

**Fitxa: Llora i carbonera →**



Ou de reig en fase d'ou (groc per dins).

**Fitxa: Ou de reig →**



Camperol (làmines rosades o marrons).

**Fitxa: Camperol →**

## ON VIU




62 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes; de vegades pinedes.

## D'ON VE EL NOM

*Phalloides, en forma de fal·lus, per com surt de l'ou.*



Farinera pudent: tota blanca, amb anell i volva.

# Farinera pudent

També: àngel destructor

● MORTAL

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Tota blanca, elegant i mortal. Si trobes un bolet blanc amb anell i volva, deixa'l i renta't les mans.*

**Què fa:** Mateixes toxines que la farinera borda. Mortal.

**COM EVITAR-LO**

Un bolet tot blanc amb làmines blanques no és mai per a qui comença.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–10 cm, tot blanc, cònic de jove, una mica viscós. |
| **A sota** | Làmines blanques i lliures. |
| **Peu** | Blanc i escatós, amb anell fràgil i volva en sac. |
| **Carn** | Blanca, olor desagradable. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Jove sortint de l'ou: ja és mortal.



**DE PROP**

Làmines blanques. Un xampinyó obert les tindria rosa o marrons.



**DE PROP**

Peu blanc i fibrós amb restes d'anell.



**DE PROP**

De jove a vella: tots els exemplars són blancs de dalt a baix.



**ON VIU**

Boscos de muntanya, sovint entre la molsa.

## ES CONFON AMB



Camperol (làmines rosades o marrons).

**Fitxa: Camperol →**



Bola de neu (olor d'anís, sense volva).

**Fitxa: Bola de neu →**

## ON VIU




Encara no hi ha observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: guia't per l'hàbitat. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Boscos de muntanya, coníferes i fagedes, en sòls àcids.

*Virosa, verinosa.*



Lepiota brunneoincarnata: petita, barret amb escates marró rosat.

# Lepiotes petites

També: lepiota metzinosa

● MORTAL

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Bosc de fulla · Prats · Descompon matèria morta

Sota: Làmines

*Semblen apagallums en miniatura, però algunes porten el mateix verí que la farinera borda.*

**Què fa:** El 2011 un home de Mataró va morir per una L. brunneoincarnata.

**COM EVITAR-LO**

Qualsevol 'apagallums' petit és una lepiota fins que no es demostri el contrari.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 2–8 cm, amb escates marró rosat o vinós sobre fons clar, més fosc al centre. |
| **A sota** | Làmines blanques i lliures. |
| **Peu** | Curt, amb bandes escatoses rosades; anell fràgil o només una zona marcada. |
| **Carn** | Blanca o rosada, olor afruitada. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Peu rosat amb bandes, i làmines blanques.



**DE PROP**

Barret amb escates en cercles, més fosc al centre.



**DE PROP**

Grup d'exemplars: tots fan menys de 8 cm.




**DE PROP**

Lepiota cristata: blanca, amb escates marrons i un botó fosc al centre.



**DE PROP**

L. cristata de prop: un apagallums en miniatura. Mai el cullis.

## ES CONFON AMB



Apagallums (més de 15 cm, anell mòbil, pell de serp).

**Fitxa: Apagallums →**

## ON VIU




13 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Alzinars, rouredes, marges de camins, jardins i parcs.

## D'ON VE EL NOM

*Lepiota, de lepis (escata) i ous (orella); brunneoincarnata, marró i color de carn.*



Galerina marginada: bolets marró mel en grup sobre fusta molsosa.

# Galerina marginada

● **MORTAL**

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–des

**Sobre fusta** **Descompon matèria morta** **Sota: Làmines**

*Un bolet marró petit que creix sobre la fusta. Sembla inofensiu i porta verí mortal.*

**Què fa:** Mateixes toxines que la farinera borda. Mortal.

**COM EVITAR-LO**

No cullis bolets marrons petits que surten de la fusta.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 2–6 cm, marró mel, llis i brillant quan és humit, amb la vora estriada. |
| **A sota** | Làmines marró rovell. |
| **Peu** | Prim, marró i fibrós, amb un anell petit. |
| **Carn** | Prima, olor de farina. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Peu prim amb un anell petit. Barret llis i brillant.



**DE PROP**

Làmines marró rovell i barret ataronjat.



**DE PROP**

Petita i prima: cap aquí la mida d'un dit.



**ON VIU**

Sobre soques i branques mortes de pi. Mai cullis bolets marrons de la fusta.

## ES CONFON AMB

Bolets de soca comestibles: sense experiència, impossibles de separar.

## ON VIU




Només 3 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Sobre fusta morta, sobretot de coníferes, sovint en grups.

## D'ON VE EL NOM

*Galerina, de galerus (un barret de pell); marginata, amb la vora marcada.*



Cortinari metzinós: barret taronja rovellat, sec i fibrós.

# Cortinari metzinós

● MORTAL

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–oct

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Taronja rovell i discret. El seu verí ataca els ronyons i pot trigar dues setmanes a fer-se notar.*

**Què fa:** Destrueix els ronyons. Els símptomes poden trigar de 2 a 17 dies.

**COM EVITAR-LO**

Làmines color rovell + restes de teranyina al peu = fora.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 3–8 cm, taronja rovellat, sec i fibrós. |
| **A sota** | Làmines separades i gruixudes, color rovell. |
| **Peu** | Groguenc i fibrós, amb restes de cortina. |
| **Carn** | Groguenca, olor de rave. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Làmines color rovell, separades.



**DE PROP**

Peu groguenc i fibrós, amb restes de cortina.



**DE PROP**

Diversos exemplars: tots taronja rovell, de dalt a baix.



**ON VIU**

Entre la fullaraca de roures i castanyers.

## ES CONFON AMB



Cama de perdiu (làmines que baixen pel peu, sota pins).

**Fitxa: Cama de perdiu →**



Pimpinella morada.

**Fitxa: Pimpinella morada →**

## ON VIU




Encara no hi ha observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: guia't per l'hàbitat. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Rouredes, castanyedes i bosc mixt en sòls àcids.

## D'ON VE EL NOM

*Cortinarius, per la cortina com de teranyina que tenen els joves.*



Paxil enrotllat: barrets marrons en grup, amb la vora corbada cap endins.

# Paxil enrotllat

● MORTAL

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Abans se'n menjava. Ara se sap que, menjat diverses vegades, pot provocar una reacció que destrueix la sang.*

**Què fa:** Cru és tòxic. Menjat diverses vegades pot destruir la sang i els ronyons. Hi ha hagut morts.

**COM EVITAR-LO**

Si les làmines es tornen marrons quan les fregues, deixa'l.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–15 cm, marró, amb la vora molt enrotllada cap endins. |
| **A sota** | Làmines crema que baixen pel peu, es taquen de marró en tocar-les i se separen fàcilment. |
| **Peu** | Curt i marró, que es taca en tocar-lo. |
| **Carn** | Groguenca que s'enfosqueix. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Vora del barret molt enrotllada cap a dins.



**DE PROP**

A sota: làmines crema que baixen pel peu.



**VARIACIÓ**

On el toques, les làmines es taquen de marró.



**VARIACIÓ**

Exemplar tacat de marró a les làmines i al peu.

## ES CONFON AMB



Rovellons vells (el paxil no fa llet).

**Fitxa: Rovelló →**

## ON VIU




Només 5 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes, bedollars i boscos mixtos.

## D'ON VE EL NOM

*Paxillus, petita estaca; involutus, enrotllat, per la vora.*

*Capítol VI*

# Els tòxics

No solen matar, però fan passar molt malament. Molts són bessons de bolets bons.









Reig bord · 42 | Pixacà · 43 | Amanita proxima · 44 | Fredolic metz

*Amanita muscaria*



Reig bord: barret vermell amb berrugues blanques i peu blanc.

# Reig bord

També: reig foll, matamosques

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*El bolet dels contes, vermell amb pigues blanques. Bonic de mirar i tòxic de menjar.*

**Què fa:** Entre 30 minuts i 3 hores: vòmits, confusió, agitació, al·lucinacions.

**COM EVITAR-LO**

Si les làmines o el peu són blancs, no és un ou de reig.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 8–20 cm, vermell o taronja amb berrugues blanques que la pluja pot treure. |
| **A sota** | Làmines BLANQUES i lliures. |
| **Peu** | Blanc, amb anell blanc i base bulbosa amb anells de volva. |
| **Carn** | Blanca, groguenca sota la pell. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Jove: tot cobert de berrugues, com una bola.



**DE PROP**

A sota: làmines BLANQUES i anell blanc. L'ou de reig les té grogues.



**VARIACIÓ**

La pluja li ha tret les berrugues: ara s'assembla a l'ou de reig. Mira les làmines!



**VARIACIÓ**

També n'hi ha de color taronja o groguenc.



**ON VIU**

Pinedes i fagedes de muntanya, a la tardor.

## ES CONFON AMB



Ou de reig (làmines i peu grocs).

**Fitxa: Ou de reig →**

## ON VIU




416 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes, fagedes i bedollars de muntanya.

## D'ON VE EL NOM

*Muscaria, de musca (mosca): antigament s'usava per matar mosques.*

*Amanita pantherina*



Pixacà: barret marró amb berrugues blanques, anell i bulb a la base.

# Pixacà

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*El cosí marró del reig bord, i més perillós encara. Berrugues blanques i un rodet a la base.*

**Què fa:** Com el reig bord però més fort: confusió, agitació i convulsions.

**COM EVITAR-LO**

Per a qui comença: cap amanita.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–12 cm, marró amb berrugues blanques petites i regulars; vora estriada. |
| **A sota** | Làmines blanques i lliures. |
| **Peu** | Blanc, anell llis i base bulbosa amb un rodet de volva. |
| **Carn** | Blanca, no canvia. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Jove: barret fosc esquitxat de berrugues blanques.



**DE PROP**

A sota: làmines blanques i anell llis.



**DE PROP**

Vora del barret estriada i anell penjant.



**DE PROP**

Base amb bulb i un rodet de volva: típic del pixacà.



**VARIACIÓ**

Vell i rentat per la pluja, ha perdut les berrugues.

## ES CONFON AMB

Vinosa (Amanita rubescens): la carn es torna rosa vi. Només per a experts.

## ON VIU




115 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes, alzinars i rouredes.

## D'ON VE EL NOM

*Pantherina, de pantera, per les taques blanques.*



Amanita proxima: sembla una farinera, però la volva és TARONJA rovellada.

# *Amanita proxima*

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | **Tardor** | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

**Pinedes** **Bosc de fulla** **Unit als arbres** **Sota: Làmines**

*La bessona de la farinera. Només la delata el color taronja de la volva, que sovint queda enterrada.*

**Què fa:** Danya els ronyons. Primer dóna vòmits i diarrees (unes 8–14 hores després) i en dos o tres dies pot aparèixer una insuficiència renal.

**COM EVITAR-LO**

Arrenca sempre les amanites senceres i mira el color de la volva.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 8–15 cm, blanc o crema, amb restes farinoses a la vora. |
| **A sota** | Làmines blanques i lliures. |
| **Peu** | Blanc, amb anell membranós que penja i volva amb tons TARONJA o rovell. |
| **Carn** | Blanca. |

## MIRA'L DE PROP



DE PROP

La clau: volva amb tons taronja o rovell.



DE PROP

Exemplars joves: totes les volves són taronja.



DE PROP

Anell membranós que penja, no cremós.



DE PROP

Arrenca-la sempre sencera per veure la volva.



**DE PROP**

Làmines blanques.

## ES CONFON AMB



Farinera (volva blanca, anell cremós).

**Fitxa: Farinera →**

## ON VIU




Només 4 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes i alzinars mediterranis.

## D'ON VE EL NOM

*Proxima, propera, perquè és gairebé igual que la farinera.*

*Tricholoma pardinum*



Fredolic metzinós: barrets grisos coberts d'escates fosques en cercles.

# Fredolic metzinós

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*El fals fredolic de la muntanya alta: més gros, escatós i amb olor de farina.*

**Què fa:** Vòmits i diarrees molt forts que poden durar dies.

**COM EVITAR-LO**

Si fa olor de farina i és gros i robust, no és un fredolic.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 6–12 cm, gris amb escates fosques en cercles. |
| **A sota** | Làmines blanquinoses, a vegades amb reflexos grocs o verds. |
| **Peu** | Gruixut, ple i blanc. |
| **Carn** | Blanca i ferma, olor forta de farina. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Jove: barret escatós i peu molt gruixut.



**DE PROP**

Barret escatós i peu robust i ple: res a veure amb el fredolic prim.



**DE PROP**

A sota: làmines blanquinoses i peu gruixut.



**DE PROP**

Molt més gros que un fredolic: fins a 12 cm de barret.

## ES CONFON AMB



Fredolic (petit, prim, sense olor).

**Fitxa: Fredolic →**

## ON VIU




Només 4 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Fagedes i avetoses de muntanya.

## D'ON VE EL NOM

*Tricholoma, de thrix (pèl) i loma (vora); pardinum, de pardus (lleopard), per les escates.*

*Entoloma sinuatum*



Fals carlet: bolets grossos, de barret blanquinós i sedós, en grup.

# Fals carlet

També: carlet bord

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Gros, blanc i amb aspecte de 'bon bolet'. Les làmines rosades el delaten.*

**Què fa:** Vòmits i diarrees violents. Causa moltes intoxicacions.

**COM EVITAR-LO**

Làmines rosades + olor de farina = fora.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 6–20 cm, blanc grisenc o beix, llis i sedós, amb la vora ondulada. |
| **A sota** | Làmines groguenques de joves que passen a rosa salmó. |
| **Peu** | Gruixut, blanc i ple. |
| **Carn** | Blanca i gruixuda, olor de farina rància. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Joves: carnosos i blancs, amb aspecte de 'bon bolet'. Compte.



**DE PROP**

Làmines de color crema rosat, que amb l'edat es tornen rosa salmó.



**DE PROP**

Adult: làmines rosa salmó i peu gruixut. Fa olor de farina rància.



**DE PROP**

Làmines rosades: el senyal per deixar-lo.



**DE PROP**

Pot fer fins a 20 cm: és dels bolets tòxics més grossos.

## ES CONFON AMB



Carlet.

**Fitxa: Carlet →**



Camperol.

**Fitxa: Camperol →**

## ON VIU




Només 2 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Rouredes, alzinars i fagedes, sovint a prop de rierols.

## D'ON VE EL NOM

*Entoloma, de entos (dins) i loma (vora), per la vora enrotllada; sinuatum, sinuós.*

*Omphalotus olearius*



Gírgola d'olivera: un ram de bolets taronja sobre una soca.

# Gírgola d'olivera

També: bolet d'oliu

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–des

Sobre fusta · Bosc de fulla · Viu sobre plantes o bolets

Sota: Làmines

*Un ram taronja al peu d'una olivera. Sembla un rossinyol, però té làmines de veritat i fa vomitar.*

**Què fa:** Vòmits molt forts i rampes en poca estona.

**COM EVITAR-LO**

Taronja + làmines + sobre fusta en grup = gírgola d'olivera.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–12 cm, taronja intens, en embut i ondulat. |
| **A sota** | Làmines fines i atapeïdes, taronja, que baixen pel peu. A les fosques fan una llum verdosa. |
| **Peu** | Taronja, sovint units en ram a la base. |
| **Carn** | Taronja i fibrosa. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines fines i atapeïdes de veritat, no plecs com el rossinyol.



**DE PROP**

Làmines que baixen pel peu i peus units a la base.



**ON VIU**

Al peu d'una olivera: el lloc típic.



**DE PROP**

Pot fer rams enormes: aquí, amb una mà per comparar.

## ES CONFON AMB



Rossinyol.

**Fitxa: Rossinyol →**



Gírgoles.

**Fitxa: Gírgoles →**

## ON VIU




48 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

En grups sobre soques i arrels d'olivera, alzina o castanyer.

## D'ON VE EL NOM

*Omphalotus, de omphalos (melic), pel barret enfonsat; olearius, de l'olivera.*



Bolet de cabra: barret rosat salmó amb la vora peluda.

# Lactaris de llet blanca

Bolet de cabra, pinetell bord, enganyapastors

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Semblen rovellons, però en tallar-los la llet surt blanca.*

**Què fa:** Gastroenteritis amb vòmits i diarrees.

**COM EVITAR-LO**

Llet blanca = no és rovelló.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 4–10 cm, rosat salmó amb cercles i vora peluda (bolet de cabra), o crema ataronjat amb zones. |
| **A sota** | Làmines crema o rosades, sense taques verdes. |
| **Peu** | Curt i buit, del color del barret. |
| **Carn** | Treu llet BLANCA: al pinetell bord es torna groga en pocs segons. Gust molt picant. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines pàl·lides i vora llanosa. La llet és blanca.



**DE PROP**

La vora enrotllada i peluda del bolet de cabra.



**VARIACIÓ**

Pinetell bord: la llet és blanca i es torna groga en pocs segons.



**DE PROP**

Enganyapastors (L. zonarius): té cercles com el rovelló, però la llet és blanca.



**DE PROP**

Làmines crema, sense taques verdes.

## ES CONFON AMB



Rovelló: llet vermell vi.

**Fitxa: Rovelló →**



Pinetell: llet taronja pastanaga.

**Fitxa: Pinetell →**

## ON VIU




61 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Amb bedolls, roures, castanyers i alzines.

## D'ON VE EL NOM

*Torminosus, de tormina (còlics); chrysorrheus, que vessa or; zonarius, amb zones.*

*Rubroboletus satanas*



Matagent: barret blanquinós i peu inflat vermell.

# Matagent

També: cep del diable. El nom 'mataparent' es fa servir per a diversos boletus de porus vermells.

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: jul–oct

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Porus

*Gros, blanc per dalt i vermell per sota. En tallar-lo, la carn es torna blava.*

**Què fa:** Vòmits forts i diarrees.

**COM EVITAR-LO**

Boletus amb porus vermells = fora.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 10–25 cm, blanc grisenc, gros i carnós. |
| **A sota** | Porus VERMELLS que es tornen blaus en tocar-los. |
| **Peu** | Molt gruixut i panxut, groc a dalt i vermell a baix, amb xarxa vermella. |
| **Carn** | Groguenca que blaveja; olor desagradable. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Jove: des de dalt només es veu un barret blanc. Gira'l sempre.



**DE PROP**

A sota: porus VERMELLS i peu vermell. Fora.



**DE PROP**

De prop: porus vermell taronja.



**VARIACIÓ**

En tallar-lo o tocar-lo, la carn es torna blava.



**VARIACIÓ**

Carn blavosa: un senyal per deixar-lo.

## ES CONFON AMB



Cep.

**Fitxa: Cep →**

## ON VIU




10 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Alzinars i rouredes en sòls calcaris.

## D'ON VE EL NOM

*Rubroboletus, boletus vermell; satanas, per la seva fama.*



Escleroderma: bola de pell gruixuda, groguenca i escatosa.

# *Escleroderma*

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: jul–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Bola o corall

*Sembla un pet de llop, però és dur com una patata i per dins és negre.*

**Què fa:** Vòmits, dolor de panxa i marejos poca estona després de menjar-lo.

**COM EVITAR-LO**

Talla tots els bolets en forma de bola: blanc per dins = pet de llop; negre o violaci = escleroderma.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | Bola de 3–10 cm, groguenca o marró, amb la pell gruixuda, dura i escatosa. |
| **A sota** | Per dins, violaci fosc o negre des de jove, amb vetes blanques; de vell, pols fosca. |
| **Peu** | Sense peu, o amb una base curta i arrelada. |
| **Carn** | Ferma com una patata; olor forta i desagradable. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Tallat: per dins NEGRE violaci i dur. Un pet de llop és blanc.



**DE PROP**

Interior fosc amb vetes clares.



**DE PROP**

Alguns tenen un peu curt i arrelat.



**VELL**

Vell: s'esquerda i deixa anar pols fosca.



**VARIACIÓ**

Una espècie gran (S. polyrhizum) s'obre en forma d'estrella.

## ES CONFON AMB



Pet de llop (blanc per dins, pell fina).

**Fitxa: Pet de llop →**

## ON VIU




21 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes i boscos de fulla en sòls àcids o sorrencs.

## D'ON VE EL NOM

*Scleroderma, de skleros (dur) i derma (pell): té la pell gruixuda i dura.*

*Clitocybe dealbata · C. rivulosa*



Clitocibes blancs: petits, blanquinosos, com coberts de farina.

# Clitocibes blancs

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*Petits bolets blancs que surten als mateixos prats que el cama-sec.*

**Què fa:** Suor abundant, salivera, llàgrimes, visió borrosa i diarrea.

**COM EVITAR-LO**

Bolet blanc petit de prat = fora.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 2–5 cm, blanc com cobert de farina o gebre, pla o una mica enfonsat. |
| **A sota** | Làmines atapeïdes, blanquinoses, que baixen pel peu. |
| **Peu** | Prim i blanc, que es trenca. |
| **Carn** | Prima, olor de farina. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines atapeïdes que baixen pel peu.



**DE PROP**

Barret blanc, pla o enfonsat, sense mamelló.



**ON VIU**

Als prats i gespes, de vegades en rotllana com el cama-sec.

## ES CONFON AMB



Cama-sec.

**Fitxa: Cama-sec →**



Gírgola de panical.

**Fitxa: Gírgoles →**

## ON VIU




Encara no hi ha observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: guia't per l'hàbitat. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats, gespes i marges, sovint en rotllanes.

## D'ON VE EL NOM

*Clitocybe, de klitos (pendent) i kybe (cap), pel barret en embut; dealbata, emblanquinada.*



Inocybe: bolets petits de barret cònic i fibrós.

# *Inocybe*

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: juny–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Prats · Unit als arbres

Sota: Làmines

*Petits, discrets i amb el barret esquerdat. N'hi ha moltíssims i gairebé tots són tòxics.*

**Què fa:** Suors, salivera i diarrea poca estona després.

**COM EVITAR-LO**

Petit, cònic i esquerdat = fora.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 2–7 cm, cònic o amb mamelló, fibrós i esquerdat radialment. |
| **A sota** | Làmines crema que es tornen marró terrós. |
| **Peu** | Blanquinós i fibrós. |
| **Carn** | Blanca, olor de terra o desagradable. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Barret amb fibres radials que s'esquerden: el senyal típic.



**VARIACIÓ**

Alguns es taquen de vermell (I. erubescens).



**DE PROP**

Inocybe geophylla: blancs i petits, amb un mamelló al centre.



**VARIACIÓ**

N'hi ha de tons lila, que es poden confondre amb la pimpinella.

## ES CONFON AMB



Cama-sec.

**Fitxa: Cama-sec →**



Fredolic.

**Fitxa: Fredolic →**

## ON VIU




10 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Tota mena de boscos, parcs i jardins.

## D'ON VE EL NOM

*Inocybe, de inos (fibra) i kybe (cap): barret fibrós; erubescens, que s'envermelleix.*



Verderol: tot groc verdós, barret, làmines i peu.

# Verderol

També: groguet

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: oct–des

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Abans es venia als mercats. Ara se sap que, menjat diversos dies, pot destruir el múscul.*

**Què fa:** Rabdomiòlisi (destrucció muscular). Hi ha hagut morts a França i Polònia, i des del 2009 no es pot vendre a l'Estat.

**COM EVITAR-LO**

Si un llibre antic diu que és comestible, ja no ho és.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 5–12 cm, groc verdós amb escates fosques al centre. |
| **A sota** | Làmines groc sofre. |
| **Peu** | Groc i gruixut. |
| **Carn** | Blanca o groguenca, olor de farina. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines grogues sofre.



**DE PROP**

Barret groguenc amb escates fosques al centre.



**ON VIU**

Pinedes de terra sorrenca. Abans es menjava: ja no.

## ES CONFON AMB



Fredolic (gris, no groc).

**Fitxa: Fredolic →**

## ON VIU




14 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes en sòls sorrencs.

## D'ON VE EL NOM

*Equestre, de cavaller, perquè era un bolet de nobles.*

*Agaricus xanthodermus*



Bola de neu pudent: sembla un xampinyó blanc, però la base es torna groga.

# Bola de neu pudent

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: maig–juny i set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*Sembla un xampinyó, però en rascar-lo es torna groc i fa olor de tinta.*

**Què fa:** Vòmits i diarrees.

**COM EVITAR-LO**

Rasca sempre la base dels xampinyons silvestres.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 6–15 cm, blanc, es taca de groc en fregar-lo. |
| **A sota** | Làmines rosa grisenc, després marró fosc. |
| **Peu** | Blanc, amb anell gran; la base es torna GROC CANARI en rascar-la. |
| **Carn** | Blanca, groga a la base; olor de tinta o de iode. |

## MIRA'L DE PROP



**VARIACIÓ**

Tallat de dalt a baix: la base del peu, groc canari.



**VARIACIÓ**

En rascar la base, groc intens a l'instant.



**DE PROP**

Làmines rosa grisenc de jove; es confon fàcilment amb el camperol.



**DE PROP**

Vell: làmines marró fosc.

## ES CONFON AMB



Camperol.

**Fitxa: Camperol →**



Bola de neu.

**Fitxa: Bola de neu →**

## ON VIU




Només 5 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats, jardins, marges i parcs.

## D'ON VE EL NOM

*Xanthodermus, de xanthos (groc) i derma (pell): es torna groc.*

*Coprinopsis atramentaria*



Bolet de femer: barrets grisos en forma de campana, en grup.

# Bolet de femer

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: abr–maig i set–nov

Prats · Sobre fusta · Descompon matèria morta

Sota: Làmines

*El germà gris del bolet de tinta. Amb una copa de vi, et posarà molt malament.*

**Què fa:** Amb alcohol (fins a 3 dies abans o després): enrogiment, palpitacions, vòmits.

**COM EVITAR-LO**

Si és gris i llis, no és un bolet de tinta.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 3–7 cm, gris o marró grisenc, en forma de campana, llis, sense escates llanoses. |
| **A sota** | Làmines blanques que passen a negres i es desfan. |
| **Peu** | Blanc i buit. |
| **Carn** | Prima i blanquinosa. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Joves: grisos o marró lila, llisos, sense les escates del bolet de tinta.



**VARIACIÓ**

Com el bolet de tinta, de vell es torna negre i es desfà.



**VARIACIÓ**

Del tot desfet en tinta negra.

## ES CONFON AMB



Bolet de tinta.

**Fitxa: Bolet de tinta →**

## ON VIU




Només 3 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Prats, jardins i terra rica, sovint prop de soques.

## D'ON VE EL NOM

*Coprinopsis, semblant a un Coprinus; atramentaria, d'atramentum (tinta).*



Peu de rata bord: forma de corall, branques rosa ataronjat.

# Peu de rata bord

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Bola o corall

*Un corall rosat preciós al terra del bosc. I un laxant molt fort.*

**Què fa:** Diarrees fortes. Distingir els peus de rata és difícil fins i tot per a experts.

**COM EVITAR-LO**

Per a qui comença, cap peu de rata.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | No en té: és un corall de 8–20 cm amb moltes branques. |
| **A sota** | Branques rosa ataronjat amb puntes grogues. |
| **Peu** | Base gruixuda i blanquinosa. |
| **Carn** | Blanca, amarga. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Base blanca i gruixuda d'on surten les branques.



**DE PROP**

Puntes de les branques groguenques.



**ON VIU**

Fagedes i rouredes, entre la molsa.

## ES CONFON AMB

Peu de rata col-i-flor (Ramaria botrytis): comestible, però confusible.

## ON VIU




Encara no hi ha observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: guia't per l'hàbitat. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Fagedes i rouredes.

## D'ON VE EL NOM

*Ramaria, de ramus (branca); formosa, bonica.*

*Russula emetica*



Escaldabecs: barret vermell viu i peu blanc, entre la molsa.

# Escaldabecs

● TÒXIC

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

*Vermell i brillant, amb un gust que crema la boca.*

**Què fa:** Vòmits i diarrees.

**COM EVITAR-LO**

Rússula vermella de pineda = fora.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 3–8 cm, vermell viu, llis i brillant. |
| **A sota** | Làmines blanques. |
| **Peu** | Blanc i fràgil. |
| **Carn** | Blanca, gust que crema. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Jove: barret vermell arrodonit.



**DE PROP**

A sota: làmines blanques. Gust molt picant (no te l'empassis).

## ES CONFON AMB



Llora i carbonera.
**Fitxa: Llora i carbonera →**



Rovelló: fa llet taronja o vermella i té el peu taronja. Una rússula taronja no fa llet.
**Fitxa: Rovelló →**

## ON VIU




Encara no hi ha observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: guia't per l'hàbitat. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes humides i molsoses.

## D'ON VE EL NOM

*Russula, vermellós; emetica, que fa vomitar*.


*Capítol VII*

# No valen la pena

No són perillosos de veritat, però amarguen, cauen malament o s'assemblen massa a d'altres.








Rossinyol ataronjat · 59

Molleric amarg · 60

Paloma vermellosa · 61

*Hygrophoropsis aurantiaca*



Rossinyol ataronjat: tot taronja, amb làmines de veritat.

# Rossinyol ataronjat

També: fals rossinyol

● PRECAUCIÓ

| Primavera | Estiu | **Tardor** | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: set–nov

**Pinedes** · **Sobre fusta** · **Descompon matèria morta**

**Sota: Làmines**

*El fals rossinyol: més taronja, amb làmines fines i carn tova.*

**Per què no:** No és perillós, però és dolent i a algunes persones els cau malament.

**COM EVITAR-LO**

Làmines fines i toves = no és un rossinyol.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 2–7 cm, taronja, vellutat, en embut. |
| **A sota** | Làmines fines, atapeïdes i bifurcades, taronja intens. |
| **Peu** | Taronja i prim. |
| **Carn** | Prima i tova. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

A sota: làmines fines, atapeïdes i bifurcades. El rossinyol té plecs gruixuts.



**DE PROP**

De prop: làmines toves de color taronja intens.



**ON VIU**

Sobre la pinassa i la fusta podrida.

## ES CONFON AMB



Rossinyol.

**Fitxa: Rossinyol →**



Camagroc.

**Fitxa: Camagroc →**

## ON VIU




13 observacions confirmades a Catalunya. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes, sobre la pinassa o fusta podrida.

## D'ON VE EL NOM

*Hygrophoropsis*, semblant a un *Hygrophorus*; *aurantiaca*, taronja.

*Tylopilus felleus*



Molleric amarg: sembla un cep, però el peu té una xarxa fosca.

# Molleric amarg

● PRECAUCIÓ

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: jul–oct

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Porus

*Té cara de cep, però un sol exemplar amarga tota la cassola.*

**Per què no:** No és tòxic, però és molt amarg.

**COM EVITAR-LO**

Porus rosats o xarxa fosca = no és un cep.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 6–15 cm, marró clar. |
| **A sota** | Porus blancs que es tornen rosats. |
| **Peu** | Gruixut, amb una xarxa marró fosca. |
| **Carn** | Blanca i extremadament amarga. |

## MIRA'L DE PROP



**DE PROP**

Porus rosats: el cep els té blancs o grocs.



**DE PROP**

Xarxa marró fosca i gruixuda al peu.



**DE PROP**

A sota: porus rosa pàl·lid. Tan amarg que espatlla el plat.

## ES CONFON AMB



Cep.

**Fitxa: Cep →**

## ON VIU




Encara no hi ha observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: guia't per l'hàbitat. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Pinedes i boscos mixtos en sòls àcids.

## D'ON VE EL NOM

*Tylopilus, de tylos (bony) i pilos (barret); felleus, de fel: amarg.*

AGARICALS

*Chlorophyllum rhacodes*



Paloma vermellosa: escates grosses i peu llis, sense pell de serp.

# Paloma vermellosa

● PRECAUCIÓ

| Primavera | Estiu | Tardor | Hivern |
|---|---|---|---|

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Prats

Descompon matèria morta · Sota: Làmines

*S'assembla a l'apagallums, però és més gruixuda i té el peu llis.*

**Per què no:** Moltes persones hi tenen problemes digestius. Una espècie semblant de jardins és tòxica.

**COM EVITAR-LO**

Sense pell de serp al peu = no és un apagallums.

## DESCRIPCIÓ

| | |
|---|---|
| **Barret** | 8–15 cm, amb escates grosses i esparracades sobre fons blanc. |
| **A sota** | Làmines blanques. |
| **Peu** | Llis i blanc, sense pell de serp, amb base molt bulbosa i anell que es mou. |
| **Carn** | Blanca que es torna vermell taronja en tallar-la. |

## MIRA'L DE PROP



**JOVE**

Joves tancats, amb una base molt bulbosa.



**DE PROP**

Peu llis i blanc amb anell: no té el dibuix de l'apagallums.

## ES CONFON AMB



Apagallums.

**Fitxa: Apagallums →**

## ON VIU




Només 3 observacions confirmades a Catalunya a iNaturalist: n'hi ha poques dades. Cada punt és una troballa a iNaturalist.

Boscos, parcs i jardins, en terra rica.

## D'ON VE EL NOM

*Chlorophyllum, de chloros (verd) i phyllon (fulla); rhacodes, esparracat.*

*Capítol 2*

# Com es llegeix un bolet

Abans de mirar el color, aprèn on mirar. Aquestes parts són les pistes que trobaràs a totes les pàgines del llibre.




Les parts que has de mirar en cada bolet. La volva sovint queda enterrada: per això cal arrencar sencers els bolets que no coneixes.



### Barret

La part de dalt. Mira'n el color, la textura (llisa, escatosa, llefiscosa) i la vora.

**Llora i carbonera · fitxa →**



### Làmines

Fulles primes sota el barret. El seu color i si baixen pel peu són pistes clau.

**Camperol · fitxa →**



### Porus

Una esponja en lloc de làmines: és el grup dels ceps i mollerics.

**Molleric · fitxa →**



### Plecs

Venes gruixudes i baixes que semblen làmines però no ho són. Típiques del rossinyol.

**Rossinyol · fitxa →**



### Agullons

Punxetes toves sota el barret. La llengua de bou.

**Llengua de bou · fitxa →**



### Anell

Una faldilla o collaret al peu, resta del vel que protegia les làmines.

**Apagallums · fitxa →**



### Volva

Un sac a la base del peu, sovint enterrat. Senyal d'amanita: arrenca sempre el bolet sencer.

**Farinera borda · fitxa →**



### Cortina

Un tel com de teranyina entre el barret i el peu dels joves. Senyal de cortinari.

**Cortinari metzinós · fitxa →**



### Llet

Els lactaris treuen un suc en tallar-los. El seu color separa el rovelló dels tòxics.

**Lactaris de llet blanca · fitxa →**



### Interior (gleba)

Els bolets en forma de bola s'han de tallar: el color de dins diu si són bons.

**Pet de llop · fitxa →**

*Capítol 3*

# L'edat d'un bolet

Un mateix bolet canvia molt en pocs dies. Jove i ferm és el millor moment; vell, aigualit o cucat, fins i tot un comestible et pot fer mal. I massa jove, de vegades no es pot identificar.

## Bolet de tinta: de blanc a tinta en un dia




**Jove**

Dos exemplars joves a la fullaraca. Làmines encara blanques per dins.




**En el seu punt**

Jove, blanc i tancat com un ou allargat: és el moment de collir-lo.




**Vell**

Comença a obrir-se i la vora es torna negra: ja no el cullis.




**Passat**

Del tot desfet en una pasta negra. Així acaba sempre, en poques hores.

## Pet de llop: tallat, el color de dins mana




**Jove**

Grup de joves, blancs i ferms.




**De prop**

Talla'l de dalt a baix: per dins ha de ser BLANC i compacte.




**Vell**

Obert per dalt: ja treu les espores com un fum.




**Vell**

Vell: per dins s'ha tornat marró i en pols.

## Cep: el millor és el jove





**Jove**

Joves, rodons com taps de suro: són els més ferms i els millors.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret marró, carnós, i peu gruixut i clar.




**Vell**

Vell: porus verd oliva i tous com una esponja. Deixa'l al bosc.




**Passat**

Rosegat i amb forats: dins hi haurà cucs.

## Rovelló i pinetell: del taronja al verd





**Jove**

Jove i ferm, amb la vora encara corbada cap avall.





**En el seu punt**

En el seu punt: barret taronja vinós, amb pocs cercles.




**Vell**

Vell: tot tacat de verd i tou. Deixa'l.




**Vell**

Vell: tot tacat de verd i rovell, tou. Deixa'l.

## Camperol: les làmines marquen l'edat





**Jove**

Jove: rodó i blanc, entre l'herba del prat. Gira'l per veure les làmines.




**En el seu punt**

En el seu punt: barret blanc i làmines rosades.




**Vell**

Vell: làmines marró xocolata, gairebé negres, i carn tova. Deixa'l.

## Fredolic: de petit i ferm a esquinçat




**Jove**

Jove i petit: cap a la cistella sencer.




**En el seu punt**

En el seu punt: grisos, petits i en grup sota els pins.




**Vell**


Vell: barret pla, esquinçat i ennegrit. Deixa'l.




**Passat**

Tou, brut i descompost: no el cullis.

## Senyals que un bolet està passat



**Porus verds i tous**

En els boletus, una esponja verdosa que s'enfonsa amb el dit vol dir que és vell.



### Forats i rosegades

Llimacs i cucs: si per fora està foradat, per dins també.



### Negre i desfet

Làmines que es tornen negres i líquides: el bolet de tinta ja no serveix.



### Per dins marró o en pols

Un pet de llop que per dins no és blanc ja no es menja.



### Descolorit

Els colors s'apaguen i el bolet ja no es reconeix bé.



### Esquinçat i ennegrit

Vores trencades, taques fosques i carn tova.

**Massa petit o tancat?** Un bolet molt jove encara no mostra els trets que el diferencien. I recorda: un "ou" blanc al bosc pot ser una farinera borda. No cullis mai ous tancats.

*Capítol 4*

# Colors que canvien

Molts bolets canvien de color quan els talles, quan els toques o quan envelleixen. Alguns canvis són normals; d'altres són un avís clar.



### Llet que es torna groga

Pinetell bord. Llet blanca que es torna groga en pocs segons.

**Tòxic: deixa'l**

**Lactaris de llet blanca · fitxa →**



### Taques verdes

El rovelló es taca de verd on es toca o quan és vell.

**Normal en el rovelló**

**Rovelló · fitxa →**



### Carn que es torna blava

Molts boletus de porus vermells blavegen en tallar-los.

**Senyal per deixar-lo**

**Matagent · fitxa →**



### Groc canari en rascar

La base de la bola de neu pudent es torna groga a l'instant.

**Tòxic: deixa'l**

**Bola de neu pudent · fitxa →**



### Per dins negre

Una bola que per dins és negra o violàcia és un escleroderma.

**Tòxic: deixa'l**

**Escleroderma · fitxa →**



### Volva taronja

Una amanita blanca amb la volva taronja és Amanita proxima.

**Danya els ronyons**

**Amanita proxima · fitxa →**



### Es desfà en tinta

Bolet de tinta i bolet de femer: de vells, negres i líquids.

**Massa vell**

**Bolet de tinta · fitxa →**



### Taques marrons en tocar-lo

Les làmines del paxil enrotllat es tornen marrons on les toques.

**Perillós**

**Paxil enrotllat · fitxa →**



### Làmines rosa que passen a xocolata

El camperol jove té làmines rosa; el vell, marró fosc.

**Indica l'edat**

**Camperol · fitxa →**



### Làmines que passen a rosa salmó

El fals carlet té làmines rosades d'adult.

**Tòxic: deixa'l**

**Fals carlet · fitxa →**



### Perd el violeta

La pimpinella morada es torna marró rosada amb l'edat.

**Més difícil de reconèixer**

**Pimpinella morada · fitxa →**



### Perd les berrugues

La pluja pot rentar les berrugues blanques del reig bord.

**Ara sembla un ou de reig!**

**Reig bord · fitxa →**



### Carn que es torna vinosa

La carn taronja de la cama de perdiu es torna color vi en coure-la.

**Normal en la cama de perdiu**

**Cama de perdiu · fitxa →**



### S'asseca i reviu

El cama-sec s'asseca al sol i torna a inflar-se amb la pluja.

**Normal en el cama-sec**

**Cama-sec · fitxa →**

*Capítol 5*

# Quan sortir: la pluja i els dies

Els bolets no surten el dia que plou, sinó dies després. Cada espècie triga una mica diferent: uns apareixen en una setmana i d'altres es fan esperar tres. Aquí tens el millor moment per anar a buscar cada comestible.

### Una pluja de debò

Compta amb 20–30 litres per m² en un o dos dies, o diverses pluges suaus seguides. Quatre gotes no fan sortir res: la terra ha de quedar xopa.

### Comença a comptar quan para

Els dies d'aquesta secció van des que acaba la pluja forta. Si torna a ploure, el compte s'allarga.


### Ni massa calor ni gelades

Amb temperatures suaus (10–20 °C) surten bé. Vent sec, sol fort o una gelada els paren en sec.

### Una segona onada

Si plou de nou 2–3 setmanes després, molts tornen a sortir. Torna al mateix lloc.

## De pressa 3–10 dies després de la pluja




### Bolet de tinta

**3–6 dies** · millor el dia 4

0 10 20 30 dies

Surt de pressa a prats i vorades, amb humitat. Cull-lo tancat i cuina'l el mateix dia.

Temporada: abr–maig i set–nov · fitxa →



### Cama-sec

**3–7 dies** · millor el dia 5

0 10 20 30 dies

Pluges suaus de primavera i tardor. Quan s'asseca, reviu amb la pluja següent.

Temporada: abr–juny i set–nov · fitxa →



### Camperol

**4–8 dies** · millor el dia 6




Prats i clarianes amb pluja i temperatura suau.

Temporada: maig–juny i set–nov · fitxa →



### Pet de llop

**5–9 dies** · millor el dia 7




Sol sortir en grups després de pluges tèbies.

Temporada: jul–nov · fitxa →



### Apagallums

**5–10 dies** · millor el dia 7




Clarianes i marges. Creix de pressa: en dos dies passa de tancat a obert.

Temporada: ag–nov · fitxa →

## Una setmana o dues 7–16 dies després de la pluja



### Molleric

**7–12 dies** · millor el dia 9




Pinedes. Surt aviat i en quantitat, però també es fa vell de pressa.

Temporada: set–nov · fitxa →



### Bola de neu

**7–12 dies** · millor el dia 9




Prats i ombra de les arbredes, amb pluges de tardor.

Temporada: juny–nov · fitxa →



### Pet de llop gegant

**7–14 dies** · millor el dia 10




Prats rics després de tempestes d'estiu i pluges de setembre. Creix molt en pocs dies.

Temporada: jul–oct · fitxa →



### Pet de llop de prat

**7–14 dies** · millor el dia 10




Prats de muntanya després de les tempestes d'estiu i les primeres pluges de tardor.

Temporada: juny–oct · fitxa →



### Llora i carbonera

**7–12 dies** · millor el dia 9




Boscos de caducifolis. Vol calor: surt a final d'estiu i principi de tardor.

Temporada: juny–oct · fitxa →



### Gírgoles

**7–14 dies** · millor el dia 10




La d'olm i la de panical surten després de pluges, a primavera i tardor, amb fred suau.

Temporada: oct–des · fitxa →



### Farinera

**7–14 dies** · millor el dia 10




Vol calor humida: surt després de tempestes d'estiu i setembre.

Temporada: set–nov · fitxa →



### Ou de reig

**8–14 dies** · millor el dia 11




Necessita calor i pluja: agost–octubre. Amb fred no surt.

Temporada: ag–oct · fitxa →



### Cep

**8–14 dies** · millor el dia 10




Els de tardor 10–14 dies; els d'estiu, amb calor, 7–10. Si fa fred, tarden més.

Temporada: ag–nov · fitxa →



### Carlet

**10–16 dies** · millor el dia 12




Pinedes humides, a mitjan tardor.

Temporada: oct–des · fitxa →

## Els que fan esperar 10–25 dies després de la pluja




### Rovelló

**10–18 dies** · millor el dia 14




Pinedes de pi blanc i pinyer. Les pluges d'octubre són les bones; si fa fred, tarda més.

Temporada: set–nov · fitxa →



### Pinetell

**10–18 dies** · millor el dia 14




Pinedes de pi roig i pinyer, a muntanya mitjana. Amb fred, tarda uns dies més.

Temporada: set–nov · fitxa →



## Rossinyol

**10–18 dies** · millor el dia 13




Estiu i tardor, amb humitat mantinguda. Un cop surt, en fa durant setmanes.

Temporada: juny–nov · fitxa →



## Llengua de bou

**10–20 dies** · millor el dia 14




Boscos de fulla caduca i pins. Aguanta bé les primeres fredors.

Temporada: set–des · fitxa →



## Cama de perdiu

**10–20 dies** · millor el dia 14




Pinedes, ben entrada la tardor.

Temporada: set–des · fitxa →



## Fredolic

**12–20 dies** · millor el dia 15




Amb els primers freds de novembre. Aguanta fins i tot amb tramuntana.

Temporada: oct–des · fitxa →



## Trompeta de la mort

**15–25 dies** · millor el dia 20




Boscos humits i ombrívols. Necessita setmanes d'humitat, no només un ruixat.

Temporada: ag–nov · fitxa →



## Camagroc

**15–25 dies** · millor el dia 20



Novembre i desembre, amb molta humitat. Aguanta bé el fred suau.

Temporada: oct–des · fitxa →



## Llenega negra

**15–25 dies** · millor el dia 20




Final de tardor, amb fred i humitat.

Temporada: set–nov · fitxa →



## Pimpinella morada

**15–25 dies** · millor el dia 20




Últim bolet de l'any: surt amb fred i fullaraca humida, fins i tot a l'hivern.

Temporada: oct–des · fitxa →

**Són dies orientatius.** Canvien segons l'altitud, el sòl, l'orientació i l'any. A l'ombra i a més alçada tarden més. Pregunta sempre a la gent del lloc. I recorda: els bolets tòxics surten els mateixos dies que els bons, així que el calendari no et diu mai si un bolet es pot menjar.

*Capítol 6*


# Cara a cara

Les confusions que omplen urgències cada tardor, de la més fàcil a la més difícil. Aprèn-te la clau de cada parella.

## Rovelló, pinetell o lactari de llet blanca?


FÀCIL DE DISTINGIR

**La clau:** Talla el bolet: la llet ho diu tot.





Rovelló

● COMESTIBLE




Pinetell

● COMESTIBLE




Lactaris de llet blanca

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Rovelló

● COMESTIBLE



Pinetell

● COMESTIBLE



Lactaris de llet blanca

● TÒXIC


| | Rovelló | Pinetell | Lactaris de llet blanca |
|---|---|---|---|
| 1 LLET EN TALLAR-LO | Vermell vi | Taronja pastanaga | Blanca; al pinetell bord es torna groga |
| 2 VORA DEL BARRET | Llisa | Llisa | Peluda i enrotllada (bolet de cabra) |
| 3 ES TACA DE VERD | Sí | Sí | No |
| RESULTAT | **Comestible · Excel·lent** | **Comestible · Molt bo** | **Tòxic** |

## Rovelló sense cercles o rússula?

CAL FIXAR-S'HI


**La clau:** Trenca'l: la rússula no fa llet i el peu blanc es trenca com un guix.

Al Montnegre vas trobar rússules taronja que semblaven rovellons sense cercles: mira la troballa 6. Veure-la →




Rovelló

COMESTIBLE




Escaldabecs

TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Rovelló

● COMESTIBLE



Escaldabecs


● TÒXIC

| | Rovelló | Escaldabecs |
|---|---|---|
| 1 LLET | Taronja o vermell vi | Cap |
| 2 PEU | Taronja, buit, amb clotets | Blanc i llis |
| 3 LÀMINES | Taronja o color vi, es taquen de verd | Blanques o crema |
| 4 CERCLES AL BARRET | Sovint, però no sempre | Mai |
| ON | Sota pins | Pins, alzines, castanyers |
| RESULTAT | **Comestible · Excel·lent** | **Tòxic** |

## Pet de llop o escleroderma?


FÀCIL DE DISTINGIR

**La clau:** Talla'l per la meitat: blanc per dins és pet de llop; negre o violaci, escleroderma.




**Pet de llop**

● COMESTIBLE




**Escleroderma**

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



**Pet de llop**

● COMESTIBLE



**Escleroderma**


● TÒXIC

| | Pet de llop | Escleroderma |
|---|---|---|
| 1 PELL | Fina, amb berrugues que es desprenen | Gruixuda, dura i escatosa |
| 2 PER DINS | Blanc i tou (jove) | Negre violaci i dur |
| OLOR | Suau | Forta i desagradable |
| RESULTAT | **Comestible · Acceptable (jove)** | **Tòxic** |

# Pet de llop gegant, escleroderma o ou d'amanita?


FÀCIL DE DISTINGIR

**La clau:** Talla totes les boles de dalt a baix: blanc uniforme, pet de llop; negre, escleroderma; un bolet dibuixat a dins, amanita.





**Pet de llop gegant**

● COMESTIBLE




**Escleroderma**

● TÒXIC




**Farinera borda**

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



**Pet de llop gegant**

● COMESTIBLE



**Escleroderma**

● TÒXIC



**Farinera borda**


● MORTAL

| | Pet de llop gegant | Escleroderma | Farinera borda |
|---|---|---|---|
| 1 PER DINS | Blanc i uniforme | Negre violaci | La silueta d'un bolet |
| 2 PELL | Llisa i fina | Gruixuda i escatosa | Blanca: és la volva |
| 3 MIDA | 20–50 cm | 3–10 cm | L'ou, 4–6 cm |

| | Pet de llop gegant | Escleroderma | Farinera borda |
|---|---|---|---|
| RESULTAT | Comestible · Bo (molt jove) | Tòxic | Mortal |

## Cep, matagent o molleric amarg? FÀCIL DE DISTINGIR

**La clau:** Mira el color dels porus i talla la carn.




Cep
● COMESTIBLE

Matagent
● TÒXIC

Molleric amarg
● PRECAUCIÓ

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Cep
● COMESTIBLE



Matagent
● TÒXIC



Molleric amarg
● PRECAUCIÓ


| | Cep | Matagent | Molleric amarg |
|---|---|---|---|
| 1 PORUS | Blancs, després groc verdosos | Vermells | Blancs, després rosats |

| | Cep | Matagent | Molleric amarg |
|---|---|---|---|
| 2 CARN TALLADA | Blanca, no canvia | Es torna blava | Blanca |
| 3 XARXA DEL PEU | Clara | Vermella | Fosca |
| RESULTAT | Comestible · Excel·lent | Tòxic | Precaució |

## Rossinyol o gírgola d'olivera?


CAL FIXAR-S'HI

**La clau:** Plecs gruixuts a terra = rossinyol. Làmines fines en grup sobre fusta = fora.





Rossinyol

COMESTIBLE




Gírgola d'olivera

TÒXIC




Rossinyol ataronjat

PRECAUCIÓ

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Rossinyol

COMESTIBLE



Gírgola d'olivera

TÒXIC



Rossinyol ataronjat


PRECAUCIÓ

| | Rossinyol | Gírgola d'olivera | Rossinyol ataronjat |
|---|---|---|---|
| 1 SOTA EL BARRET | Plecs gruixuts i bifurcats | Làmines fines i atapeïdes | Làmines fines i toves |
| 2 ON CREIX | A terra | En grups sobre soques | Sobre pinassa o fusta |
| CARN | Blanca i ferma | Taronja | Tova |
| RESULTAT | Comestible · Excel·lent | Tòxic | Precaució |

## Cama-sec o clitocibe blanc?


CAL FIXAR-S'HI

**La clau:** Làmines molt separades i un peu que es retorça sense trencar-se.




Cama-sec

● COMESTIBLE




Clitocibes blancs

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Cama-sec

● COMESTIBLE



Clitocibes blancs


● TÒXIC

| | Cama-sec | Clitocibes blancs |
|---|---|---|
| 1 COLOR | Cuir o crema | Blanc, com enfarinat |
| 2 LÀMINES | Molt separades, no baixen pel peu | Atapeïdes, baixen pel peu |
| 3 PEU RETORÇAT | No es trenca | Es trenca |
| RESULTAT | **Comestible · Excel·lent** | **Tòxic** |

## Fredolic o fredolic metzinós?


CAL FIXAR-S'HI

**La clau:** El metzinós és més gros, escatós, fa olor de farina i viu a la muntanya alta.




**Fredolic**

● COMESTIBLE




**Fredolic metzinós**

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



**Fredolic**

● COMESTIBLE



**Fredolic metzinós**


● TÒXIC

| | Fredolic | Fredolic metzinós |
|---|---|---|
| 1 BARRET | 3–7 cm, gris ratolí, feltrat | 6–12 cm, escates fosques en cercles |
| 2 PEU | Prim, fràgil, buit | Gruixut, ple |
| OLOR | Gairebé cap | Farina |
| RESULTAT | **Comestible · Molt bo** | **Tòxic** |

## Cama de perdiu o cortinari?


CAL FIXAR-S'HI

**La clau:** Les làmines de la cama de perdiu són gruixudes i baixen pel peu; les del cortinari, no.




**Cama de perdiu**


● COMESTIBLE




**Cortinari metzinós**

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



**Cama de perdiu**

● COMESTIBLE



**Cortinari metzinós**

● MORTAL


| | Cama de perdiu | Cortinari metzinós |
|---|---|---|
| 1 LÀMINES | Gruixudes, baixen pel peu | Color rovell, no baixen pel peu |
| 2 BARRET | Llefiscós, amb mamelló punxegut | Sec i fibrós |

| | Cama de perdiu | Cortinari metzinós |
|---|---|---|
| ON | Sota pins | Sota roures i castanyers |
| RESULTAT | Comestible · Bo | Mortal |

## Apagallums o lepiota?


CAL FIXAR-S'HI

**La clau:** Regla dels 15 cm, anell mòbil i peu de pell de serp.





Apagallums

● COMESTIBLE




Lepiotes petites

● MORTAL




Paloma vermellosa

● PRECAUCIÓ

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Apagallums

● COMESTIBLE



Lepiotes petites

● MORTAL



Paloma vermellosa

● PRECAUCIÓ


| | Apagallums | Lepiotes petites | Paloma vermellosa |
|---|---|---|---|
| 1 BARRET | 15–30 cm | 2–8 cm | 10–15 cm |

| | Apagallums | Lepiotes petites | Paloma vermellosa |
|---|---|---|---|
| 2 PEU | Alt, pell de serp | Curt, bandes escatoses | Llis |
| 3 ANELL | Doble, es mou | Fràgil o absent | Doble, es mou |
| RESULTAT | Comestible · Molt bo | Mortal | Precaució |

## Carlet o fals carlet?


CAL FIXAR-S'HI

**La clau:** Làmines blanques tacades de vi, o làmines rosades amb olor de farina.




Carlet

COMESTIBLE




Fals carlet

TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Carlet

● COMESTIBLE



Fals carlet


● TÒXIC

| | Carlet | Fals carlet |
|---|---|---|
| 1 BARRET | Rosat amb taques vinoses | Blanc grisenc o beix |
| 2 LÀMINES | Blanques tacades de vi | Groguenques, després rosa salmó |
| OLOR | Suau | Farina rància |
| RESULTAT | **Comestible · Molt bo** | **Tòxic** |

## Ou de reig, reig bord o farinera borda?


DIFÍCIL · RISC GREU

**La clau:** Talla l'ou per la meitat: només el reig és taronja i groc per dins.




**Ou de reig**

● COMESTIBLE




**Reig bord**

● TÒXIC




**Farinera borda**

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



**Ou de reig**

● COMESTIBLE



**Reig bord**

● TÒXIC



**Farinera borda**


● MORTAL

| | Ou de reig | Reig bord | Farinera borda |
|---|---|---|---|
| 1 BARRET | Taronja, llis | Vermell amb berrugues | Verd oliva, groguenc o blanc |
| 2 LÀMINES | Grogues | Blanques | Blanques |
| 3 PEU I ANELL | Grocs | Blancs | Blancs |
| 4 VOLVA | Sac blanc gran | Anells al bulb | Sac blanc |
| RESULTAT | **Comestible · Excel·lent** | **Tòxic** | **Mortal** |

## Llora o farinera borda?


DIFÍCIL · RISC GREU

**La clau:** Arrenca-la sencera: la llora no té ni anell ni volva.




Llora i carbonera

● COMESTIBLE




Farinera borda

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Llora i carbonera

● COMESTIBLE



Farinera borda

● MORTAL


| | Llora i carbonera | Farinera borda |
|---|---|---|
| 1 BARRET | Verd clapat, sense fibres | Verd oliva amb fibres |
| 2 ANELL | No | Sí, com una faldilla |
| 3 VOLVA | No | Sí, sovint enterrada |

| | Llora i carbonera | Farinera borda |
|---|---|---|
| 4 PEU TRENCAT | Com un guix | A fibres |
| RESULTAT | Comestible · Molt bo | Mortal |

## Camperol, bola de neu pudent o farinera pudent?


DIFÍCIL · RISC GREU

**La clau:** Un xampinyó obert té làmines rosades o marrons, mai blanques, i no té volva.





Camperol

● COMESTIBLE




Bola de neu pudent

● TÒXIC




Farinera pudent

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Camperol

● COMESTIBLE



Bola de neu pudent

● TÒXIC



Farinera pudent


● MORTAL

| | Camperol | Bola de neu pudent | Farinera pudent |
|---|---|---|---|
| 1 LÀMINES | Rosa, després xocolata | Rosa grisenc, després marró | Blanques sempre |
| 2 BASE DEL PEU | Sense volva | Groc canari en rascar-la | Volva en sac |
| OLOR | De bolet | Tinta o iode | Desagradable |
| RESULTAT | **Comestible · Bo** | **Tòxic** | **Mortal** |

## Farinera o Amanita proxima?


DIFÍCIL · RISC GREU

**La clau:** Arrenca-la i mira la volva: blanca és farinera; taronja rovellada, proxima.




Farinera

● COMESTIBLE




Amanita proxima

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Farinera

● COMESTIBLE



Amanita proxima


● TÒXIC

| | Farinera | Amanita proxima |
|---|---|---|
| 1 VOLVA | Blanca i gruixuda | Amb tons taronja o rovell |
| 2 ANELL | Cremós, es desfà | Membranós, penja |
| TOXICITAT | Comestible, no recomanable | Danya els ronyons |
| RESULTAT | **Comestible · Acceptable · no recomanable** | **Tòxic** |

## Pimpinella morada o cortinari?


DIFÍCIL · RISC GREU

**La clau:** Fes l'esporada: rosa pàl·lid és pimpinella, marró rovell és cortinari.




**Pimpinella morada**

● COMESTIBLE




**Cortinari metzinós**

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



**Pimpinella morada**

● COMESTIBLE



**Cortinari metzinós**

● MORTAL

| | Pimpinella morada | Cortinari metzinós |
|---|---|---|
| 1 CORTINA | No | Sí, de jove |
| 2 ESPORADA | Rosa pàl·lid | Marró rovell |
| 3 LÀMINES VELLES | Lila terrós | Color rovell |

| | Pimpinella morada | Cortinari metzinós |
|---|---|---|
| RESULTAT | Comestible · Bo (sempre cuinada) | Mortal |

*Capítol 7*

# Abans de sortir

Cada tardor hi ha intoxicacions greus a Catalunya, gairebé sempre per confondre un bolet conegut amb un bessó. Aquestes són les regles dels boletaires amb experiència.

### Només et menges el que reconeixes al 100%

Ni un 90%, ni "em sembla que sí". Un sol exemplar de farinera borda pot matar una persona adulta.

### Aprèn pocs bolets, però a fons

Comença pels de nivell 1. Afegeix-ne un o dos cada temporada, sempre amb algú que en sàpiga.

### Arrenca sencers els que no coneguis

La volva (el sac de la base) sovint queda enterrada. Els que ja coneixes bé, talla'ls amb ganivet.

### Cistella de vímet, mai bossa de plàstic

A la bossa s'aixafen i fermenten. Porta els dubtosos a part, en una capsa.

### Cap truc casolà funciona

Ni la moneda de plata, ni l'all, ni que se'l mengin els cargols. Mira el capítol 8.

### Fes-los revisar

Les associacions micològiques i les exposicions de bolets de tardor revisen cistelles.

### Sempre cuinats, i amb mesura

Cap bolet silvestre cru. Amb nens, embarassades o gent gran, encara més prudència.

### Només exemplars sans

Fora els vells, aigualits, cucats, florits, glaçats o de vores de carretera. Ho veuràs al capítol 3.

### Guarda'n un de cru a la nevera

Si menges una espècie per primer cop, guarda'n un exemplar. Si hi ha intoxicació, els metges sabran què és.

### Respecta el bosc

Res de rastells. Deixa els petits, tapa el forat, endú-te'n només el que menjaràs i informa't de les normes locals.

**Cistella de vímet**
Deixa respirar els bolets i escampa espores mentre camines.

**Ganivet amb raspall**
Per tallar i netejar la terra allà mateix.

**Capsa per als dubtosos**
Separats de la resta, per ensenyar-los a algú que en sàpiga.

**Mòbil carregat**
Obre aquest llibre a casa abans de sortir: al bosc sovint no hi ha cobertura.

**Roba de colors vius**
A la tardor hi ha batudes de senglar. Fes-te veure.

**Digues on vas**
Avisa algú de la zona i l'hora de tornada.

●○○

### Nivell 1 · Fàcil

Té un tret inconfusible i no té cap bessó perillós a Catalunya.

●●○

### Nivell 2 · Compte

Té un bessó tòxic. Cal comprovar 2 o 3 trets en cada exemplar.

●●●


### Nivell 3 · Expert

Es pot confondre amb un bolet mortal. Només amb un expert al costat.

*Capítol 8*

# Descarts ràpids i mites

No hi ha cap regla per saber si un bolet és bo. Però sí que n'hi ha per saber quan deixar-lo. Si en compleix una, no va a la cistella.




**La combinació mortal.** Làmines blanques, anell i volva en sac: és una amanita. Si en veus les tres, o fins i tot només la volva, fora de la cistella.

- **Té volva: un sac a la base**
  Amanites. Hi ha la farinera borda i la farinera pudent.

- **Làmines blanques i anell**
  Combinació típica de les amanites mortals.

- **Bolet blanc amb làmines**
  Clitocibes, farinera pudent, lepiotes. Massa risc.

- **"Apagallums" de menys de 15 cm**
  Pot ser una lepiota mortal.

- **Porus vermells o carn que blaveja**
  Matagent i parents.

**Lactari amb llet blanca**

Només el grup del rovelló té llet taronja o vermella.

**Bolet marró petit sobre fusta**

Pot ser una galerina, mortal.

**Cortina o làmines color rovell**

Cortinaris. Alguns destrueixen els ronyons.

**Bola que per dins no és blanca**

Escleroderma, o un ou d'amanita.

**Ram taronja sobre olivera o alzina**

Gírgola d'olivera.

**Vell, aigualit, cucat o florit**

Fins i tot un comestible pot intoxicar quan està passat.

**Ou tancat**

Per fora, un ou de reig i una farinera borda són iguals.

**Recorda:** superar els descarts no vol dir que el bolet sigui comestible. Només vol dir que pots continuar comprovant-lo amb la seva pàgina.

**FALS**

*«Si una moneda de plata o un all s'enfosqueixen, el bolet és tòxic.»*

La farinera borda no enfosqueix ni la plata ni l'all.

**FALS**

*«Si se'l mengen els cargols o els conills, és bo.»*

Els animals mengen farinera borda sense problemes.

**FALS**

*«Els que es pelen fàcilment són comestibles.»*

La farinera borda es pela molt bé.

**FALS**

*«Si fa bona olor i té bon gust, no fa mal.»*

Els intoxicats per farinera borda expliquen que era bona.

**FALS**

*«Bullir-los o assecar-los treu el verí.»*

Les toxines mortals resisteixen la cocció i l'assecat.

**FALS**

*«Si al cap d'una hora estic bé, ja està.»*

Els mortals triguen de 6 a 24 hores. Els cortinaris, fins a dues setmanes.

*Capítol 9*

# Abans de menjar-te'l

Repassa aquesta llista amb cada bolet que vulguis cuinar. Si n'hi ha un que no pots marcar, no te'l mengis.

### Sé com es diu

En sé el nom i l'he comparat amb la seva pàgina del llibre.

### He mirat a sota del barret

Làmines, porus, plecs o agullons, i el seu color.

### He vist la base sencera

Sé si té volva o no.

### He descartat el seu bessó

He comprovat la clau del cara a cara.

### Està jove i sa

Ferm, sense cucs, sense floridura i sense aigua.

### Si en tinc el mínim dubte, no me'l menjo

Cap bolet val una nit a urgències.

*Capítol 10*

# A la cuina i a casa

Un bolet ben identificat també es pot fer malbé després. Així es tracten a casa.

### Neteja'ls al bosc

Treu la terra amb el ganivet i el raspall abans de posar-los a la cistella. A casa, un drap humit; no els deixis en remull.

### A la nevera, poc temps

En una capsa o en paper, mai en plàstic, i menja'ls en un o dos dies.

### Per congelar

La majoria es conserven millor si abans els saltes o els escaldes uns minuts.

### Per assecar

Ceps a làmines, trompetes, camagrocs i cama-secs s'assequen molt bé a l'aire o a l'assecador.

### Sempre ben cuinats

Cap bolet silvestre cru. Alguns, com la pimpinella o la vinosa, són tòxics crus.

### Primer tast

Si és el primer cop que menges una espècie, menja'n poca quantitat i guarda'n un exemplar cru a la nevera.

### Sense alcohol

El bolet de femer amb alcohol provoca palpitacions i vòmits, fins i tot dies després.

### Només el que menjaràs

No cal buidar el bosc. Molts boletaires es posen un màxim d'uns 3 kg per persona i dia.

*Capítol 11*

# Les meves troballes

Sortida pel Montnegre-Corredor, 18 d'octubre de 2026. Entre 280 i 620 m, en sauló amb alzines, castanyers i pins. 76 fotos que donen 18 bolets diferents: aquí tens què és cada un i per què no és un altre.

**Identificació orientativa a partir de fotos.** No te'n mengis cap per això. Per menjar un bolet cal tenir l'exemplar sencer amb la base, olorar-lo, tallar-lo i que el confirmi algú expert, per exemple una associació micològica.

**18**
bolets diferents en 76 fotos

**4**
comestibles segons la bibliografia, cap de confirmat

**14**
tòxics, no comestibles o sense determinar

**0**
rovellons: les taronges eren rússules i boletus

LA PREGUNTA

## Eren rovellons sense cercles?

**No.** Els bolets taronja sense cercles de les fotos són d'altres espècies. Es pot dir amb molta seguretat, però mai al 100% només amb fotos: per això tens la prova de les cinc comprovacions.




**Fotos 28–29 i 61–64 · troballa 6.** Una rússula: peu blanc i llis, làmines crema, vora del barret amb ratlletes i sense llet. El rovelló té el peu taronja amb clotets i làmines taronja.




**Fotos 70–71 · troballa 9.** Per sota té porus, com una esponja, no làmines. És un boletus petit, res a veure amb el rovelló.

### COM SABER QUE ÉS UN ROVELLÓ

1. Trenca'l o talla'l: ha de sortir llet de color (vermell vi o taronja), mai blanca.
2. Espera uns minuts: la zona tallada es torna verda.
3. Mira el peu: buit per dins i sovint amb clotets més foscos.
4. Mira les làmines: taronja o color vi, mai blanques ni crema.
5. Mira on és: sota pins, sempre.

Els cercles no serveixen per decidir: el rovelló de veritat (*L. sanguifluus*) sovint gairebé no en té. Si en trencar-lo surt **llet blanca**, fora: pot ser

l'enganyapastors, que té cercles com el rovelló i és tòxic. Pàgina del rovelló →

## Comestibles segons la bibliografia 4 troballes

Cap d'aquests està confirmat. Abans de menjar-te'ls, els ha de veure una persona experta amb l'exemplar sencer.



A la base d'un pi

### 7 Bolet coliflor

*Sparassis crispa*

● COMESTIBLE DE JOVE SEGONS LA BIBLIOGRAFIA

Confiança alta 14:51 · ≈ 620 m

**Per què és aquest**

Massa de color crema de lòbuls plans i arrissats, com fulls de lasanya, enganxada a la base d'un pi.

**Per què no és...**

- **Peus de rata (*Ramaria*)**: tenen branques cilíndriques que acaben en punta, no lòbuls plans. Algunes, com *Ramaria formosa*, són tòxiques.

PROVA DE CAMP

Toca un lòbul: és una làmina plana i ondulada, no un cilindre.

Al llibre: **Peu de rata bord · fitxa**

Fotos 125147



Pell color albercoc esquerdada i peu vermell, 16:01



Exemplar vell: porus groc oliva grans, 15:16



Jove: peu groc a dalt i vermell a baix, 15:55

## 9 Boletus de porus grocs i peu vermell

*Rheubarbariboletus armeniacus / Xerocomellus*

● COMESTIBLE MEDIOCRE SEGONS LA BIBLIOGRAFIA

Confiança mitjana 15:16, 15:55 i 16:01 · 510–590 m

**Compte:** els boletus tòxics de peu vermell (*Rubroboletus*, *Suillellus*, *Imperator*).

### Per què és aquest

Tenen porus (com una esponja) en lloc de làmines. La pell, color albercoc, s'esquerda en mosaic i deixa veure la carn clara. Els porus són groc oliva i el peu vermell rosat. Surten en sòl sorrenc amb alzines i pins.

### Per què no és...

- **Matagent i altres boletus de peu vermell**: tenen els porus vermells o taronja. Aquí són grocs.
- **Rovelló**: té làmines, no porus, i fa llet taronja.

**PROVA DE CAMP**

Mira els porus: grocs en aquest grup, vermells o taronja en els tòxics de peu vermell.

Al llibre: **Matagent · fitxa**

Fotos 131645–131648 · 135513–135515 · 140103–140104



Grup amb peu curt i punxetes



De prop: punxetes còniques

## 10 Pet de llop

*Lycoperdon perlatum*

COMESTIBLE NOMÉS MOLT JOVE · Confiança alta

15:24 · ≈ 560 m

**Compte:** un ou d'*Amanita* tancat sembla una boleta blanca. Algunes són mortals.

### Per què és aquest

Boletes blanques amb un peu curt, cobertes de punxetes còniques que cauen i deixen un dibuix de xarxa.

### Per què no és...

- **Escleroderma (nº 13)**: no té punxes, la pell és gruixuda i escatosa i per dins es torna negre violaci.
- **Ou d'*Amanita***: si el talles per la meitat, a dins s'hi veu la silueta d'un bolet.

**PROVA DE CAMP**

Talla'l de dalt a baix: si per dins és blanc i uniforme, és pet de llop. Si s'hi veu la silueta d'un bolet, és un ou d'Amanita.

Al llibre: **Pet de llop · fitxa** **Farinera borda · fitxa**

Fotos 132356–132400



Porus grocs i peu rosat puntejat



Barret vermell vellutat

## 18 Boletus vermell de porus grocs

*Hortiboletus rubellus (probable)*

● COMESTIBLE MEDIOCRE SEGONS LA BIBLIOGRAFIA

Confiança mitjana 16:44 · ≈ 280 m

### Per què és aquest

Barret vermell sang i vellutat, porus grocs i peu rosat amb puntets, a l'herba de la vora del camí.

### Per què no és...

- **Boletus tòxics de peu vermell**: tenen els porus vermells o taronja.
- **Boletus de peu vermell color albercoc (nº 9)**: tenen la pell esquerdada en mosaic.

> PROVA DE CAMP
> Pressiona els porus: s'haurien de tornar blaus.

Al llibre: **Matagent · fitxa**

Fotos 144430–144434

## No comestibles, tòxics o sense determinar

14 troballes

Les rússules que no es poden identificar per foto (nº 14, 15 i 16) van aquí: si no saps què és, no es menja.



Exemplar jove sobre sauló, 13:53



Adult en embut, amb la vora blanca, 15:37



Diversos barrets fusionats, molt jove, 14:25

## 1 Hidnel

*Hydnellum sp. (tipus H. concrescens / H. scrobiculatum)*

NO COMESTIBLE · Confiança mitjana

13:53, 14:25 i 15:37 · 350–585 m

### Per què és aquest

Dur com el suro, amb la vora blanca i cotonosa que creix i engloba branquetes. Els barrets es fusionen entre ells i per sota té agullons en lloc de làmines. Li agrada el sauló.

### Per què no és...

- **Llengua de bou (*Hydnum repandum*)**: és carnosa i trencadissa, de color taronja crema uniforme i sense la vora cotonosa.
- ***Thelephora***: és marró xocolata fosc.
- ***Coltricia perennis***: té zones marró rovell i porus en lloc d'agullons.

**PROVA DE CAMP**

Gira'l: si a sota té agullons i la carn és dura i fibrosa com el suro, és un hidnel.

Al llibre: **Llengua de bou · fitxa**

Fotos 115343–115347 · 122519–122521 · 133741–133742



De costat: làmines blanques i peu curt i gruixut



Barret llefiscós groc oliva sota pins

## 2 Rússula groc oliva

*Russula cf. ochroleuca*

NO COMESTIBLE · Confiança mitjana · 14:07 · ≈ 400 m

**Compte:** recorda la farinera borda (*Amanita phalloides*), que és mortal.

### Per què és aquest

Barret llefiscós groc verdós, amb la vora una mica estriada, làmines blanques i peu blanc, curt i gruixut, sense anell a la vista. Sota pins.

### Per què no és...

- **Farinera borda (*Amanita phalloides*)**: té la vora llisa amb fibres radials, un peu més esvelt amb anell i una volva en forma de sac a la base. A les fotos no es veu la base, així que no es pot descartar del tot.
- **Llora (*Russula virescens*)**: té la pell seca i esquerdada en plaques verdes.

**PROVA DE CAMP**

Arrenca-la sencera i mira la base. Si la carn del peu es trenca com un guix i no hi ha ni anell ni volva, és una rússula.

Al llibre: **Farinera borda · fitxa** **Llora i carbonera · fitxa**

Fotos 120731–120733



Barrets desfent-se en tinta negra, 15:23



Des de dalt, amb restes blanques del vel



Exemplar obrint-se, 14:21

## 3 Coprí garsa

*Coprinopsis picacea*

TÒXIC O SOSPITÓS · Confiança mitjana

14:21 i 15:23 · 385–580 m

### Per què és aquest

Peu blanc, molt alt i buit. El barret es desfà en una tinta negra que goteja. És fosc, amb plaques blanques del vel, com el plomatge d'una garsa. A les 14:21 se'n veu un obrint-se, amb el centre ocre i la vora plisada que ennegreix.

### Per què no és...

- **Bolet de tinta (*Coprinus comatus*)**: és blanc, llanós i allargat, i surt a prats i cunetes.
- **Bolet de femer (*Coprinopsis atramentaria*)**: és gris, sense plaques blanques, i creix en grups atapeïts al costat de soques.

**PROVA DE CAMP**

Les plaques blanques es desenganxen amb el dit: són restes del vel que embolicava el bolet jove.

Al llibre: **Bolet de tinta · fitxa** **Bolet de femer · fitxa**

Fotos 122119–122123 · 132315–132328



Barret setinat que s'esquinça per la vora, 15:40



Grupet sota alzines, 14:25



Peu fibrós amb escametes marrons

## 4 Bolets crema de barret fibrós

*Inocybe sp. probable (o Hebeloma)*

● POTENCIALMENT TÒXIC  Confiança baixa

14:25 i 15:40 · 515–570 m

**Compte:** es cullen per error pensant que són cama-secs. Moltes *Inocybe* porten muscarina.

### Per què és aquest

Barret crema i setinat, de fibres radials, que s'esquinça per la vora. Peu fibrós amb escametes marrons. En grupets sota alzines. Sense microscopi no es pot arribar a l'espècie.

### Per què no és...

- **Cama-sec (*Marasmius oreades*)**: creix en rotllanes als prats, té les làmines molt separades i un peu tan corretjós que es retorça sense trencar-se.

- *Psathyrella candolleana*: té el peu blanc, llis i molt fràgil, i les làmines acaben marró violaci fosc.

> **PROVA DE CAMP**
> Fes l'esporada (el barret de cap per avall sobre un paper unes hores): marró tabac a Inocybe i Hebeloma; blanca al cama-sec.

Al llibre: **Inocybe · fitxa** **Cama-sec · fitxa**

Fotos 122512–122515 · 134020–134035



Barret vermell, làmines i peu blancs, 15:36



Descolorida per la pluja: blanca amb el centre rosa, 14:32



Forma més ataronjada, 15:48

## 5 Rússules vermelles

*Russula grup emetica / fragilis*

● TÒXIC (PICANT) Confiança mitjana

14:32, 15:36 i 15:48 · 535–590 m

### Per què és aquest

Barret vermell o corall, làmines i peu blancs, i carn que es trenca com un guix. La pluja renta el vermell: la de les 14:32 ha quedat blanca amb el centre rosa i la vora acanalada. Les d'aquest grup piquen molt i fan mal de panxa.

### Per què no és...

- **Reig bord (*Amanita muscaria*)**: té berrugues blanques al barret, anell al peu i una volva en anells a la base.
- **Ou de reig (*Amanita caesarea*)**: té les làmines i el peu grocs i una volva blanca en sac.

**PROVA DE CAMP**

Pressiona el peu: a les rússules es trenca com un guix i mai hi ha anell ni volva.

Al llibre: **Escaldabecs · fitxa** **Reig bord · fitxa** **Ou de reig · fitxa**

Fotos 123244–123258 · 133623–133632 · 134854–134855



Barret ocre taronja llefiscós i làmines crema, 15:49



Vora amb solcs com una pinta



Exemplar grisenc trencat: la carn s'esmicola com un guix, 14:41



Grisa pàl·lida de vora estriada, 14:34

## 6 Rússules pudents de vora acanalada

*Russula grup foetens / sororia / amoenolens*

NO COMESTIBLE · Confiança mitjana

14:34, 14:41, 15:19 i 15:49 · 535–580 m

**Compte:** la grisa de les 14:34 també encaixa amb l'amanita envainada (*Amanita vaginata*). Cal veure la base.

### Per què és aquest

Vora del barret amb solcs com una pinta, barret llefiscós ocre taronja o marró grisenc, i peu blanc que es taca de marró. Solen fer pudor: a ranci, a formatge o a oli.

### Per què no és...

- **Rovelló (*Lactarius*)**: fa llet taronja o vermella, té el peu taronja amb clotets i les làmines taronja. Aquesta no fa llet i té el peu blanc.
- **Amanita envainada (*Amanita vaginata*)**: també té la vora estriada, però el peu és més esvelt i fràgil i surt d'una volva en forma de sac.

**PROVA DE CAMP**

Olora-la: la pudor de ranci o d'ametlla amarga és típica d'aquest grup. I trenca-la: no fa llet.

Al llibre: **Rovelló · fitxa**

Fotos 123410–123412 · 124109–124127 · 131916–131917 · 134909–135027



Forma de boletus, tot cobert de feltre



Vist des de dalt

## 8 Boletus parasitat per una floridura

*Hypomyces chrysospermus*

**NO ES MENJA MAI** Confiança alta 15:13 · ≈ 600 m

### Per què és aquest

Té forma de boletus, però està deformat i folrat sencer d'un feltre blanc que groguenca, sense porus a la vista. És una floridura que es menja el boletus. Un boletus amb aquesta floridura no es menja mai.

### Per què no és...

- **Hidnel (nº 1)**: no té forma de barret sobre un peu, i per sota té agullons.
- **Boletus sa**: té els porus a la vista i la superfície llisa o vellutada, sense feltre.

Fotos 131311–131320



Sobre un tronc mort

## 11 Repises blanques

*Trametes sp. (probable T. hirsuta)*

NO COMESTIBLE · Confiança mitjana · 15:26 · ≈ 565 m

### Per què és aquest

Repises petites, blanquinoses i amb zones ocre, amb porus blancs per sota, sobre un tronc mort. Són corretjoses.

### Per què no és...

- **Cua de gall dindi (*Trametes versicolor*)**: té bandes de molts colors, blavoses o marrons.

Fotos 132613–132614



Cara inferior en laberint



Vista de dalt, sobre un tronc de pi

## 12 Repisa de porus en laberint

*Gloeophyllum sp. (probable)*

NO COMESTIBLE · Confiança baixa · 15:35 · ≈ 595 m

### Per què és aquest

Repisa marró fosca sobre un tronc de pi, amb la cara inferior en forma de laberint marró.

### Per què no és...

- ***Daedalea quercina***: té un laberint molt més gruixut, color suro clar, i creix en roure.

Fotos 133531–133533



Pell gruixuda amb escates poligonals



Exemplars petits; un d'esquerdat

13

## Escleroderma

*Scleroderma citrinum / verrucosum*

TÒXIC · Confiança alta · 15:37 · ≈ 580 m

### Per què és aquest

Bola ocre marró sense peu de veritat, de pell gruixuda i trencada en escates poligonals, com pell de rèptil.

### Per què no és...

- **Pet de llop (nº 10)**: té punxetes i per dins és blanc i esponjós.
- **Tòfones**: creixen enterrades i fan una olor intensa.

> **PROVA DE CAMP**
> Talla'l: per dins és negre violaci marbrejat, fins i tot de jove.

Al llibre: **Escleroderma · fitxa** **Pet de llop · fitxa**

Fotos 133756–133801



Làmines crema ocre i peu rosa



Barret vermell vi

## 14 Rússula vinosa de peu rosa

*Russula grup xerampelina o d'altres*

SENSE DETERMINAR · Confiança baixa · 15:46 · ≈ 540 m

### Per què és aquest

Barret vermell vi fosc, làmines crema ocre i peu rosat. Per arribar a l'espècie calen l'olor i l'esporada.

### Per què no és...

- **Rússules vermelles picants (n° 5)**: tenen les làmines i el peu blancs.

**PROVA DE CAMP**

Olora-la: les del grup xerampelina fan olor de marisc o de peix.

Fotos 134600–134603



Peu blanc robust sense anell a la vista



La carn s'esquerda en falques

## 15 Rússula gran blanc crema

*Russula sp.*

SENSE DETERMINAR · Confiança baixa · 15:47 · ≈ 540 m

**Compte:** les amanites blanques (*A. verna*, *A. virosa*), que són mortals.

### Per què és aquest

Bolet gran blanc crema, de pell llefiscosa, amb la carn que s'esquerda en falques i un peu blanc robust, sense anell a la vista.

### Per què no és...

- **Amanites blanques (*A. verna*, *A. virosa*, *A. ovoidea*)**: tenen anell al peu i volva a la base.

**PROVA DE CAMP**

Amb qualsevol bolet gran i blanc, arrenca'l sencer i busca la volva.

Al llibre: **Farinera pudent · fitxa** **Farinera · fitxa**

Fotos 134730–134746



Làmines blanques



Barret porpra llefiscós

## 16 Rússula violeta

*Russula cf. cyanoxantha (carbonera)*

● SENSE DETERMINAR (LA CARBONERA ÉS COMESTIBLE)

Confiança baixa 15:55 · ≈ 510 m

### Per què és aquest

Barret porpra vinós i llefiscós, làmines blanques i peu blanc rosat, sota alzines i castanyers.

### Per què no és...

- ***Russula atropurpurea***: té el centre gairebé negre i les làmines es trenquen en fregar-les.

> **PROVA DE CAMP**
> Passa el dit per les làmines: si es dobleguen com si fossin greixoses, sense trencar-se, és la carbonera. Si es trenquen, és una altra.

Al llibre: **Llora i carbonera · fitxa**

Fotos 135505–135508



Embut blanc brut de terra



Làmines molt atapeïdes

## 17 Rússula blanca en embut

*Russula grup delica / chloroides*

NO RECOMANABLE · Confiança mitjana · 16:01 · ≈ 510 m

### Per què és aquest

Embut blanc que surt empenyent la terra (per això va tan brut), amb làmines molt atapeïdes i peu curt.

### Per què no és...

- ***Lactifluus* blancs (*L. piperatus*, *L. vellereus*)**: en tallar les làmines treuen llet blanca.

**PROVA DE CAMP**

Fes un tall a les làmines: si surt llet, és un Lactifluus.

Al llibre: **Lactaris de llet blanca · fitxa**

Fotos 140151–140152

### Per a la propera sortida

Amb aquestes quatre fotos de cada bolet, la identificació seria molt més segura.

#### 1 · Sencer, amb la base

Arrenca'l i fotografia la base per veure si té volva.

#### 2 · Per sota

Una foto de les làmines, els porus o els agullons.

#### 3 · Tallat

Mira si canvia de color o si fa llet, i de quin color.

#### 4 · Olor i arbre

Apunta l'olor i quin arbre tenia al costat.

*Capítol 13*

# Si algú es troba malament

**TRUCA**

## 112

Digues que heu menjat bolets silvestres i quan.

Copia el número

**SERVEI D'INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA · 24 H**

## 91 562 04 20

Consultes telefòniques d'intoxicacions per a tot l'Estat.

Copia el número

**QUAN HAN COMENÇAT ELS SÍMPTOMES?**

| | |
|---|---|
| **< 6 h** | Normalment digestiva o nerviosa. Cal anar a urgències igualment. |
| **6–24 h** | Alerta màxima: farinera borda, lepiotes o galerina. Encara que et trobis millor, el fetge s'està danyant. |
| **2–17 dies** | Set intensa i poca orina: cortinari metzinós. |


**QUÈ FER**

- Ves a urgències encara que sembli lleu.
- Porta els bolets que sobrin, crus o cuinats, i les peles.
- Avisa tothom que n'hagi menjat.
- No prenguis remeis casolans ni provoquis el vòmit sense indicació mèdica.

*Mapa*

# On surten els bolets

Cada punt és una observació confirmada a iNaturalist. Tria fins a quatre bolets per comparar-los.




Afegeix un altre bolet

**Pobles** **Parcs naturals**

Arrossega per moure't · pessiga o fes servir + i − per apropar-te

**Avís:** aquest llibre és una eina d'aprenentatge i no substitueix la revisió d'un micòleg. Els bolets canvien amb l'edat, la pluja i el terreny, i cap foto les mostra totes.

**Fonts del text:** Generalitat de Catalunya (bolets comestibles i tòxics més freqüents), Història Natural dels Països Catalans (comestibilitat i toxicitat), Ministeri de Justícia (Servei d'Informació Toxicològica). **Obres consultades com a referència**, sense reproduir-ne textos ni fotos: *Guía de setas de Hoyo de Manzanares* (2018), *Guía de setas de Páramos y Valles Palentinos* (2008) i *La Guia dels Bolets Catalans* (dos-a-la-tres.com).

**Fotografies:** observacions d'iNaturalist amb llicència Creative Commons, la majoria fetes a Catalunya. Cada foto porta el nom de qui la va fer.

**Rovelló** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació
**Rovelló** · Вова Протас · CC BY-NC · observació
**Rovelló** · Nico Hernandez · CC BY · observació
**Rovelló** · RitmeNatura · CC BY-NC · observació
**Rovelló** · Cristobal Jimenez · CC BY-NC-ND · observació
**Rovelló** · Izan Lopez Vergel · CC BY-NC · observació
**Rovelló** · Izan Lopez Vergel · CC BY-NC · observació
**Pinetell** · jl_cc · CC BY-NC · observació
**Pinetell** · marahf · CC BY-NC · observació
**Pinetell** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació
**Pinetell** · stoned_microscopy · CC BY-NC · observació
**Pinetell** · stoned_microscopy · CC BY-NC · observació
**Pinetell** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació
**Pinetell** · jacilluch · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
**Pinetell** · Mutari · Public domain · Wikimedia Commons
**Trompeta de la mort** · yaya_love · CC BY-NC · observació
**Trompeta de la mort** · Josep Sais i Brucet · CC BY-NC · observació
**Trompeta de la mort** · pogon · CC BY-NC · observació
**Trompeta de la mort** · fenneck · CC BY-NC · observació
**Trompeta de la mort** · hherb · CC BY-NC · observació
**Trompeta de la mort** · yossarianc · CC BY-NC · observació
**Trompeta de la mort** · Guille Marín · CC BY-NC · observació
**Camagroc** · Josep Sais i Brucet · CC BY-NC · observació
**Camagroc** · mingokt · CC BY-NC · observació
**Camagroc** · Nico Hernandez · CC BY · observació
**Camagroc** · polchof · CC BY-NC · observació
**Camagroc** · nicomanus · CC BY-NC · observació
**Camagroc** · Nico Hernandez · CC BY · observació
**Camagroc** · Nico Hernandez · CC BY · observació
**Llengua de bou** · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació
**Llengua de bou** · Alba Rovira · CC BY-NC · observació
**Llengua de bou** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació
**Llengua de bou** · Josep Sais i Brucet · CC BY-NC · observació
**Llengua de bou** · Jacobo Martín · CC BY-NC · observació

**Llengua de bou** · jonatan_antunez · CC BY-NC · observació

**Molleric** · Javier A. Canteros · CC BY-NC · observació

**Molleric** · Sean S · CC BY-NC · observació

**Molleric** · Sean S · CC BY-NC · observació

**Molleric** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Molleric** · Ibai Olariaga · CC BY-NC · observació

**Molleric** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Molleric** · oriolusoriolus · CC BY-NC · observació

**Bolet de tinta** · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

**Bolet de tinta** · jorditb · CC BY-NC · observació

**Bolet de tinta** · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

**Bolet de tinta** · Joan Ramon Torrella · CC BY-NC · observació

**Bolet de tinta** · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

**Bolet de tinta** · Daniel Fornos Alimbau · CC BY-NC · observació

**Bolet de tinta** · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

**Cep** · Carmelo López Abad · CC BY-NC · observació

**Cep** · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

**Cep** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Cep** · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

**Cep** · hherb · CC BY-NC · observació

**Cep** · UNIRSE Llavi · CC BY-NC · observació

**Cep** · Joan Corominas Melian · CC BY-NC · observació

**Cep** · fr_em · CC BY-NC · observació

**Cep** · Thomas Pruß · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

**Cep** · DenesFeri · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

**Rossinyol** · jonatan_antunez · CC BY-NC · observació

**Rossinyol** · Miguel A. Casado · CC BY-NC · observació

**Rossinyol** · Marc Riera · CC BY · observació

**Rossinyol** · David Pereira · CC BY-NC · observació

**Rossinyol** · Àngel Argüelles · CC BY-NC · observació

**Rossinyol** · Josep M. Esteve Guilera · CC BY-NC · observació

**Rossinyol** · oriol3333 · CC BY-NC · observació

**Rossinyol** · Игорь Лебединский · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

**Fredolic** · josep65 · CC BY-NC · observació

**Fredolic** · Nico Hernandez · CC BY · observació

**Fredolic** · Nico Hernandez · CC BY · observació

**Fredolic** · Nico Hernandez · CC BY · observació

**Fredolic** · Xavi · CC BY-NC · observació

**Fredolic** · javixu · CC BY-NC · observació

**Fredolic** · Nico Hernandez · CC BY · observació

**Fredolic** · Pere Orga Esteve · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

**Llenega negra** · jl__cc · CC BY-NC · observació

**Llenega negra** · jl__cc · CC BY-NC · observació

**Llenega negra** · LaiaGuàrdia · CC BY-NC-ND · observació

**Llenega negra** · yossarianc · CC BY-NC · observació

**Llenega negra** · jl__cc · CC BY-NC · observació

**Llenega negra** · Nico Hernandez · CC BY · observació

**Llenega negra** · Nico Hernandez · CC BY · observació

**Carlet** · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

**Carlet** · Joseba · CC BY-NC · observació

**Carlet** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

**Carlet** · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

**Carlet** · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

**Carlet** · Víctor Huete Pelaez · CC BY-NC · observació

**Carlet** · Cristobal Jimenez · CC BY-NC-ND · observació

**Carlet** · Netol · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

**Cama-sec** · Izan Lopez Vergel · CC BY-NC · observació

**Cama-sec** · manelor · CC BY-NC-ND · observació

**Cama-sec** · Experience Matters · CC BY-NC · observació

**Cama-sec** · yossarianc · CC BY-NC · observació

**Cama-sec** · Joan Corominas Melian · CC BY-NC · observació

**Cama-sec** · Peyut · CC BY-NC · observació

**Cama-sec** · Xavier Béjar · CC BY-ND · observació

**Apagallums** · victoriadurazo · CC BY-NC · observació

**Apagallums** · Ángel Argüelles · CC BY-NC · observació

**Apagallums** · Oriol Sastre · CC BY · observació

**Apagallums** · Izan Lopez Vergel · CC BY-NC · observació

**Apagallums** · José Ignacio Márquez Corro · CC BY-NC · observació

**Apagallums** · Joan Corominas Melian · CC BY-NC · observació

**Apagallums** · mussolbarrios · CC BY-NC · observació

**Apagallums** · George Chernilevsky · Public domain · Wikimedia Commons

**Gírgoles** · toniconca · CC BY-NC · observació

**Gírgoles** · Purnendu Roy · CC BY-NC · observació

**Gírgoles** · Nico Hernandez · CC BY · observació

**Gírgoles** · Javier Royán Martín · CC BY-NC · observació

**Gírgoles** · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

**Gírgoles** · Juan José de Haro · CC BY-SA · observació

**Gírgoles** · Purnendu Roy · CC BY-NC · observació

**Cama de perdiu** · Jorge Pérez Arienza · CC BY-NC · observació

**Cama de perdiu** · Assumpta MC · CC BY-NC · observació

**Cama de perdiu** · lkrauel · CC BY-NC · observació

**Cama de perdiu** · Pablo Silvestre Pérez · CC BY-NC · observació

**Cama de perdiu** · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

**Cama de perdiu** · Nico Hernandez · CC BY · observació

**Pet de llop** · guspiralsnuvols · CC BY-NC · observació

**Pet de llop** · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

**Pet de llop** · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

**Pet de llop** · José María Pando · CC BY-NC · observació

**Pet de llop** · victoriadurazo · CC BY-NC · observació

**Pet de llop** · guspiralsnuvols · CC BY-NC · observació

**Pet de llop** · Fatima Carrasco · CC BY-NC · observació

**Pet de llop gegant** · bargon · CC BY-NC · observació

**Pet de llop gegant** · Angel Zofío Leiva · CC BY-NC · observació

**Pet de llop gegant** · Ángel Argüelles · CC BY-NC · observació

**Pet de llop gegant** · spacecadetkiddo · CC BY-NC · observació

**Pet de llop gegant** · Dr. Fabio Mao Valletta · CC BY-NC · observació

**Pet de llop gegant** · Jofre · CC BY-NC · observació

**Pet de llop de prat** · Daniel Joaquín Aguirre Howes · CC BY-NC · observació

**Pet de llop de prat** · Joan Prunera-Olivé · CC BY-NC · observació

**Pet de llop de prat** · piranyeta · CC BY-NC · observació

**Pet de llop de prat** · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

**Pet de llop de prat** · marina_torrellas · CC BY-NC · observació

**Pet de llop de prat** · ainasm · CC BY-NC · observació

**Ou de reig** · LaiaGuàrdia · CC BY-NC-ND · observació

**Ou de reig** · LaiaGuàrdia · CC BY-NC-ND · observació

**Ou de reig** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Ou de reig** · Xavier de Pedro Puente · CC BY-NC · observació

**Ou de reig** · lkrauel · CC BY-NC · observació

**Ou de reig** · Xavier de Pedro Puente · CC BY-NC · observació

**Ou de reig** · marcaluco · CC BY-NC · observació

**Llora i carbonera** · Javier Martínez Fuentes · CC BY-NC · observació

**Llora i carbonera** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Llora i carbonera** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Llora i carbonera** · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

**Llora i carbonera** · mussolbarrios · CC BY-NC · observació

**Llora i carbonera** · tarareare · CC BY-SA · observació

**Llora i carbonera** · nicomanus · CC BY-NC · observació

**Pimpinella morada** · Marc · CC BY-NC · observació

**Pimpinella morada** · Marc · CC BY-NC · observació

**Pimpinella morada** · no rights reserved · CC0 · observació

**Pimpinella morada** · Guille Marín · CC BY-NC · observació

**Pimpinella morada** · hherb · CC BY-NC · observació

**Pimpinella morada** · marcaluco · CC BY-NC · observació

**Pimpinella morada** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

**Pimpinella morada** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

**Camperol** · Jose-Antonio Ortiz-Marzo · CC BY-NC · observació

**Camperol** · marcaluco · CC BY-NC · observació

**Camperol** · Jose-Antonio Ortiz-Marzo · CC BY-NC · observació

**Camperol** · Sarah and Fernando · CC BY-NC · observació

**Camperol** · kiksalinas-anapri · CC BY-NC · observació

**Camperol** · Bernat Espigulé · CC BY-NC · observació

**Bola de neu** · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

**Bola de neu** · Angel Zofio Leiva · CC BY-NC · observació

**Bola de neu** · jorge-prieto · CC BY-NC · observació

**Bola de neu** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Bola de neu** · Jerry Cooper · CC BY · observació

**Bola de neu** · laurasanchezjimenez · CC BY-NC · observació

**Farinera** · jl_cc · CC BY-NC · observació

**Farinera** · Rafael Carbonell Font · CC BY · observació

**Farinera** · marcaluco · CC BY-NC · observació

**Farinera** · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

**Farinera** · lkrauel · CC BY-NC · observació

**Farinera** · Adrià Mercader · CC BY-NC · observació

**Farinera borda** · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

**Farinera borda** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Farinera borda** · Josep Sais i Brucet · CC BY-NC · observació

**Farinera borda** · no rights reserved · CC0 · observació

**Farinera borda** · polchof · CC BY-NC · observació

**Farinera borda** · no rights reserved · CC0 · observació

**Farinera borda** · BrunadelPirineu · CC BY-NC · observació

**Farinera borda** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Farinera pudent** · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

**Farinera pudent** · yossarianc · CC BY-NC · observació

**Farinera pudent** · Jesse Kalwij · CC BY-NC · observació

**Farinera pudent** · Rene Weigelt · CC BY-NC · observació

**Farinera pudent** · Nicolas Schwab · CC BY-NC · observació

**Farinera pudent** · Вадим Рыбаков · CC BY-NC · observació

**Lepiotes petites** · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

**Lepiotes petites** · Jose-Antonio Ortiz-Marzo · CC BY-NC · observació

**Lepiotes petites** · Víctor Huete Pelaez · CC BY-NC · observació

**Lepiotes petites** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Lepiotes petites** · santigibertbolets · CC BY-NC · observació

**Lepiotes petites** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

**Galerina marginada** · Mario Vega Pérez · CC BY-NC · observació

**Galerina marginada** · Mario Vega Pérez · CC BY-NC · observació

**Galerina marginada** · faluke · CC BY-NC · observació

**Galerina marginada** · Ángel Fernández Cancio · CC BY-NC · observació

**Galerina marginada** · Ibai Olariaga · CC BY-NC · observació

**Cortinari metzinós** · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

**Cortinari metzinós** · Federico Calledda · CC BY-NC · observació

**Cortinari metzinós** · ljantos · CC BY-NC · observació

**Cortinari metzinós** · Marco Floriani · CC BY-NC · observació

**Cortinari metzinós** · Nicolas Schwab · CC BY-NC · observació

**Paxil enrotllat** · joxepo · CC BY-NC · observació

**Paxil enrotllat** · jonatan_antunez · CC BY-NC · observació

**Paxil enrotllat** · José Luis Romero Rego · CC BY-NC · observació

**Paxil enrotllat** · Jose Castro · CC BY · observació

**Paxil enrotllat** · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

**Reig bord** · graellsia · CC BY-NC · observació

**Reig bord** · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

**Reig bord** · Вова Протас · CC BY-NC · observació

**Reig bord** · johnnywiller · CC BY-NC · observació

**Reig bord** · mavero · CC BY-NC · observació

**Reig bord** · mmart · CC BY-NC · observació

**Pixacà** · nicomanus · CC BY-NC · observació

**Pixacà** · luiS · CC BY-NC · observació

**Pixacà** · Yves Bas · CC BY · observació

**Pixacà** · Oriol Sastre · CC BY · observació

**Pixacà** · josep65 · CC BY-NC · observació

**Pixacà** · Yves Bas · CC BY · observació

**Amanita proxima** · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

**Amanita proxima** · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

**Amanita proxima** · jorgemartin71 · CC BY-NC · observació

**Amanita proxima** · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

**Amanita proxima** · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

**Amanita proxima** · Pere Valls · CC BY-NC · observació

**Fredolic metzinós** · Antton Meléndez · CC BY-NC · observació

**Fredolic metzinós** · jeclerencia · CC BY-NC · observació

**Fredolic metzinós** · josep65 · CC BY-NC · observació

**Fredolic metzinós** · josep65 · CC BY-NC · observació

**Fredolic metzinós** · Guinberteau Jacques · CC BY-NC · observació

**Fals carlet** · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

**Fals carlet** · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

**Fals carlet** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Fals carlet** · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

**Fals carlet** · Víctor Huete Pelaez · CC BY-NC · observació

**Fals carlet** · BrunadelPirineu · CC BY-NC · observació

**Gírgola d'olivera** · Juan Bertrand-Figueroa · CC BY-NC · observació

**Gírgola d'olivera** · Bernat Espigulé · CC BY-NC · observació

**Gírgola d'olivera** · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

**Gírgola d'olivera** · Miquel Rafa · CC BY-NC · observació

**Gírgola d'olivera** · albadomingo · CC BY-NC · observació

**Lactaris de llet blanca** · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

**Lactaris de llet blanca** · josep65 · CC BY-NC · observació

**Lactaris de llet blanca** · David Marcos Vidal · CC BY-NC · observació

**Lactaris de llet blanca** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

**Lactaris de llet blanca** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

**Lactaris de llet blanca** · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

**Matagent** · ceslal · CC BY-NC · observació

**Matagent** · hherb · CC BY-NC · observació

**Matagent** · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

**Matagent** · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

**Matagent** · Joseba · CC BY-NC · observació

**Matagent** · Purnendu Roy · CC BY-NC · observació

**Escleroderma** · Oriol Sastre · CC BY · observació

**Escleroderma** · nicomanus · CC BY-NC · observació

**Escleroderma** · alfredoherrero · CC BY-NC · observació

**Escleroderma** · jorgemartin71 · CC BY-NC · observació

**Escleroderma** · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

**Escleroderma** · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

**Clitocibes blancs** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Clitocibes blancs** · maricel patino · CC BY-NC · observació

**Clitocibes blancs** · lovewildlifeforever · CC BY-NC · observació

**Clitocibes blancs** · Aura Montenegro · CC BY-NC · observació

**Inocybe** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Inocybe** · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

**Inocybe** · Jose Castro · CC BY · observació

**Inocybe** · David Marcos Vidal · CC BY-NC · observació

**Inocybe** · deinonyco · CC BY-NC-SA · observació

**Verderol** · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

**Verderol** · Sean S · CC BY-NC · observació

**Verderol** · josep65 · CC BY-NC · observació

**Verderol** · oriol3333 · CC BY-NC · observació

**Bola de neu pudent** · joxepo · CC BY-NC · observació

**Bola de neu pudent** · MAR (Miguel A. Ribes) · CC BY-NC · observació

**Bola de neu pudent** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Bola de neu pudent** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Bola de neu pudent** · Felipe Castilla Lattke · CC BY-NC · observació

**Bolet de femer** · jonatan_antunez · CC BY-NC · observació

**Bolet de femer** · diana_fuir · CC BY-NC · observació

**Bolet de femer** · ferran garcia mari · CC BY-NC · observació

**Bolet de femer** · diana_fuir · CC BY-NC · observació

**Peu de rata bord** · Cordula Bernert · CC BY-NC · observació

**Peu de rata bord** · Stevan Baluban · CC BY-NC · observació

**Peu de rata bord** · Philippe Geniez · CC BY-NC · observació

**Peu de rata bord** · adeline_chartreuse · CC BY-NC · observació

**Escaldabecs** · noah_siegel · CC BY-NC-SA · observació

**Escaldabecs** · Vladimir Bryukhov · CC BY-NC · observació

**Escaldabecs** · Simon M Davies · CC BY-NC · observació

**Rossinyol ataronjat** · Rubén Pérez-González · CC BY-NC · observació

**Rossinyol ataronjat** · Enric Gràcia i Barba · CC BY-NC · observació

**Rossinyol ataronjat** · Rubén Pérez-González · CC BY-NC · observació

**Rossinyol ataronjat** · Enric Gràcia i Barba · CC BY-NC · observació

**Molleric amarg** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Molleric amarg** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Molleric amarg** · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

**Molleric amarg** · Suso Tizón · CC BY-NC-SA · observació

**Paloma vermellosa** · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

**Paloma vermellosa** · Borja Rodríguez-de-Francisco · CC BY-NC · observació

**Paloma vermellosa** · Susana Lara Celma · CC BY-NC · observació