NO COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Falso rebozuelo

*Hygrophoropsis aurantiaca* · fals rossinyol · rossinyol ataronjat

*No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.*

Todo naranja, con láminas verdaderas.

Debajo

De cerca: láminas blandas naranja intenso.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Láminas verdaderas: finas, apretadas, bifurcadas varias veces, naranja vivo.
! Carne delgada y blanda, no compacta.
! Sombrero aterciopelado naranja a pardo anaranjado.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 2–8 cm, deprimido, margen enrollado; naranja a pardo anaranjado, aterciopelado.
**DEBAJO** Láminas finas, apretadas, decurrentes, bifurcadas, naranja intenso.
**PIE** Delgado, naranja pardo, a menudo curvado.
**CARNE** Delgada, blanda, anaranjada.
**ESPORADA** Blanca a crema.

**GRAVEDAD** ●○○ **Leve.** No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

**DÓNDE** Con pino silvestre y rodeno. **Sobre madera.** Pinares, sobre restos de madera y acículas.

**SE CONFUNDE CON**

**Rebozuelo** (rossinyol · *Cantharellus cibarius*) COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas), carne gruesa y firme, color yema de huevo. → p. 13

**Seta de olivo** (gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*) TÓXICA Omphalotus crece en grandes ramilletes sobre madera de olivo, encina o castaño y es mucho más carnoso. → p. 55

**COMPRUEBE** Parte inferior: pase el dedo; los pliegues no se separan como láminas.






CISTELLA SEGURA · CATALUÑA

# Setas comestibles *esenciales* de Cataluña

Las 80 setas que hay que conocer en Cataluña, a fondo: cómo reconocerlas, cómo son, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

● 47 COMESTIBLES ● 24 TÓXICAS ● 9 MORTALES

**Ante la duda, no la recolecte.**

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

# Las 12 reglas

*No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.*

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.** Conocer una especie significa saber reconocer todos sus rasgos decisivos y todas las especies peligrosas con las que se confunde.

2. **Extraiga el ejemplar entero.** La base del pie (volva, bulbo, micelio) es imprescindible para descartar amanitas mortales.

3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.** En un mismo corro pueden crecer mezcladas una comestible y una tóxica (por ejemplo, el cama-sec y los clitocibes blancos).

4. **No mezcle especies en la cesta** y lleve las dudosas aparte, envueltas en papel.

5. **Deseche los ejemplares viejos, agusanados, empapados, helados o muy jóvenes.** Los viejos se descomponen y pueden causar intoxicaciones aunque la especie sea comestible; los botones muy jóvenes aún no muestran los rasgos de identificación.

6. **Use una cesta rígida y ventilada**, nunca bolsas de plástico, que aceleran la descomposición.

7. **No crea en pruebas caseras.** El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.

8. **Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas.** Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.

9. **Ante cualquier duda, consulte a un micólogo** (sociedades micológicas y sus exposiciones), con el ejemplar entero y fresco, nunca solo con una foto.

10. **Cocine siempre las setas.** Muchas comestibles son tóxicas en crudo o poco hechas: colmenillas, pie azul, armilaria, amanita vinosa, mataparents.

11. **Guarde un ejemplar crudo** de cada especie en la nevera hasta el día siguiente: si alguien se encuentra mal, servirá para identificarla.

12. **Evite lugares contaminados**: cunetas de carreteras, zonas industriales, vertederos, campos tratados.

**Para montarlo:** imprime a doble cara volteando por el **borde corto**, a tamaño real; ordena las hojas por su número pequeño (un montón con las A y otro con las B), dobla cada montón por la mitad y grapa por el pliegue.



TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Boleto de Satanás

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs

*Tóxico: intoxicaciones gastrointestinales intensas, incluso cocinado.*

Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.

Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.

De cerca: poros rojo anaranjado.

E F M A M J **J A S O** N D · Tubos · Sin anillo · Sin volva · 100–1300 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

CÓMO ES

**SOMBRERO** 8–25 cm, convexo, macizo; blanquecino, gris ceniza a gris oliváceo, a veces rosado en el margen.
**DEBAJO** Tubos amarillos; poros rojos a rojo anaranjados que azulean al tocarlos.
**PIE** Muy grueso y bulboso, amarillo arriba, rojo carmín en la zona media y con retículo rojo.
**CARNE** Blanquecina amarillenta, que azulea débil y lentamente.
**OLOR** Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (A VECES INTENSO)** Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal; puede requerir atención hospitalaria por deshidratación.

**DÓNDE** Con roble pubescente, encina, castaño y haya. Bosques claros y cálidos de planifolios.

SE CONFUNDE CON

**Boleto reticulado** (cep d'estiu · *Boletus reticulatus*) COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea. → p.10

**COMPRUEBE** Poros y corte.

NO COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

# Cualbra morada

*Russula torulosa* · escaldabec vinós

*No comestible por su sabor muy picante; la SCM la sitúa entre las especies «a refusar».*

Sombrero púrpura oscuro y pie teñido de púrpura, bajo pinos.

Debajo: láminas crema y pie rosa púrpura.

De lado: pie teñido de púrpura.

E F M A M J J A S **O N D** · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1600 m de altitud

## RASGOS DE ALARMA

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.
! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.
! Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

**SABOR** Muy picante (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

**DÓNDE** Con pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero. Pinares mediterráneos y de montaña media.

## SE CONFUNDE CON

**Níscalo de sangre** (rovelló · *Lactarius sanguifluus*) COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que verdean y pie hueco con hoyuelos. → p. 4

**Carbonera** (llora · *Russula cyanoxantha*) COMESTIBLE La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas, sabor suave y crece bajo planifolios. → p. 6

**Escaldabec de pineda** (*Russula sanguinea*) NO COMESTIBLE Sombrero rojo sangre o rosado, sin tonos púrpura oscuro; láminas algo decurrentes.

**COMPRUEBE** Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.





# Cómo mirar una seta

*Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.*




1 **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.
2 **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.
3 **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?
4 **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?
5 **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?
6 **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

## QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO

**Láminas**
Hojas finas, como un libro

**Tubos**
Una esponja de agujeritos

**Pliegues**
Venas gruesas, no hojas

**Aguijones**
Púas blandas

**Interior**
Una bola: córtela

## LA EDAD CUENTA

*Una comestible vieja o pasada también intoxica. Cójala joven y firme. (Níscalo de sangre)*

✓ Joven

✓ En su punto

✕ Viejo

✕ Pasado

**Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE**

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

*rebollón · mízcalo*

# Níscalos

*Lactarius sanguifluus* y *L. deliciosus* · rovelló, pinetell

*Casi iguales y los dos comestibles excelentes. Lo que los separa es el color del látex al cortarlos.*

De sangre: naranja vinoso, con pocas zonas.

Níscalo: zonas bien marcadas.

Níscalo: láminas naranja vivo.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2100 m de altitud

| | Níscalo de sangre | Níscalo |
|---|---|---|
| LÁTEX | Rojo vino desde el primer momento | Naranja zanahoria; no pasa a vino |
| LÁMINAS | Rosa vinoso o lila | Naranja vivo |
| DÓNDE | Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media | Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías |

**LOS DOS**

✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
✓ Siempre bajo pinos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Paxilo** (paxil·le tòxic · *Paxillus involutus*) MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne. → p. 61

**Enganyapastors de llet groga** (*Lactarius chrysorrheus*) TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 39

**Enganyapastors** (*Lactarius zonarius*) TÓXICA Látex blanco inmutable y muy picante; láminas crema; no verdea; bajo planifolios. → p. 40

**COMPRUEBE** Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.



TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Falso níscalo

*Lactarius torminosus* · cabra de beç · lleterol de beç

*Tóxica (gastrointestinal). En algunos países del norte se consume tras tratamientos prolongados: esa práctica no la hace segura.*

Bolet de cabra: sombrero rosado salmón con el margen peludo.

Debajo

El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

E F M A M J J **A S O** N D Láminas Sin anillo Sin volva 500–1900 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
! Látex blanco que no cambia.
! Siempre bajo abedules.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 4–10 cm, deprimido; rosa salmón con zonas; margen enrollado cubierto de pelos largos.
**DEBAJO** Láminas apretadas, crema rosado.
**PIE** Pálido, hueco.
**ESPORADA** Crema.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.
**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

**DÓNDE** Con abedul. Abedulares y bosques con abedul.

**SE CONFUNDE CON**

**Níscalo** (pinetell · *Lactarius deliciosus*) COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo pinos. → p. 4

**Pinetell d'avet** (*Lactarius salmonicolor*) COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos. → p. 5

**COMPRUEBE** Margen y látex.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Enganyapastors

*Lactarius zonarius* · enganyapastors d'alzina

*Tóxica (gastrointestinal) y muy picante. Su sombrero zonado recuerda al del pinetell, de ahí «enganyapastors» (engañapastores).*

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1300 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Látex blanco que no cambia de color.
! Láminas crema, sin manchas verdes.
! Bajo robles y encinas, no bajo pinos.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 5–12 cm, deprimido; crema ocráceo a naranja pálido con zonas concéntricas; margen enrollado, algo viscoso.

**DEBAJO** Láminas apretadas, crema.

**PIE** Corto y grueso, pálido, a veces con escrobículas.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y quejigo. Encinares y robledales, a menudo sobre caliza.

**SE CONFUNDE CON**

**Níscalo** (pinetell · *Lactarius deliciosus*) COMESTIBLE Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos. → p. 4

**Níscalo de sangre** (rovelló · *Lactarius sanguifluus*) COMESTIBLE Látex rojo vino; bajo pinos. → p. 4

**COMPRUEBE** Látex.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

## *Lactarius semisanguifluus*

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva
300–1700 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Látex naranja al cortar que se vuelve rojo vinoso en 5–10 minutos.
✓ Láminas naranja, que verdean.
✓ Pie hueco con escrobículas.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y carrasco. Pinares, a menudo sobre suelos calcáreos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Enganyapastors de llet groga** (*Lactarius chrysorrheus*) TÓXICA Látex blanco que amarillea en segundos; sin verdeo; bajo planifolios. → p. 39

**Níscalo** (pinetell · *Lactarius deliciosus*) COMESTIBLE En el pinetell el látex sigue naranja durante bastante más tiempo. → p. 4

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

## Pinetell d'avet

*Lactarius salmonicolor*

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva
900–1900 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Crece exclusivamente bajo abetos (Abies alba).
✓ Látex naranja que no vira a rojo vino.
✓ Pie con escrobículas, hueco.

**DÓNDE** Con abeto blanco. Abetales puros o mixtos con haya y pino silvestre.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Falso níscalo** (cabra de beç · *Lactarius torminosus*) TÓXICA Margen lanoso, látex blanco; bajo abedul. → p. 41

**Níscalo** (pinetell · *Lactarius deliciosus*) COMESTIBLE Bajo pinos y con manchas verdes abundantes. → p. 4

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Carbonera

*Russula cyanoxantha* · llora · llora morada

*Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).*

Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.

Carbonera (R. cyanoxantha)

E F M A M **J J A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 50–1700 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).

✓ Sin anillo ni volva.

✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 5–15 cm, convexo y luego deprimido; violeta, púrpura, azul grisáceo, verde oliva, a menudo mezclados en el mismo ejemplar; liso, brillante y algo viscoso con humedad.

**DEBAJO** Láminas apretadas, blancas, flexibles y lardáceas (grasas al tacto).

**PIE** 5–10 × 1,5–3 cm, blanco, a veces teñido de violeta, firme.

**DÓNDE** Con haya, castaño, encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Oronja verde** (farinera borda · *Amanita phalloides*) MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 62

***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.

**Cualbra morada** (*Russula torulosa*) NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante. → p. 42

**COMPRUEBE** Base del pie (desentiérrela) y anillo.



TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Enganyapastors de llet groga

*Lactarius chrysorrheus* · pinetell bord

*Tóxica: provoca trastornos gastrointestinales.*

Enganyapastors (L. zonarius): tiene zonas como el rovelló, pero látex blanco.

Láminas crema, sin manchas verdes.



Pinetell bord

E F M A M J J A **S O N D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1300 m de altitud

### RASGOS DE ALARMA

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.

! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.

! No se mancha de verde.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 4–8 cm, convexo y después deprimido; ocre salmón pálido con manchas o zonas concéntricas más oscuras.

**DEBAJO** Láminas apretadas, crema a rosado pálido.

**PIE** 3–6 × 1–1,5 cm, pálido, hueco.

**CARNE** Blanquecina, que amarillea con el látex.

**SABOR** Picante y amargo (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, en general de evolución favorable.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bosques de Quercus y castañares, también mezclados con pinos.

### SE CONFUNDE CON

**Níscalo de sangre** (rovelló · *Lactarius sanguifluus*) COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos. → p. 4

**COMPRUEBE** Látex.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA

## Colmenilla negra

*Morchella elata* · múrgola

E F M A M J J A S O N D — Alvéolos — Sin anillo — Sin volva

300–2000 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero cónico con costillas longitudinales oscuras, más oscuras que los alvéolos.

✓ Completamente hueca en una sola cavidad (córtela).

✓ Sombrero unido al pie por su borde.

**DÓNDE** Con abeto blanco y pino silvestre. **En prados.**

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Falsa colmenilla** (bolet de greix · *Gyromitra esculenta*) MORTAL Sombrero cerebriforme y varias cavidades internas. → p. 69

**Colmenilla** (múrgola · *Morchella esculenta*) CONDICIONADA Costillas claras, alvéolos irregulares. → p. 37

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

## Trufa negra

*Tuber melanosporum* · tòfona negra

E F M A M J J A S O N D — Tubérculo — Sin anillo — Sin volva

300–1300 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Hongo subterráneo en forma de tubérculo de 2–8 cm.

✓ Piel negra con pequeñas verrugas piramidales.

✓ Interior negro violáceo con finas venas blancas al madurar.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y quejigo y otros. En los «quemados»: círculos de suelo casi sin hierba alrededor de árboles productores.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Pota de cavall groga** (*Scleroderma citrinum*) TÓXICA Superficial, piel amarilla gruesa, olor desagradable. → p. 45

**Trufa de invierno** (magenca · *Tuber brumale*) COMESTIBLE Interior gris con venas blancas más gruesas y espaciadas; olor diferente.



COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*barba de cabra*

## Seta coliflor

*Sparassis crispa* · peu de rata de pi · greixa

*Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.*

Una bola como una coliflor, al pie de un pino.

De cerca

Crema pálido, entre la pinaza.

E F M A M J J A S O N D — Ramificado — Sin anillo — Sin volva — 100–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.

✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.

✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** Sin sombrero: masa de lóbulos laminares ondulados, crema a amarillo ocre.

**DEBAJO** Himenio liso sobre los lóbulos.

**PIE** Base gruesa común, enraizada.

**CARNE** Blanca, elástica, olor agradable.

**ESPORADA** Blanca a crema.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y rodeno. **Sobre madera.** Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Peu de rata bord** (*Ramaria formosa*) TÓXICA Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios. → p. 46

**Coliflor rosa** (peu de rata col-i-flor · *Ramaria botrytis*) CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

**COMPRUEBE** Forma de las ramas.



COMESTIBLES

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*hongo blanco*

# Boleto

*Boletus edulis* · cep · sureny

***Deseche los ejemplares viejos, blandos o con los tubos verdes y esponjosos, que se degradan con rapidez.***

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.

Jóvenes, redondos como tapones de corcho

Ceps recolectados en la cesta de mimbre.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva — 600–2000 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.

✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).

✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 8–25 cm, hemisférico y luego convexo; pardo claro a castaño, con el borde a menudo blanquecino; liso, algo viscoso con humedad.

**DEBAJO** Tubos blancos, luego amarillo verdosos; poros pequeños y redondos del mismo color; se separan fácilmente de la carne.

**SABOR** Suave, a avellana.

**DÓNDE** Con haya, castaño, roble albar, pino silvestre y abeto blanco y otros. Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Boleto de Satanás** (matagent · *Rubroboletus satanas*) TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente. → p. 43

**Boleto amargo** (molleric amarg · *Tylopilus felleus*) NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.

**Pie rojo amargo** (mataparent amarg · *Caloboletus calopus*) NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

**COMPRUEBE** Poros y pie.



CONDICIONADA ●●○ MEDIA

*cagarria*

# Colmenilla

*Morchella esculenta* · múrgola · rabassola

***Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.***

E F **M** **A** **M** J J A S O N D — Alvéolos — Sin anillo — Sin volva — 0–1600 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.

✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.

✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 4–10 cm de alto, ovoide o redondeado; amarillo pálido a ocre o gris, con alvéolos irregulares.

**DEBAJO** El interior de los alvéolos.

**PIE** Blanco a crema, granuloso, hueco, a menudo ensanchado en la base.

**CARNE** Delgada, cerosa, frágil.

**DÓNDE** **En prados.** Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Falsa colmenilla** (bolet de greix · *Gyromitra esculenta*) MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. → p. 69

***Verpa bohemica*** TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.

**Colmenilla negra** (múrgola · *Morchella elata*) CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica. → p. 38

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.



COMESTIBLES

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Seta de chopo

*Cyclocybe cylindracea* · pollancró

*Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).*

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1200 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
- ✓ Anillo membranoso en el pie.
- ✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
- ✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 4–10 cm, convexo; crema, ante o pardo claro, centro oscuro, a menudo agrietado.

**DEBAJO** Láminas apretadas, crema → pardo tabaco.

**PIE** Blanco, fibroso, con anillo membranoso.

**ESPORADA** Pardo tabaco.

**DÓNDE** Con chopo negro y álamo blanco. **En prados y sobre madera.** Riberas, choperas y parques.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Galerina marginada** (*Galerina marginata*) MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos. → p. 66

**Bolet de pi** (*Hypholoma fasciculare*) TÓXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo. → p. 58

**COMPRUEBE** Tamaño y árbol.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Gorro verde

*Russula virescens* · llora verda

E F M A M **J** **J** **A** **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

50–1500 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Cutícula verde agrietada en pequeñas placas (aspecto de mosaico o de piel de lagarto), seca y mate.
- ✓ Láminas blancas o crema; sin anillo y SIN volva: desentierre la base completa para comprobarlo.
- ✓ Carne blanca, firme, quebradiza como la tiza.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Bordes de caminos y claros de robledales, castañares y alcornocales, a menudo en suelo con poca hojarasca.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Oronja verde** (farinera borda · *Amanita phalloides*) MORTAL La farinera borda tiene anillo en el pie y una volva membranosa en la base, a menudo enterrada; su sombrero es liso, satinado, con fibras radiales, no agrietado en… → p. 62

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Boleto negro

*Boletus aereus* · sureny fosc

E F M A M **J** **J** **A** **S** **O** **N** D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

50–1200 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Sombrero pardo muy oscuro, casi negro, seco y aterciopelado, a veces con tonos bronce.
- ✓ Poros blancos y luego amarillo verdosos; carne blanca inmutable.
- ✓ Pie robusto, pardo, con retículo pardo.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Boleto de Satanás** (matagent · *Rubroboletus satanas*) TÓXICA Sombrero blanquecino, poros rojos, pie con retículo rojo. → p. 43

**Pie rojo** (mataparent de cama roja · *Neoboletus erythropus*) CONDICIONADA Poros rojos y carne amarilla que azulea al instante.



COMESTIBLES

Sombrero granate y pie grueso blanquecino.

Sombrero pardo rojizo, aterciopelado.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

## Boleto pinícola

*Boletus pinophilus* · cep rogenc

E F M A **M** **J** A **S** **O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

800–2100 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero pardo rojizo, granate o caoba.
✓ Poros blancos, luego amarillo verdosos; carne blanca inmutable.
✓ Pie robusto, teñido de pardo rojizo, con retículo.

**DÓNDE** Con pino silvestre, negro y haya y otros. Claros y bordes de pinares de montaña, entre arándanos y brezos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Pie rojo** (mataparent de cama roja · *Neoboletus erythropus*) CONDICIONADA Poros rojos; carne amarilla que azulea al instante.

**Boleto** (cep · *Boletus edulis*) COMESTIBLE Sombrero pardo claro; pie blanquecino. → p. 8

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

## Boleto reticulado

*Boletus reticulatus* · cep d'estiu

E F M A M **J** **J** **A** **S** O N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

100–1500 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero pardo claro, seco, finamente aterciopelado, que se agrieta en tiempo seco.
✓ Retículo marcado que recorre el pie hasta casi la base.
✓ Poros blancos, después amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

**DÓNDE** Con roble pubescente, albar y castaño y otros. Bordes soleados de robledales y castañares, claros con hierba.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Boleto de Satanás** (matagent · *Rubroboletus satanas*) TÓXICA Poros rojos y pie rojo. → p. 43

**Boleto amargo** (molleric amarg · *Tylopilus felleus*) NO COMESTIBLE Poros rosados y retículo oscuro; sabor muy amargo.

Orellanas jóvenes saliendo de la corteza.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Seta de ostra

*Pleurotus ostreatus* · orellana

E F M A M J J A S **O** **N** **D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva

0–1500 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Repisas en grupos superpuestos sobre madera de planifolios (chopos, hayas, robles).
✓ Láminas blancas, decurrentes, que llegan hasta un pie lateral corto o inexistente.
✓ Sombrero en forma de concha, gris azulado a pardo.

**DÓNDE** Con chopo negro y haya. **En prados y sobre madera.**

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Pleurocybella porrigens*** TÓXICA Blanca pura, delgada, sobre madera de coníferas.

**Seta de olivo** (gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*) TÓXICA Naranja intenso. → p. 55

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

## Molinera

*Clitopilus prunulus* · moixernó blanc de tardor

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

100–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas decurrentes que pasan de blancas a ROSADAS al madurar.
✓ Esporada rosada (déjela sobre papel unas horas): si es blanca, deséchela.
✓ Olor intenso a harina fresca.

**OLOR** A harina fresca, intenso.

**DÓNDE** Con castaño, roble pubescente y pino silvestre.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Clitocibe blanc** (*Clitocybe rivulosa*) TÓXICA Láminas que siguen blancas o crema, esporada blanca, sin olor a harina intenso; en prados. → p. 54

***Clitocybe phyllophila*** TÓXICA Esporada blanca rosada pálida, sombrero con pruina blanca; olor débil, no harinoso.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Seta de cardo

*Pleurotus eryngii* · gírgola de panical

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y láminas que bajan por el pie.

Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.

Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1200 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.
✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 3–10 cm, convexo y luego deprimido, a menudo excéntrico; pardo grisáceo a pardo, liso o finamente escamoso.

**DEBAJO** Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

**PIE** Corto, blanco, central o excéntrico.

**CARNE** Blanca, firme.

**ESPORADA** Blanca.

**DÓNDE** **En prados.** Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Clitocibe blanc** (*Clitocybe rivulosa*) TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 54

**Fals carlet** (*Entoloma sinuatum*) TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 57

**COMPRUEBE** Color y base.



COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Boleto granulado

*Suillus granulatus* · molleric · molleric granellut

*Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).*

En su punto: sombrero pardo brillante, pie amarillento, en grupo bajo pinos.

Poros amarillos con gotitas blancas

Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

E F M A **M** **J** **J** A **S** **O** **N** **D** Tubos Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 4–10 cm, convexo; amarillo anaranjado, pardo naranja o pardo castaño; muy viscoso con humedad, brillante en seco.

**DEBAJO** Tubos y poros amarillos, que en jóvenes exudan gotas blanquecinas.

**PIE** 4–8 × 1–2 cm, cilíndrico, amarillo pálido, con granulaciones que oscurecen; sin anillo.

**DÓNDE** Con pino carrasco, silvestre, laricio, piñonero y rodeno. Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Boleto picante** (molleric pebrer · *Chalciporus piperatus*) NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.

**Molleric de bou** (*Suillus bovinus*) SIN INTERÉS Poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes; sin granulaciones.

**Molleric** (*Suillus collinitus*) COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.

**COMPRUEBE** Color de los poros.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Cama de perdiu

*Chroogomphus rutilus* · pota de perdiu

*Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.*

En su punto: sombrero rojizo y láminas ocre que bajan por el pie.

Debajo


Carne y pie de color naranja salmón.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
✓ Bajo pinos.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 3–10 cm, cónico convexo y después plano con mamelón; ocre cobrizo a pardo vinoso, viscoso con humedad y brillante en seco.

**DEBAJO** Láminas espaciadas, gruesas, decurrentes; ocre y luego púrpura negruzco por las esporas.

**PIE** 5–12 cm, estrechado hacia la base, ocre anaranjado con fibrillas; restos de cortina en la parte alta de jóvenes.

**CARNE** Ocre salmón, amarillo anaranjada en la base del pie; vinosa al cocinarla.

**DÓNDE** Con pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero. Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** (*Cortinarius orellanus*) MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 68

**Falso rebozuelo** (fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*) NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca. → p. 44

**COMPRUEBE** Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.



COMESTIBLE ●●○ MEDIA *carrerilla*

# Senderuela

*Marasmius oreades* · cama-sec · carrereta

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.*

En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.

La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.

Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

E F M **A M J** J A **S O N** D Láminas Sin anillo Sin volva 0–2200 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 2–5 cm, acampanado y luego plano con mamelón; ocre a ante, más claro en seco.

**DEBAJO** Láminas libres o escotadas, muy espaciadas, crema.

**PIE** 4–8 × 0,2–0,5 cm, del color del sombrero, correoso y elástico.

**OLOR** Débil, a almendra amarga.

**DÓNDE** **En prados.** Corros de hierba más verde o más seca en prados.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Lepiota metzinosa** (*Lepiota brunneoincarnata*) MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 65

**Clitocibe blanc** (*Clitocybe rivulosa*) TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 54

***Inocybe* (especies de prado)** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

**COMPRUEBE** Sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Carlet

*Hygrophorus russula*

*Puede amargar ligeramente.*

En su punto: sombreros rosados con salpicaduras vinosas, firmes.

Debajo

Láminas algo decurrentes y pie blanco manchado.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1300 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.
✓ Bajo encinas y robles.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 5–15 cm, carnoso, convexo; rosa vinoso, manchado de púrpura, algo viscoso con humedad.
**DEBAJO** Láminas céreas, blancas que se manchan de rosa vinoso, adnatas o algo decurrentes.
**PIE** Robusto, blanco con manchas vinosas.
**CARNE** Blanca, firme, rosada bajo la cutícula.
**ESPORADA** Blanca.
**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y quejigo. Hojarasca de encinares calizos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Fals carlet** (*Entoloma sinuatum*) TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia. → p. 57

**Cualbra morada** (*Russula torulosa*) NO COMESTIBLE Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos. → p. 42

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas maduras.





COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *cabrito*

# Rebozuelo

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

*subpruinosus).*

En su punto: todo amarillo yema, carnoso, con el margen ondulado.

Debajo

De cerca

E F M A M **J J A S O N** D Pliegues Sin anillo Sin volva 50–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 3–10 cm, convexo y luego en embudo, margen ondulado y lobulado; amarillo yema a amarillo anaranjado, liso.
**DEBAJO** Pliegues gruesos, espaciados, bifurcados, muy decurrentes, del mismo color que el sombrero.
**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.
**DÓNDE** Con encina, alcornoque, castaño, haya y roble albar y otros. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** (*Cortinarius orellanus*) MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 68

**Seta de olivo** (gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*) TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 55

**Falso rebozuelo** (fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*) NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda. → p. 44

**COMPRUEBE** Parte inferior.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*trompeta negra*

# Trompeta de los muertos

*Craterellus cornucopioides* · trompeta de la mort · trompeta

*Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto: negras, firmes y en grupo.

Mire por dentro

Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

E F M A M J J A S O N D · Liso · Sin anillo · Sin volva · 100–1600 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.
✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).
✓ Carne delgada y elástica.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** Trompeta de 4–12 cm de alto y 2–8 cm de boca; interior pardo negruzco, finamente escamoso; margen ondulado y vuelto hacia fuera.

**DEBAJO** Cara externa lisa o con arrugas muy bajas, gris ceniza a gris violáceo.

**PIE** No diferenciado: la trompeta se estrecha hasta la base hueca.

**CARNE** Delgada, elástica, negruzca.

**ESPORADA** Blanca.

**DÓNDE** Con haya, encina, castaño, roble pubescente y albar. Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Orella de gat negra** (*Helvella lacunosa*) CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

***Craterellus cinereus*** COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

**COMPRUEBE** Forma general.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Platera

*Infundibulicybe geotropa* · pampa

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva

0–1600 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero crema ocráceo en embudo con un mamelón central marcado.
✓ Láminas decurrentes, apretadas, crema.
✓ Pie alto, grueso y fibroso, del color del sombrero.

**DÓNDE** **En prados.** Claros y bordes herbosos: los corros se ven a distancia.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Paxilo** (paxil·le tòxic · *Paxillus involutus*) MORTAL Se mancha de pardo y las láminas son ocre amarillentas. → p. 61

**Pardilla** (*Clitocybe nebularis*) TÓXICA Sombrero gris ceniza sin mamelón y olor dulzón fuerte.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Llenega blanca

*Hygrophorus gliocyclus*

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Con anillo · Sin volva

200–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero blanco crema a amarillento pálido, muy viscoso.
✓ Láminas crema, céreas, espaciadas, decurrentes.
✓ Pie con un anillo mucoso y la parte inferior viscosa.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y carrasco. Pinares calizos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Mocosa blanca tacada** (*Hygrophorus chrysodon*) SIN INTERÉS Gránulos dorados en el margen y el pie; poco viscoso.

**Babosa negra** (llenega negra · *Hygrophorus latitabundus*) COMESTIBLE Sombrero oscuro. → p. 30

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Babosa negra

*Hygrophorus latitabundus* · llenega negra · llenega

*latitabundus o H. limacinus). Retire el mucílago al limpiarla.*

En su punto: sombrero pardo oliva, brillante y viscoso.

Láminas blancas y pie blanco con puntitos.

Joven

E F M A M J J A S **O N D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 100–1500 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.
✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.
✓ Esporada blanca.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 5–12 cm, convexo con un mamelón ancho; pardo oliváceo oscuro a negruzco, muy viscoso.

**DEBAJO** Láminas espaciadas, gruesas, céreas, blancas, algo decurrentes.

**PIE** 6–12 × 1,5–2,5 cm, blanco en la parte alta, con la parte inferior cubierta de mucílago grisáceo y una zona anular.

**CARNE** Blanca, firme.

**DÓNDE** Con pino carrasco, laricio y silvestre. Pinaza de pinares calizos; los sombreros viscosos quedan cubiertos de agujas pegadas.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Llenega borda** (*Cortinarius trivialis*) NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.

**Cama de perdiu mucosa** (*Gomphidius glutinosus*) COMESTIBLE Láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo intenso.

**COMPRUEBE** Color de las láminas maduras y esporada.





COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*trompeta amarilla*

# Angula de monte

*Craterellus lutescens* · camagroc · rossinyol de pi

*Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).*

En su punto: pies amarillos y sombreros pardos, en grupo entre el musgo.

Debajo no hay láminas

Pie amarillo y hueco.

E F M A M J J A S **O N D** — Liso — Sin anillo — Sin volva — 300–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 2–6 cm, en embudo perforado hasta el pie, margen ondulado; pardo oscuro con tonos anaranjados.

**DEBAJO** Casi liso o con venas bajas, rosado anaranjado a amarillo.

**PIE** 3–8 cm, hueco, amarillo anaranjado vivo.

**CARNE** Delgada, elástica.

**ESPORADA** Blanca a crema.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y abeto blanco. Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

**CUÁNDO** De las últimas especies de la temporada; aguanta hasta las primeras heladas.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Falso rebozuelo** (fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*) NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo. → p. 44

**Camagroc** (*Craterellus tubaeformis*) COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado. → p. 16

**COMPRUEBE** Parte inferior y pie.

Molleric calçat (S. luteus)

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Boleto anillado

*Suillus luteus* · molleric calçat

E F M A M J J A S O N D — Tubos — Con anillo — Sin volva

400–2000 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Anillo membranoso amplio en el pie, blanquecino o violáceo por debajo.

✓ Sombrero pardo chocolate muy viscoso.

✓ Poros pequeños, amarillos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y negro. Bordes de pista y claros herbosos en pinares jóvenes.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Boleto granulado** (molleric · *Suillus granulatus*)
COMESTIBLE Sin anillo. → p. 11

***Suillus grevillei*** COMESTIBLE Sombrero amarillo anaranjado; exclusivo de alerces (plantados).

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Camagroc

*Craterellus tubaeformis*

E F M A M J J A S O N D — Pliegues — Sin anillo — Sin volva

600–1900 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Pie hueco, amarillo pardusco o grisáceo.

✓ Pliegues bien marcados, bifurcados, gris amarillentos a gris lila.

✓ Sombrero en embudo pardo.

**DÓNDE** Con abeto blanco, pino silvestre y haya. **Sobre madera.** Bosques húmedos de montaña sobre suelo ácido, entre musgo y madera muy descompuesta.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Angula de monte** (camagroc · *Craterellus lutescens*)
COMESTIBLE Parte inferior casi lisa y rosado anaranjada; pie naranja vivo. → p. 15





COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*seta de San Jorge*

# Perrechico

*Calocybe gambosa* · moixernó · bolet de Sant Jordi

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 400–2000 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.

✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.

✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.

✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 5–15 cm, carnoso, convexo e irregular; blanco a crema o ante pálido; margen enrollado.

**DEBAJO** Láminas muy apretadas, estrechas, blancas a crema, escotadas.

**PIE** Robusto, blanco, macizo.

**OLOR** Intenso a harina fresca.

**DÓNDE** **En prados.** Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Inosperma erubescens*** MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 67

**Cogomassa** (*Amanita verna*) MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 63

**Fals carlet** (*Entoloma sinuatum*) TÓXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 57

**COMPRUEBE** Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Pie azul

*Lepista nuda* · pimpinella morada

***Comestible, siempre bien cocinado: en crudo o poco hecho provoca trastornos digestivos (parte A del anexo del RD 30/2009).***

En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.

Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.

De cerca: láminas y pie violetas.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
✓ Sin cortina ni anillo.
✓ Olor afrutado o perfumado.

**OLOR** Afrutado, perfumado.

**DÓNDE** **En prados.** Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus…)*** TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.

**Barret de bruixa** (*Inocybe geophylla*) TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas. → p. 59

***Mycena pura*** TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano. → p. 56

**COMPRUEBE** Esporada y parte alta del pie.



COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *gamuza*

# Lengua de vaca

*Hydnum repandum* · llengua de bou · llémena

***Los ejemplares viejos amargan.***

En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.

Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.

Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 4–15 cm, irregular, carnoso; crema, ante o naranja pálido, liso y mate.
**DEBAJO** Aguijones de 3–8 mm, blandos y frágiles, crema anaranjados, algo decurrentes.
**PIE** 3–7 × 1,5–3 cm, blanco, macizo, a menudo excéntrico.
**CARNE** Blanca, quebradiza, que amarillea al tacto.
**ESPORADA** Blanca.
**SABOR** Suave; amargo en ejemplares viejos.

**DÓNDE** Con encina, haya, castaño, pino silvestre y abeto blanco y otros. Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Hydnellum / Sarcodon*** NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.

**Picornell de pi** (*Hydnum rufescens*) COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie. → p. 18

**COMPRUEBE** Consistencia de la carne.



COMESTIBLES

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Picornell de pi

*Hydnum rufescens*

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva

0–1700 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Aguijones bajo el sombrero, que no descienden por el pie.

✓ Sombrero naranja rojizo, más pequeño que el de la llengua de bou.

✓ Pie central y esbelto.

**DÓNDE** Con pino silvestre, carrasco y encina. Pinares y bosques mixtos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Lengua de vaca** (llengua de bou · *Hydnum repandum*) COMESTIBLE Más grande y pálido, aguijones algo decurrentes. → p. 17

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Hígado de buey

*Fistulina hepatica* · fetge de vaca

E F M A M J J **A S O N** D Tubos Sin anillo Sin volva

100–1300 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Repisa en forma de lengua o hígado, rojo sangre, sobre troncos de robles o castaños.

✓ Por debajo, tubos crema que se separan unos de otros.

✓ Carne roja jaspeada como la carne cruda, que suelta jugo rojizo.

**DÓNDE** Con castaño, roble pubescente y albar. **Sobre madera.** Troncos y base de castaños y robles viejos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Gírgola groga** (*Laetiporus sulphureus*) CONDICIONADA Amarillo anaranjado, en grupos superpuestos.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Pet de llop gros

*Bovistella utriformis*

E F M A **M J J A S O** N D Interior Sin anillo Sin volva

500–2400 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Cuerpo en forma de peonza (6–15 cm), con la piel dividida en placas o verrugas piramidales.

✓ Interior blanco y compacto en los jóvenes; base estéril esponjosa.

**DÓNDE** **En prados.** Pastos de montaña y prados secos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Pota de cavall groga** (*Scleroderma citrinum*) TÓXICA Interior negro. → p. 45

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

## Capuchina

*Tricholoma portentosum* · fredolic gros

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

300–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero gris oscuro con fibras radiales negras, a menudo con tonos violáceos o amarillentos, algo viscoso.

✓ Láminas blancas con reflejos amarillo limón, escotadas.

✓ Pie blanco con tonos amarillentos; sin anillo.

**OLOR** A harina.

**DÓNDE** Con pino silvestre, rodeno y laricio.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Fredolic metzinós** (*Tricholoma pardinum*) TÓXICA Sombrero con escamas oscuras sobre fondo claro, no fibras radiales lisas. → p. 53

***Tricholoma virgatum* / *T. sciodes*** TÓXICA Sabor amargo o picante, mamelón agudo, sin tonos amarillos en láminas.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

*ratón*

# Negrilla

*Tricholoma terreum* · fredolic · negret

*) con material italiano no encontró esos compuestos y concluye que debe considerarse comestible.*

En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.

Debajo

Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.
✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

**OLOR** Débil, no harinoso.

**DÓNDE** Con pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero. Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Fredolic metzinós** (*Tricholoma pardinum*) TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas como un dibujo de tigre; olor a harina; láminas con reflejos verde amarillentos. → p. 53

***Tricholoma virgatum / T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo; carne amarga o picante; láminas con arista punteada de negro en T.

***Inocybe (varias especies grises)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada parda), olor espermático o terroso.

**COMPRUEBE** Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.



COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*amanita de los césares*

# Oronja

*Amanita caesarea* · ou de reig · reig

*Comestible excelente. Los «huevos» cerrados no deben recolectarse: en ese estado se confunden con los de la farinera borda y otras amanitas mortales.*

En su punto: sombrero naranja, pie amarillo y volva blanca.

Láminas y pie AMARILLOS; volva blanca en saco.

Joven: sale de un huevo blanco.

E F M A M J J **A S O** N D Láminas Con anillo **Con volva** 50–1100 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 8–20 cm, primero hemisférico y después plano; naranja rojizo a naranja amarillento, liso, brillante, margen estriado; a veces con un trozo grande de volva blanca.

**DEBAJO** Láminas libres, apretadas, amarillo dorado.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Oronja verde** (farinera borda · *Amanita phalloides*) MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 62

**Matamoscas** (reig bord · *Amanita muscaria*) TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 49

***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal del huevo.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Oreja de Judas

*Auricularia auricula-judae* · orella de Judes

E F M A M J J A S O N D

Gelatinoso Sin anillo Sin volva

0–1400 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Cuerpo gelatinoso, elástico, en forma de oreja, pardo rojizo.

✓ Crece sobre ramas y troncos, sobre todo de saúco.

✓ Cara externa aterciopelada, interna lisa o con venas.

**DÓNDE** **En prados y sobre madera.** Saúcos, sauces, robles y otros planifolios, en lugares húmedos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Peziza (copas pardas en el suelo)*** TÓXICA Crecen en el suelo, son quebradizas, no elásticas.

***Exidia y otras gelatinosas*** SIN INTERÉS Formas de cerebro o costra, negras o ámbar, sin forma de oreja.

Grande, toda blanca, con una volva blanca y...

Láminas crema y pie harinoso.

CONDICIONADA ●●● DIFÍCIL

## Farinera

*Amanita ovoidea*

E F M A M J J A S O N D

Láminas Con anillo **Con volva**

0–1100 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Seta grande, enteramente blanca o crema, con restos harinosos en el margen y en el pie.

✓ Volva gruesa, membranosa, blanca con tonos ocre amarillentos.

✓ Anillo cremoso y frágil que se deshace pronto (a menudo no se ve).

**DÓNDE** Con encina, pino carrasco y roble pubescente. Bordes de camino y claros en terreno calizo.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cogomassa** (*Amanita verna*) MORTAL Más pequeña y esbelta, sin restos harinosos, anillo membranoso persistente; frecuente en primavera. → p. 63

**Oronja verde** (farinera borda · *Amanita phalloides*) MORTAL Sombrero satinado con fibras radiales; anillo membranoso persistente. → p. 62

Sombreros blancos y láminas rosa grisáceo.

Láminas rosa grisáceo; nunca blancas en un...

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

## Bola de nieve

*Agaricus arvensis* · bola de neu

E F M A M J J A S O N D

Láminas Con anillo Sin volva

0–2000 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Olor a anís o almendra amarga.

✓ Láminas gris rosadas que pasan a pardas (nunca blancas).

✓ Anillo grande y doble, con la cara inferior en forma de rueda dentada.

**OLOR** Anís.

**DÓNDE** **En prados.** Prados y bordes de bosque.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Oronja verde** (farinera borda · *Amanita phalloides*) MORTAL Láminas blancas y volva. → p. 62

**Farinera pudent** (*Amanita virosa*) MORTAL Láminas blancas y volva. → p. 64

Joven y blanco en medio del prado

Con la mano al lado: puede superar los 30 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

## Bejín gigante

*Calvatia gigantea* · pet de llop gegant

E F M A M J J A S O N D

Interior Sin anillo Sin volva

0–1500 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Bola blanca enorme (10–50 cm), de piel lisa como el cuero.

✓ Interior blanco puro, compacto y uniforme en los jóvenes (córtelo entero).

**DÓNDE** **En prados.** Prados ricos en nitrógeno, huertos, bordes de bosque y de río.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Oronja verde** (farinera borda · *Amanita phalloides*) MORTAL El huevo de amanita es mucho menor y al cortarlo muestra la silueta de una seta. → p. 62

**Pota de cavall groga** (*Scleroderma citrinum*) TÓXICA Interior negro; piel gruesa amarilla escamosa; tamaño mucho menor. → p. 45

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *bejín*

# Pedo de lobo

*Lycoperdon perlatum* · pet de llop

*Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.*

Joven, blanco y lleno de verrugas: el momento de recolectarlo.

De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden.

Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

E F M A M J J **A S O N D** · Interior · Sin anillo · Sin volva · 0–2000 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.
- ✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.
- ✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** Cuerpo en forma de pera de 3–8 cm de alto, blanco y luego pardo claro, cubierto de espinas cónicas de distintos tamaños.

**DEBAJO** Interior (gleba) blanco y firme de joven, después amarillo oliva y pulverulento.

**PIE** Base estéril estrecha (pseudopie).

**DÓNDE** **En prados.** Bosques de todo tipo y sus bordes.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Oronja verde** (farinera borda · *Amanita phalloides*) MORTAL Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie). → p. 62

**Pota de cavall groga** (*Scleroderma citrinum*) TÓXICA Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa. → p. 45

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.



COMESTIBLE ●●○ MEDIA *galamperna*

# Parasol

*Macrolepiota procera* · apagallums · cogomella

*Deseche el pie, fibroso.*

En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.

Pie con dibujo de piel de serpiente

Debajo

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Con anillo · Sin volva · 0–1800 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.
- ✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
- ✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
- ✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 10–30 cm; de joven cerrado sobre el pie como una baqueta de tambor, después plano con mamelón; escamas pardas concéntricas sobre fondo blanquecino.

**DEBAJO** Láminas libres, blancas a crema, apretadas, unidas a un collar.

**PIE** 15–40 × 1–2 cm, cilíndrico, con bulbo en la base; cubierto de bandas pardas en zigzag.

**CARNE** Blanca, blanda en el sombrero, fibrosa en el pie; inmutable.

**OLOR** Agradable, a avellana.

**DÓNDE** **En prados.** Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Lepiota metzinosa** (*Lepiota brunneoincarnata*) MORTAL Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado. → p. 65

**Amanita pantera** (pixacà · *Amanita pantherina*) TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso. → p. 48

**COMPRUEBE** Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *matacandil*

# Barbuda

*Coprinus comatus* · bolet de tinta

*Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.*

Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado: el momento de recolectarlo.

Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por...

Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

E F M A M J J A S O N D — Láminas · Con anillo · Sin volva · 0–1500 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).
✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 5–15 cm de alto, cilíndrico y después acampanado; blanco con la punta parda y escamas lanosas.
**DEBAJO** Láminas libres, muy apretadas, blancas → rosadas → negras y delicuescentes.
**PIE** 10–25 cm, blanco, hueco, con anillo móvil.
**CARNE** Blanca, delgada.
**ESPORADA** Negra.
**DÓNDE** **En prados.** Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.
**CUÁNDO** Otoño y, en menor medida, primavera; aparece pocos días después de una lluvia.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Bolet de femer** (*Coprinopsis atramentaria*) TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada. → p. 60

**Coprí garsa** (*Coprinopsis picacea*) NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

**COMPRUEBE** Color y superficie del sombrero.



COMESTIBLE ●●○ MEDIA *seta de campo*

# Champiñón silvestre

*Agaricus campestris* · camperol

*Los Agaricus acumulan metales pesados: evite los de cunetas y zonas contaminadas y no los consuma en grandes cantidades de forma habitual.*

En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.

Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un...

Gírelo siempre

E F M A M J J A S O N D — Láminas · Con anillo · Sin volva · 0–2000 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
✓ Sin volva en la base.
✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 4–10 cm, convexo, blanco, sedoso o finamente escamoso, con restos de velo en el margen.
**DEBAJO** Láminas libres, apretadas, rosa vivo → pardo chocolate.
**PIE** Corto, blanco, con anillo fino que desaparece pronto.
**DÓNDE** **En prados.** Pastos con ganado, prados de siega.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cogomassa** (*Amanita verna*) MORTAL Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 63

**Bola de neu pudent** (*Agaricus xanthodermus*) TÓXICA Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol. → p. 51

**Fals carlet** (*Entoloma sinuatum*) TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques. → p. 57

**COMPRUEBE** Láminas y base.

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

# Llame ahora

**112**

**Emergencias**
Diga que han comido setas silvestres y cuándo.

**91 562 04 20**

**Toxicología · 24 h**
Información de intoxicaciones.

## QUÉ HACER

→ **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.

→ **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.

→ **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.

→ **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.

→ **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

**Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).**

## ANÓTELO ANTES DE SALIR

**ALOJAMIENTO**

**CENTRO DE SALUD**

**SOCIEDAD MICOLÓGICA**

**DÓNDE APARQUÉ**

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.





TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Pota de cavall groga

*Scleroderma citrinum*

*Tóxica (gastrointestinal, a veces intensa).*

Bola de piel gruesa, amarillenta y escamosa.

Cortada

Interior oscuro con vetas claras.

E F M A M J J **A S O N** D ● Interior Sin anillo Sin volva 0–1200 m de altitud

### RASGOS DE ALARMA

! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** Cuerpo globoso de 3–10 cm sin pie, de piel gruesa amarillo ocre, agrietada en escamas.

**DEBAJO** Masa interna (gleba) negra violácea con venas blancas, que acaba en polvo pardo.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

**DÓNDE** Con alcornoque, encina, castaño y pino piñonero. Bosques sobre suelo ácido, bordes de camino.

### SE CONFUNDE CON

**Pedo de lobo** (pet de llop · *Lycoperdon perlatum*) COMESTIBLE El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes. → p. 24

**Bejín gigante** (pet de llop gegant · *Calvatia gigantea*) COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina. → p. 25

**Trufa negra** (tòfona negra · *Tuber melanosporum*) COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable. → p. 38

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Peu de rata bord

*Ramaria formosa*

*Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).*

Forma de coral, ramas rosa anaranjado.

Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.

Puntas de las ramas amarillentas.

E F M A M J J **A S O N** D ● Ramificado Sin anillo Sin volva 200–1600 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** Masa coraliforme de 6–20 cm, ramas rosado salmón con puntas amarillas.

**DEBAJO** Himenio liso sobre las ramas.

**PIE** Tronco común blanquecino.

**CARNE** Blanca, algo amarga.

**ESPORADA** Ocre.

**SABOR** Algo amargo (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

**DÓNDE** Con haya, roble pubescente y castaño. Bosques de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Seta coliflor** (peu de rata de pi · *Sparassis crispa*) COMESTIBLE Lóbulos aplanados crema, en pinos. →p.7

**Coliflor rosa** (peu de rata col-i-flor · *Ramaria botrytis*) CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

**COMPRUEBE** Forma.





# Fotografías

**Lepiota metzinosa** Luis Ballester (CC BY-NC), Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC), Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

**Lepiota pudent** Jacobo Krauel (CC BY-NC), santigibertbolets (CC BY-NC)

**Barbuda** Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), jorditb (CC BY-NC), Daniel Fornos Alimbau (CC BY-NC)

**Champiñón silvestre** Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC), Sarah and Fernando (CC BY-NC)

**Bola de nieve** Felipe Hidalgo (CC BY-NC), jorge-prieto (CC BY-NC), Javier Marcos Martínez (CC BY-NC)

**Bola de neu pudent** joxepo (CC BY-NC), Javier Marcos Martínez (CC BY-NC), Felipe Castilla Lattke (CC BY-NC)

**Pedo de lobo** guspiralsnuvols (CC BY-NC), victoriadurazo (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

**Bejín gigante** bargon (CC BY-NC), Ángel Argüelles (CC BY-NC), spacecadetkiddo (CC BY-NC)

**Pet de llop gros** Daniel Joaquin Aguirre Howes (CC BY-NC), piranyeta (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

**Negrilla** josep65 (CC BY-NC), Nico Hernandez (CC BY)

**Capuchina** David Marcos Vidal (CC BY-NC), jesus_lamata (CC BY-NC)

**Seta de los caballeros** Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Sean S (CC BY-NC), josep65 (CC BY-NC)

**Fredolic metzinós** Antton Meléndez (CC BY-NC), josep65 (CC BY-NC)

**Pie azul** Marc (CC BY-NC), no rights reserved (CC0), Guille Marín (CC BY-NC)

**Clitocibe blanc** Javier Marcos Martínez (CC BY-NC), Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC), julian_alonso (CC BY-NC)

**Platera** Josep Sais i Brucet (CC BY-NC), Jacobo Krauel (CC BY-NC), Roser Melero (CC BY-NC-SA)

**Perrechico** miguelayuso (CC BY-NC), Carmelo López Abad (CC BY-NC), esther69 (CC BY-NC)

**Babosa negra** jl__cc (CC BY-NC), yossarianc (CC BY-NC)

**Llenega blanca** pauoc (CC BY-NC), Luis Ballester (CC BY-NC), Francisco Valverde (CC BY-NC)

**Carlet** Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Jacobo Krauel (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

**Senderuela** Izan Lopez Vergel (CC BY-NC), Experience Matters (CC BY-NC), yossarianc (CC BY-NC)

**Seta de olivo** Juan Bertrand-Figueroa (CC BY-NC), Bernat Espigulé (CC BY-NC), Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC)

***Mycena pura*** Sean S (CC BY-NC), Hannah (CC BY-NC)

**Seta de cardo** toniconca (CC BY-NC), Nico Hernandez (CC BY), Javier Royán Martín (CC BY-NC)

**Seta de ostra** Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), Juan José de Haro (CC BY-SA)

**Fals carlet** Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Javier Marcos Martínez (CC BY-NC), Luis Ballester (CC BY-NC)

**Molinera** Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC), Cándido Sos (CC BY-NC)

**Seta de chopo** Bernat Espigulé (CC BY-NC), martaasoler (CC BY-NC)

**Bolet de pi** Josep Sais i Brucet (CC BY-NC), oriol3333 (CC BY-NC)

**Galerina marginada** Mario Vega Pérez (CC BY-NC), faluke (CC BY-NC)

***Inosperma erubescens*** Javier Marcos Martínez (CC BY-NC), Jose Castro (CC BY)

**Barret de bruixa** Cándido Sos (CC BY-NC), David Marcos Vidal (CC BY-NC), deinonyco (CC BY-NC-SA)

**Cortinari metzinós** Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Federico Calledda (CC BY-NC), ljantos (CC BY-NC)

**Bolet de femer** jonatan_antunez (CC BY-NC), diana_fuir (CC BY-NC), ferran garcia mari (CC BY-NC)

**Colmenilla** rauldelamorena (CC BY-NC), franja44 (CC BY-NC)

**Colmenilla negra** Eva Palacian (CC BY-NC), tonipons (CC BY-NC)

**Falsa colmenilla** Lídia Carrera (CC BY), M.Antònia Barros Amils (CC BY-NC), jaap_engberts (CC BY-NC)

**Trufa negra** Luis Ballester (CC BY-NC), jorgecalamocha (CC BY-NC), Charo Val (CC BY-NC)

**Árboles, parejas y otras** Thomas Pruß (CC BY-SA 3.0), no rights reserved (CC0), Quercus morisii (CC BY-NC), David Pereira (CC BY-NC), Jacobo Krauel (CC BY-NC), piranyeta (CC BY-NC), Вова Прорас (CC BY-NC), Izan Lopez Vergel (CC BY-NC), jl__cc (CC BY-NC), Alba Rovira (CC BY-NC), dbmhartley (CC0), Tom W (CC BY), Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), Daniel Espejo Fraga (CC BY-NC), Josep Gesti (CC BY-SA), kionez15 (CC BY-NC), Manolo (CC BY-NC), mmaterezaa (CC BY-NC), Arnau Comajuan (CC BY-NC), merisolano (CC BY-NC), Awinch1001 (CC0), Jugrü (Public domain), Josemiriarte (CC BY-SA 3.0), mariacazcarraperez (CC BY-NC), JMK (CC BY-SA 3.0), Quentin Groom (CC0), Agnieszka Kwiecień, Nova (CC BY-SA 4.0), Vojtěch Zavadil (CC BY-SA 3.0), ocell (CC BY-NC), Stefan.lefnaer (CC BY-SA 4.0), Jordi Bassols Garcia (CC BY-NC), Lluïsabisbe (CC BY-NC), Christian Fischer (CC BY-SA 3.0), Ayotte, Gilles, 1948- (CC BY-SA 4.0), Marc Riera (CC BY), Hladac (CC BY-SA 4.0), adriamanrique (CC BY-NC), Dietmar Rabich (CC BY-SA 4.0)

**Setas con que se confunden, sin ficha** *Lactarius vinosus*, Massimo Tabone (CC BY-NC); *Russula heterophylla*, Marco Floriani (CC BY-NC); *Russula sardonia*, Fabio Mauri (CC BY-NC); *Suillus grevillei*, Светлана Мещерягина (CC BY-NC); *Craterellus cinereus*, Davide Puddu (CC BY); *Sarcodon imbricatus*, Jerzy Opioła (CC BY-SA); *Exidia glandulosa*, Christian Schwarz (CC BY-NC); *Legaliana badia*, jacinta lluch valero (CC BY-SA); *Amanita crocea*, salvatore_bacciu_paola_mereu (CC BY-NC); *Tricholoma virgatum*, Kathie Hodge (CC BY-NC-SA); *Inocybe flocculosa*, Taye Bright (CC BY-NC); *Cortinarius violaceus*, Federico Calledda (CC BY-NC); *Entoloma clypeatum*, Federico Calledda (CC BY-NC); *Pseudosperma rimosum*, Amadej Trnkoczy (CC BY-NC-SA); *Pleurocybella porrigens*, mycowalt (CC BY-SA); *Collybia phyllophila*, pinonbistro (CC BY-NC); *Kuehneromyces mutabilis*, Dr. Hans-Günter Wagner (CC BY-SA); *Verpa bohemica*, Taye Bright (CC BY-NC)

# Fotografías

*Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público. Cada una, con su autor, su licencia y el enlace al original, en la ficha de la web.*

***Lactarius semisanguifluus*** gardatxanae (CC BY-NC), David Marcos Vidal (CC BY-NC), Quercus morisii (CC BY-NC)

**Pinetell d'avet** David Marcos Vidal (CC BY-NC), Ibai Olariaga (CC BY-NC)

**Enganyapastors de llet groga** Jacobo Krauel (CC BY-NC)

**Enganyapastors** Luis Ballester (CC BY-NC), maricel patino (CC BY-NC), Pere Pujol Font (CC BY-NC)

**Falso níscalo** Alba Rovira (CC BY-NC), josep65 (CC BY-NC), David Marcos Vidal (CC BY-NC)

**Gorro verde** Javier Martínez Fuentes (CC BY-NC), Quercus morisii (CC BY-NC)

**Carbonera** Antoni Sunyer (CC BY-NC), Cándido Sos (CC BY-NC), mussolbarrios (CC BY-NC)

**Cualbra morada** Juan Carlos Zamora (CC BY-NC), Miguel (CC BY-NC)

**Rúsula emética** noah_siegel (CC BY-NC-SA), Simon M Davies (CC BY-NC), Vladimir Bryukhov (CC BY-NC)

**Seta coliflor** Nuria Kumari (CC BY-NC), Roger Vila (CC BY-NC), Xavi (CC BY-NC)

**Boleto** Carmelo López Abad (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC), Thomas Pruß (CC BY-SA 3.0)

**Boleto negro** Quercus morisii (CC BY-NC), Cándido Sos (CC BY-NC), hherb (CC BY-NC)

**Boleto pinícola** czech_mushrooms (CC0), UNIRSE Llavi (CC BY-NC), Joan Corominas Melian (CC BY-NC)

**Boleto reticulado** BrunadelPirineu (CC BY-NC), marula (CC BY-NC)

**Boleto de Satanás** ceslal (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

**Boleto granulado** Javier A. Canteros (CC BY-NC), Sean S (CC BY-NC), Quercus morisii (CC BY-NC)

**Boleto anillado** hherb (CC BY-NC), Ibai Olariaga (CC BY-NC), josep65 (CC BY-NC)

**Cama de perdiu** Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC), Assumpta MC (CC BY-NC), lkrauel (CC BY-NC)

**Paxilo** joxepo (CC BY-NC), jonatan_antunez (CC BY-NC), José Luis Romero Rego (CC BY-NC)

**Falso rebozuelo** Rubén Pérez-González (CC BY-NC), Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC)

**Pota de cavall groga** Oriol Sastre (CC BY), nicomanus (CC BY-NC), alfredoherrero (CC BY-NC)

**Rebozuelo** jonatan_antunez (CC BY-NC), Marc Riera (CC BY), David Pereira (CC BY-NC)

**Trompeta de los muertos** yaya_love (CC BY-NC), pogon (CC BY-NC), fenneck (CC BY-NC)

**Angula de monte** Josep Sais i Brucet (CC BY-NC), Nico Hernandez (CC BY), polchof (CC BY-NC)

**Camagroc** andarubel (CC BY-NC), Luis Ballester (CC BY-NC), Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

**Lengua de vaca** Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), Jacobo Krauel (CC BY-NC), Josep Sais i Brucet (CC BY-NC)

**Picornell de pi** Joseba (CC BY-NC), Ángel Argüelles (CC BY-NC), Luis Ballester (CC BY-NC)

**Peu de rata bord** Cordula Bernert (CC BY-NC), Stevan Baluban (CC BY-NC), Philippe Geniez (CC BY-NC)

**Hígado de buey** Eduardo Martínez (CC BY), tarareare (CC BY-SA), Joan Ventura (CC BY-NC)

**Oreja de Judas** bertogcliment (CC BY-NC), Emily Nyenyedzi Davies (CC BY), S. Menéndez (CC BY)

**Oronja** GLJIVARSKO DRUSTVO NIS from Serbia (CC BY 2.0)

**Farinera** jl__cc (CC BY-NC), marcaluco (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

**Oronja verde** J. IGNASI (CC BY-NC), no rights reserved (CC0), polchof (CC BY-NC)

**Cogomassa** Luis Ballester (CC BY-NC), Amari García (CC BY-NC), Fatima Carrasco (CC BY-NC)

**Farinera pudent** Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Jesse Kalwij (CC BY-NC), Rene Weigelt (CC BY-NC)

***Amanita proxima*** Luis Ballester (CC BY-NC), Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), jorgemartin71 (CC BY-NC)

**Amanita pantera** nicomanus (CC BY-NC), Yves Bas (CC BY), Oriol Sastre (CC BY)

**Matamoscas** graellsia (CC BY-NC), Вова Прорас (CC BY-NC), Quercus morisii (CC BY-NC)

***Amanita gemmata*** Achim Lammerts (Syntaxys) (CC BY-SA 4.0), Strobilomyces (CC BY-SA 3.0)

**Parasol** victoriadurazo (CC BY-NC), Oriol Sastre (CC BY), Izan Lopez Vergel (CC BY-NC)

Sombrero rojo vivo y pie blanco, entre el...

Debajo: láminas blancas. Sabor muy picante.

TÓXICA ●●○ MEDIA

## Rúsula emética

*Russula emetica* · escaldabecs

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

600–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero rojo escarlata brillante, cutícula que se pela casi entera.
! Láminas y pie blancos puros; sin látex.
! Carne frágil y muy picante.

**SABOR** Muy picante (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas.

**DÓNDE** Con pino silvestre, negro y abeto blanco. Bosques de coníferas húmedos, entre musgo.

**SE CONFUNDE CON**

**Níscalo de sangre** (rovelló · *Lactarius sanguifluus*)
COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, pie hueco con hoyuelos y láminas que verdean. → p. 4

Parece una farinera, pero la volva es NARANJA...

La clave: volva con tonos naranja o herrumbre.

TÓXICA ●●● DIFÍCIL

## *Amanita proxima*

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

0–900 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Amanita blanca o crema con volva DELGADA de color naranja ocráceo a herrumbre.
! Anillo membranoso persistente.
! Láminas blancas.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Tóxica: provoca insuficiencia renal aguda.

**SÍNDROME NEFROTÓXICO AGUDO** Síntomas de 8 a 14 horas.

**DÓNDE** Con encina y pino carrasco. Encinares y pinares calizos mediterráneos.

**SE CONFUNDE CON**

**Farinera** (*Amanita ovoidea*) CONDICIONADA A. → p. 20

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Amanita pantera

*Amanita pantherina* · pixacà · reig bru

*Tóxica (neurotóxica), potencialmente grave.*

Sombrero pardo con verrugas blancas, anillo y bulbo en la base.

Debajo: láminas blancas y anillo liso.

Margen del sombrero estriado y anillo colgante.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 0–1900 m de altitud

### RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.

! Base del pie en bulbo con un reborde (como un calcetín enrollado) y 1–2 anillos por encima.

! Anillo liso, sin estrías por arriba.

! La carne NO enrojece.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 5–12 cm, pardo a pardo oliváceo, con verrugas blancas pequeñas; margen estriado.

**DEBAJO** Láminas libres, blancas.

**PIE** Blanco, con anillo liso y bulbo marginado.

**CARNE** Blanca, inmutable.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, alternancia de excitación y somnolencia; vómitos; en casos graves convulsiones y coma.

**DÓNDE** Con pino silvestre, roble pubescente, haya y encina. Bosques de coníferas y planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Parasol** (apagallums · *Macrolepiota procera*) COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 21

**COMPRUEBE** Pie y base.





# Índice


Pie azul 28
Pimpinella morada 28
Pinetell 4
Pinetell 11
Pinetell bord 39
Pinetell d'avet 5
Pinetell d'avetosa 5
Pinetell de calceta 16
Pixacà 48
Platera 31
*Pleurotus eryngii* 34
*Pleurotus ostreatus* 35
Pollancró 36
Pota de cavall groga 45
Pota de perdiu 12
Rabassola 37
*Ramaria formosa* 46
Ratón 26
Rebollón 4
Rebollón 4
Rebozuelo 13
Rebozuelo anaranjado 15
Reig 19
Reig bord 49
Reig bru 48
Robellón 4
Rossinyol 13
Rossinyol ataronjat 44
Rossinyol de pi 15
Rossinyolic 15
Rossinyolic embudat 16
Rourenc 9
Rourenc d'estiu 10
Rovelló 4
Rovelló bord 39
Rovelló d'avet 5
Rovelló d'obaga 4
Rovelló de cabra 39
Rovelló de cabra 41
*Rubroboletus satanas* 43
*Russula cyanoxantha* 6
*Russula emetica* 47
*Russula torulosa* 42
*Russula virescens* 9
Rúsula emética 47
*Scleroderma citrinum* 45
Senderuela 33
Seta calabaza 8
Seta coliflor 7
Seta de campo 23
Seta de cardo 34
Seta de chopo 36
Seta de los caballeros 52
Seta de olivo 55
Seta de ostra 35
Seta de San Jorge 29
Seta del cura 9
Siurenc 9
*Sparassis crispa* 7
*Suillus granulatus* 11
*Suillus luteus* 16
Sureny 8
Sureny fosc 9
Tòfona negra 38
*Tricholoma equestre* 52
*Tricholoma pardinum* 53
*Tricholoma portentosum* 27
*Tricholoma terreum* 26
Trompeta 14
Trompeta amarilla 15
Trompeta de la mort 14
Trompeta de los muertos 14
Trompeta negra 14
Trufa negra 38
*Tuber melanosporum* 38
Vaqueta 13
Vaqueta negra 14
Verderol 52

# Índice


| | |
|---|---|
| *Lactarius torminosus* | 41 |
| *Lactarius zonarius* | 40 |
| Lengua de buey | 18 |
| Lengua de gato | 17 |
| Lengua de vaca | 17 |
| *Lepiota brunneoincarnata* | 65 |
| *Lepiota cristata* | 50 |
| Lepiota metzinosa | 65 |
| Lepiota pudent | 50 |
| *Lepista nuda* | 28 |
| Llémena | 17 |
| Llenega | 30 |
| Llenega blanca | 31 |
| Llenega negra | 30 |
| Llengua de bou | 17 |
| Llengua de bou rogenca | 18 |
| Lleterol de beç | 41 |
| Lleterola de llet groga | 39 |
| Llora | 9 |
| Llora | 6 |
| Llora clapada | 9 |
| Llora morada | 6 |
| Llora verda | 9 |
| Llorell | 6 |
| *Lycoperdon perlatum* | 24 |
| *Macrolepiota procera* | 21 |
| *Marasmius oreades* | 33 |
| Matacandil | 21 |
| Matacandil | 22 |
| Matagent | 43 |
| Matamoscas | 49 |
| Mataparent de Satanàs | 43 |
| Mízcalo | 4 |
| Moixernó | 29 |
| Moixernó blanc de tardor | 35 |
| Moixí | 11 |
| Moixí de calceta | 16 |
| Molinera | 35 |
| Molleric | 11 |
| Molleric calçat | 16 |
| Molleric granellut | 11 |
| *Morchella elata* | 38 |
| *Morchella esculenta* | 37 |
| Murga | 37 |
| Murga | 69 |
| Múrgola | 37 |
| Múrgola | 38 |
| *Mycena pura* | 56 |
| Negret | 26 |
| Negrilla | 26 |
| Níscalo | 4 |
| Níscalo de sangre | 4 |
| *Omphalotus olearius* | 55 |
| Oreja de Judas | 20 |
| Orella d'ase | 14 |
| Orella de Judes | 20 |
| Orella de saüquer | 20 |
| Orellana | 35 |
| Oronja | 19 |
| Oronja verde | 62 |
| Ou de reig | 19 |
| Palometa | 65 |
| Pampa | 31 |
| Parasol | 21 |
| Paxil enrotllat | 61 |
| Paxil·le tòxic | 61 |
| *Paxillus involutus* | 61 |
| Paxilo | 61 |
| Pedo de lobo | 24 |
| Pentinella borda | 62 |
| Perrechico | 29 |
| Pet de llop | 24 |
| Pet de llop de prat | 27 |
| Pet de llop gegant | 25 |
| Pet de llop gros | 27 |
| Peu de rata bord | 46 |
| Peu de rata de pi | 7 |
| Picornell de pi | 18 |






TÓXICA ●○○ FÁCIL

*falsa oronja*

# Matamoscas

*Amanita muscaria* · reig bord

*Tóxica (neurotóxica). Los tratamientos «para destoxificarla» no son seguros.*

Sombrero rojo con verrugas blancas y pie blanco.

Debajo

Joven: cubierta de verrugas, como una bola.

E F M A M J J **A S O N** D · Láminas · Con anillo · **Con volva** · 300–2200 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero rojo con verrugas blancas (que la lluvia puede borrar).
! Láminas y pie BLANCOS.
! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 8–20 cm, rojo escarlata a naranja, con verrugas blancas; margen estriado.
**DEBAJO** Láminas libres, blancas.
**PIE** Blanco, con anillo blanco y bulbo con anillos de volva.
**ESPORADA** Blanca.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia; vómitos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, abedul, abeto blanco y pino negro. Bosques de montaña sobre suelo ácido.

**SE CONFUNDE CON**

**Oronja** (ou de reig · *Amanita caesarea*) COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca. → p. 19

**COMPRUEBE** Láminas y pie.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Lepiota pudent

*Lepiota cristata*

*Tóxica (gastrointestinal). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.*

Lepiota cristata

L. cristata de cerca

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1600 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
! Olor desagradable, a goma o gas.
! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 2–5 cm, blanco con disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
**DEBAJO** Láminas libres, blancas.
**PIE** Delgado, blanquecino, con anillo frágil.
**ESPORADA** Blanca.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.
**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

**DÓNDE** **En prados.** Hojarasca, jardines y bordes de camino.

**SE CONFUNDE CON**

**Parasol** (apagallums · *Macrolepiota procera*) COMESTIBLE Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado. → p. 21

**COMPRUEBE** Tamaño.





# Índice


Clitocibe blanc 54
*Clitocybe rivulosa* 54
*Clitopilus prunulus* 35
Cogoma 20
Cogoma borda 62
Cogoma verda 62
Cogomassa 63
Cogomassa farinera 20
Cogomella 21
Coliflor de pi 7
Colmenilla 37
Colmenilla negra 38
*Coprinopsis atramentaria* 60
*Coprinus comatus* 22
Cortinari metzinós 68
*Cortinarius orellanus* 68
*Craterellus cornucopioides* 14
*Craterellus lutescens* 15
*Craterellus tubaeformis* 16
Cualbra llora 6
Cualbra morada 42
Cualbra pinenca 42
Cul-blanc 20
*Cyclocybe cylindracea* 36
Enganyapastors 40
Enganyapastors d'alzina 40
Enganyapastors de llet groga 39
*Entoloma sinuatum* 57
Escaldabec estriat 47
Escaldabec vinós 42
Escaldabecs 47
Esclatasang 4
Fals camagroc 16
Fals carlet 57
Fals rossinyol 44
Falsa colmenilla 69
Falsa oronja 49
Falso níscalo 41
Falso rebozuelo 44
Farinera 20
Farinera borda 62
Farinera pudent 64
Farinot 62
Fetge de vaca 18
*Fistulina hepatica* 18
Fredolic 26
Fredolic gros 27
Fredolic metzinós 53
Galamperna 21
Galerina marginada 66
*Galerina marginata* 66
Galerina metzinosa 66
Gamuza 17
Gírgola 35
Gírgola d'olivera 55
Gírgola de panical 34
Gorro verde 9
Greixa 7
Groguet 52
*Gyromitra esculenta* 69
Hígado de buey 18
Hongo blanco 8
Hongo negro 9
Huevo de rey 19
*Hydnum repandum* 17
*Hydnum rufescens* 18
*Hygrophoropsis aurantiaca* 44
*Hygrophorus gliocyclus* 31
*Hygrophorus latitabundus* 30
*Hygrophorus russula* 32
*Hypholoma fasciculare* 58
*Infundibulicybe geotropa* 31
*Inocybe geophylla* 59
*Inosperma erubescens* 67
*Lactarius chrysorrheus* 39
*Lactarius deliciosus* 4
*Lactarius salmonicolor* 5
*Lactarius sanguifluus* 4
*Lactarius semisanguifluus* 5

TODOS LOS NOMBRES

# Índice

*Nombres en catalán, castellano y científicos (en cursiva), con su página.*


*Agaricus arvensis* 25
*Agaricus campestris* 23
*Agaricus xanthodermus* 51
*Amanita caesarea* 19
Amanita de los césares 19
*Amanita gemmata* 60
Amanita mortal 62
*Amanita muscaria* 49
*Amanita ovoidea* 20
Amanita pantera 48
*Amanita pantherina* 48
*Amanita phalloides* 62
*Amanita proxima* 47
*Amanita verna* 63
*Amanita virosa* 64
Angula de monte 15
Apagallums 21
Arigany 38
*Auricularia auricula-judae* 20
Babosa negra 30
Babosillo 16
Barba de cabra 7
Barbuda 22
Barret de bruixa 59
Bejín 24
Bejín gigante 25
Bola de neu 25
Bola de neu pudent 51
Bola de nieve 25
Bolet d'oliu 55
Bolet de femer 60
Bolet de greix 69
Bolet de mantellina 68
Bolet de pi 58
Bolet de Sant Jordi 29
Bolet de tinta 22
Boleto 8
Boleto anillado 16
Boleto de Satanás 43
Boleto estival 10
Boleto granulado 11
Boleto negro 9
Boleto pinícola 10
Boleto reticulado 10
*Boletus aereus* 9
*Boletus edulis* 8
*Boletus pinophilus* 10
*Boletus reticulatus* 10
Bonete 69
*Bovistella utriformis* 27
Brunet 26
Buixó 8
Cabeza de fraile 31
Cabra de beç 41
Cabrito 13
Cagarria 37
*Calocybe gambosa* 29
*Calvatia gigantea* 25
Cama de perdiu 12
Cama-sec 33
Camagroc 15
Camagroc 16
Camperol 23
Candeleta 54
*Cantharellus cibarius* 13
Capuchina 27
Carbonera 6
Carlet 32
Carlet bord 57
Carner bord 57
Carrereta 33
Carrerilla 33
Cep 8
Cep 10
Cep d'estiu 10
Cep negre 9
Cep rogenc 10
Champiñón silvestre 23
*Chroogomphus rutilus* 12


ANEXO



TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Bola de neu pudent

*Agaricus xanthodermus*

*Tóxica (gastrointestinal).*

Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.

Láminas rosa grisáceo de joven; se confunde...

Vieja: láminas pardo oscuro.

E F M A **M J** J A **S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1500 m de altitud

### RASGOS DE ALARMA

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.

! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 5–15 cm, blanco o gris pardo, que amarillea al roce.

**DEBAJO** Láminas libres, rosadas → pardas.

**PIE** Blanco con anillo grueso y base algo bulbosa, amarillo cromo al corte.

**ESPORADA** Pardo chocolate.

**OLOR** Desagradable (tinta, fenol).

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

**DÓNDE** **En prados.** Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

**SE CONFUNDE CON**

**Champiñón silvestre** (camperol · *Agaricus campestris*) COMESTIBLE No amarillea y huele bien. → p. 23

**Bola de nieve** (bola de neu · *Agaricus arvensis*) COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo. → p. 25

**COMPRUEBE** Base del pie.

TÓXICAS

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Seta de los caballeros

*Tricholoma equestre* · verderol · groguet

*Tóxica.*

Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.

Debajo: láminas amarillo azufre.

Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el...

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1700 m de altitud

### RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillo azufre intenso.
! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.
! Pie amarillo.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 5–12 cm, amarillo verdoso a amarillo oliváceo, centro pardo escamoso, viscoso.
**DEBAJO** Láminas escotadas, amarillo azufre.
**PIE** Amarillo, fibroso.
**CARNE** Blanca amarillenta.
**OLOR** A harina débil.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

**SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO** Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura; en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria.

**DÓNDE** Con pino piñonero, silvestre y rodeno. **En prados.** Pinares sobre suelo arenoso.

**SE CONFUNDE CON**

**Capuchina** (fredolic gros · *Tricholoma portentosum*) COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras.
→ p. 27

**COMPRUEBE** Sombrero.



PALABRAS DE SETERO

# Glosario

**Adnata (lámina)**: unida al pie en todo su ancho.

**Aguijones**: púas blandas bajo el sombrero que producen las esporas (llengua de bou).

**Alvéolo**: celdilla del sombrero de las colmenillas.

**Amatoxinas**: toxinas de la farinera borda, las lepiotas pequeñas y la galerina; dañan el hígado y no se destruyen con la cocción.

**Anillo**: resto del velo parcial en el pie.

**Areolada**: cutícula agrietada en pequeñas placas.

**Bulbo marginado**: base del pie engrosada con un reborde neto.

**Cortina**: velo en forma de telaraña entre sombrero y pie (*Cortinarius*).

**Cutícula**: piel del sombrero.

**Decurrente (lámina)**: que baja por el pie.

**Delicuescente**: que se licúa al madurar (coprinos).

**Ectomicorriza / micorriza**: asociación entre el micelio de un hongo y las raíces de una planta.

**Escotada (lámina)**: con una muesca junto al pie.

**Escrobículas**: hoyuelos o manchas hundidas en el pie (lactarios).

**Esporada**: depósito de esporas que deja un sombrero sobre un papel; su color es diagnóstico.

**Excéntrico (pie)**: no centrado bajo el sombrero.

**Fasciculado**: en ramillete, con los pies unidos por la base.

**Fibriloso**: cubierto de fibras finas.

**Gleba**: masa interna fértil de los pedos de lobo y las trufas.

**Herbario (pliego)**: ejemplar seco conservado en una colección científica; es la prueba más sólida de presencia.

**Higrófano**: que cambia de color al perder agua.

**Himenio / himenóforo**: superficie fértil que produce las esporas (láminas, poros, pliegues, aguijones).

**Hipogeo**: que fructifica bajo tierra.

**Látex**: líquido que sale al cortar los lactarios.

**Lignícola**: que crece sobre madera.

**Libre (lámina)**: que no toca el pie.

**Mamelón**: abultamiento central del sombrero.

**Micelio**: conjunto de filamentos (hifas) que forman el cuerpo del hongo; vive en el suelo o la madera todo el año.

**Muscarina**: toxina de *Inocybe*, *Clitocybe* y *Mycena pura*; provoca sudoración, salivación y bradicardia.

**Nitrófilo**: que vive en suelos ricos en nitrógeno.

**Pliegues**: venas gruesas, bajas y ramificadas bajo el sombrero (rebozuelos).

**Poros**: aberturas de los tubos (boletos).

**Pruina, pruinoso**: capa fina de polvo blanquecino.

**Quemado (trufero)**: zona sin hierba alrededor de un árbol productor de trufa.

**Reticulado (pie)**: con una red en relieve.

**Saprófito**: que se alimenta de materia orgánica muerta.

**Sinónimo**: nombre científico que designa la misma especie que el nombre aceptado.

**Velo universal**: membrana que envuelve la seta joven; deja la volva y a veces verrugas en el sombrero.

**Viscoso, glutinoso**: pegajoso o cubierto de mucílago.

**Volva**: resto del velo universal en la base del pie.

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

# Síndromes

*Según cuánto tardan los síntomas. Más de 6 horas es señal de alarma.*

## PRECOZ (MENOS DE 6 H)

### Gastrointestinal
Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. La mayoría se resuelven en horas, pero algunas son intensas.

*Lactarios de látex blanco, rúsulas picantes, Entoloma sinuatum, Omphalotus olearius, Tricholoma pardinum, Rubroboletus satanas, Agaricus xanthodermus, Ramaria formosa, Hypholoma fasciculare, Scleroderma, setas comestibles en mal estado*

### Colinérgico (muscarínico)
Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, pulso lento.

*Inocybe e Inosperma, clitocibes blancos (Clitocybe rivulosa), Mycena pura*

### Neurológico central (panterínico)
Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia, a veces convulsiones o coma.

*Amanita pantherina, A. muscaria, A. gemmata*

### Alucinógeno
Alteraciones de la percepción y del comportamiento.

*Psilocybe, Panaeolus*

### Coprínico (tipo disulfiram)
Enrojecimiento, palpitaciones y malestar al beber alcohol, hasta 3 días después.

*Coprinopsis atramentaria + alcohol*

## TARDÍA (6–24 H)

### Hepatotóxico (faloidiano)
Gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave. Potencialmente mortal.

*Amanita phalloides, A. verna, A. virosa, lepiotas pequeñas (Lepiota brunneoincarnata y afines), Galerina marginata*

### Giromitriano (convulsivo)
Síntomas digestivos, neurológicos (convulsiones) y daño hepático. Potencialmente mortal.

*Gyromitra esculenta*

## RETARDADA (MÁS DE 24 H)

### Nefrotóxico
Sed, cansancio, dolor lumbar, alteraciones de la orina; insuficiencia renal.

*Cortinarius orellanus (de 2 a 15 días) y Amanita proxima (síntomas en 8–14 h, fallo renal en 1–3 días)*

### Rabdomiolítico
Debilidad y dolor muscular, orina oscura; afectación cardíaca en casos graves.

*Tricholoma equestre (comidas repetidas)*

### Hemolítico
Destrucción de glóbulos rojos e insuficiencia renal.

*Paxillus involutus (personas sensibilizadas)*





TÓXICA ●●○ MEDIA

# Fredolic metzinós

*Tricholoma pardinum*

*Tóxico: gastroenteritis intensa.*

Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.

Sombrero escamoso y pie robusto y lleno

Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

E F M A M J J **A S O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 800–2000 m de altitud

### RASGOS DE ALARMA
- ! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).
- ! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
- ! Olor a harina.

### CÓMO ES
**SOMBRERO** 6–15 cm, convexo, blanco grisáceo con escamas gris oscuro concéntricas.
**DEBAJO** Láminas escotadas, blanquecinas con reflejo verde amarillento.
**PIE** Robusto, blanco, con manchas ocre en la base.
**CARNE** Blanca, gruesa.
**OLOR** A harina.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

**DÓNDE** Con abeto blanco, haya y pino silvestre. Bosques de montaña.

**SE CONFUNDE CON**

**Negrilla** (fredolic · *Tricholoma terreum*) COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 26

**COMPRUEBE** Tamaño y escamas.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Clitocibe blanc

*Clitocybe rivulosa* · candeleta

*Tóxica (muscarina).*

E F M A M J J A **S O N D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.
! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).
! Esporada blanca (no rosada).

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 2–5 cm, plano o algo deprimido, blanco con pruina que deja ver zonas más oscuras.
**DEBAJO** Láminas decurrentes, apretadas, blancas a crema.
**PIE** Corto, blanquecino.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO (COLINÉRGICO)** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

**DÓNDE** **En prados.** Prados, céspedes, claros herbosos.

**SE CONFUNDE CON**

**Senderuela** (cama-sec · *Marasmius oreades*) COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso. → p. 33

**Molinera** (moixernó blanc de tardor · *Clitopilus prunulus*) COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina. → p. 35

**COMPRUEBE** Láminas.





# Calendario

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedo de lobo *24* | | | | | | | | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Pinetell d'avet *5* | | | | | | | **J** | **A** | **S** | **O** | N | D |
| Barbuda *22* | | | **M** | **A** | **M** | J | J | A | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Boleto anillado *16* | | | | | | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | D |
| Boleto granulado *11* | | | | | **M** | **J** | **J** | A | **S** | **O** | **N** | D |
| Cama de perdiu *12* | | | | | | | | | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Camagroc *16* | | | | | | | | | **S** | **O** | **N** | D |
| Farinera *20* | | | | | | | | | **S** | **O** | **N** | **D** |
| *Lactarius semisanguifluus* *5* | | | | | | | | | **S** | **O** | **N** | D |
| Lengua de vaca *17* | **E** | | | | | | | | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Níscalo *4* | | | | | | | | **A** | **S** | **O** | **N** | D |
| Níscalo de sangre *4* | **E** | | | | | **J** | | | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Picornell de pi *18* | | | | | | | | | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Seta coliflor *7* | | | | | | | | | **S** | **O** | **N** | D |
| Trompeta de los muertos *14* | **E** | | | | | | | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Angula de monte *15* | **E** | | | | | | | | S | **O** | **N** | **D** |
| Babosa negra *30* | **E** | | | | | | | | S | **O** | **N** | **D** |
| Capuchina *27* | | | | | | | | | S | **O** | **N** | **D** |
| Carlet *32* | **E** | | | | | | | | | **O** | **N** | **D** |
| Llenega blanca *31* | | | | | | | | | S | **O** | **N** | **D** |
| Negrilla *26* | **E** | | | | | | | | S | **O** | **N** | **D** |
| Platera *31* | | | | | | | | | S | **O** | **N** | **D** |
| Seta de cardo *34* | | | | **A** | **M** | | | | | **O** | **N** | **D** |

CUÁNDO SALEN

# Calendario

*Meses en que sale cada comestible en Cataluña: oscuro, lo habitual; claro, solo algunos años. El número es su página.*

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oreja de Judas *20* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Pie azul *28* | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Seta de ostra *35* | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Trufa negra *38* | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ |
| Colmenilla *37* | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Colmenilla negra *38* | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Perrechico *29* | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | |
| Senderuela *33* | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |
| Seta de chopo *36* | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |
| Boleto pinícola *10* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Champiñón silvestre *23* | ■ | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pet de llop gros *27* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Bejín gigante *25* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Bola de nieve *25* | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Boleto negro *9* | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Boleto reticulado *10* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Carbonera *6* | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Gorro verde *9* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Rebozuelo *13* | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Boleto *8* | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Hígado de buey *18* | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Molinera *35* | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Oronja *19* | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Parasol *21* | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |





TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Seta de olivo

*Omphalotus olearius* · gírgola d'olivera · bolet d'oliu

*Tóxica: gastroenteritis intensa. Confusión frecuente con el rossinyol.*

Un ramillete de setas anaranjadas sobre un tocón.

Debajo

Láminas que bajan por el pie y pies unidos en la...

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño.
! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.
! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

CÓMO ES

**SOMBRERO** 5–15 cm, convexo y luego en embudo con mamelón; naranja a pardo anaranjado.
**DEBAJO** Láminas apretadas, finas, muy decurrentes, naranja.
**PIE** Largo, curvado, naranja, unido a otros por la base.
**CARNE** Anaranjada, fibrosa.
**ESPORADA** Blanca a crema.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

**DÓNDE** Con olivo, encina, castaño y roble pubescente. **Sobre madera.** Olivares, encinares y castañares; tocones y raíces.

SE CONFUNDE CON

**Rebozuelo** (rossinyol · *Cantharellus cibarius*) COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en el suelo. → p. 13

**COMPRUEBE** Parte inferior y crecimiento.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# *Mycena pura*

*Tóxica (muscarina).*

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Pequeña seta (2–5 cm) lila, rosada o violácea con el margen estriado.

! Olor a rábano.

! Pie hueco, frágil.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 2–5 cm, acampanado y luego plano, lila rosado, estriado en el margen.

**DEBAJO** Láminas espaciadas, blanquecinas a lila pálido.

**PIE** Hueco, frágil, del color del sombrero.

**ESPORADA** Blanca.

**OLOR** A rábano.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, molestias digestivas.

**DÓNDE** Hojarasca y pinaza.

**SE CONFUNDE CON**

**Pie azul** (pimpinella morada · *Lepista nuda*) COMESTIBLE Mucho mayor, carnosa, olor afrutado.
→ p. 28

**Pimpinella morada petita** (*Laccaria amethystina*) SIN INTERÉS Láminas gruesas, sin olor a rábano.

**COMPRUEBE** Tamaño.







# Árboles y sus setas

## Encina

alzina · *Quercus ilex*

*Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate; en el interior a menudo en forma de mata.*

**BUSQUE** Gorro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto negro *9*, Boleto reticulado *10*, Rebozuelo *13*, Trompeta de los muertos *14*

**CUIDADO** Paxilo *61*, Oronja verde *62*, Cogomasa *63*, Cortinari metzinós *68*, Enganyapastors de llet groga *39*, Enganyapastors *40*

## Abeto blanco

avet · *Abies alba*

*Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.*

**BUSQUE** Pinetell d'avet *5*, Boleto *8*, Rebozuelo *13*, Angula de monte *15*, Camagroc *16*, Lengua de vaca *17*

**CUIDADO** Falsa colmenilla *69*, Rúsula emética *47*, Matamoscas *49*, Fredolic metzinós *53*

## Pino rodeno

pinastre · *Pinus pinaster*

*Pino alto de copa piramidal o irregular, de verde oscuro brillante.*

**BUSQUE** Níscalos *4*, Seta coliflor *7*, Boleto granulado *11*, Capuchina *27*

**CUIDADO** Seta de los caballeros *52*, Falso rebozuelo *44*

## Roble albar

roure de fulla gran · *Quercus petraea*

*Roble alto y de tronco recto en bosques frescos de montaña.*

**BUSQUE** Carbonera *6*, Boleto *8*, Boleto reticulado *10*, Rebozuelo *13*, Trompeta de los muertos *14*, Hígado de buey *18*

## Olivo

olivera · *Olea europaea*

*Árbol de copa gris verdosa y tronco retorcido.*

**CUIDADO** Seta de olivo *55*

# Árboles y sus setas

HOJA

TRONCO

## Pino silvestre

pi roig · *Pinus sylvestris*

*Copa irregular y alta; la parte superior del tronco y las ramas gruesas son de color naranja asalmonado, visible de...*

**BUSQUE** Níscalos *4*, *Lactarius semisanguifluus 5*, Seta coliflor *7*, Boleto *8*, Boleto pinícola *10*, Boleto granulado *11*

**CUIDADO** Paxilo *61*, Falsa colmenilla *69*, Rúsula emética *47*, Amanita pantera *48*, Matamoscas *49*, *Amanita gemmata 60*

HOJA

TRONCO

## Castaño

castanyer · *Castanea sativa*

*Árbol grande de copa amplia; a menudo en forma de rebrotes de cepa (castañares de leña).*

**BUSQUE** Gorro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto *8*, Boleto negro *9*, Boleto pinícola *10*, Boleto reticulado *10*

**CUIDADO** Paxilo *61*, Oronja verde *62*, Cortinari metzinós *68*, Enganyapastors de llet groga *39*, Boleto de Satanás *43*, Pota de cavall groga *45*

HOJA

TRONCO

## Pino negro

pi negre · *Pinus uncinata*

*Pino de copa estrecha y oscura de la alta montaña, a menudo en el límite del bosque.*

**BUSQUE** Níscalos *4*, Boleto pinícola *10*, Boleto anillado *16*

**CUIDADO** Falsa colmenilla *69*, Rúsula emética *47*, Matamoscas *49*

HOJA

TRONCO

## Chopo negro

pollancre · *Populus nigra*

*Árbol alto de ribera y de plantaciones en hileras (chopos híbridos).*

**BUSQUE** Seta de ostra *35*, Seta de chopo *36*

HOJA

TRONCO

## Álamo blanco

àlber · *Populus alba*

*Copa blanquecina cuando el viento gira las hojas.*

**BUSQUE** Seta de chopo *36*





TÓXICA ●●○ MEDIA

# Fals carlet

*Entoloma sinuatum* · carlet bord

*Tóxica: gastroenteritis intensa.*

Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.

Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa...

Adulto

E F M A M J J A **S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 100–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
- ! Esporada rosada.
- ! Olor a harina rancia.
- ! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 8–20 cm, convexo e irregular; gris ocráceo a gris pardo, brillante y sedoso.

**DEBAJO** Láminas escotadas, amarillentas → rosa salmón.

**OLOR** A harina rancia.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO)** Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

**DÓNDE** Con roble pubescente, haya y castaño. Bosques de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Carlet** (*Hygrophorus russula*) COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca. → p. 32

**Perrechico** (moixernó · *Calocybe gambosa*) COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera. → p. 29

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas.

TÓXICAS

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Bolet de pi

*Hypholoma fasciculare*

*Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.*

E F M A M J J A S O N D — Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.

! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.

! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 2–7 cm, amarillo azufre, centro naranja.

**DEBAJO** Láminas apretadas, amarillas → verdosas → pardo violáceas.

**PIE** Amarillo, con zona anular de fibras.

**ESPORADA** Pardo violácea.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

**DÓNDE** **En prados y sobre madera.** Tocones y madera muerta.

**SE CONFUNDE CON**

**Seta de chopo** (pollancró · *Cyclocybe cylindracea*) COMESTIBLE Crema, anillo membranoso, en chopos. → p. 36

**Armilaria** (alzinoi · *Armillaria mellea*) CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

**COMPRUEBE** Color.





# Árboles y sus setas

## Pino piñonero

pi pinyer · *Pinus pinea*

*Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.*

**BUSQUE** Níscalos *4*, Boleto granulado *11*, Cama de perdiu *12*, Negrilla *26*

**CUIDADO** Pota de cavall groga *45*, Seta de los caballeros *52*, Cualbra morada *42*

## Alcornoque

surera · *Quercus suber*

*Árbol de copa amplia y verde grisácea; tronco con corcho grueso o, si se ha descorchado, de color rojo anaranjado.*

**BUSQUE** Corro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto negro *9*, Rebozuelo *13*, Oronja *19*

**CUIDADO** Oronja verde *62*, Cogomassa *63*, Enganyapastors de llet groga *39*, Pota de cavall groga *45*

## Roble pubescente

roure martinenc · *Quercus pubescens*

*Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las hojas secas.*

**BUSQUE** Corro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto negro *9*, Boleto reticulado *10*, Trompeta de los muertos *14*, Lengua de vaca *17*

**CUIDADO** Oronja verde *62*, Cogomassa *63*, Cortinari metzinós *68*, Enganyapastors de llet groga *39*, Enganyapastors *40*, Boleto de Satanás *43*

## Abedul

bedoll · *Betula pendula*

*Árbol esbelto de tronco blanco y ramillas colgantes.*

**BUSQUE** Carbonera *6*

**CUIDADO** Paxilo *61*, Farinera pudent *64*, Falso níscalo *41*, Matamoscas *49*

## Avellano

avellaner · *Corylus avellana*

*Arbusto grande de muchos tallos.*

**BUSQUE** Trufa negra *38*

ANEXO

# Árboles y sus setas

*Muchas setas viven unidas a las raíces de un árbol: reconocerlo por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.*

## Pino carrasco

pi blanc · *Pinus halepensis*

*Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido; tronco a menudo inclinado o tortuoso.*

**BUSQUE** Níscalos 4, *Lactarius semisanguifluus* 5, Boleto granulado 11, Cama de perdiu 12, Picornell de pi 18, Farinera 20

**CUIDADO** *Amanita proxima* 47, Cualbra morada 42

## Pino laricio

pinassa · *Pinus nigra subsp. salzmannii*

*Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.*

**BUSQUE** Níscalos 4, *Lactarius semisanguifluus* 5, Seta coliflor 7, Boleto granulado 11, Boleto anillado 16, Cama de perdiu 12

**CUIDADO** *Amanita gemmata* 60, Cualbra morada 42

## Haya

faig · *Fagus sylvatica*

*Árbol alto de corteza lisa y gris; bajo su copa densa apenas crece sotobosque.*

**BUSQUE** Gorro verde 9, Carbonera 6, Boleto 8, Boleto pinícola 10, Boleto reticulado 10, Rebozuelo 13

**CUIDADO** Oronja verde 62, Farinera pudent 64, Boleto de Satanás 43, Peu de rata bord 46, Amanita pantera 48, Fredolic metzinós 53

## Pícea

pícea · *Picea abies*

*Conífera cónica de ramas colgantes.*

**BUSQUE** Boleto 8

## Quejigo

roure de fulla petita · *Quercus faginea*

*Roble de porte modesto y copa clara, marcescente.*

**BUSQUE** Carlet 32, Trufa negra 38

**CUIDADO** Enganyapastors 40





TÓXICA ●●○ MEDIA

# Barret de bruixa

*Inocybe geophylla*

*Tóxica (muscarina).*

Sombrero con fibras radiales que se agrietan: la señal típica.

Inocybe geophylla

Las hay lilas, que pueden confundirse con la...

E F M A M J J **A S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

### RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta (1–4 cm) blanca sedosa (o lila en la variedad lilacina) con mamelón agudo.

! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.

! Olor terroso o espermático.

### CÓMO ES

**SOMBRERO** 1–4 cm, cónico con mamelón, blanco sedoso o lila.

**DEBAJO** Láminas grisáceas → pardas.

**PIE** Delgado, blanco o lila.

**ESPORADA** Parda.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

**DÓNDE** Bordes de camino en bosques de todo tipo.

**SE CONFUNDE CON**

**Pie azul** (pimpinella morada · *Lepista nuda*) COMESTIBLE Mucho mayor y carnosa. → p. 28

**Senderuela** (cama-sec · *Marasmius oreades*) COMESTIBLE Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema. → p. 33

**COMPRUEBE** Tamaño.

Sombrero amarillo pálido con restos blancos...

Láminas y pie blancos; volva en collar sobre...

TÓXICA ●●○ MEDIA

## *Amanita gemmata*

E F M A **M** **J** J A S **O** **N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

300–1800 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero amarillo pálido a amarillo ocre con placas blancas.
! Láminas blancas.
! Bulbo con reborde de volva y anillo frágil.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas.

**DÓNDE** Con pino silvestre y laricio. Pinares sobre suelo ácido o arenoso.

**SE CONFUNDE CON**

**Oronja** (ou de reig · *Amanita caesarea*) COMESTIBLE
Láminas y pie amarillos, volva en saco. → p. 19

Sombreros grises en forma de campana, en...

Jóvenes

TÓXICA ●○○ FÁCIL

## Bolet de femer

*Coprinopsis atramentaria*

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

0–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero gris, ovoide o acampanado, con estrías o pequeñas escamas en el centro (sin escamas lanosas).
! Láminas que se licúan en tinta negra.
! Crece en ramilletes, sobre madera enterrada o tocones.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Tóxica si se toma alcohol (coprina): antes, durante o hasta tres días después de comerla.

**SÍNDROME COPRÍNICO (TIPO DISULFIRAM) CON ALCOHOL** Síntomas de minutos a 2 horas tras beber alcohol, hasta 72 horas después de comer la seta.

**DÓNDE** **En prados y sobre madera.** Parques, huertos, bordes de camino, tocones.

**SE CONFUNDE CON**





MORTAL ●○○ FÁCIL *bonete*

# Falsa colmenilla

*Gyromitra esculenta* · bolet de greix · murga

*Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).*

E F **M** **A** **M** **J** J A S O N D — Liso — Sin anillo — Sin volva — 600–2200 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.
! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 4–10 cm, cerebriforme, pardo rojizo a pardo oscuro.
**DEBAJO** Superficie del sombrero.
**PIE** Blanquecino, irregular, con cavidades.
**CARNE** Frágil, cerosa.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

**SÍNDROME GIROMITRIANO (CONVULSIVO Y HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

**DÓNDE** Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. **Sobre madera.** Coníferas de montaña.

**SE CONFUNDE CON**

**Colmenilla** (múrgola · *Morchella esculenta*) CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 37

**Colmenilla negra** (múrgola · *Morchella elata*) CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco. → p. 38

**COMPRUEBE** **Corte longitudinal.**

MORTAL ●●○ MEDIA

# Cortinari metzinós

*Cortinarius orellanus* · bolet de mantellina

*Mortal: la orellanina destruye el riñón de forma tardía e irreversible.*

Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.

Láminas color herrumbre, espaciadas.

Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

E F M A M J J A **S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 100–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
! Esporada pardo herrumbre.
! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 3–8 cm, convexo con mamelón, pardo anaranjado, seco, fibroso.

**OLOR** Débil a rábano.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

**SÍNDROME ORELLÁNICO (NEFROTÓXICO TARDÍO)** Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida; insuficiencia renal que puede requerir diálisis o trasplante.

**DÓNDE** Con roble pubescente, castaño y encina. Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

**SE CONFUNDE CON**

**Rebozuelo** (rossinyol · *Cantharellus cibarius*) COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas. → p. 13

**Camagroc** (*Craterellus tubaeformis*) COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas. → p. 16

**COMPRUEBE** **Parte inferior.**





MORTAL ●●○ MEDIA

# Paxilo

*Paxillus involutus* · paxil·le tòxic · paxil enrotllat

*Potencialmente mortal.*

Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia dentro.

Margen del sombrero muy enrollado.

Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

E F M A M J J **A S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1900 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.
! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.
! Sin látex.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

**SÍNDROME HEMOLÍTICO (PAXÍLICO)** Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y fallo renal.

**DÓNDE** Con abedul, pino silvestre, encina y castaño. Bosques variados, también parques; prefiere suelos ácidos.

**SE CONFUNDE CON**

**Níscalo de sangre** (rovelló · *Lactarius sanguifluus*) COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo. → p. 4

**Níscalo** (pinetell · *Lactarius deliciosus*) COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 4

**COMPRUEBE** **Corte: látex o no.**

# Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

Adulta: sombrero verde oliva, anillo como una falda y volva en la base.

Debajo: láminas BLANCAS y anillo colgante.

Láminas blancas y base con volva

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 0–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos; tras una aparente mejoría, daño hepático grave a partir del segundo o tercer día, que puede requerir trasplante o causar la muerte.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente, alcornoque, castaño y haya. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** (llora verda · *Russula virescens*) COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico. → p. 9

**Carbonera** (llora · *Russula cyanoxantha*) COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 6

**Bola de nieve** (bola de neu · *Agaricus arvensis*) COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva. → p. 25

**COMPRUEBE** **Base y pie.**







# *Inosperma erubescens*

*Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.*

Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.

Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).

E F M A **M J J** A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
- ! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
- ! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 3–8 cm, cónico acampanado, blanquecino que se mancha de rojo, fibroso y agrietado.
**DEBAJO** Láminas apretadas, blanquecinas → pardas, con manchas rojas.
**PIE** Blanco, fibroso, que enrojece.
**ESPORADA** Parda.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO (GRAVE)** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión; puede ser mortal sin tratamiento.

**DÓNDE** **En prados.** Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

**SE CONFUNDE CON**

**Perrechico** (moixernó · *Calocybe gambosa*) COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 29

**COMPRUEBE** **Sombrero, manchas rojas y olor.**

MORTAL ●●○ MEDIA

# Galerina marginada

*Galerina marginata* · galerina metzinosa

*Mortal: contiene amatoxinas como la farinera borda.*

Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.

Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...

Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Con anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
! Anillo fino pardo en el pie.
! Esporada pardo herrumbre.
! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**DÓNDE** **Sobre madera.** Madera muerta de coníferas y planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Seta de chopo** (pollancró · *Cyclocybe cylindracea*) COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 36

***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

**Armilaria** (alzinoi · *Armillaria mellea*) CONDICIONADA Mayor, escamas oscuras, esporada blanca.

**COMPRUEBE** **Tamaño y árbol.**





MORTAL ●●○ MEDIA

# Cogomassa

*Amanita verna*

*Mortal, con las mismas toxinas que la farinera borda. Sale en primavera, cuando se busca el moixernó, y también en otoño.*

E F M **A M J** J A S O N D Láminas Con anillo **Con volva** 0–900 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta enteramente blanca.
! Volva blanca en saco en la base.
! Anillo membranoso blanco.
! Láminas blancas, libres.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 4–10 cm, blanco (a veces crema en el centro), liso y satinado.

**DEBAJO** Láminas libres, blancas.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y alcornoque. Encinares y robledales mediterráneos.

**SE CONFUNDE CON**

**Perrechico** (moixernó · *Calocybe gambosa*) COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina. → p. 29

**Champiñón silvestre** (camperol · *Agaricus campestris*) COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 23

**COMPRUEBE** **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

# Farinera pudent

*Amanita virosa*

*Mortal (amatoxinas).*

Toda blanca, con anillo y volva.

Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría...

Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 500–1800 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
! Volva blanca en saco.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 5–10 cm, cónico a acampanado, blanco puro.
**DEBAJO** Láminas libres, blancas.
**PIE** Blanco, lanoso, con anillo frágil.
**ESPORADA** Blanca.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.
**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

**DÓNDE** Con haya y abedul. Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

**SE CONFUNDE CON**

**Bola de nieve** (bola de neu · *Agaricus arvensis*) COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva. → p. 25

**COMPRUEBE** **Láminas y base.**



MORTAL ●●○ MEDIA

# Lepiota metzinosa

*Lepiota brunneoincarnata* · palometa

*Mortal: contiene amatoxinas como la farinera borda. Las lepiotas pequeñas son responsables de intoxicaciones graves en Cataluña.*

Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.

Pie rosado con bandas y láminas blancas.

Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el...

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–900 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
! Láminas blancas, libres.

**CÓMO ES**

**SOMBRERO** 2–6 cm, convexo y luego plano; escamas pardo vinosas concéntricas, centro oscuro.
**DEBAJO** Láminas libres, blancas a crema.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.
**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**DÓNDE** **En prados.** Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

**SE CONFUNDE CON**

**Parasol** (apagallums · *Macrolepiota procera*) COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado. → p. 21

**Senderuela** (cama-sec · *Marasmius oreades*) COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas. → p. 33

**COMPRUEBE** **Tamaño, anillo y pie.**