Árboles y sus setas

Abeto blanco
avet

Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.

BUSQUE Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Trompetas negra y amarilla *11*, Lengua de vaca *12*

CUIDADO Falsa colmenilla *50*, Amanita pantera y matamoscas *33*, Fredolic metzinós *37*

Alcornoque
surera

Árbol de copa amplia y verde grisácea.

BUSQUE Carbonera *5*, Rebozuelo *10*, Oronja *13*

CUIDADO Oronja verde *43*, Cogomassa *44*, Enganyapastors *26*, Pota de cavall groga *31*

Roble pubescente
roure martinenc

Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las...

BUSQUE Carbonera *5*, Trompetas negra y amarilla *11*, Lengua de vaca *12*, Oronja *13*, Babosa negra y carlet *21*

CUIDADO Oronja verde *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Boleto de Satanás *29*, Peu de rata bord *32*

Haya
faig

Árbol alto de corteza lisa y gris.

BUSQUE Carbonera *5*, Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Trompetas negra y amarilla *11*, Lengua de vaca *12*

CUIDADO Oronja verde *43*, Farinera pudent *45*, Boleto de Satanás *29*, Peu de rata bord *32*, Amanita pantera y matamoscas *33*, Fredolic metzinós *37*

Castaño
castanyer

Árbol grande de copa amplia.

BUSQUE Carbonera *5*, Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Trompetas negra y amarilla *11*, Lengua de vaca *12*, Oronja *13*

CUIDADO Paxilo *42*, Oronja verde *43*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Boleto de Satanás *29*, Pota de cavall groga *31*

Setas *esenciales*

de Cataluña

Las 54 que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES

20 TÓXICAS

9 MORTALES

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa · candeleta

TÓXICA ●●○ MEDIA

E F M A M J J A **S O N D**

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas a crema, bajan por el pie
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
En prados
0–2000 m; sobre todo 300–1000 m
Prados, céspedes, claros herbosos.

RASGOS DE ALARMA
- ! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.
- ! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).
- ! Esporada blanca (no rosada).

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

SE CONFUNDE CON

Senderuela *cama-sec* **COMESTIBLE** El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes. → p. 22

Molinera *moixernó blanc de tardor* **COMESTIBLE** Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina.

Champiñón silvestre *camperol* **COMESTIBLE** Láminas libres rosadas a pardas. → p. 16

COMPRUEBE Láminas.

Barbuda

Coprinus comatus · bolet de tinta

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

E F M A M J J A **S O N D**

Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.



1 Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado
2 Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por dentro.
3 Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas → rosadas → negras
- ✓ **Anillo** fino, se desliza
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** negra

DÓNDE
En prados
0–1500 m; sobre todo 200–1000 m
Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).
- ✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
- ✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Bolet de femer **TÓXICA** Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada.

Coprí garsa **NO COMESTIBLE** Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

COMPRUEBE Color y superficie del sombrero.

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.**
2. **Saque la seta entera, con la base del pie.**
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.**
4. **No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.**
5. **Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.**
6. **Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.**
7. **No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata…).**
8. **Las apps de fotos orientan, pero no deciden.**
9. **Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.**
10. **Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.**
11. **Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.**
12. **Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.**

CÓMO LEER LAS FICHAS

COMESTIBLE TÓXICA MORTAL	Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen.
●●○ Media	Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil.
E F M A M J J A **S O N** D	Meses en que sale; en claro, solo algunos años.
✓ ✗ ◐	Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte.
🌲 🌳 ⛰ 🛶	Dónde: pinos y abetos, árboles de hoja ancha, prados, madera, altitud.
●●○ Grave	En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal.
→ *p. 12*	Página de la seta con la que se confunde.

EMPIEZAN EN LA PÁGINA ■ Comestibles *4* ■ Tóxicas *26* ■ Mortales *42* ■ Árboles *51*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura**. Uso personal o sin ánimo de lucro.

DÓNDE BUSCAR

Árboles y sus setas

Reconocer el árbol por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.

Pino carrasco — pi blanc

Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido.

BUSQUE Níscalos *4*, Boleto granulado *8*, Cama de perdiu *9*, Negrilla *18*, Babosa negra y carlet *21*

CUIDADO Cualbra morada *28*

Pino piñonero — pi pinyer

Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.

BUSQUE Níscalos *4*, Boleto granulado *8*, Cama de perdiu *9*, Negrilla *18*

CUIDADO Pota de cavall groga *31*, Seta de los caballeros *36*, Cualbra morada *28*

Pino laricio — pinassa

Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.

BUSQUE Níscalos *4*, Seta coliflor *6*, Boleto granulado *8*, Cama de perdiu *9*, Trompetas negra y amarilla *11*, Negrilla *18*

CUIDADO Cualbra morada *28*

Pino silvestre — pi roig

Copa irregular y alta.

BUSQUE Níscalos *4*, Seta coliflor *6*, Boleto *7*, Boleto granulado *8*, Cama de perdiu *9*, Rebozuelo *10*

CUIDADO Paxilo *42*, Falsa colmenilla *50*, Amanita pantera y matamoscas *33*, Seta de los caballeros *36*, Fredolic metzinós *37*, Cualbra morada *28*

Encina — alzina

Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate.

BUSQUE Carbonera *5*, Rebozuelo *10*, Trompetas negra y amarilla *11*, Lengua de vaca *12*, Oronja *13*, Babosa negra y carlet *21*

CUIDADO Paxilo *42*, Oronja verde *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Boleto de Satanás *29*

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Champiñón silvestre

Agaricus campestris · camperol

E F M A **M J** J A **S O N** D

1. En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.
2. Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un…
3. Gírelo siempre: láminas rosadas y pie blanco sin volva.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** rosa vivo → pardo chocolate
- ✓ **Anillo** fino, se pierde pronto
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** pardo chocolate

DÓNDE

- ⛰ En prados
- ⛰ 0–2000 m; sobre todo 200–1000 m

Pastos con ganado, prados de siega.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
- ✓ Sin volva en la base.
- ✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
- ✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cogomassa MORTAL
Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 44

Bola de neu pudent TÓXICA
Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie. → p. 35

Fals carlet TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia. → p. 39

COMPRUEBE Láminas y base.

Fredolic metzinós

TÓXICA ●●○ MEDIA

Tricholoma pardinum

E F M A M J J **A S O** N D

1. Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.
2. Sombrero escamoso y pie robusto y lleno
3. Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blanquecinas, reflejo verdoso
- ✗ **Anillo** ✗ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

- 🌲 Abeto blanco y pino silvestre
- 🌳 Haya
- ⛰ 800–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

- ! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).
- ! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
- ! Olor a harina.

OLOR A harina.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

SE CONFUNDE CON

Negrilla *fredolic* COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 18

Capuchina *fredolic gros* COMESTIBLE
Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

COMPRUEBE Tamaño y escamas.

Falsa colmenilla

MORTAL ●○○ FÁCIL

Gyromitra esculenta · bolet de greix · murga

E F M **A** **M** **J** J A S O N D

Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).

CÓMO ES

✕ **Láminas** sombrero arrugado, como un cerebro

DÓNDE

Pino silvestre, abeto blanco y pino negro

Sobre madera

600–2200 m; sobre todo 1000–1800 m

Coníferas de montaña.

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

SÍNDROME GIROMITRIANO Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

SE CONFUNDE CON

Colmenilla *múrgola* CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 25

Colmenilla negra *múrgola* CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

ANTES DEL NOMBRE

Cómo mirar una seta

Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.



1 **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

2 **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

3 **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

4 **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

5 **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

6 **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO

Láminas
Hojas finas, como un libro

Tubos
Una esponja de agujeritos



Pliegues
Venas gruesas, no hojas

Aguijones
Púas blandas

Interior
Una bola: córtela

LA EDAD CUENTA



Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Seta de los caballeros

Tricholoma equestre · verderol · groguet

E F M A M J J A S **O** **N** **D**



1 Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie. 2 Debajo: láminas amarillo azufre. 3 Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el centro.

CÓMO ES

✓ **Láminas** amarillo azufre

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

DÓNDE

Pino piñonero, silvestre y rodeno

En prados

0–1700 m; sobre todo 400–1500 m

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillo azufre intenso.

! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.

! Pie amarillo.

OLOR A harina débil.

GRAVEDAD ●●○ Grave. Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura.

SE CONFUNDE CON

Capuchina *fredolic gros* COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras.



Oronja verde *farinera borda* MORTAL Láminas blancas, anillo y volva. → p. 43

COMPRUEBE Sombrero.

Pedo de lobo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Lycoperdon perlatum · pet de llop

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** **D**

Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.

1 Joven, blanco y lleno de verrugas 2 De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden. 3 Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

CÓMO ES

✕ **Láminas** una bola: por dentro, blanca y firme

DÓNDE

En prados

0–2000 m; sobre todo 400–1100 m

Bosques de todo tipo y sus bordes.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.

✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Oronja verde *farinera borda* MORTAL Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie). → p. 43

Pota de cavall groga TÓXICA Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa. → p. 31

COMPRUEBE Corte longitudinal.

Níscalos

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

Lactarius sanguifluus y *L. deliciosus* · rovelló, pinetell

Casi iguales y los dos comestibles excelentes. Lo que los separa es el color del látex al cortarlos.

1 De sangre: naranja vinoso, con pocas zonas. 2 Níscalo: zonas bien marcadas.
3 Níscalo: láminas naranja vivo.

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex** 0–2100 m de altitud

E F M A M J J A **S O N D**

	Níscalo de sangre	Níscalo
LÁTEX	Rojo vino desde el primer momento	Naranja zanahoria; no pasa a vino
LÁMINAS	Rosa vinoso o lila	Naranja vivo
DÓNDE	Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media	Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías

LOS DOS

✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
✓ Siempre bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Paxilo *paxil·le tòxic* MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde). → p. 42

Enganyapastors de llet groga TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 26

COMPRUEBE Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.

Cortinari metzinós

MORTAL ●●○ MEDIA

Cortinarius orellanus · bolet de mantellina

E F M A M J J A **S O N** D

1 Sombrero naranja... 2 Láminas color herrumbre, espaciadas. 3 Pie amarillento y fibroso

CÓMO ES

✓ **Láminas** amarillo anaranjadas → herrumbre
◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
✗ **Volva**

DÓNDE

Roble pubescente, castaño y encina
100–1500 m de altitud
Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
! Esporada pardo herrumbre.
! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

SÍNDROME ORELLÁNICO Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida.

SE CONFUNDE CON

Rebozuelo *rossinyol* COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas. → p. 10

Camagroc COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

COMPRUEBE **Parte inferior.**

Negrilla

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Tricholoma terreum · fredolic · negret

E F M A M J J A S **O N D**

1 En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.
2 Debajo: láminas blanquecinas o grisáceas y pie blanco. 3 Sombrero gris ratón

CÓMO ES

✓ **Láminas** blancas a gris pálido
◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
✗ **Volva**
● **Esporada** blanca

DÓNDE

Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero
0–1800 m; sobre todo 300–1000 m
Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.
✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

OLOR Débil, no harinoso.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Fredolic metzinós TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas... → p. 37

Tricholoma virgatum* / *T. sciodes TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo.

***Inocybe* (varias especies grises)** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada...

COMPRUEBE Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

Bola de neu pudent

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Agaricus xanthodermus

E F M A **M J** J A **S O N** D

1 Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.
2 Láminas rosa grisáceo de joven; se confunde fácilmente con... 3 Vieja: láminas pardo oscuro.

CÓMO ES

✓ **Láminas** rosadas → pardas
✓ **Anillo** grueso
✗ **Volva**
● **Esporada** pardo chocolate

DÓNDE

En prados
0–1500 m; sobre todo 200–500 m
Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

RASGOS DE ALARMA

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.
! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.
! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

OLOR Desagradable (tinta, fenol).

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON

Champiñón silvestre *camperol* COMESTIBLE No amarillea y huele bien. → p. 16

Bola de nieve *bola de neu* COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo.

COMPRUEBE Base del pie.

MORTAL ●●○ MEDIA

Inosperma erubescens

E F M A **M J J** A S O N D

Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.

1 Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso. 2 Algunas se manchan de rojo...

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blanquecinas → pardas, manchas rojas
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** parda

DÓNDE
En prados
0–1500 m de altitud
Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
- ! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
- ! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

GRAVEDAD ●●● Mortal. Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión.

SE CONFUNDE CON

Perrechico *moixernó* COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 20

COMPRUEBE Sombrero, manchas rojas y olor.

Carbonera

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Russula cyanoxantha · llora · llora morada

E F M A M **J J A S O N** D

Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).

2 Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base. 3 Carbonera (R. cyanoxantha)

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas, flexibles y grasas
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
Haya, castaño, encina y alcornoque y otros
50–1700 m; sobre todo 300–1100 m
Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).
- ✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde *farinera borda* MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 43

Russula sardonia TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.

Cualbra morada NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante. → p. 28

COMPRUEBE Base del pie (desentiérrela) y anillo.

Lepiota pudent

TÓXICA ●●○ MEDIA

Lepiota cristata

E F M A M J J **A S O N** D

Tóxica (gastrointestinal). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.

2 Lepiota cristata 3 L. cristata de cerca

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** fino, frágil
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
En prados
0–1600 m; sobre todo 300–1000 m
Hojarasca, jardines y bordes de camino.

RASGOS DE ALARMA
- ! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
- ! Olor desagradable, a goma o gas.
- ! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

GRAVEDAD ●○○ Moderada. Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

SE CONFUNDE CON

Parasol *apagallums* COMESTIBLE Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado. → p. 14

COMPRUEBE Tamaño.

Pie azul

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Lepista nuda · pimpinella morada

E F M A M J J A S **O N D**

Comestible, siempre bien cocinado: en crudo o poco hecho provoca trastornos digestivos (parte A del anexo del RD 30/2009).



1 En su punto 2 Debajo 3 De cerca: láminas y pie violetas.

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** violeta lila
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** rosada pálida

DÓNDE
En prados
0–1800 m; sobre todo 300–1000 m
Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
- ✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
- ✓ Sin cortina ni anillo.
- ✓ Olor afrutado o perfumado.

OLOR Afrutado, perfumado.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...) TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes.

Barret de bruixa TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas. → p. 41



Mycena pura TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano. → p. 41

COMPRUEBE Esporada y parte alta del pie.

Seta coliflor

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Sparassis crispa · peu de rata de pi · greixa

E F M A M J J A **S** **O** **N** D

Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.

1 Una bola como una coliflor, al pie de un pino.
2 De cerca: lóbulos planos y ondulados, como fideos anchos. 3 Crema pálido, entre la pinaza.

CÓMO ES

✕ **Láminas** lóbulos rizados, como una coliflor
● **Esporada** blanca a crema

DÓNDE

Pino silvestre, laricio y rodeno
Sobre madera
100–1800 m; sobre todo 300–1500 m
Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.
✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.
✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Peu de rata bord TÓXICA Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios. → p. 32

Coliflor rosa *peu de rata col-i-flor* CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

COMPRUEBE Forma de las ramas.

Galerina marginada

MORTAL ●●● MEDIA

Galerina marginata · galerina metzinosa

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

1 Setas pardo miel en grupo... 2 Pie delgado con un anillo... 3 Láminas pardo herrumbre y...

CÓMO ES

✓ **Láminas** amarillentas → pardo herrumbre
✓ **Anillo** fino
✕ **Volva**

DÓNDE

Sobre madera
0–2000 m; sobre todo 400–1300 m
Madera muerta de coníferas y planifolios.

RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
! Anillo fino pardo en el pie.
! Esporada pardo herrumbre.
! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

SE CONFUNDE CON

Seta de chopo *pollancró* COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 24

Kuehneromyces mutabilis COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

COMPRUEBE **Tamaño y árbol.**

Perrechico

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Calocybe gambosa · moixernó · bolet de Sant Jordi

E F M **A** **M** **J** J A S O N D

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

CÓMO ES

✓ **Láminas** blancas a crema, muy juntas
✕ **Anillo** ✕ **Volva**
● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados
400–2000 m; sobre todo 500–1200 m
Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

OLOR Intenso a harina fresca.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Inosperma erubescens MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 48

Cogomassa MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 44

Fals carlet TÓXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 39

COMPRUEBE Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

TÓXICAS ●●○ MEDIA

Amanita pantera y matamoscas

Amanita pantherina y *A. muscaria* · pixacà, reig bord

1 Matamoscas: rojo con verrugas blancas. 2 Amanita pantera: parda con verrugas blancas.
3 Amanita pantera: bulbo con reborde, como un calcetín.

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva** 0–2200 m de altitud

E F M A M J **A** **S** **O** **N** D

	Amanita pantera	Matamoscas
SOMBRERO	Pardo; verrugas blanco puro, en círculos	Rojo o naranja, más grande
BASE	Bulbo con reborde, como un calcetín	Bulbo con anillos de volva
DÓNDE	Pinares, robledales, hayedos, encinares	Pinares y abedulares de montaña

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

! Verrugas blancas en el sombrero (la lluvia puede borrarlas).
! Láminas y pie blancos; bulbo en la base.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones y somnolencia; vómitos.

SE CONFUNDE CON



Parasol *apagallums* COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 14

Oronja *ou de reig* COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca. → p. 13

COMPRUEBE Láminas blancas, anillo y volva: descártela (la oronja las tiene amarillas).

Lepiota metzinosa

MORTAL ●●○ MEDIA

Lepiota brunneoincarnata · palometa

E F M A M J J A S O N D

1 Pequeña, sombrero con... 2 Pie rosado con bandas y... 3 Sombrero con escamas en...

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas a crema
- ◑ **Anillo** solo una zona algodonosa
- ✕ **Volva**

DÓNDE

En prados

0–900 m; sobre todo por debajo de 300 m

Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
! Láminas blancas, libres.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

SE CONFUNDE CON

Parasol *apagallums*
COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y... → p. 14

Senderuela *cama-sec*
COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas. → p. 22

COMPRUEBE **Tamaño, anillo y pie.**

Boleto

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Boletus edulis · cep · sureny

E F M A M J J A S O N D

1 En su punto 2 Jóvenes, redondos como tapones de... 3 Ceps recolectados en la cesta de...

CÓMO ES

- ✓ **Tubos** blancos, luego amarillo verdosos
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE

Pino silvestre, abeto blanco y pícea

Haya, castaño y roble albar

600–2000 m; sobre todo 900–1700 m

Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

SABOR Suave, a avellana.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto de Satanás *matagent*
TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo. → p. 29

Boleto amargo *molleric amarg*
NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.

Pie rojo amargo *mataparent amarg*
NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

COMPRUEBE Poros y pie.

Peu de rata bord

TÓXICA ●●○ MEDIA

Ramaria formosa

E F M A M J J A S O N D

Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).

1 Forma de coral, ramas rosa anaranjado. 2 Base blanca y gruesa de la que salen las ramas. 3 Puntas de las ramas amarillentas.

CÓMO ES

- ✕ **Láminas** ramas, como un coral
- ● **Esporada** ocre

DÓNDE

Haya, roble pubescente y castaño

200–1600 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios.

RASGOS DE ALARMA

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.
! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

SABOR Algo amargo (no la pruebe).

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

SE CONFUNDE CON

Seta coliflor *peu de rata de pi*
COMESTIBLE Lóbulos aplanados crema, en pinos. → p. 6

Coliflor rosa *peu de rata col-i-flor*
CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

COMPRUEBE Forma.

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

Babosa negra y carlet

Hygrophorus latitabundus y *H. russula* · llenega negra

1 Babosa negra: oscura, brillante y viscosa. 2 Carlet: rosa con manchas vinosas. 3 Láminas blancas, espaciadas, como de cera.

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva** 0–1500 m de altitud

E F M A M J J A S O N D

	Babosa negra	Carlet
SOMBRERO	Pardo oscuro a casi negro, con mucha baba	Rosa vinoso con manchas, poco viscoso
LÁMINAS	Blancas, espaciadas	Blancas, se manchan de vinoso
PIE	Abajo, con una funda de baba gris	Robusto, con manchas vinosas
DÓNDE	Bajo pinos, en suelo calizo	Bajo encinas y robles

LOS DOS

✓ Láminas blancas, gruesas y céreas: como de cera al tocarlas.
✓ Esporada blanca.
✓ Salen tarde: de octubre a diciembre.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Fals carlet TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada). → p. 39

Llenega borda NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre).

COMPRUEBE Láminas blancas: si con la edad se vuelven rosa salmón o pardo herrumbre, no es ninguna de las dos.

Boleto granulado

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Suillus granulatus · molleric · molleric granellut

E F M A M J J A **S O N** D

Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).

1 En su punto 2 Poros amarillos con gotitas blancas
3 Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

CÓMO ES
- ✓ **Tubos** amarillos, con gotitas de jóvenes
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo ocre

DÓNDE
- Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero y otros
- 0–1800 m; sobre todo 400–1500 m

Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
- ✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
- ✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
- ✓ Bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto picante *molleric pebrer* NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.

Molleric de bou SIN INTERÉS Poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes; sin granulaciones.

Molleric COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.

COMPRUEBE Color de los poros.

Farinera pudent

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita virosa

E F M A M J J **A S O** N D

Mortal (amatoxinas).

1 Toda blanca, con anillo y volva. 2 Láminas blancas. Un champiñón...
3 Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, frágil
- ✓ **Volva** en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
- Haya y abedul
- 500–1800 m de altitud

Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

RASGOS DE ALARMA
- ! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
- ! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
- ! Volva blanca en saco.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

SE CONFUNDE CON

Bola de nieve *bola de neu* COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva.

COMPRUEBE **Láminas y base.**

Senderuela

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Marasmius oreades · cama-sec · carrereta

E F M **A M J** J A **S O N** D

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.

1 En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.
2 La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.
3 Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** crema, muy separadas
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
- En prados
- 0–2200 m; sobre todo 200–1400 m

Corros de hierba más verde o más seca en prados.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
- ✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
- ✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
- ✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

OLOR Débil, a almendra amarga.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Lepiota metzinosa MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 46

Clitocibe blanc TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 38

Inocybe (especies de prado) TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

COMPRUEBE Sombrero.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

E F M A M J J **A S O N** D

1 Bola de piel gruesa, amarillenta y escamosa. 2 Cortada 3 Interior oscuro con vetas claras.

CÓMO ES
- ✕ **Láminas** una bola: por dentro, negra violácea

DÓNDE
- Pino piñonero
- Alcornoque, encina y castaño
- 0–1200 m; sobre todo 200–1000 m

RASGOS DE ALARMA
- ! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.
- ! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

GRAVEDAD ●●○ Grave. Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

SE CONFUNDE CON

Pedo de lobo *pet de llop* COMESTIBLE El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes. → p. 17

Bejín gigante *pet de llop gegant* COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina.

Trufa negra *tòfona negra* COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

Cogomassa

MORTAL ●●● MEDIA

Amanita verna

E F M **A M J** J A **S O** N D

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
- Encina, roble pubescente y alcornoque
- 0–900 m de altitud

Encinares y robledales mediterráneos.

RASGOS DE ALARMA
- ! Seta enteramente blanca.
- ! Volva blanca en saco en la base.
- ! Anillo membranoso blanco.
- ! Láminas blancas, libres.

GRAVEDAD ●●● Mortal. Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

SE CONFUNDE CON

Perrechico *moixernó* COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y... → p. 20

Champiñón silvestre *camperol* COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 16

COMPRUEBE Base y pie.

Cama de perdiu

COMESTIBLE ●●● MEDIA

Chroogomphus rutilus · pota de perdiu

E F M A M J J A **S O N D**

Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.

1 En su punto 2 Debajo: láminas gruesas, espaciadas y muy decurrentes. 3 Carne y pie de color naranja salmón.

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** gruesas, ocre → púrpura negruzco
- ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** negra o gris negruzca

DÓNDE
- Pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero
- 0–1800 m; sobre todo 400–1200 m

Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
- ✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
- ✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
- ✓ Bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 49

Falso rebozuelo *falsrossinyol* NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca. → p. 30

Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

COMPRUEBE Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

Falsos rebozuelos

TÓXICAS ●○○ FÁCIL

Hygrophoropsis aurantiaca y *Omphalotus olearius* · falsrossinyol, gírgola d'olivera

1 Seta de olivo: en ramillete sobre un tocón. 2 Falso rebozuelo: pequeño y todo naranja. 3 Láminas finas, apretadas y ramificadas.

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** 0–1800 m de altitud

E F M A M J J A **S O N D**

	Falso rebozuelo	Seta de olivo
TAMAÑO	Pequeño (2–8 cm), carne delgada y blanda	Grande (5–15 cm) y carnoso
CÓMO SALE	Suelto, en la pinaza o sobre madera podrida de pino	En ramilletes de pies unidos, sobre tocones y raíces de olivo, encina o castaño

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS
- ! Láminas verdaderas: finas, apretadas y que bajan por el pie.
- ! Todo naranja: sombrero, láminas y pie.
- ! Pase el dedo por debajo: las láminas se separan; los pliegues del rebozuelo, no.

SETA DE OLIVO ●●○ Grave. Irrita el estómago y el intestino.

FALSO REBOZUELO ●○○ Leve. No comestible: puede sentar mal.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

SE CONFUNDE CON

Rebozuelo *rossinyol* COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas), carne gruesa y firme, color yema de huevo. → p. 10

COMPRUEBE Debajo del sombrero: láminas finas, falso; pliegues gruesos y romos, rebozuelo.

Seta de cardo

COMESTIBLE ●●● MEDIA

Pleurotus eryngii · gírgola de panical

E F M **A M** J J A S **O N D**

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

1 En su punto 2 Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes. 3 Sombrero y láminas

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blanquecinas, bajan por el pie
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
- En prados
- 0–1200 m de altitud

Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.
- ✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
- ✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Clitocibe blanc TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 38

Fals carlet TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 39

COMPRUEBE Color y base.

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D

1 En su punto 2 Debajo 3 De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 49

Seta de olivo *gírgola d'olivera* TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 30

Falso rebozuelo *fals rossinyol* NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda. → p. 30

COMPRUEBE Parte inferior.

Oronja verde

MORTAL ●●● MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde *llorra verda* COMESTIBLE La llorra verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera *llorra* COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 5

COMPRUEBE **Base y pie.**

Seta de chopo

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Cyclocybe cylindracea · pollancró

E F M **A M J** J A **S O N** D

Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** crema → pardo tabaco
- ✓ **Anillo** membranoso
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo tabaco

DÓNDE
- Chopo negro y álamo blanco
- En prados
- Sobre madera
- 0–1200 m; sobre todo por debajo de 300 m

Riberas, choperas y parques.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
- ✓ Anillo membranoso en el pie.
- ✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
- ✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Galerina marginada MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre. → p. 47

Bolet de pi TÓXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo. → p. 40

COMPRUEBE Tamaño y árbol.

Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs

E F M A M J **J A S O** N D

1 Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo. 2 Debajo 3 De cerca: poros rojo anaranjado.

CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON

Boleto reticulado *cep d'estiu* COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.

Boleto negro *sureny fosc* COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

Paxilo

MORTAL ●●● MEDIA

Paxillus involutus · paxil·le tòxic · paxil enrotllat

E F M A M J J A S O N D

1 Sombreros pardos en grupo 2 Margen del sombrero muy enrollado. 3 Debajo

CÓMO ES

✓ **Láminas** ocre, se manchan de pardo
✕ **Anillo** ✕ **Volva**
● **Esporada** pardo ocre

DÓNDE

Pino silvestre
Abedul, encina y castaño
0–1900 m; sobre todo 400–1400 m

RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.
! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.
! Sin látex.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

SÍNDROME HEMOLÍTICO Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y...

SE CONFUNDE CON

Níscalo de sangre *rovelló* COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea. → p. 4

Níscalo *pinetell* COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 4

Platera *pampa* COMESTIBLE La pampa es crema ocrácea con mamelón y no se mancha de pardo.

COMPRUEBE **Corte: látex o no.**

COMESTIBLES ●○○ FÁCIL

Trompetas negra y amarilla

Craterellus cornucopioides y C. lutescens · trompeta de la mort, camagroc

1 Trompeta de los muertos: negra, en grupo. 2 Angula de monte: pie amarillo y sombrero pardo. 3 Por debajo, liso o con venas bajas.

✕ **Láminas** 100–1800 m de altitud

E F M A M J J A S O N D

	Trompeta de los muertos	Angula de monte
COLOR	Negra o gris muy oscuro, toda ella	Sombrero pardo; pie amarillo anaranjado vivo
POR DEBAJO	Gris ceniza, liso o apenas arrugado	Rosado anaranjado o amarillo, con venas muy bajas
DÓNDE	Hojarasca húmeda de hayedos, encinares y castañares	Musgo húmedo de pinares y abetales, cerca del agua

LOS DOS

✓ Sin láminas: por debajo, lisas o con venas muy bajas.
✓ Huecas hasta abajo, en forma de embudo o trompeta.
✓ Carne delgada y elástica.
✓ Salen en grupo, a menudo muchas juntas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Falso rebozuelo *fals rossinyol* NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo. → p. 30

Orella de gat negra CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

COMPRUEBE Mire por debajo: si tiene láminas finas y apretadas, no es ninguna de las dos.

Cualbra morada

NO COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Russula torulosa · escaldabec vinós

E F M A M J J A S O N D

1 Sombrero púrpura oscuro y pie teñido de... 2 Debajo 3 De lado: pie teñido de púrpura.

CÓMO ES

✓ **Láminas** crema pálido, frágiles
✕ **Anillo** ✕ **Volva**
● **Esporada** crema

DÓNDE

Pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero
0–1600 m; sobre todo 300–900 m
Pinares mediterráneos y de montaña media.

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.
! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.
! Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

SABOR Muy picante (no la pruebe).

GRAVEDAD ●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

SE CONFUNDE CON

Níscalo de sangre *rovelló* COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que verdean y pie hueco con hoyuelos. → p. 4

Carbonera *llora* COMESTIBLE La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas, sabor suave y crece bajo planifolios. → p. 5

Escaldabec de pineda NO COMESTIBLE Sombrero rojo sangre o rosado, sin tonos púrpura oscuro; láminas algo decurrentes.

COMPRUEBE Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.

Colmenilla

CONDICIONADA ●●○ MEDIA

Morchella esculenta · múrgola · rabassola

E F M A M J J A S O N D

Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.

CÓMO ES

✕ **Láminas** sombrero con alvéolos, como un panal
● **Esporada** crema ocrácea

DÓNDE

En prados
0–1600 m; sobre todo 200–1200 m
Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.
✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Falsa colmenilla *bolet de greix* MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. → p. 50

Verpa bohemica TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.

Colmenilla negra *múrgola* CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica.

COMPRUEBE Corte longitudinal.

Lengua de vaca

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Hydnum repandum · llengua de bou · llémena

E F M A M J J A S O N D

Los ejemplares viejos amargan.

1 En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.
2 Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas. 3 Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

CÓMO ES
- ✓ **Aguijones** blandos, crema anaranjados
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, haya, castaño y roble pubescente
- 0–1800 m; sobre todo 400–1000 m

Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
- ✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
- ✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

SABOR Suave; amargo en ejemplares viejos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Hydnellum* / *Sarcodon NO COMESTIBLE
Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.

Picornell de pi COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie.

COMPRUEBE Consistencia de la carne.

TÓXICAS ●●○ MEDIA

Pequeñas con muscarina

Inocybe geophylla y Mycena pura

E F M A M J J A S O N D

Pequeñas, blancas o lilas; las lilas se confunden con el pie azul.

1 Barret de bruixa: blanco, con un pico en el centro. 2 Mycena pura: lila, borde con rayas.
3 Mycena pura, entre la pinaza.

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** 0–2000 m de altitud

	Barret de bruixa	Mycena pura
COLOR	Blanco sedoso, a veces lila	Lila o rosado; borde con rayas
FORMA	Cónico, con pico; fibras que se agrietan	Acampanado; pie hueco y frágil
OLOR	A tierra	A rábano

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS
- ! Pequeñas: de 1 a 5 cm.
- ! En la hojarasca de pinares, hayedos y bosques mixtos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

SE CONFUNDE CON

Pie azul *pimpinella morada* COMESTIBLE
Mucho mayor y carnosa. → p. 19

Senderuela *cama-sec* COMESTIBLE Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema. → p. 22

COMPRUEBE Tamaño: el pie azul es grande, carnoso y huele a fruta.

Enganyapastors

TÓXICAS ●○○ FÁCIL

Lactarius zonarius y *L. chrysorrheus* · pinetell bord, rovelló bord

E F M A M J J A S O N D

Parecen níscalos, pero su látex es blanco. Los dos son tóxicos.



1 Enganyapastors: zonas como el níscalo. 2 De llet groga 3 Láminas crema, nunca verdes.

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex** 0–1300 m de altitud

E F M A M J J A S O N D

	Enganyapastors	De llet groga
LÁTEX	Blanco, no cambia; muy picante	Blanco que amarillea en segundos
SOMBRERO	Crema a naranja pálido, con zonas	Ocre salmón pálido, con zonas

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS
- ! Látex BLANCO al cortar (en los níscalos es rojo vino o naranja).
- ! Láminas crema que no se manchan de verde.
- ! Bajo encinas, alcornoques y robles; no bajo pinos.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

SE CONFUNDE CON

Níscalo *pinetell* COMESTIBLE Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos. → p. 4

Níscalo de sangre *rovelló* COMESTIBLE Látex rojo vino; bajo pinos. → p. 4

COMPRUEBE Corte el pie: si el látex es blanco, descártela.

Falso níscalo

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Lactarius torminosus · cabra de beç · lleterol de beç

E F M A M J J A S O N D

Tóxica (gastrointestinal). En algunos países del norte se consume tras tratamientos prolongados: esa práctica no la hace segura.

1 Bolet de cabra 2 Debajo 3 El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** crema rosado
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ✓ **Látex** blanco
- ● **Esporada** crema

DÓNDE
- Abedul
- 500–1900 m; sobre todo por debajo de 1600 m

Abedulares y bosques con abedul.

RASGOS DE ALARMA
- ! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
- ! Látex blanco que no cambia.
- ! Siempre bajo abedules.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

SE CONFUNDE CON

Níscalo *pinetell* COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo pinos. → p. 4

Pinetell d'avet COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos.

COMPRUEBE Margen y látex.

Bolet de pi

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Hypholoma fasciculare

E F M A M J J A S O N D

Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** amarillas → verdosas
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo violácea

DÓNDE

En prados
Sobre madera
0–2000 m; sobre todo 400–1100 m
Tocones y madera muerta.

RASGOS DE ALARMA

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

SE CONFUNDE CON

Seta de chopo *pollancró* COMESTIBLE
Crema, anillo membranoso, en chopos.
→ p. 24

Armilaria *alzinoi* CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

COMPRUEBE Color.

Oronja

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Amanita caesarea · ou de reig · reig

E F M A M J J A S O N D

1 En su punto: sombrero naranja, pie amarillo y volva blanca.
2 Láminas y pie AMARILLOS; volva blanca en saco. 3 Joven: sale de un huevo blanco.

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** amarillo dorado
- ✓ **Anillo** amarillo, colgante
- ✓ **Volva** blanca, grande, en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

Encina, alcornoque, roble pubescente y castaño
50–1100 m; sobre todo 200–700 m
Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde *farinera borda*
MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 43

Matamoscas *reig bord*
TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 33

Amanita crocea
CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

COMPRUEBE Corte longitudinal del huevo.

Cómo montar el cuaderno

1. **Imprime a doble cara**, «voltear por el borde largo», a **tamaño real (100 %)**.
2. **Corta** todas las hojas por la mitad, por la línea de puntos ✂.
3. **Ordena las mitades** por el número pequeño de abajo: la 1 encima del todo, con los números a la vista.
4. **Dobla el montón** por la mitad, hacia atrás, para que la primera página quede por fuera.
5. **Grapa por el pliegue** (2 grapas) o cóselo con hilo por 3 agujeros.

Esta media hoja sobra: puedes tirarla o usarla de punto de libro.

Parasol

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Macrolepiota procera · apagallums · cogomella

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D

1 En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.
2 Pie con dibujo de piel de serpiente 3 Debajo

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas a crema
- ✓ **Anillo** doble, se desliza
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

En prados
0–1800 m; sobre todo 200–1100 m
Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.
✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

OLOR Agradable, a avellana.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Lepiota metzinosa MORTAL
Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado.
→ p. 46

Amanita pantera *pixacà*
TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso.
→ p. 33

Apagallums CONDICIONADA
Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

COMPRUEBE Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

Fals carlet

TÓXICA ●●○ MEDIA

Entoloma sinuatum · carlet bord

E F M A M J J A **S** **O** **N** D

1 Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.
2 Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa salmón. 3 Adulto

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** amarillentas → rosa salmón
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** rosada

DÓNDE

Roble pubescente, haya y castaño
100–1500 m; sobre todo 200–800 m
Bosques de planifolios.

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.
! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

OLOR A harina rancia.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

SE CONFUNDE CON

Carlet COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas.
→ p. 21

Perrechico *moixernó*
COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas.
→ p. 20

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas.