

CISTELLA SEGURA · CATALUÑA

Setas comestibles *esenciales* de Cataluña

Las 80 setas que hay que conocer en Cataluña, a fondo: cómo reconocerlas, cómo son, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

● 47 COMESTIBLES ● 24 TÓXICAS ● 9 MORTALES

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.** Conocer una especie significa saber reconocer todos sus rasgos decisivos y todas las especies peligrosas con las que se confunde.

2. **Extraiga el ejemplar entero.** La base del pie (volva, bulbo, micelio) es imprescindible para descartar amanitas mortales.

3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.** En un mismo corro pueden crecer mezcladas una comestible y una tóxica (por ejemplo, el cama-sec y los clitocibes blancos).

4. **No mezcle especies en la cesta** y lleve las dudosas aparte, envueltas en papel.

5. **Deseche los ejemplares viejos, agusanados, empapados, helados o muy jóvenes.** Los viejos se descomponen y pueden causar intoxicaciones aunque la especie sea comestible; los botones muy jóvenes aún no muestran los rasgos de identificación.

6. **Use una cesta rígida y ventilada**, nunca bolsas de plástico, que aceleran la descomposición.

7. **No crea en pruebas caseras.** El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.

8. **Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas.** Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.

9. **Ante cualquier duda, consulte a un micólogo** (sociedades micológicas y sus exposiciones), con el ejemplar entero y fresco, nunca solo con una foto.

10. **Cocine siempre las setas.** Muchas comestibles son tóxicas en crudo o poco hechas: colmenillas, pie azul, armilaria, amanita vinosa, mataparents.

11. **Guarde un ejemplar crudo** de cada especie en la nevera hasta el día siguiente: si alguien se encuentra mal, servirá para identificarla.

12. **Evite lugares contaminados**: cunetas de carreteras, zonas industriales, vertederos, campos tratados.

ANTES DEL NOMBRE

Cómo mirar una seta

Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.



1 **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

2 **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

3 **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

4 **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

5 **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

6 **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO

Láminas
Hojas finas, como un libro

Tubos
Una esponja de agujeritos

Pliegues
Venas gruesas, no hojas

Aguijones
Púas blandas

Interior
Una bola: córtela

LA EDAD CUENTA

Una comestible vieja o pasada también intoxica. Cójala joven y firme. (Níscalo de sangre)

Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

Níscalos

Lactarius sanguifluus y *L. deliciosus* · rovelló, pinetell

Casi iguales y los dos comestibles excelentes. Lo que los separa es el color del látex al cortarlos.

De sangre: naranja vinoso, con pocas zonas.

Níscalo: zonas bien marcadas.

Níscalo: láminas naranja vivo.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2100 m de altitud

	Níscalo de sangre	Níscalo
LÁTEX	Rojo vino desde el primer momento	Naranja zanahoria; no pasa a vino
LÁMINAS	Rosa vinoso o lila	Naranja vivo
DÓNDE	Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media	Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías

LOS DOS

✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
✓ Siempre bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Paxilo MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne. → p. 61

Enganyapastors de llet groga TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 39

Enganyapastors TÓXICA Látex blanco inmutable y muy picante; láminas crema; no verdea; bajo planifolios. → p. 40

COMPRUEBE Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Lactarius semisanguifluus

E F M A M J J A **S** **O** **N** D Láminas Sin anillo Sin volva

300–1700 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Látex naranja al cortar que se vuelve rojo vinoso en 5–10 minutos.

✓ Láminas naranja, que verdean.

✓ Pie hueco con escrobículas.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y carrasco. Pinares, a menudo sobre suelos calcáreos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Enganyapastors de llet groga TÓXICA Látex blanco que amarillea en segundos; sin verdeo; bajo planifolios. → p. 39

Níscalo COMESTIBLE En el pinetell el látex sigue naranja durante bastante más tiempo. → p. 4

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pinetell d'avet

Lactarius salmonicolor

E F M A M J J **A** **S** **O** N D Láminas Sin anillo Sin volva

900–1900 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Crece exclusivamente bajo abetos (Abies alba).

✓ Látex naranja que no vira a rojo vino.

✓ Pie con escrobículas, hueco.

DÓNDE Con abeto blanco. Abetales puros o mixtos con haya y pino silvestre.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Falso níscalo TÓXICA Margen lanoso, látex blanco; bajo abedul. → p. 41

Níscalo COMESTIBLE Bajo pinos y con manchas verdes abundantes. → p. 4

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Carbonera

Russula cyanoxantha · llora · llora morada

Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).

Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.

Carbonera (R. cyanoxantha)

E F M A M **J J A S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 50–1700 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).

✓ Sin anillo ni volva.

✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–15 cm, convexo y luego deprimido; violeta, púrpura, azul grisáceo, verde oliva, a menudo mezclados en el mismo ejemplar; liso, brillante y algo viscoso con humedad.

DEBAJO Láminas apretadas, blancas, flexibles y lardáceas (grasas al tacto).

PIE 5–10 × 1,5–3 cm, blanco, a veces teñido de violeta, firme.

CARNE Blanca, firme.

DÓNDE Con haya, castaño, encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 62

- ***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.

Cualbra morada NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante. → p. 42

COMPRUEBE Base del pie (desentiérrela) y anillo.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *barba de cabra*

Seta coliflor

Sparassis crispa · peu de rata de pi · greixa

Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.

Una bola como una coliflor, al pie de un pino.

De cerca

Crema pálido, entre la pinaza.

E F M A M J J A **S O N** D ● Ramificado Sin anillo Sin volva 100–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.
- ✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.
- ✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

CÓMO ES

SOMBRERO Sin sombrero: masa de lóbulos laminares ondulados, crema a amarillo ocre.

DEBAJO Himenio liso sobre los lóbulos.

PIE Base gruesa común, enraizada.

CARNE Blanca, elástica, olor agradable.

ESPORADA Blanca a crema.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y rodeno. **Sobre madera.** Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Peu de rata bord TÓXICA Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios. → p. 46

Coliflor rosa CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

COMPRUEBE Forma de las ramas.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *hongo blanco*

Boleto

Boletus edulis · cep · sureny

Deseche los ejemplares viejos, blandos o con los tubos verdes y esponjosos, que se degradan con rapidez.

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.

Jóvenes, redondos como tapones de corcho

Ceps recolectados en la cesta de mimbre.

E F M A M J J **A S O** N D Tubos Sin anillo Sin volva 600–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.

✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).

✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

CÓMO ES

SOMBRERO 8–25 cm, hemisférico y luego convexo; pardo claro a castaño, con el borde a menudo blanquecino; liso, algo viscoso con humedad.

DEBAJO Tubos blancos, luego amarillo verdosos; poros pequeños y redondos del mismo color; se separan fácilmente de la carne.

SABOR Suave, a avellana.

DÓNDE Con haya, castaño, roble albar, pino silvestre y abeto blanco y otros. Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto de Satanás TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente. → p. 43

Boleto amargo NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.

Pie rojo amargo NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

COMPRUEBE Poros y pie.

En su punto

Debajo

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Gorro verde

Russula virescens · llora verda

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

50–1500 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Cutícula verde agrietada en pequeñas placas (aspecto de mosaico o de piel de lagarto), seca y mate.
- ✓ Láminas blancas o crema; sin anillo y SIN volva: desentierre la base completa para comprobarlo.
- ✓ Carne blanca, firme, quebradiza como la tiza.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde MORTAL La farinera borda tiene anillo en el pie y una volva membranosa en la base, a menudo enterrada; su sombrero es liso, satinado, con fibras radiales, no agrietado en… → p. 62

Carbonera COMESTIBLE La carbonera tiene la cutícula lisa y brillante y láminas flexibles y grasas al tacto. → p. 6

Joven

Adulto

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Boleto negro

Boletus aereus · sureny fosc

E F M A M J J A S O N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

50–1200 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero pardo muy oscuro, casi negro, seco y aterciopelado, a veces con tonos bronce.
- ✓ Poros blancos y luego amarillo verdosos; carne blanca inmutable.
- ✓ Pie robusto, pardo, con retículo pardo.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto de Satanás TÓXICA Sombrero blanquecino, poros rojos, pie con retículo rojo. → p. 43

Pie rojo CONDICIONADA Poros rojos y carne amarilla que azulea al instante.

Sombrero granate y pie grueso blanquecino.

Sombrero pardo rojizo, aterciopelado.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Boleto pinícola

Boletus pinophilus · cep rogenc

E F M A **M** **J** J A **S** **O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

800–2100 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero pardo rojizo, granate o caoba.

✓ Poros blancos, luego amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

✓ Pie robusto, teñido de pardo rojizo, con retículo.

DÓNDE Con pino silvestre, negro y haya y otros. Claros y bordes de pinares de montaña, entre arándanos y brezos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Pie rojo CONDICIONADA Poros rojos; carne amarilla que azulea al instante.

Boleto COMESTIBLE Sombrero pardo claro; pie blanquecino. → p. 8

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Boleto reticulado

Boletus reticulatus · cep d'estiu

E F M A M **J** **J** **A** **S** O N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva

100–1500 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero pardo claro, seco, finamente aterciopelado, que se agrieta en tiempo seco.

✓ Retículo marcado que recorre el pie hasta casi la base.

✓ Poros blancos, después amarillo verdosos; carne blanca inmutable.

DÓNDE Con roble pubescente, albar y castaño y otros. Bordes soleados de robledales y castañares, claros con hierba.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto de Satanás TÓXICA Poros rojos y pie rojo. → p. 43

Boleto amargo NO COMESTIBLE Poros rosados y retículo oscuro; sabor muy amargo.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Boleto granulado

Suillus granulatus · molleric · molleric granellut

Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).

En su punto: sombrero pardo brillante, pie amarillento, en grupo bajo pinos.

Poros amarillos con gotitas blancas

Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Tubos · Sin anillo · Sin volva · 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

CÓMO ES

SOMBRERO 4–10 cm, convexo; amarillo anaranjado, pardo naranja o pardo castaño; muy viscoso con humedad, brillante en seco.

DEBAJO Tubos y poros amarillos, que en jóvenes exudan gotas blanquecinas.

PIE 4–8 × 1–2 cm, cilíndrico, amarillo pálido, con granulaciones que oscurecen; sin anillo.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre, laricio, piñonero y rodeno. Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto picante NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.

Molleric de bou SIN INTERÉS Poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes; sin granulaciones.

Molleric COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.

COMPRUEBE Color de los poros.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus · pota de perdiu

Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.

En su punto: sombrero rojizo y láminas ocre que bajan por el pie.

Debajo

Carne y pie de color naranja salmón.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
✓ Bajo pinos.

CÓMO ES

SOMBRERO 3–10 cm, cónico convexo y después plano con mamelón; ocre cobrizo a pardo vinoso, viscoso con humedad y brillante en seco.

DEBAJO Láminas espaciadas, gruesas, decurrentes; ocre y luego púrpura negruzco por las esporas.

PIE 5–12 cm, estrechado hacia la base, ocre anaranjado con fibrillas; restos de cortina en la parte alta de jóvenes.

CARNE Ocre salmón, amarillo anaranjada en la base del pie; vinosa al cocinarla.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero. Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 68

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca. → p. 44

COMPRUEBE Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *cabrito*

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

subpruinosus).

En su punto: todo amarillo yema, carnoso, con el margen ondulado.

Debajo

De cerca

E F M A M **J J A S O N** D Pliegues Sin anillo Sin volva 50–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

CÓMO ES

SOMBRERO 3–10 cm, convexo y luego en embudo, margen ondulado y lobulado; amarillo yema a amarillo anaranjado, liso.

DEBAJO Pliegues gruesos, espaciados, bifurcados, muy decurrentes, del mismo color que el sombrero.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

DÓNDE Con encina, alcornoque, castaño, haya y roble albar y otros. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 68

Seta de olivo TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 55

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda. → p. 44

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Trompeta de los muertos

Craterellus cornucopioides · trompeta de la mort · trompeta

Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).

En su punto: negras, firmes y en grupo.

Mire por dentro

Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

E F M A M J J A **S O N D** Liso Sin anillo Sin volva 100–1600 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.

✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).

✓ Carne delgada y elástica.

CÓMO ES

SOMBRERO Trompeta de 4–12 cm de alto y 2–8 cm de boca; interior pardo negruzco, finamente escamoso; margen ondulado y vuelto hacia fuera.

DEBAJO Cara externa lisa o con arrugas muy bajas, gris ceniza a gris violáceo.

PIE No diferenciado: la trompeta se estrecha hasta la base hueca.

CARNE Delgada, elástica, negruzca.

ESPORADA Blanca.

DÓNDE Con haya, encina, castaño, roble pubescente y albar. Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Orella de gat negra CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

- ***Craterellus cinereus*** COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

COMPRUEBE Forma general.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

trompeta amarilla

Angula de monte

Craterellus lutescens · camagroc · rossinyol de pi

Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).

En su punto: pies amarillos y sombreros pardos, en grupo entre el musgo.

Debajo no hay láminas

Pie amarillo y hueco.

E F M A M J J A S **O** **N** **D** — Liso — Sin anillo — Sin volva — 300–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.

✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.

✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

CÓMO ES

SOMBRERO 2–6 cm, en embudo perforado hasta el pie, margen ondulado; pardo oscuro con tonos anaranjados.

DEBAJO Casi liso o con venas bajas, rosado anaranjado a amarillo.

PIE 3–8 cm, hueco, amarillo anaranjado vivo.

CARNE Delgada, elástica.

ESPORADA Blanca a crema.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y abeto blanco. Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

CUÁNDO De las últimas especies de la temporada; aguanta hasta las primeras heladas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo. → p. 44

Camagroc COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado. → p. 16

COMPRUEBE Parte inferior y pie.

Molleric calçat (S. luteus)

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Boleto anillado

Suillus luteus · molleric calçat

E F M A M J J A S O N D — Tubos — Con anillo — Sin volva

400–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Anillo membranoso amplio en el pie, blanquecino o violáceo por debajo.
- ✓ Sombrero pardo chocolate muy viscoso.
- ✓ Poros pequeños, amarillos.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y negro. Bordes de pista y claros herbosos en pinares jóvenes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto granulado COMESTIBLE Sin anillo. → p. 11

- ***Suillus grevillei*** COMESTIBLE Sombrero amarillo anaranjado; exclusivo de alerces (plantados).

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Camagroc

Craterellus tubaeformis

E F M A M J J A S O N D — Pliegues — Sin anillo — Sin volva

600–1900 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Pie hueco, amarillo pardusco o grisáceo.
- ✓ Pliegues bien marcados, bifurcados, gris amarillentos a gris lila.
- ✓ Sombrero en embudo pardo.

DÓNDE Con abeto blanco, pino silvestre y haya. **Sobre madera.** Bosques húmedos de montaña sobre suelo ácido, entre musgo y madera muy descompuesta.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Angula de monte COMESTIBLE Parte inferior casi lisa y rosado anaranjada; pie naranja vivo. → p. 15

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *gamuza*

Lengua de vaca

Hydnum repandum · llengua de bou · llémena

Los ejemplares viejos amargan.

En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.

Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.

Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

CÓMO ES

SOMBRERO 4–15 cm, irregular, carnoso; crema, ante o naranja pálido, liso y mate.

DEBAJO Aguijones de 3–8 mm, blandos y frágiles, crema anaranjados, algo decurrentes.

PIE 3–7 × 1,5–3 cm, blanco, macizo, a menudo excéntrico.

CARNE Blanca, quebradiza, que amarillea al tacto.

ESPORADA Blanca.

SABOR Suave; amargo en ejemplares viejos.

DÓNDE Con encina, haya, castaño, pino silvestre y abeto blanco y otros. Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Hydnellum / Sarcodon*** NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.

Picornell de pi COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie.
→ p. 18

COMPRUEBE Consistencia de la carne.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Picornell de pi

Hydnum rufescens

E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva

0–1700 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Aguijones bajo el sombrero, que no descienden por el pie.

✓ Sombrero naranja rojizo, más pequeño que el de la llengua de bou.

✓ Pie central y esbelto.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco y encina. Pinares y bosques mixtos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Lengua de vaca COMESTIBLE Más grande y pálido, aguijones algo decurrentes. → p. 17

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Hígado de buey

Fistulina hepatica · fetge de vaca

E F M A M J J **A S O N** D Tubos Sin anillo Sin volva

100–1300 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Repisa en forma de lengua o hígado, rojo sangre, sobre troncos de robles o castaños.

✓ Por debajo, tubos crema que se separan unos de otros.

✓ Carne roja jaspeada como la carne cruda, que suelta jugo rojizo.

DÓNDE Con castaño, roble pubescente y albar. **Sobre madera.** Troncos y base de castaños y robles viejos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Gírgola groga CONDICIONADA Amarillo anaranjado, en grupos superpuestos.

Oronja

Amanita caesarea · ou de reig · reig

Comestible excelente. Los «huevos» cerrados no deben recolectarse: en ese estado se confunden con los de la farinera borda y otras amanitas mortales.

En su punto: sombrero naranja, pie amarillo y volva blanca.

Láminas y pie AMARILLOS; volva blanca en saco.

Joven: sale de un huevo blanco.

E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 50–1100 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).

✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.

✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.

✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

CÓMO ES

SOMBRERO 8–20 cm, primero hemisférico y después plano; naranja rojizo a naranja amarillento, liso, brillante, margen estriado; a veces con un trozo grande de volva blanca.

DEBAJO Láminas libres, apretadas, amarillo dorado.

PIE 8–15 × 2–3 cm, amarillo, con anillo membranoso amarillo, colgante y estriado.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 62

Matamoscas TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 49

- ***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

COMPRUEBE Corte longitudinal del huevo.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Oreja de Judas

Auricularia auricula-judae · orella de Judes

E F M A M J J A S O N D — Gelatinoso — Sin anillo — Sin volva

0–1400 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Cuerpo gelatinoso, elástico, en forma de oreja, pardo rojizo.

✓ Crece sobre ramas y troncos, sobre todo de saúco.

✓ Cara externa aterciopelada, interna lisa o con venas.

DÓNDE **En prados y sobre madera.** Saúcos, sauces, robles y otros planifolios, en lugares húmedos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Peziza (copas pardas en el suelo)*** TÓXICA Crecen en el suelo, son quebradizas, no elásticas.
- ***Exidia y otras gelatinosas*** SIN INTERÉS Formas de cerebro o costra, negras o ámbar, sin forma de oreja.

Grande, toda blanca, con una volva blanca y...

Láminas crema y pie harinoso.

CONDICIONADA ●●● DIFÍCIL

Farinera

Amanita ovoidea

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

0–1100 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Seta grande, enteramente blanca o crema, con restos harinosos en el margen y en el pie.

✓ Volva gruesa, membranosa, blanca con tonos ocre amarillentos.

✓ Anillo cremoso y frágil que se deshace pronto (a menudo no se ve).

DÓNDE Con encina, pino carrasco y roble pubescente. Bordes de camino y claros en terreno calizo.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cogomassa MORTAL Más pequeña y esbelta, sin restos harinosos, anillo membranoso persistente; frecuente en primavera. → p. 63

Oronja verde MORTAL Sombrero satinado con fibras radiales; anillo membranoso persistente. → p. 62

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

galamperna

Parasol

Macrolepiota procera · apagallums · cogomella

Deseche el pie, fibroso.

En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.

Pie con dibujo de piel de serpiente

Debajo

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.

✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).

✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.

✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

CÓMO ES

SOMBRERO 10–30 cm; de joven cerrado sobre el pie como una baqueta de tambor, después plano con mamelón; escamas pardas concéntricas sobre fondo blanquecino.

DEBAJO Láminas libres, blancas a crema, apretadas, unidas a un collar.

PIE 15–40 × 1–2 cm, cilíndrico, con bulbo en la base; cubierto de bandas pardas en zigzag.

CARNE Blanca, blanda en el sombrero, fibrosa en el pie; inmutable.

OLOR Agradable, a avellana.

DÓNDE **En prados.** Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Lepiota metzinosa MORTAL Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado. → p. 65

Amanita pantera TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso. → p. 48

COMPRUEBE Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *matacandil*

Barbuda

Coprinus comatus · bolet de tinta

Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.

Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado: el momento de recolectarlo.

Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por...

Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

E F **M** **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D** — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1500 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).
✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–15 cm de alto, cilíndrico y después acampanado; blanco con la punta parda y escamas lanosas.
DEBAJO Láminas libres, muy apretadas, blancas → rosadas → negras y delicuescentes.
PIE 10–25 cm, blanco, hueco, con anillo móvil.
CARNE Blanca, delgada.
ESPORADA Negra.
DÓNDE **En prados.** Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.
CUÁNDO Otoño y, en menor medida, primavera; aparece pocos días después de una lluvia.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Bolet de femer TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada. → p. 60

Coprí garsa NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

COMPRUEBE Color y superficie del sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

seta de campo

Champiñón silvestre

Agaricus campestris · camperol

Los Agaricus acumulan metales pesados: evite los de cunetas y zonas contaminadas y no los consuma en grandes cantidades de forma habitual.

En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.

Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un…

Círelo siempre

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
✓ Sin volva en la base.
✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

CÓMO ES

SOMBRERO 4–10 cm, convexo, blanco, sedoso o finamente escamoso, con restos de velo en el margen.

DEBAJO Láminas libres, apretadas, rosa vivo → pardo chocolate.

PIE Corto, blanco, con anillo fino que desaparece pronto.

DÓNDE **En prados.** Pastos con ganado, prados de siega.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cogomassa MORTAL Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 63

Bola de neu pudent TÓXICA Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol. → p. 51

Fals carlet TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques. → p. 57

COMPRUEBE Láminas y base.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *bejín*

Pedo de lobo

Lycoperdon perlatum · pet de llop

Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.

Joven, blanco y lleno de verrugas: el momento de recolectarlo.

De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden.

Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

E F M A M J J **A S O N D** Interior Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.

✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

CÓMO ES

SOMBRERO Cuerpo en forma de pera de 3–8 cm de alto, blanco y luego pardo claro, cubierto de espinas cónicas de distintos tamaños.

DEBAJO Interior (gleba) blanco y firme de joven, después amarillo oliva y pulverulento.

PIE Base estéril estrecha (pseudopie).

DÓNDE **En prados.** Bosques de todo tipo y sus bordes.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde MORTAL Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie). → p. 62

Pota de cavall groga TÓXICA Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa. → p. 45

COMPRUEBE Corte longitudinal.

Sombreros blancos y láminas rosa grisáceo.

Láminas rosa grisáceo, nunca blancas en un...

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Bola de nieve

Agaricus arvensis · bola de neu

E F M A M **J J A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva

0–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Olor a anís o almendra amarga.
- ✓ Láminas gris rosadas que pasan a pardas (nunca blancas).
- ✓ Anillo grande y doble, con la cara inferior en forma de rueda dentada.

OLOR Anís.

DÓNDE **En prados.** Prados y bordes de bosque.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde MORTAL Láminas blancas y volva. → p. 62

Farinera pudent MORTAL Láminas blancas y volva. → p. 64

Joven y blanco en medio del prado

Con la mano al lado: puede superar los 30 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Bejín gigante

Calvatia gigantea · pet de llop gegant

E F M A **M J J A S O** N D — Interior — Sin anillo — Sin volva

0–1500 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Bola blanca enorme (10–50 cm), de piel lisa como el cuero.
- ✓ Interior blanco puro, compacto y uniforme en los jóvenes (córtelo entero).

DÓNDE **En prados.** Prados ricos en nitrógeno, huertos, bordes de bosque y de río.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde MORTAL El huevo de amanita es mucho menor y al cortarlo muestra la silueta de una seta. → p. 62

Pota de cavall groga TÓXICA Interior negro; piel gruesa amarilla escamosa; tamaño mucho menor. → p. 45

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL *ratón*

Negrilla

Tricholoma terreum · fredolic · negret

) con material italiano no encontró esos compuestos y concluye que debe considerarse comestible.

En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.

Debajo

Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.

✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.

✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.

✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

CÓMO ES

SOMBRERO 3–8 cm, cónico convexo y luego plano con mamelón; gris ratón a gris pardo, afieltrado o finamente escamoso.

DEBAJO Láminas escotadas, bastante separadas, blancas a gris pálido.

OLOR Débil, no harinoso.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero. Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Fredolic metzinós TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas como un dibujo de tigre; olor a harina; láminas con reflejos verde amarillentos. → p. 53

- ***Tricholoma virgatum* / *T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo; carne amarga o picante; láminas con arista punteada de negro en T.
- ***Inocybe* (varias especies grises)** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada parda), olor espermático o terroso.

COMPRUEBE Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

Joven

Cortado

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Pet de llop gros

Bovistella utriformis

E F M A **M J J A S O** N D — Interior — Sin anillo — Sin volva

500–2400 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Cuerpo en forma de peonza (6–15 cm), con la piel dividida en placas o verrugas piramidales.

✓ Interior blanco y compacto en los jóvenes; base estéril esponjosa.

DÓNDE **En prados.** Pastos de montaña y prados secos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Pota de cavall groga TÓXICA Interior negro. → p. 45

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Capuchina

Tricholoma portentosum · fredolic gros

E F M A M J J A **S O N D** — Láminas — Sin anillo — Sin volva

300–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris oscuro con fibras radiales negras, a menudo con tonos violáceos o amarillentos, algo viscoso.

✓ Láminas blancas con reflejos amarillo limón, escotadas.

✓ Pie blanco con tonos amarillentos; sin anillo.

OLOR A harina.

DÓNDE Con pino silvestre, rodeno y laricio. Pinares, a menudo con brezo o musgo.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Fredolic metzinós TÓXICA Sombrero con escamas oscuras sobre fondo claro, no fibras radiales lisas. → p. 53

- ***Tricholoma virgatum* / *T. sciodes*** TÓXICA Sabor amargo o picante, mamelón agudo, sin tonos amarillos en láminas.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Pie azul

Lepista nuda · pimpinella morada

Comestible, siempre bien cocinado: en crudo o poco hecho provoca trastornos digestivos (parte A del anexo del RD 30/2009).

En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.

Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.

De cerca: láminas y pie violetas.

E F M A M J J A S O N D — Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
✓ Sin cortina ni anillo.
✓ Olor afrutado o perfumado.

OLOR Afrutado, perfumado.

DÓNDE **En prados.** Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus…)*** TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.

Barret de bruixa TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas. → p. 59

Mycena pura TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano. → p. 56

COMPRUEBE Esporada y parte alta del pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

seta de San Jorge

Perrechico

Calocybe gambosa · moixernó · bolet de Sant Jordi

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

E F M **A** **M** **J** J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 400–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–15 cm, carnoso, convexo e irregular; blanco a crema o ante pálido; margen enrollado.

DEBAJO Láminas muy apretadas, estrechas, blancas a crema, escotadas.

PIE Robusto, blanco, macizo.

OLOR Intenso a harina fresca.

DÓNDE **En prados.** Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Inosperma erubescens MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 67

Cogomassa MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 63

Fals carlet TÓXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 57

COMPRUEBE Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Babosa negra

Hygrophorus latitabundus · llenega negra · llenega

latitabundus o H. limacinus). Retire el mucílago al limpiarla.

En su punto: sombrero pardo oliva, brillante y viscoso.

Láminas blancas y pie blanco con puntitos.

Joven

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 100–1500 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.
✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.
✓ Esporada blanca.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–12 cm, convexo con un mamelón ancho; pardo oliváceo oscuro a negruzco, muy viscoso.

DEBAJO Láminas espaciadas, gruesas, céreas, blancas, algo decurrentes.

PIE 6–12 × 1,5–2,5 cm, blanco en la parte alta, con la parte inferior cubierta de mucílago grisáceo y una zona anular.

CARNE Blanca, firme.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre. Pinaza de pinares calizos; los sombreros viscosos quedan cubiertos de agujas pegadas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Llenega borda NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.

Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE Láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo intenso.

COMPRUEBE Color de las láminas maduras y esporada.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Platera

Infundibulicybe geotropa · pampa

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva

0–1600 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero crema ocráceo en embudo con un mamelón central marcado.

✓ Láminas decurrentes, apretadas, crema.

✓ Pie alto, grueso y fibroso, del color del sombrero.

DÓNDE **En prados.** Claros y bordes herbosos: los corros se ven a distancia.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Paxilo MORTAL Se mancha de pardo y las láminas son ocre amarillentas. → p. 61

Pardilla TÓXICA Sombrero gris ceniza sin mamelón y olor dulzón fuerte.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Llenega blanca

Hygrophorus gliocyclus

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Con anillo Sin volva

200–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero blanco crema a amarillento pálido, muy viscoso.

✓ Láminas crema, céreas, espaciadas, decurrentes.

✓ Pie con un anillo mucoso y la parte inferior viscosa.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y carrasco. Pinares calizos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Mocosa blanca tacada SIN INTERÉS Gránulos dorados en el margen y el pie; poco viscoso.



Babosa negra COMESTIBLE Sombrero oscuro. → p. 30

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Carlet

Hygrophorus russula

Puede amargar ligeramente.

En su punto: sombreros rosados con salpicaduras vinosas, firmes.

Debajo

Láminas algo decurrentes y pie blanco manchado.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1300 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.
✓ Bajo encinas y robles.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–15 cm, carnoso, convexo; rosa vinoso, manchado de púrpura, algo viscoso con humedad.

DEBAJO Láminas céreas, blancas que se manchan de rosa vinoso, adnatas o algo decurrentes.

PIE Robusto, blanco con manchas vinosas.

CARNE Blanca, firme, rosada bajo la cutícula.

ESPORADA Blanca.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo. Hojarasca de encinares calizos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Fals carlet TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia. → p. 57

Cualbra morada NO COMESTIBLE Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos. → p. 42

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *carrerilla*

Senderuela

Marasmius oreades · cama-sec · carrereta

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.

En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.

La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.

Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–2200 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

CÓMO ES

SOMBRERO 2–5 cm, acampanado y luego plano con mamelón; ocre a ante, más claro en seco.
DEBAJO Láminas libres o escotadas, muy espaciadas, crema.
PIE 4–8 × 0,2–0,5 cm, del color del sombrero, correoso y elástico.
CARNE Delgada, blanquecina.
OLOR Débil, a almendra amarga.
DÓNDE **En prados.** Corros de hierba más verde o más seca en prados.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Lepiota metzinosa MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 65

Clitocibe blanc TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 54

- ***Inocybe (especies de prado)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

COMPRUEBE Sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Seta de cardo

Pleurotus eryngii · gírgola de panical

Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y láminas que bajan por el pie.

Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.

Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1200 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.

✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

CÓMO ES

SOMBRERO 3–10 cm, convexo y luego deprimido, a menudo excéntrico; pardo grisáceo a pardo, liso o finamente escamoso.

DEBAJO Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

PIE Corto, blanco, central o excéntrico.

CARNE Blanca, firme.

ESPORADA Blanca.

DÓNDE **En prados.** Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Clitocibe blanc TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 54

Fals carlet TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 57

COMPRUEBE Color y base.

Orellanas jóvenes saliendo de la corteza.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Seta de ostra

Pleurotus ostreatus · orellana

E **F** **M** A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva

0–1500 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Repisas en grupos superpuestos sobre madera de planifolios (chopos, hayas, robles).

✓ Láminas blancas, decurrentes, que llegan hasta un pie lateral corto o inexistente.

✓ Sombrero en forma de concha, gris azulado a pardo.

DÓNDE Con chopo negro y haya. **En prados y sobre madera.** Troncos de planifolios, sobre todo en riberas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Pleurocybella porrigens*** TÓXICA Blanca pura, delgada, sobre madera de coníferas.

Seta de olivo TÓXICA Naranja intenso. → p. 55

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Molinera

Clitopilus prunulus · moixernó blanc de tardor

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D Láminas Sin anillo Sin volva

100–1800 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas decurrentes que pasan de blancas a ROSADAS al madurar.

✓ Esporada rosada (déjela sobre papel unas horas): si es blanca, deséchela.

✓ Olor intenso a harina fresca.

OLOR A harina fresca, intenso.

DÓNDE Con castaño, roble pubescente y pino silvestre. Bosques claros y bordes, a menudo cerca de boletos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Clitocibe blanc TÓXICA Láminas que siguen blancas o crema, esporada blanca, sin olor a harina intenso; en prados. → p. 54

- ***Clitocybe phyllophila*** TÓXICA Esporada blanca rosada pálida, sombrero con pruina blanca; olor débil, no harinoso.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Seta de chopo

Cyclocybe cylindracea · pollancró

Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1200 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

CÓMO ES

SOMBRERO 4–10 cm, convexo; crema, ante o pardo claro, centro oscuro, a menudo agrietado.

DEBAJO Láminas apretadas, crema → pardo tabaco.

PIE Blanco, fibroso, con anillo membranoso.

ESPORADA Pardo tabaco.

DÓNDE Con chopo negro y álamo blanco. **En prados y sobre madera.** Riberas, choperas y parques.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Galerina marginada MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos. → p. 66

Bolet de pi TÓXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo. → p. 58

COMPRUEBE Tamaño y árbol.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA *cagarria*

Colmenilla

Morchella esculenta · múrgola · rabassola

Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.

E F **M A M** J J A S O N D · Alvéolos · Sin anillo · Sin volva · 0–1600 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.

✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.

✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

CÓMO ES

SOMBRERO 4–10 cm de alto, ovoide o redondeado; amarillo pálido a ocre o gris, con alvéolos irregulares.

DEBAJO El interior de los alvéolos.

PIE Blanco a crema, granuloso, hueco, a menudo ensanchado en la base.

CARNE Delgada, cerosa, frágil.

ESPORADA Crema ocrácea.

DÓNDE **En prados.** Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Falsa colmenilla MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. → p. 69

- ***Verpa bohemica*** TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.

Colmenilla negra CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica. → p. 38

COMPRUEBE Corte longitudinal.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA

Colmenilla negra

Morchella elata · múrgola

E F M **A** **M** **J** J A S O N D — Alvéolos — Sin anillo — Sin volva

300–2000 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero cónico con costillas longitudinales oscuras, más oscuras que los alvéolos.

✓ Completamente hueca en una sola cavidad (córtela).

✓ Sombrero unido al pie por su borde.

DÓNDE Con abeto blanco y pino silvestre. **En prados.**

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Falsa colmenilla MORTAL Sombrero cerebriforme y varias cavidades internas. → p. 69

Colmenilla CONDICIONADA Costillas claras, alvéolos irregulares. → p. 37

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

Trufa negra

Tuber melanosporum · tòfona negra

E **F** **M** A M J J A S O N **D** — Tubérculo — Sin anillo — Sin volva

300–1300 m de altitud

CÓMO RECONOCERLA

✓ Hongo subterráneo en forma de tubérculo de 2–8 cm.

✓ Piel negra con pequeñas verrugas piramidales.

✓ Interior negro violáceo con finas venas blancas al madurar.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo y otros. En los «quemados»: círculos de suelo casi sin hierba alrededor de árboles productores.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Pota de cavall groga TÓXICA Superficial, piel amarilla gruesa, olor desagradable. → p. 45

Trufa de invierno COMESTIBLE Interior gris con venas blancas más gruesas y espaciadas; olor diferente.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Enganyapastors de llet groga

Lactarius chrysorrheus · pinetell bord

Tóxica: provoca trastornos gastrointestinales.

Enganyapastors (L. zonarius): tiene zonas como el rovelló, pero látex blanco.

Láminas crema, sin manchas verdes.



Pinetell bord

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1300 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.

! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.

! No se mancha de verde.

CÓMO ES

SOMBRERO 4–8 cm, convexo y después deprimido; ocre salmón pálido con manchas o zonas concéntricas más oscuras.

DEBAJO Láminas apretadas, crema a rosado pálido.

PIE 3–6 × 1–1,5 cm, pálido, hueco.

CARNE Blanquecina, que amarillea con el látex.

SABOR Picante y amargo (no la pruebe).

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, en general de evolución favorable.

DÓNDE Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bosques de Quercus y castañares, también mezclados con pinos.

SE CONFUNDE CON

Níscalo de sangre COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos. → p. 4

COMPRUEBE Látex.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Enganyapastors

Lactarius zonarius · enganyapastors d'alzina

Tóxica (gastrointestinal) y muy picante. Su sombrero zonado recuerda al del pinetell, de ahí «enganyapastors» (engañapastores).

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1300 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Látex blanco que no cambia de color.
! Láminas crema, sin manchas verdes.
! Bajo robles y encinas, no bajo pinos.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–12 cm, deprimido; crema ocráceo a naranja pálido con zonas concéntricas; margen enrollado, algo viscoso.

DEBAJO Láminas apretadas, crema.

PIE Corto y grueso, pálido, a veces con escrobículas.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo. Encinares y robledales, a menudo sobre caliza.

SE CONFUNDE CON

Níscalo COMESTIBLE Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos. → p. 4

Níscalo de sangre COMESTIBLE Látex rojo vino; bajo pinos. → p. 4

COMPRUEBE Látex.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Falso níscalo

Lactarius torminosus · cabra de beç · lleterol de beç

Tóxica (gastrointestinal). En algunos países del norte se consume tras tratamientos prolongados: esa práctica no la hace segura.

Bolet de cabra: sombrero rosado salmón con el margen peludo.

Debajo

El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 500–1900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.

! Látex blanco que no cambia.

! Siempre bajo abedules.

CÓMO ES

SOMBRERO 4–10 cm, deprimido; rosa salmón con zonas; margen enrollado cubierto de pelos largos.

DEBAJO Láminas apretadas, crema rosado.

PIE Pálido, hueco.

ESPORADA Crema.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

DÓNDE Con abedul. Abedulares y bosques con abedul.

SE CONFUNDE CON

Níscalo COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo pinos. → p. 4

Pinetell d'avet COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos. → p. 5

COMPRUEBE Margen y látex.

NO COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

Cualbra morada

Russula torulosa · escaldabec vinós

No comestible por su sabor muy picante; la SCM la sitúa entre las especies «a refusar».

Sombrero púrpura oscuro y pie teñido de púrpura, bajo pinos.

Debajo: láminas crema y pie rosa púrpura.

De lado: pie teñido de púrpura.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1600 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.
! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.
! Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

SABOR Muy picante (no la pruebe).

GRAVEDAD ●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero. Pinares mediterráneos y de montaña media.

SE CONFUNDE CON

Níscalo de sangre COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que verdean y pie hueco con hoyuelos. → p. 4

Carbonera COMESTIBLE La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas, sabor suave y crece bajo planifolios. → p. 6

Escaldabec de pineda NO COMESTIBLE Sombrero rojo sangre o rosado, sin tonos púrpura oscuro; láminas algo decurrentes.

COMPRUEBE Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Boleto de Satanás

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs

Tóxico: intoxicaciones gastrointestinales intensas, incluso cocinado.

Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.

Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.

De cerca: poros rojo anaranjado.

E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva — 100–1300 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
! Poros rojos o rojo anaranjados.
! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
! La carne azulea débilmente al corte.

CÓMO ES

SOMBRERO 8–25 cm, convexo, macizo; blanquecino, gris ceniza a gris oliváceo, a veces rosado en el margen.
DEBAJO Tubos amarillos; poros rojos a rojo anaranjados que azulean al tocarlos.
PIE Muy grueso y bulboso, amarillo arriba, rojo carmín en la zona media y con retículo rojo.
CARNE Blanquecina amarillenta, que azulea débil y lentamente.
OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (A VECES INTENSO) Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal; puede requerir atención hospitalaria por deshidratación.

DÓNDE Con roble pubescente, encina, castaño y haya. Bosques claros y cálidos de planifolios.

SE CONFUNDE CON

Boleto reticulado COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea. → p. 10

COMPRUEBE Poros y corte.

NO COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Falso rebozuelo

Hygrophoropsis aurantiaca · fals rossinyol · rossinyol ataronjat

No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

Todo naranja, con láminas verdaderas.

Debajo

De cerca: láminas blandas naranja intenso.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Láminas verdaderas: finas, apretadas, bifurcadas varias veces, naranja vivo.
! Carne delgada y blanda, no compacta.
! Sombrero aterciopelado naranja a pardo anaranjado.

CÓMO ES

SOMBRERO 2–8 cm, deprimido, margen enrollado; naranja a pardo anaranjado, aterciopelado.
DEBAJO Láminas finas, apretadas, decurrentes, bifurcadas, naranja intenso.
PIE Delgado, naranja pardo, a menudo curvado.
CARNE Delgada, blanda, anaranjada.
ESPORADA Blanca a crema.

GRAVEDAD ●○○ **Leve.** No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

DÓNDE Con pino silvestre y rodeno. **Sobre madera.** Pinares, sobre restos de madera y acículas.

SE CONFUNDE CON

Rebozuelo COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas), carne gruesa y firme, color yema de huevo. → p. 13

Seta de olivo TÓXICA Omphalotus crece en grandes ramilletes sobre madera de olivo, encina o castaño y es mucho más carnoso. → p. 55

COMPRUEBE Parte inferior: pase el dedo; los pliegues no se separan como láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

Tóxica (gastrointestinal, a veces intensa).

Bola de piel gruesa, amarillenta y escamosa.

Cortada

Interior oscuro con vetas claras.

E F M A M J J **A S O N** D ● Interior Sin anillo Sin volva 0–1200 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

CÓMO ES

SOMBRERO Cuerpo globoso de 3–10 cm sin pie, de piel gruesa amarillo ocre, agrietada en escamas.

DEBAJO Masa interna (gleba) negra violácea con venas blancas, que acaba en polvo pardo.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

DÓNDE Con alcornoque, encina, castaño y pino piñonero. Bosques sobre suelo ácido, bordes de camino.

SE CONFUNDE CON

Pedo de lobo COMESTIBLE El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes. → p. 24

Bejín gigante COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina. → p. 25

Trufa negra COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable. → p. 38

COMPRUEBE Corte longitudinal.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Peu de rata bord

Ramaria formosa

Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).

Forma de coral, ramas rosa anaranjado.

Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.

Puntas de las ramas amarillentas.

E F M A M J J **A S O N** D ● Ramificado Sin anillo Sin volva 200–1600 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

CÓMO ES

SOMBRERO Masa coraliforme de 6–20 cm, ramas rosado salmón con puntas amarillas.

DEBAJO Himenio liso sobre las ramas.

PIE Tronco común blanquecino.

CARNE Blanca, algo amarga.

ESPORADA Ocre.

SABOR Algo amargo (no la pruebe).

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

DÓNDE Con haya, roble pubescente y castaño. Bosques de planifolios.

SE CONFUNDE CON

Seta coliflor COMESTIBLE Lóbulos aplanados crema, en pinos. → p.7

Coliflor rosa CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

COMPRUEBE Forma.

Sombrero rojo vivo y pie blanco, entre el...

Debajo: láminas blancas. Sabor muy picante.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Rúsula emética

Russula emetica · escaldabecs

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva

600–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero rojo escarlata brillante, cutícula que se pela casi entera.
! Láminas y pie blancos puros; sin látex.
! Carne frágil y muy picante.

SABOR Muy picante (no la pruebe).

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas.

DÓNDE Con pino silvestre, negro y abeto blanco. Bosques de coníferas húmedos, entre musgo.

SE CONFUNDE CON

Níscalo de sangre COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, pie hueco con hoyuelos y láminas que verdean.

→ p. 4

Parece una farinera, pero la volva es NARANJA...

La clave: volva con tonos naranja o herrumbre.

TÓXICA ●●● DIFÍCIL

Amanita proxima

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — **Con volva**

0–900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Amanita blanca o crema con volva DELGADA de color naranja ocráceo a herrumbre.
! Anillo membranoso persistente.
! Láminas blancas.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Tóxica: provoca insuficiencia renal aguda.

SÍNDROME NEFROTÓXICO AGUDO Síntomas de 8 a 14 horas.

DÓNDE Con encina y pino carrasco. Encinares y pinares calizos mediterráneos.

SE CONFUNDE CON

Farinera CONDICIONADA A. → p. 20

TÓXICA ●●○ MEDIA

Amanita pantera

Amanita pantherina · pixacà · reig bru

Tóxica (neurotóxica), potencialmente grave.

Sombrero pardo con verrugas blancas, anillo y bulbo en la base.

Debajo: láminas blancas y anillo liso.

Margen del sombrero estriado y anillo colgante.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 0–1900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.

! Base del pie en bulbo con un reborde (como un calcetín enrollado) y 1–2 anillos por encima.

! Anillo liso, sin estrías por arriba.

! La carne NO enrojece.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–12 cm, pardo a pardo oliváceo, con verrugas blancas pequeñas; margen estriado.

DEBAJO Láminas libres, blancas.

PIE Blanco, con anillo liso y bulbo marginado.

CARNE Blanca, inmutable.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, alternancia de excitación y somnolencia; vómitos; en casos graves convulsiones y coma.

DÓNDE Con pino silvestre, roble pubescente, haya y encina. Bosques de coníferas y planifolios.

SE CONFUNDE CON

Parasol COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 21

COMPRUEBE Pie y base.

Matamoscas

Amanita muscaria · reig bord

Tóxica (neurotóxica). Los tratamientos «para destoxificarla» no son seguros.

Sombrero rojo con verrugas blancas y pie blanco.

Debajo

Joven: cubierta de verrugas, como una bola.

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 300–2200 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero rojo con verrugas blancas (que la lluvia puede borrar).

! Láminas y pie BLANCOS.

! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

CÓMO ES

SOMBRERO 8–20 cm, rojo escarlata a naranja, con verrugas blancas; margen estriado.

DEBAJO Láminas libres, blancas.

PIE Blanco, con anillo blanco y bulbo con anillos de volva.

ESPORADA Blanca.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia; vómitos.

DÓNDE Con pino silvestre, abedul, abeto blanco y pino negro. Bosques de montaña sobre suelo ácido.

SE CONFUNDE CON

Oronja COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca.

→ p. 19

COMPRUEBE Láminas y pie.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Lepiota pudent

Lepiota cristata

Tóxica (gastrointestinal). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.

Lepiota cristata

L. cristata de cerca

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1600 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.

! Olor desagradable, a goma o gas.

! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

CÓMO ES

SOMBRERO 2–5 cm, blanco con disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.

DEBAJO Láminas libres, blancas.

PIE Delgado, blanquecino, con anillo frágil.

ESPORADA Blanca.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

DÓNDE **En prados.** Hojarasca, jardines y bordes de camino.

SE CONFUNDE CON

Parasol COMESTIBLE Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado. → p. 21

COMPRUEBE Tamaño.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

Tóxica (gastrointestinal).

Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.

Láminas rosa grisáceo de joven; se confunde...

Vieja: láminas pardo oscuro.

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.

! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–15 cm, blanco o gris pardo, que amarillea al roce.

DEBAJO Láminas libres, rosadas → pardas.

PIE Blanco con anillo grueso y base algo bulbosa, amarillo cromo al corte.

ESPORADA Pardo chocolate.

OLOR Desagradable (tinta, fenol).

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

DÓNDE **En prados.** Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

SE CONFUNDE CON

Champiñón silvestre COMESTIBLE No amarillea y huele bien. → p. 23

Bola de nieve COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo. → p. 25

COMPRUEBE Base del pie.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Seta de los caballeros

Tricholoma equestre · verderol · groguet

Tóxica.

Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.

Debajo: láminas amarillo azufre.

Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el...

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1700 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillo azufre intenso.
! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.
! Pie amarillo.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–12 cm, amarillo verdoso a amarillo oliváceo, centro pardo escamoso, viscoso.
DEBAJO Láminas escotadas, amarillo azufre.
PIE Amarillo, fibroso.
CARNE Blanca amarillenta.
OLOR A harina débil.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura; en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria.

DÓNDE Con pino piñonero, silvestre y rodeno. **En prados.** Pinares sobre suelo arenoso.

SE CONFUNDE CON

Capuchina COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras. → p. 27

COMPRUEBE Sombrero.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

Tóxico: gastroenteritis intensa.

Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.

Sombrero escamoso y pie robusto y lleno

Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 800–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).

! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.

! Olor a harina.

CÓMO ES

SOMBRERO 6–15 cm, convexo, blanco grisáceo con escamas gris oscuro concéntricas.

DEBAJO Láminas escotadas, blanquecinas con reflejo verde amarillento.

PIE Robusto, blanco, con manchas ocre en la base.

CARNE Blanca, gruesa.

OLOR A harina.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

DÓNDE Con abeto blanco, haya y pino silvestre. Bosques de montaña.

SE CONFUNDE CON

Negrilla COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 26

COMPRUEBE Tamaño y escamas.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa · candeleta

Tóxica (muscarina).

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.
! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).
! Esporada blanca (no rosada).

CÓMO ES

SOMBRERO 2–5 cm, plano o algo deprimido, blanco con pruina que deja ver zonas más oscuras.
DEBAJO Láminas decurrentes, apretadas, blancas a crema.
PIE Corto, blanquecino.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO (COLINÉRGICO) Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

DÓNDE **En prados.** Prados, céspedes, claros herbosos.

SE CONFUNDE CON

Senderuela COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso. → p. 33

Molinera COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina. → p. 35

COMPRUEBE Láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Seta de olivo

Omphalotus olearius · gírgola d'olivera · bolet d'oliu

Tóxica: gastroenteritis intensa. Confusión frecuente con el rossinyol.

Un ramillete de setas anaranjadas sobre un tocón.



Debajo

Láminas que bajan por el pie y pies unidos en la...

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño.

! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.

! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–15 cm, convexo y luego en embudo con mamelón; naranja a pardo anaranjado.

DEBAJO Láminas apretadas, finas, muy decurrentes, naranja.

PIE Largo, curvado, naranja, unido a otros por la base.

CARNE Anaranjada, fibrosa.

ESPORADA Blanca a crema.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

DÓNDE Con olivo, encina, castaño y roble pubescente. **Sobre madera.** Olivares, encinares y castañares; tocones y raíces.

SE CONFUNDE CON

Rebozuelo COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en el suelo.

→ p. 13

COMPRUEBE Parte inferior y crecimiento.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Mycena pura

Tóxica (muscarina).

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta (2–5 cm) lila, rosada o violácea con el margen estriado.

! Olor a rábano.

! Pie hueco, frágil.

CÓMO ES

SOMBRERO 2–5 cm, acampanado y luego plano, lila rosado, estriado en el margen.

DEBAJO Láminas espaciadas, blanquecinas a lila pálido.

PIE Hueco, frágil, del color del sombrero.

ESPORADA Blanca.

OLOR A rábano.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, molestias digestivas.

DÓNDE Hojarasca y pinaza.

SE CONFUNDE CON

Pie azul COMESTIBLE Mucho mayor, carnosa, olor afrutado. → p. 28

Pimpinella morada petita SIN INTERÉS Láminas gruesas, sin olor a rábano.

COMPRUEBE Tamaño.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Fals carlet

Entoloma sinuatum · carlet bord

Tóxica: gastroenteritis intensa.

Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.

Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa...

Adulto

E F M A M J J A **S** **O** **N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 100–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.

! Esporada rosada.

! Olor a harina rancia.

! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

CÓMO ES

SOMBRERO 8–20 cm, convexo e irregular; gris ocráceo a gris pardo, brillante y sedoso.

DEBAJO Láminas escotadas, amarillentas → rosa salmón.

OLOR A harina rancia.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO) Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

DÓNDE Con roble pubescente, haya y castaño. Bosques de planifolios.

SE CONFUNDE CON

Carlet COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca. → p. 32

Perrechico COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera. → p. 29

COMPRUEBE Color del sombrero y de las láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.

! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.

! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

CÓMO ES

SOMBRERO 2–7 cm, amarillo azufre, centro naranja.

DEBAJO Láminas apretadas, amarillas → verdosas → pardo violáceas.

PIE Amarillo, con zona anular de fibras.

ESPORADA Pardo violácea.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

DÓNDE **En prados y sobre madera.** Tocones y madera muerta.

SE CONFUNDE CON

Seta de chopo COMESTIBLE Crema, anillo membranoso, en chopos. → p. 36

Armilaria CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

COMPRUEBE Color.

TÓXICA ●●○ MEDIA

Barret de bruixa

Inocybe geophylla

Tóxica (muscarina).

Sombrero con fibras radiales que se agrietan: la señal típica.

Inocybe geophylla

Las hay lilas, que pueden confundirse con la...

E F M A M J J **A S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta (1–4 cm) blanca sedosa (o lila en la variedad lilacina) con mamelón agudo.

! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.

! Olor terroso o espermático.

CÓMO ES

SOMBRERO 1–4 cm, cónico con mamelón, blanco sedoso o lila.

DEBAJO Láminas grisáceas → pardas.

PIE Delgado, blanco o lila.

ESPORADA Parda.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

DÓNDE Bordes de camino en bosques de todo tipo.

SE CONFUNDE CON

Pie azul COMESTIBLE Mucho mayor y carnosa. → p. 28

Senderuela COMESTIBLE Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema. → p. 33

COMPRUEBE Tamaño.

Sombrero amarillo pálido con restos blancos...

Láminas y pie blancos; volva en collar sobre...

TÓXICA ●●○ MEDIA

Amanita gemmata

E F M A **M** **J** J A S **O** N D Láminas Con anillo **Con volva**

300–1800 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero amarillo pálido a amarillo ocre con placas blancas.
! Láminas blancas.
! Bulbo con reborde de volva y anillo frágil.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas.

DÓNDE Con pino silvestre y laricio. Pinares sobre suelo ácido o arenoso.

SE CONFUNDE CON

Oronja COMESTIBLE Láminas y pie amarillos, volva en saco. → p. 19

Sombreros grises en forma de campana, en...

Jóvenes

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Bolet de femer

Coprinopsis atramentaria

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** D Láminas Sin anillo Sin volva

0–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero gris, ovoide o acampanado, con estrías o pequeñas escamas en el centro (sin escamas lanosas).
! Láminas que se licúan en tinta negra.
! Crece en ramilletes, sobre madera enterrada o tocones.

GRAVEDAD ●○○ **Moderada.** Tóxica si se toma alcohol (coprina): antes, durante o hasta tres días después de comerla.

SÍNDROME COPRÍNICO (TIPO DISULFIRAM) CON ALCOHOL Síntomas de minutos a 2 horas tras beber alcohol, hasta 72 horas después de comer la seta.

DÓNDE **En prados y sobre madera.** Parques, huertos, bordes de camino, tocones.

SE CONFUNDE CON

MORTAL ●●○ MEDIA

Paxilo

Paxillus involutus · paxil·le tòxic · paxil enrotllat

Potencialmente mortal.

Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia dentro.

Margen del sombrero muy enrollado.

Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.

! Sin látex.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

SÍNDROME HEMOLÍTICO (PAXÍLICO) Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y fallo renal.

DÓNDE Con abedul, pino silvestre, encina y castaño. Bosques variados, también parques; prefiere suelos ácidos.

SE CONFUNDE CON

Níscalo de sangre COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo. → p. 4

Níscalo COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 4

COMPRUEBE **Corte: látex o no.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

Adulta: sombrero verde oliva, anillo como una falda y volva en la base.

Debajo: láminas BLANCAS y anillo colgante.

Láminas blancas y base con volva

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 0–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).

! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

! Láminas BLANCAS, libres.

! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos; tras una aparente mejoría, daño hepático grave a partir del segundo o tercer día, que puede requerir trasplante o causar la muerte.

DÓNDE Con encina, roble pubescente, alcornoque, castaño y haya. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico. → p. 9

Carbonera COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 6

Bola de nieve COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva. → p. 25

COMPRUEBE **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Cogomassa

Amanita verna

Mortal, con las mismas toxinas que la farinera borda. Sale en primavera, cuando se busca el moixernó, y también en otoño.

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 0–900 m de altitud

MORTALES

RASGOS DE ALARMA

- ! Seta enteramente blanca.
- ! Volva blanca en saco en la base.
- ! Anillo membranoso blanco.
- ! Láminas blancas, libres.

CÓMO ES

SOMBRERO 4–10 cm, blanco (a veces crema en el centro), liso y satinado.

DEBAJO Láminas libres, blancas.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque. Encinares y robledales mediterráneos.

SE CONFUNDE CON

Perrechico COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina. → p. 29

Champiñón silvestre COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 23

COMPRUEBE **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Farinera pudent

Amanita virosa

Mortal (amatoxinas).

Toda blanca, con anillo y volva.

Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría...

Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

E F M A M J J **A S O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 500–1800 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.

! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.

! Volva blanca en saco.

CÓMO ES

SOMBRERO 5–10 cm, cónico a acampanado, blanco puro.

DEBAJO Láminas libres, blancas.

PIE Blanco, lanoso, con anillo frágil.

ESPORADA Blanca.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

DÓNDE Con haya y abedul. Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

SE CONFUNDE CON

Bola de nieve COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva. → p. 25

COMPRUEBE **Láminas y base.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata · palometa

Mortal: contiene amatoxinas como la farinera borda. Las lepiotas pequeñas son responsables de intoxicaciones graves en Cataluña.

Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.

Pie rosado con bandas y láminas blancas.

Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el...

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–900 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.

! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.

! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.

! Láminas blancas, libres.

CÓMO ES

SOMBRERO 2–6 cm, convexo y luego plano; escamas pardo vinosas concéntricas, centro oscuro.

DEBAJO Láminas libres, blancas a crema.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

DÓNDE **En prados.** Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

SE CONFUNDE CON

Parasol COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado. → p. 21

Senderuela COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas. → p. 33

COMPRUEBE **Tamaño, anillo y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Galerina marginada

Galerina marginata · galerina metzinosa

Mortal: contiene amatoxinas como la farinera borda.

Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.

Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...

Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Con anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.

! Anillo fino pardo en el pie.

! Esporada pardo herrumbre.

! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

DÓNDE **Sobre madera.** Madera muerta de coníferas y planifolios.

SE CONFUNDE CON

Seta de chopo COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 36

≈ ***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

Armilaria CONDICIONADA Mayor, escamas oscuras, esporada blanca.

COMPRUEBE **Tamaño y árbol.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Inosperma erubescens

Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.

Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.

Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).

E F M A **M** **J** **J** A S O N D Láminas Sin anillo Sin volva 0–1500 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.

! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.

! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

CÓMO ES

SOMBRERO 3–8 cm, cónico acampanado, blanquecino que se mancha de rojo, fibroso y agrietado.

DEBAJO Láminas apretadas, blanquecinas → pardas, con manchas rojas.

PIE Blanco, fibroso, que enrojece.

ESPORADA Parda.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SÍNDROME MUSCARÍNICO (GRAVE) Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión; puede ser mortal sin tratamiento.

DÓNDE **En prados.** Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

SE CONFUNDE CON

Perrechico COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 29

COMPRUEBE **Sombrero, manchas rojas y olor.**

MORTAL ●●○ MEDIA

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus · bolet de mantellina

Mortal: la orellanina destruye el riñón de forma tardía e irreversible.

Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.

Láminas color herrumbre, espaciadas.

Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

E F M A M J J A **S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 100–1500 m de altitud

MORTALES

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
! Esporada pardo herrumbre.
! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

CÓMO ES

SOMBRERO 3–8 cm, convexo con mamelón, pardo anaranjado, seco, fibroso.

OLOR Débil a rábano.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

SÍNDROME ORELLÁNICO (NEFROTÓXICO TARDÍO) Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida; insuficiencia renal que puede requerir diálisis o trasplante.

DÓNDE Con roble pubescente, castaño y encina. Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

SE CONFUNDE CON

Rebozuelo COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas. → p. 13

Camagroc COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas. → p. 16

COMPRUEBE **Parte inferior.**

Falsa colmenilla

Gyromitra esculenta · bolet de greix · murga

Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).

E F M **A** **M** **J** J A S O N D — Liso — Sin anillo — Sin volva — 600–2200 m de altitud

RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

CÓMO ES

SOMBRERO 4–10 cm, cerebriforme, pardo rojizo a pardo oscuro.

DEBAJO Superficie del sombrero.

PIE Blanquecino, irregular, con cavidades.

CARNE Frágil, cerosa.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

SÍNDROME GIROMITRIANO (CONVULSIVO Y HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

DÓNDE Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. **Sobre madera.** Coníferas de montaña.

SE CONFUNDE CON

Colmenilla CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 37

Colmenilla negra CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco. → p. 38

COMPRUEBE **Corte longitudinal.**

Árboles y sus setas

Muchas setas viven unidas a las raíces de un árbol: reconocerlo por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.



Pino carrasco

pi blanc

Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido; tronco a menudo inclinado o tortuoso.

BUSQUE Níscalos *4*, *Lactarius semisanguifluus* *5*, Boleto granulado *11*, Cama de perdiu *12*, Picornell de pi *18*, Farinera *20*

CUIDADO *Amanita proxima* *47*, Cualbra morada *42*



Pino laricio

pinassa

Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.

BUSQUE Níscalos *4*, *Lactarius semisanguifluus* *5*, Seta coliflor *7*, Boleto granulado *11*, Boleto anillado *16*, Cama de perdiu *12*

CUIDADO *Amanita gemmata* *60*, Cualbra morada *42*





Haya

faig

Árbol alto de corteza lisa y gris; bajo su copa densa apenas crece sotobosque.

BUSQUE Gorro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto *8*, Boleto pinícola *10*, Boleto reticulado *10*, Rebozuelo *13*

CUIDADO Oronja verde *62*, Farinera pudent *64*, Boleto de Satanás *43*, Peu de rata bord *46*, Amanita pantera *48*, Fredolic metzinós *53*



Pícea

pícea

Conífera cónica de ramas colgantes.

BUSQUE Boleto *8*



Quejigo

roure de fulla petita

Roble de porte modesto y copa clara, marcescente.

BUSQUE Carlet *32*, Trufa negra *38*

CUIDADO Enganyapastors *40*

Árboles y sus setas

HOJA


TRONCO

Pino piñonero

pi pinyer

Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.

BUSQUE Níscalos *4*, Boleto granulado *11*, Cama de perdiu *12*, Negrilla *26*

CUIDADO Pota de cavall groga *45*, Seta de los caballeros *52*, Cualbra morada *42*

HOJA

TRONCO

Alcornoque

surera

Árbol de copa amplia y verde grisácea; tronco con corcho grueso o, si se ha descorchado, de color rojo anaranjado.

BUSQUE Gorro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto negro *9*, Rebozuelo *13*, Oronja *19*

CUIDADO Oronja verde *62*, Cogomassa *63*, Enganyapastors de llet groga *39*, Pota de cavall groga *45*

HOJA

TRONCO

Roble pubescente

roure martinenc

Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las hojas secas.

BUSQUE Gorro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto negro *9*, Boleto reticulado *10*, Trompeta de los muertos *14*, Lengua de vaca *17*

CUIDADO Oronja verde *62*, Cogomassa *63*, Cortinari metzinós *68*, Enganyapastors de llet groga *39*, Enganyapastors *40*, Boleto de Satanás *43*

HOJA

TRONCO

Abedul

bedoll

Árbol esbelto de tronco blanco y ramillas colgantes.

BUSQUE Carbonera *6*

CUIDADO Paxilo *61*, Farinera pudent *64*, Falso níscalo *41*, Matamoscas *49*

HOJA


TRONCO

Avellano

avellaner

Arbusto grande de muchos tallos.

BUSQUE Trufa negra *38*

Árboles y sus setas

HOJA


TRONCO

Pino silvestre

pi roig

Copa irregular y alta; la parte superior del tronco y las ramas gruesas son de color naranja asalmonado, visible de...

BUSQUE Níscalos *4*, *Lactarius semisanguifluus 5*, Seta coliflor *7*, Boleto *8*, Boleto pinícola *10*, Boleto granulado *11*

CUIDADO Paxilo *61*, Falsa colmenilla *69*, Rúsula emética *47*, Amanita pantera *48*, Matamoscas *49*, *Amanita gemmata 60*

HOJA


TRONCO

Castaño

castanyer

Árbol grande de copa amplia; a menudo en forma de rebrotes de cepa (castañares de leña).

BUSQUE Gorro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto *8*, Boleto negro *9*, Boleto pinícola *10*, Boleto reticulado *10*

CUIDADO Paxilo *61*, Oronja verde *62*, Cortinari metzinós *68*, Enganyapastors de llet groga *39*, Boleto de Satanás *43*, Pota de cavall groga *45*

HOJA


TRONCO

Pino negro

pi negre

Pino de copa estrecha y oscura de la alta montaña, a menudo en el límite del bosque.

BUSQUE Níscalos *4*, Boleto pinícola *10*, Boleto anillado *16*

CUIDADO Falsa colmenilla *69*, Rúsula emética *47*, Matamoscas *49*

HOJA

TRONCO

Chopo negro

pollancre

Árbol alto de ribera y de plantaciones en hileras (chopos híbridos).

BUSQUE Seta de ostra *35*, Seta de chopo *36*


HOJA

TRONCO

Álamo blanco

àlber

Copa blanquecina cuando el viento gira las hojas.

BUSQUE Seta de chopo *36*

Árboles y sus setas

HOJA


TRONCO

Encina

alzina

Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate; en el interior a menudo en forma de mata.

BUSQUE Gorro verde *9*, Carbonera *6*, Boleto negro *9*, Boleto reticulado *10*, Rebozuelo *13*, Trompeta de los muertos *14*

CUIDADO Paxilo *61*, Oronja verde *62*, Cogomassa *63*, Cortinari metzinós *68*, Enganyapastors de llet groga *39*, Enganyapastors *40*

HOJA


TRONCO

Abeto blanco

avet

Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.

BUSQUE Pinetell d'avet *5*, Boleto *8*, Rebozuelo *13*, Angula de monte *15*, Camagroc *16*, Lengua de vaca *17*

CUIDADO Falsa colmenilla *69*, Rúsula emética *47*, Matamoscas *49*, Fredolic metzinós *53*


HOJA


TRONCO

Pino rodeno

pinastre

Pino alto de copa piramidal o irregular, de verde oscuro brillante.

BUSQUE Níscalos *4*, Seta coliflor *7*, Boleto granulado *11*, Capuchina *27*

CUIDADO Seta de los caballeros *52*, Falso rebozuelo *44*

HOJA

TRONCO

Roble albar

roure de fulla gran

Roble alto y de tronco recto en bosques frescos de montaña.

BUSQUE Carbonera *6*, Boleto *8*, Boleto reticulado *10*, Rebozuelo *13*, Trompeta de los muertos *14*, Hígado de buey *18*


HOJA

TRONCO

Olivo

olivera

Árbol de copa gris verdosa y tronco retorcido.

CUIDADO Seta de olivo *55*

CUÁNDO SALEN

Calendario

Meses en que sale cada comestible en Cataluña: oscuro, lo habitual; claro, solo algunos años. El número es su página.

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Oreja de Judas *20*	■	■	■	■	■					■	■	■
Pie azul *28*	■	■	■	■						■	■	■
Seta de ostra *35*	■	■	■							■	■	■
Trufa negra *38*	■	■	■									■
Colmenilla *37*		■	■	■	■	■						
Colmenilla negra *38*			■	■	■	■	■					
Perrechico *29*			■	■	■	■				■		
Senderuela *33*				■	■	■			■	■	■	
Seta de chopo *36*				■	■	■			■	■	■	
Boleto pinícola *10*					■	■	■	■	■	■		
Champiñón silvestre *23*	■				■	■			■	■	■	■
Pet de llop gros *27*					■	■	■	■	■	■		
Bejín gigante *25*					■	■	■	■	■	■		
Bola de nieve *25*						■	■	■	■	■	■	
Boleto negro *9*						■	■	■	■	■	■	
Boleto reticulado *10*					■	■	■	■	■			
Carbonera *6*						■	■	■	■	■	■	
Gorro verde *9*					■	■	■	■	■	■		
Rebozuelo *13*						■	■	■	■	■	■	
Boleto *8*							■	■	■	■		
Hígado de buey *18*								■	■	■	■	
Molinera *35*								■	■	■	■	
Oronja *19*							■	■	■	■		
Parasol *21*						■	■	■	■	■	■	

Calendario

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Pedo de lobo *24*								●	●	●	●	●
Pinetell d'avet *5*							●	●	●	●		
Barbuda *22*			●	●	●				●	●	●	●
Boleto anillado *16*						●	●	●	●	●	●	
Boleto granulado *11*					●	●	●		●	●	●	●
Cama de perdiu *12*									●	●	●	●
Camagroc *16*									●	●	●	●
Farinera *20*									●	●	●	●
Lactarius semisanguifluus *5*									●	●	●	●
Lengua de vaca *17*	●								●	●	●	●
Níscalo *4*								●	●	●	●	●
Níscalo de sangre *4*	●					●			●	●	●	●
Picornell de pi *18*									●	●	●	●
Seta coliflor *7*									●	●	●	
Trompeta de los muertos *14*	●							●	●	●	●	●
Angula de monte *15*	●									●	●	●
Babosa negra *30*	●									●	●	●
Capuchina *27*										●	●	●
Carlet *32*	●									●	●	●
Llenega blanca *31*										●	●	●
Negrilla *26*	●									●	●	●
Platera *31*										●	●	●
Seta de cardo *34*				●	●					●	●	●

Síndromes

Según cuánto tardan los síntomas. Más de 6 horas es señal de alarma.

PRECOZ (MENOS DE 6 H)

Gastrointestinal

Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. La mayoría se resuelven en horas, pero algunas son intensas.

Lactarios de látex blanco, rúsulas picantes, Entoloma sinuatum, Omphalotus olearius, Tricholoma pardinum, Rubroboletus satanas, Agaricus xanthodermus, Ramaria formosa, Hypholoma fasciculare, Scleroderma, setas comestibles en mal estado

Colinérgico (muscarínico)

Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, pulso lento.

Inocybe e Inosperma, clitocibes blancos (Clitocybe rivulosa), Mycena pura

Neurológico central (panterínico)

Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia, a veces convulsiones o coma.

Amanita pantherina, A. muscaria, A. gemmata

Alucinógeno

Alteraciones de la percepción y del comportamiento.

Psilocybe, Panaeolus

Coprínico (tipo disulfiram)

Enrojecimiento, palpitaciones y malestar al beber alcohol, hasta 3 días después.

Coprinopsis atramentaria + alcohol

TARDÍA (6–24 H)

Hepatotóxico (faloidiano)

Gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave. Potencialmente mortal.

Amanita phalloides, A. verna, A. virosa, lepiotas pequeñas (Lepiota brunneoincarnata y afines), Galerina marginata

Giromitriano (convulsivo)

Síntomas digestivos, neurológicos (convulsiones) y daño hepático. Potencialmente mortal.

Gyromitra esculenta

RETARDADA (MÁS DE 24 H)

Nefrotóxico

Sed, cansancio, dolor lumbar, alteraciones de la orina; insuficiencia renal.

Cortinarius orellanus (de 2 a 15 días) y Amanita proxima (síntomas en 8–14 h, fallo renal en 1–3 días)

Rabdomiolítico

Debilidad y dolor muscular, orina oscura; afectación cardíaca en casos graves.

Tricholoma equestre (comidas repetidas)

Hemolítico

Destrucción de glóbulos rojos e insuficiencia renal.

Paxillus involutus (personas sensibilizadas)

Glosario

Adnata (lámina): unida al pie en todo su ancho.

Aguijones: púas blandas bajo el sombrero que producen las esporas (llengua de bou).

Alvéolo: celdilla del sombrero de las colmenillas.

Amatoxinas: toxinas de la farinera borda, las lepiotas pequeñas y la galerina; dañan el hígado y no se destruyen con la cocción.

Anillo: resto del velo parcial en el pie.

Areolada: cutícula agrietada en pequeñas placas.

Bulbo marginado: base del pie engrosada con un reborde neto.

Cortina: velo en forma de telaraña entre sombrero y pie (*Cortinarius*).

Cutícula: piel del sombrero.

Decurrente (lámina): que baja por el pie.

Delicuescente: que se licúa al madurar (coprinos).

Ectomicorriza / micorriza: asociación entre el micelio de un hongo y las raíces de una planta.

Escotada (lámina): con una muesca junto al pie.

Escrobículas: hoyuelos o manchas hundidas en el pie (lactarios).

Esporada: depósito de esporas que deja un sombrero sobre un papel; su color es diagnóstico.

Excéntrico (pie): no centrado bajo el sombrero.

Fasciculado: en ramillete, con los pies unidos por la base.

Fibriloso: cubierto de fibras finas.

Gleba: masa interna fértil de los pedos de lobo y las trufas.

Herbario (pliego): ejemplar seco conservado en una colección científica; es la prueba más sólida de presencia.

Higrófano: que cambia de color al perder agua.

Himenio / himenóforo: superficie fértil que produce las esporas (láminas, poros, pliegues, aguijones).

Hipogeo: que fructifica bajo tierra.

Látex: líquido que sale al cortar los lactarios.

Lignícola: que crece sobre madera.

Libre (lámina): que no toca el pie.

Mamelón: abultamiento central del sombrero.

Micelio: conjunto de filamentos (hifas) que forman el cuerpo del hongo; vive en el suelo o la madera todo el año.

Muscarina: toxina de *Inocybe*, *Clitocybe* y *Mycena pura*; provoca sudoración, salivación y bradicardia.

Nitrófilo: que vive en suelos ricos en nitrógeno.

Pliegues: venas gruesas, bajas y ramificadas bajo el sombrero (rebozuelos).

Poros: aberturas de los tubos (boletos).

Pruina, pruinoso: capa fina de polvo blanquecino.

Quemado (trufero): zona sin hierba alrededor de un árbol productor de trufa.

Reticulado (pie): con una red en relieve.

Saprófito: que se alimenta de materia orgánica muerta.

Sinónimo: nombre científico que designa la misma especie que el nombre aceptado.

Velo universal: membrana que envuelve la seta joven; deja la volva y a veces verrugas en el sombrero.

Viscoso, glutinoso: pegajoso o cubierto de mucílago.

Volva: resto del velo universal en la base del pie.

Índice

Nombres en catalán, castellano y científicos (en cursiva), con su página.

Agaricus arvensis 25
Agaricus campestris 23
Agaricus xanthodermus 51
Amanita caesarea 19
Amanita de los césares 19
Amanita gemmata 60
Amanita mortal 62
Amanita muscaria 49
Amanita ovoidea 20
Amanita pantera 48
Amanita pantherina 48
Amanita phalloides 62
Amanita proxima 47
Amanita verna 63
Amanita virosa 64
Angula de monte 15
Apagallums 21
Arigany 38
Auricularia auricula-judae 20
Babosa negra 30
Babosillo 16
Barba de cabra 7
Barbuda 22
Barret de bruixa 59
Bejín 24
Bejín gigante 25
Bola de neu 25
Bola de neu pudent 51
Bola de nieve 25
Bolet d'oliu 55
Bolet de femer 60
Bolet de greix 69
Bolet de mantellina 68
Bolet de pi 58
Bolet de Sant Jordi 29
Bolet de tinta 22
Boleto 8
Boleto anillado 16
Boleto de Satanás 43
Boleto estival 10
Boleto granulado 11
Boleto negro 9
Boleto pinícola 10
Boleto reticulado 10
Boletus aereus 9
Boletus edulis 8
Boletus pinophilus 10
Boletus reticulatus 10
Bonete 69
Bovistella utriformis 27
Brunet 26
Buixó 8
Cabeza de fraile 31
Cabra de beç 41
Cabrito 13
Cagarria 37
Calocybe gambosa 29
Calvatia gigantea 25
Cama de perdiu 12
Cama-sec 33
Camagroc 15
Camagroc 16
Camperol 23
Candeleta 54
Cantharellus cibarius 13
Capuchina 27
Carbonera 6
Carlet 32
Carlet bord 57
Carner bord 57
Carrereta 33
Carrerilla 33
Cep 8
Cep 10
Cep d'estiu 10
Cep negre 9
Cep rogenc 10
Champiñón silvestre 23
Chroogomphus rutilus 12

Índice

Clitocibe blanc 54
Clitocybe rivulosa 54
Clitopilus prunulus 35
Cogoma 20
Cogoma borda 62
Cogoma verda 62
Cogomassa 63
Cogomassa farinera 20
Cogomella 21
Coliflor de pi 7
Colmenilla 37
Colmenilla negra 38
Coprinopsis atramentaria 60
Coprinus comatus 22
Cortinari metzinós 68
Cortinarius orellanus 68
Craterellus cornucopioides 14
Craterellus lutescens 15
Craterellus tubaeformis 16
Cualbra llora 6
Cualbra morada 42
Cualbra pinenca 42
Cul-blanc 20
Cyclocybe cylindracea 36
Enganyapastors 40
Enganyapastors d'alzina 40
Enganyapastors de llet groga 39
Entoloma sinuatum 57
Escaldabec estriat 47
Escaldabec vinós 42
Escaldabecs 47
Esclatasang 4
Fals camagroc 16
Fals carlet 57
Fals rossinyol 44
Falsa colmenilla 69
Falsa oronja 49
Falso níscalo 41
Falso rebozuelo 44
Farinera 20
Farinera borda 62
Farinera pudent 64
Farinot 62
Fetge de vaca 18
Fistulina hepatica 18
Fredolic 26
Fredolic gros 27
Fredolic metzinós 53
Galamperna 21
Galerina marginada 66
Galerina marginata 66
Galerina metzinosa 66
Gamuza 17
Círgola 35
Círgola d'olivera 55
Círgola de panical 34
Gorro verde 9
Greixa 7
Groguet 52
Gyromitra esculenta 69
Hígado de buey 18
Hongo blanco 8
Hongo negro 9
Huevo de rey 19
Hydnum repandum 17
Hydnum rufescens 18
Hygrophoropsis aurantiaca 44
Hygrophorus gliocyclus 31
Hygrophorus latitabundus 30
Hygrophorus russula 32
Hypholoma fasciculare 58
Infundibulicybe geotropa 31
Inocybe geophylla 59
Inosperma erubescens 67
Lactarius chrysorrheus 39
Lactarius deliciosus 4
Lactarius salmonicolor 5
Lactarius sanguifluus 4
Lactarius semisanguifluus 5

Índice

Lactarius torminosus 41
Lactarius zonarius 40
Lengua de buey 18
Lengua de gato 17
Lengua de vaca 17
Lepiota brunneoincarnata 65
Lepiota cristata 50
Lepiota metzinosa 65
Lepiota pudent 50
Lepista nuda 28
Llémena 17
Llenega 30
Llenega blanca 31
Llenega negra 30
Llengua de bou 17
Llengua de bou rogenca 18
Lleterol de beç 41
Lleterola de llet groga 39
Llora 9
Llora 6
Llora clapada 9
Llora morada 6
Llora verda 9
Llorell 6
Lycoperdon perlatum 24
Macrolepiota procera 21
Marasmius oreades 33
Matacandil 21
Matacandil 22
Matagent 43
Matamoscas 49
Mataparent de Satanàs 43
Mízcalo 4
Moixernó 29
Moixernó blanc de tardor 35
Moixí 11
Moixí de calceta 16
Molinera 35
Molleric 11
Molleric calçat 16
Molleric granellut 11
Morchella elata 38
Morchella esculenta 37
Murga 37
Murga 69
Múrgola 37
Múrgola 38
Mycena pura 56
Negret 26
Negrilla 26
Níscalo 4
Níscalo de sangre 4
Omphalotus olearius 55
Oreja de Judas 20
Orella d'ase 14
Orella de Judes 20
Orella de saüquer 20
Orellana 35
Oronja 19
Oronja verde 62
Ou de reig 19
Palometa 65
Pampa 31
Parasol 21
Paxil enrotllat 61
Paxil·le tòxic 61
Paxillus involutus 61
Paxilo 61
Pedo de lobo 24
Pentinella borda 62
Perrechico 29
Pet de llop 24
Pet de llop de prat 27
Pet de llop gegant 25
Pet de llop gros 27
Peu de rata bord 46
Peu de rata de pi 7
Picornell de pi 18

Índice

Pie azul 28
Pimpinella morada 28
Pinetell 4
Pinetell 11
Pinetell bord 39
Pinetell d'avet 5
Pinetell d'avetosa 5
Pinetell de calceta 16
Pixacà 48
Platera 31
Pleurotus eryngii 34
Pleurotus ostreatus 35
Pollancró 36
Pota de cavall groga 45
Pota de perdiu 12
Rabassola 37
Ramaria formosa 46
Ratón 26
Rebollón 4
Rebollón 4
Rebozuelo 13
Rebozuelo anaranjado 15
Reig 19
Reig bord 49
Reig bru 48
Robellón 4
Rossinyol 13
Rossinyol ataronjat 44
Rossinyol de pi 15
Rossinyolic 15
Rossinyolic embudat 16
Rourenc 9
Rourenc d'estiu 10
Rovelló 4
Rovelló bord 39
Rovelló d'avet 5
Rovelló d'obaga 4
Rovelló de cabra 39
Rovelló de cabra 41
Rubroboletus satanas 43
Russula cyanoxantha 6
Russula emetica 47
Russula torulosa 42
Russula virescens 9
Rúsula emética 47
Scleroderma citrinum 45
Senderuela 33
Seta calabaza 8
Seta coliflor 7
Seta de campo 23
Seta de cardo 34
Seta de chopo 36
Seta de los caballeros 52
Seta de olivo 55
Seta de ostra 35
Seta de San Jorge 29
Seta del cura 9
Siurenc 9
Sparassis crispa 7
Suillus granulatus 11
Suillus luteus 16
Sureny 8
Sureny fosc 9
Tòfona negra 38
Tricholoma equestre 52
Tricholoma pardinum 53
Tricholoma portentosum 27
Tricholoma terreum 26
Trompeta 14
Trompeta amarilla 15
Trompeta de la mort 14
Trompeta de los muertos 14
Trompeta negra 14
Trufa negra 38
Tuber melanosporum 38
Vaqueta 13
Vaqueta negra 14
Verderol 52

Fotografías

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público. Cada una, con su autor, su licencia y el enlace al original, en la ficha de la web.

Lactarius semisanguifluus gardatxanae (CC BY-NC), David Marcos Vidal (CC BY-NC), Quercus morisii (CC BY-NC)

Pinetell d'avet David Marcos Vidal (CC BY-NC), Ibai Olariaga (CC BY-NC)

Enganyapastors de llet groga Jacobo Krauel (CC BY-NC)

Enganyapastors Luis Ballester (CC BY-NC), maricel patino (CC BY-NC), Pere Pujol Font (CC BY-NC)

Falso níscalo Alba Rovira (CC BY-NC), josep65 (CC BY-NC), David Marcos Vidal (CC BY-NC)

Gorro verde Javier Martínez Fuentes (CC BY-NC), Quercus morisii (CC BY-NC)

Carbonera Antoni Sunyer (CC BY-NC), Cándido Sos (CC BY-NC), mussolbarrios (CC BY-NC)

Cualbra morada Juan Carlos Zamora (CC BY-NC), Miguel (CC BY-NC)

Rúsula emética noah_siegel (CC BY-NC-SA), Simon M Davies (CC BY-NC), Vladimir Bryukhov (CC BY-NC)

Seta coliflor Nuria Kumari (CC BY-NC), Roger Vila (CC BY-NC), Xavi (CC BY-NC)

Boleto Carmelo López Abad (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC), Thomas Pruß (CC BY-SA 3.0)

Boleto negro Quercus morisii (CC BY-NC), Cándido Sos (CC BY-NC), hherb (CC BY-NC)

Boleto pinícola czech_mushrooms (CC0), UNIRSE Llavi (CC BY-NC), Joan Corominas Melian (CC BY-NC)

Boleto reticulado BrunadelPirineu (CC BY-NC), marula (CC BY-NC)

Boleto de Satanás ceslal (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

Boleto granulado Javier A. Canteros (CC BY-NC), Sean S (CC BY-NC), Quercus morisii (CC BY-NC)

Boleto anillado hherb (CC BY-NC), Ibai Olariaga (CC BY-NC), josep65 (CC BY-NC)

Cama de perdiu Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC), Assumpta MC (CC BY-NC), Ikrauel (CC BY-NC)

Paxilo joxepo (CC BY-NC), jonatan_antunez (CC BY-NC), José Luis Romero Rego (CC BY-NC)

Falso rebozuelo Rubén Pérez-González (CC BY-NC), Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC)

Pota de cavall groga Oriol Sastre (CC BY), nicomanus (CC BY-NC), alfredoherrero (CC BY-NC)

Rebozuelo jonatan_antunez (CC BY-NC), Marc Riera (CC BY), David Pereira (CC BY-NC)

Trompeta de los muertos yaya_love (CC BY-NC), pogon (CC BY-NC), fenneck (CC BY-NC)

Angula de monte Josep Sais i Brucet (CC BY-NC), Nico Hernandez (CC BY), polchof (CC BY-NC)

Camagroc andarubel (CC BY-NC), Luis Ballester (CC BY-NC), Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

Lengua de vaca Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), Jacobo Krauel (CC BY-NC), Josep Sais i Brucet (CC BY-NC)

Picornell de pi Joseba (CC BY-NC), Ángel Argüelles (CC BY-NC), Luis Ballester (CC BY-NC)

Peu de rata bord Cordula Bernert (CC BY-NC), Stevan Baluban (CC BY-NC), Philippe Geniez (CC BY-NC)

Hígado de buey Eduardo Martínez (CC BY), tarareare (CC BY-SA), Joan Ventura (CC BY-NC)

Oreja de Judas bertogcliment (CC BY-NC), Emily Nyenyedzi Davies (CC BY), S. Menéndez (CC BY)

Oronja GLJIVARSKO DRUSTVO NIS from Serbia (CC BY 2.0)

Farinera jl__cc (CC BY-NC), marcaluco (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

Oronja verde J. IGNASI (CC BY-NC), no rights reserved (CC0), polchof (CC BY-NC)

Cogomassa Luis Ballester (CC BY-NC), Amari García (CC BY-NC), Fatima Carrasco (CC BY-NC)

Farinera pudent Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Jesse Kalwij (CC BY-NC), Rene Weigelt (CC BY-NC)

Amanita proxima Luis Ballester (CC BY-NC), Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), jorgemartin71 (CC BY-NC)

Amanita pantera nicomanus (CC BY-NC), Yves Bas (CC BY), Oriol Sastre (CC BY)

Matamoscas graellsia (CC BY-NC), Вова Прогас (CC BY-NC), Quercus morisii (CC BY-NC)

Amanita gemmata Achim Lammerts (Syntaxys) (CC BY-SA 4.0), Strobilomyces (CC BY-SA 3.0)

Parasol victoriadurazo (CC BY-NC), Oriol Sastre (CC BY), Izan Lopez Vergel (CC BY-NC)

Fotografías

Lepiota metzinosa Luis Ballester (CC BY-NC), Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC), Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

Lepiota pudent Jacobo Krauel (CC BY-NC), santigibertbolets (CC BY-NC)

Barbuda Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), jorditb (CC BY-NC), Daniel Fornos Alimbau (CC BY-NC)

Champiñón silvestre Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC), Sarah and Fernando (CC BY-NC)

Bola de nieve Felipe Hidalgo (CC BY-NC), jorge-prieto (CC BY-NC), Javier Marcos Martínez (CC BY-NC)

Bola de neu pudent joxepo (CC BY-NC), Javier Marcos Martínez (CC BY-NC), Felipe Castilla Lattke (CC BY-NC)

Pedo de lobo guspiralsnuvols (CC BY-NC), victoriadurazo (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

Bejín gigante bargon (CC BY-NC), Ángel Argüelles (CC BY-NC), spacecadetkiddo (CC BY-NC)

Pet de llop gros Daniel Joaquin Aguirre Howes (CC BY-NC), piranyeta (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

Negrilla josep65 (CC BY-NC), Nico Hernandez (CC BY)

Capuchina David Marcos Vidal (CC BY-NC), jesus_lamata (CC BY-NC)

Seta de los caballeros Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Sean S (CC BY-NC), josep65 (CC BY-NC)

Fredolic metzinós Antton Meléndez (CC BY-NC), josep65 (CC BY-NC)

Pie azul Marc (CC BY-NC), no rights reserved (CC0), Guille Marín (CC BY-NC)

Clitocibe blanc Javier Marcos Martínez (CC BY-NC), Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC), julian_alonso (CC BY-NC)

Platera Josep Sais i Brucet (CC BY-NC), Jacobo Krauel (CC BY-NC), Roser Melero (CC BY-NC-SA)

Perrechico miguelayuso (CC BY-NC), Carmelo López Abad (CC BY-NC), esther69 (CC BY-NC)

Babosa negra jl__cc (CC BY-NC), yossarianc (CC BY-NC)

Llenega blanca pauoc (CC BY-NC), Luis Ballester (CC BY-NC), Francisco Valverde (CC BY-NC)

Carlet Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Jacobo Krauel (CC BY-NC), J. IGNASI (CC BY-NC)

Senderuela Izan Lopez Vergel (CC BY-NC), Experience Matters (CC BY-NC), yossarianc (CC BY-NC)

Seta de olivo Juan Bertrand-Figueroa (CC BY-NC), Bernat Espigulé (CC BY-NC), Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC)

Mycena pura Sean S (CC BY-NC), Hannah (CC BY-NC)

Seta de cardo toniconca (CC BY-NC), Nico Hernandez (CC BY), Javier Royán Martín (CC BY-NC)

Seta de ostra Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), Juan José de Haro (CC BY-SA)

Fals carlet Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Javier Marcos Martínez (CC BY-NC), Luis Ballester (CC BY-NC)

Molinera Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC), Cándido Sos (CC BY-NC)

Seta de chopo Bernat Espigulé (CC BY-NC), martaasoler (CC BY-NC)

Bolet de pi Josep Sais i Brucet (CC BY-NC), oriol3333 (CC BY-NC)

Galerina marginada Mario Vega Pérez (CC BY-NC), faluke (CC BY-NC)

Inosperma erubescens Javier Marcos Martínez (CC BY-NC), Jose Castro (CC BY)

Barret de bruixa Cándido Sos (CC BY-NC), David Marcos Vidal (CC BY-NC), deinonyco (CC BY-NC-SA)

Cortinari metzinós Felipe Hidalgo (CC BY-NC), Federico Calledda (CC BY-NC), ljantos (CC BY-NC)

Bolet de femer jonatan_antunez (CC BY-NC), diana_fuir (CC BY-NC), ferran garcia mari (CC BY-NC)

Colmenilla rauldelamorena (CC BY-NC), franja44 (CC BY-NC)

Colmenilla negra Eva Palacian (CC BY-NC), tonipons (CC BY-NC)

Falsa colmenilla Lídia Carrera (CC BY), M.Antònia Barros Amils (CC BY-NC), jaap_engberts (CC BY-NC)

Trufa negra Luis Ballester (CC BY-NC), jorgecalamocha (CC BY-NC), Charo Val (CC BY-NC)

Árboles, parejas y otras Thomas Pruß (CC BY-SA 3.0), no rights reserved (CC0), Quercus morisii (CC BY-NC), David Pereira (CC BY-NC), Jacobo Krauel (CC BY-NC), piranyeta (CC BY-NC), Вова Протас (CC BY-NC), Izan Lopez Vergel (CC BY-NC), jl__cc (CC BY-NC), Alba Rovira (CC BY-NC), dbmhartley (CC0), Tom W (CC BY), Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC), Daniel Espejo Fraga (CC BY-NC), Josep Gesti (CC BY-SA), kionez15 (CC BY-NC), Manolo (CC BY-NC), mmaterezaa (CC BY-NC), Arnau Comajuan (CC BY-NC), merisolano (CC BY-NC), Awinch1001 (CC0), Jugrü (Public domain), Josemiriarte (CC BY-SA 3.0), mariacazcarraperez (CC BY-NC), JMK (CC BY-SA 3.0), Quentin Groom (CC0), Agnieszka Kwiecień, Nova (CC BY-SA 4.0), Vojtěch Zavadil (CC BY-SA 3.0), ocell (CC BY-NC), Stefan.lefnaer (CC BY-SA 4.0), Jordi Bassols Garcia (CC BY-NC), Lluïsabisbe (CC BY-NC), Christian Fischer (CC BY-SA 3.0), Ayotte, Gilles, 1948- (CC BY-SA 4.0), Marc Riera (CC BY), Hladac (CC BY-SA 4.0), adriamanrique (CC BY-NC), Dietmar Rabich (CC BY-SA 4.0)

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

Llame ahora

112

Emergencias
Diga que han comido setas silvestres y cuándo.

91 562 04 20

Toxicología · 24 h
Información de intoxicaciones.

QUÉ HACER

- → **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.
- → **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.
- → **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.
- → **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.
- → **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).

ANÓTELO ANTES DE SALIR

ALOJAMIENTO

CENTRO DE SALUD

SOCIEDAD MICOLÓGICA

DÓNDE APARQUÉ

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura**. Uso personal o sin ánimo de lucro.