SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

# Llame ahora

**112** — **Emergencias**
Diga que han comido setas silvestres y cuándo.

**91 562 04 20** — **Toxicología · 24 h**
Información de intoxicaciones.

## QUÉ HACER

- → **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.
- → **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.
- → **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.
- → **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.
- → **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

**Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).**

## ANÓTELO ANTES DE SALIR

ALOJAMIENTO


CENTRO DE SALUD

SOCIEDAD MICOLÓGICA

DÓNDE APARQUÉ

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura**. Uso personal o sin ánimo de lucro.






CISTELLA SEGURA · CATALUÑA

# Setas *esenciales*

Las 46 setas que hay que conocer en Cataluña: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

● 25 COMESTIBLES ● 9 MORTALES ● 12 TÓXICAS

**Ante la duda, no la recolecte.**

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**



MORTAL ●○○ FÁCIL — *murga*

# Bolet de greix

*Gyromitra esculenta* · falsa colmenilla · bonete

*Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).*





E F M **A M J** J A S O N D · Liso · Sin anillo · Sin volva · 600–2200 m

## RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.
! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

**GRAVEDAD ●●● Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

**SÍNDROME GIROMITRIANO (CONVULSIVO Y HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

**DÓNDE** Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. Coníferas de montaña.

### SE CONFUNDE CON



**Múrgola** CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 29



**Múrgola** CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco.

**COMPRUEBE Corte longitudinal.**



COMESTIBLE ●○○ FÁCIL — *llémena*

# Llengua de bou

*Hydnum repandum* · lengua de vaca · gamuza

*Los ejemplares viejos amargan.*


En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.


Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.


Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

E F M A M J J A **S O N D** · Aguijones · Sin anillo · Sin volva · 0–1800 m

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

**SABOR** Suave; amargo en ejemplares viejos.

**DÓNDE** Con encina, haya, castaño, pino silvestre y abeto blanco y otros. Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Hydnellum / Sarcodon*** NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.



**Picornell de pi** COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie.

**COMPRUEBE** Consistencia de la carne.

ANTES DE SALIR

# Las 12 reglas

*No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.*

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.** Conocer una especie significa saber reconocer todos sus rasgos decisivos y todas las especies peligrosas con las que se confunde.
2. **Extraiga el ejemplar entero.** La base del pie (volva, bulbo, micelio) es imprescindible para descartar amanitas mortales.
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.** En un mismo corro pueden crecer mezcladas una comestible y una tóxica (por ejemplo, el cama-sec y los clitocibes blancos).
4. **No mezcle especies en la cesta** y lleve las dudosas aparte, envueltas en papel.
5. **Deseche los ejemplares viejos, agusanados, empapados, helados o muy jóvenes.** Los viejos se descomponen y pueden causar intoxicaciones aunque la especie sea comestible; los botones muy jóvenes aún no muestran los rasgos de identificación.
6. **Use una cesta rígida y ventilada**, nunca bolsas de plástico, que aceleran la descomposición.
7. **No crea en pruebas caseras.** El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.
8. **Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas.** Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.
9. **Ante cualquier duda, consulte a un micólogo** (sociedades micológicas y sus exposiciones), con el ejemplar entero y fresco, nunca solo con una foto.
10. **Cocine siempre las setas.** Muchas comestibles son tóxicas en crudo o poco hechas: colmenillas, pie azul, armilaria, amanita vinosa, mataparents.
11. **Guarde un ejemplar crudo** de cada especie en la nevera hasta el día siguiente: si alguien se encuentra mal, servirá para identificarla.
12. **Evite lugares contaminados**: cunetas de carreteras, zonas industriales, vertederos, campos tratados.



SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

# Síndromes

*Según cuánto tardan los síntomas. Más de 6 horas es señal de alarma.*

### PRECOZ (MENOS DE 6 H)

**Gastrointestinal**
Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. La mayoría se resuelven en horas, pero algunas son intensas.
*Lactarios de látex blanco, rúsulas picantes, Entoloma sinuatum, Omphalotus olearius, Tricholoma pardinum, Rubroboletus satanas, Agaricus xanthodermus, Ramaria formosa, Hypholoma fasciculare, Scleroderma, setas comestibles en mal estado*

**Colinérgico (muscarínico)**
Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, pulso lento.
*Inocybe e Inosperma, clitocibes blancos (Clitocybe rivulosa), Mycena pura*

**Neurológico central (panterínico)**
Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia, a veces convulsiones o coma.
*Amanita pantherina, A. muscaria, A. gemmata*

**Alucinógeno**
Alteraciones de la percepción y del comportamiento.
*Psilocybe, Panaeolus*

**Coprínico (tipo disulfiram)**
Enrojecimiento, palpitaciones y malestar al beber alcohol, hasta 3 días después.
*Coprinopsis atramentaria + alcohol*

### TARDÍA (6–24 H)

**Hepatotóxico (faloidiano)**
Gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave. Potencialmente mortal.
*Amanita phalloides, A. verna, A. virosa, lepiotas pequeñas (Lepiota brunneoincarnata y afines), Galerina marginata*

**Giromitriano (convulsivo)**
Síntomas digestivos, neurológicos (convulsiones) y daño hepático. Potencialmente mortal.
*Cyromitra esculenta*

### RETARDADA (MÁS DE 24 H)

**Nefrotóxico**
Sed, cansancio, dolor lumbar, alteraciones de la orina; insuficiencia renal.
*Cortinarius orellanus (de 2 a 15 días) y Amanita proxima (síntomas en 8–14 h, fallo renal en 1–3 días)*

**Rabdomiolítico**
Debilidad y dolor muscular, orina oscura; afectación cardíaca en casos graves.
*Tricholoma equestre (comidas repetidas)*

**Hemolítico**
Destrucción de glóbulos rojos e insuficiencia renal.
*Paxillus involutus (personas sensibilizadas)*







COMESTIBLE ●●○ MEDIA *reig*

# Ou de reig

*Amanita caesarea* · oronja · amanita de los césares

*Comestible excelente. Los «huevos» cerrados no deben recolectarse: en ese estado se confunden con los de la farinera borda y otras amanitas mortales.*


En su punto: sombrero naranja, pie amarillo y volva blanca.


Láminas y pie AMARILLOS; volva blanca en saco.


Joven: sale de un huevo blanco.

E F M A M J J A **S** **O** N D · Láminas · Con anillo · **Con volva** · 50–1100 m

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON


**Farinera borda** MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 31


**Reig bord** TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 45

- ***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal del huevo.



MORTAL ●●○ MEDIA *bolet de mantellina*

# Cortinari metzinós

*Cortinarius orellanus*


Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.


Láminas color herrumbre, espaciadas.


Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

E F M A M J J A **S** **O** N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 100–1500 m

### RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
! Esporada pardo herrumbre.
! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

**OLOR** Débil a rábano.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

**SÍNDROME ORELLÁNICO (NEFROTÓXICO TARDÍO)** Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida; insuficiencia renal que puede requerir diálisis o trasplante.

**DÓNDE** Con roble pubescente, castaño y encina. Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

### SE CONFUNDE CON


**Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas. → p. 12


**Camagroc** COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

TÓXICA ●●○ MEDIA

*carlet bord*

# Fals carlet

*Entoloma sinuatum*


Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.


Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa...


Adulto

E F M A M J J A **S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 100–1500 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.
! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

**OLOR** A harina rancia.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO)** Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

**DÓNDE** Con roble pubescente, haya y castaño. Bosques de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**


**Carlet** COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca. → p. 25


**Moixernó** COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera. → p. 23

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas.






ANTES DEL NOMBRE

# Cómo mirar una seta

*Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.*




**1 Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

**2 Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

**3 Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

**4 Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

**5 Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

**6 Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

**QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO**


**Láminas** Hojas finas


**Tubos** Una esponja


**Pliegues** Venas gruesas


**Aguijones** Púas blandas


**Interior** Bola sin sombrero


**LA EDAD CUENTA**

*Una comestible vieja o pasada también intoxica. Cójala joven y firme. (Rovelló)*


✓ Joven


✓ En su punto


✗ Viejo


✗ Pasado

**Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE**








MORTAL ●●○ MEDIA

# *Inosperma erubescens*

*Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina. ).*


Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.


Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).



E F M A **M J J** A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1500 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO (GRAVE)** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión; puede ser mortal sin tratamiento.

**DÓNDE** Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

**SE CONFUNDE CON**


**Moixernó** COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 23

**COMPRUEBE** **Sombrero, manchas rojas y olor.**





COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*cogomella*

# Apagallums

*Macrolepiota procera* · parasol · galamperna


En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.


Pie con dibujo de piel de serpiente


Debajo

E F M A M J J **A S O N** D · Láminas · Con anillo · Sin volva · 0–1800 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.
✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

**OLOR** Agradable, a avellana.

**DÓNDE** Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Lepiota metzinosa** MORTAL Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado. → p. 34


**Pixacà** TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso. → p. 44


**Apagallums** CONDICIONADA Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

**COMPRUEBE** Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

DÓNDE BUSCAR

# Árboles y sus setas

*Muchas setas viven unidas a las raíces de un árbol: reconocerlo por la hoja y el tronco es el primer paso.*






## Pino carrasco

pi blanc

*Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido; tronco a menudo inclinado o tortuoso.*

**BUSQUE** Rovelló y pinetell *6*, Molleric *10*, Cama de perdiu *11*, Fredolic *21*, Llenega negra *24*

**CUIDADO** Cualbra morada *40*






## Pino piñonero

pi pinyer

*Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.*

**BUSQUE** Rovelló y pinetell *6*, Molleric *10*, Cama de perdiu *11*, Fredolic *21*

**CUIDADO** Verderol *46*, Cualbra morada *40*






## Pino laricio

pinassa

*Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.*

**BUSQUE** Rovelló y pinetell *6*, Peu de rata de pi *8*, Molleric *10*, Cama de perdiu *11*, Camagroc *14*, Fredolic *21*

**CUIDADO** Cualbra morada *40*






## Pino silvestre

pi roig

*Copa irregular y alta; la parte superior del tronco y las ramas gruesas son de color naranja asalmonado, visible de...*

**BUSQUE** Rovelló y pinetell *6*, Peu de rata de pi *8*, Cep *9*, Molleric *10*, Cama de perdiu *11*, Rossinyol *12*

**CUIDADO** Paxil·le tòxic *30*, Bolet de greix *38*, Pixacà *44*, Reig bord *45*, Verderol *46*, Fredolic metzinós *47*






## Encina

alzina

*Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate; en el interior a menudo en forma de mata.*

**BUSQUE** Llora *7*, Rossinyol *12*, Trompeta de la mort *13*, Llengua de bou *15*, Ou de reig *16*, Carlet *25*

**CUIDADO** Paxil·le tòxic *30*, Farinera borda *31*, Cogomassa *32*, Cortinari metzinós *37*, Enganyapastors de llet groga *39*, Matagent *41*





TÓXICA ●○○ FÁCIL

*bolet d'oliu*

# Gírgola d'olivera

*Omphalotus olearius* · seta de olivo

*Tóxica: gastroenteritis intensa. Confusión frecuente con el rossinyol.*


Un ramillete de setas anaranjadas sobre un tocón.


Debajo


Láminas que bajan por el pie y pies unidos en la...

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1000 m

RASGOS DE ALARMA

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño.
! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.
! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

**DÓNDE** Con olivo, encina, castaño y roble pubescente. Olivares, encinares y castañares; tocones y raíces.

SE CONFUNDE CON


**Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en el suelo. → p. 12

**COMPRUEBE** Parte inferior y crecimiento.





COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Bolet de tinta

*Coprinus comatus* · barbuda · matacandil

*Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.*


Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado: el momento de recolectarlo.


Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por...


Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

E F **M A M** J J A **S O N D** Láminas Con anillo Sin volva 0–1500 m

CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).
✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

**DÓNDE** Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON


**Bolet de femer** TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada.


**Coprí garsa** NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

**COMPRUEBE** Color y superficie del sombrero.





MORTAL ●●○ MEDIA

*galerina metzinosa*

# Galerina marginada

*Galerina marginata*


Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.


Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...


Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Con anillo Sin volva 0–2000 m

RASGOS DE ALARMA

! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
! Anillo fino pardo en el pie.
! Esporada pardo herrumbre.
! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**DÓNDE** Madera muerta de coníferas y planifolios.

SE CONFUNDE CON


**Pollancró** COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 28

≈ ***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

**COMPRUEBE** **Tamaño y árbol.**

TÓXICA ●●○ MEDIA *candeleta*

# Clitocibe blanc

*Clitocybe rivulosa*





E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.
! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).
! Esporada blanca (no rosada).

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO (COLINÉRGICO)** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

**DÓNDE** Prados, céspedes, claros herbosos.

**SE CONFUNDE CON**


**Cama-sec** COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso. → p. 26


**Moixernó blanc de tardor** COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina.

**COMPRUEBE** Láminas.







# Árboles y sus setas






**Abeto blanco** avet

*Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.*

**BUSQUE** Cep 9, Rossinyol 12, Camagroc 14, Llengua de bou 15
**CUIDADO** Bolet de greix 38, Reig bord 45, Fredolic metzinós 47






**Alcornoque** surera

*Árbol de copa amplia y verde grisácea; tronco con corcho grueso o, si se ha descorchado, de color rojo anaranjado.*

**BUSQUE** Llora 7, Rossinyol 12, Ou de reig 16
**CUIDADO** Farinera borda 31, Cogomassa 32, Enganyapastors de llet groga 39






**Roble pubescente** roure martinenc

*Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las hojas secas.*

**BUSQUE** Llora 7, Trompeta de la mort 13, Llengua de bou 15, Ou de reig 16, Carlet 25
**CUIDADO** Farinera borda 31, Cogomassa 32, Cortinari metzinós 37, Enganyapastors de llet groga 39, Matagent 41, Peu de rata bord 43






**Haya** faig

*Árbol alto de corteza lisa y gris; bajo su copa densa apenas crece sotobosque.*

**BUSQUE** Llora 7, Cep 9, Rossinyol 12, Trompeta de la mort 13, Llengua de bou 15
**CUIDADO** Farinera borda 31, Farinera pudent 33, Matagent 41, Peu de rata bord 43, Pixacà 44, Fredolic metzinós 47






**Castaño** castanyer

*Árbol grande de copa amplia; a menudo en forma de rebrotes de cepa (castañares de leña).*

**BUSQUE** Llora 7, Cep 9, Rossinyol 12, Trompeta de la mort 13, Llengua de bou 15, Ou de reig 16
**CUIDADO** Paxil·le tòxic 30, Farinera borda 31, Cortinari metzinós 37, Enganyapastors de llet groga 39, Matagent 41, Peu de rata bord 43







MORTAL ●●○ MEDIA *palometa*

# Lepiota metzinosa

*Lepiota brunneoincarnata*


Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.

Pie rosado con bandas y láminas blancas.

Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el...

E F M **A M** J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–900 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
! Láminas blancas, libres.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**DÓNDE** Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

**SE CONFUNDE CON**


**Apagallums** COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado. → p. 17


**Cama-sec** COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas. → p. 26

**COMPRUEBE** **Tamaño, anillo y pie.**






COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Camperol

*Agaricus campestris* · champiñón silvestre · seta de campo


En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.

Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un...

Girelo siempre

E F M A **M J** J A **S O N** D Láminas Con anillo Sin volva 0–2000 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
✓ Sin volva en la base.
✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

**DÓNDE** Pastos con ganado, prados de siega.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Cogomassa** MORTAL Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 32


**Bola de neu pudent** TÓXICA Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol.


**Fals carlet** TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques. → p. 50

**COMPRUEBE** Láminas y base.

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

*esclatasang · rovelló d'obaga*

# Rovelló y pinetell

*Lactarius sanguifluus* y *L. deliciosus* · níscalos, rebollones


Rovelló: naranja vinoso, con pocas zonas.


Pinetell: zonas bien marcadas.


Pinetell: láminas naranja vivo.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2100 m

| | Rovelló | Pinetell |
|---|---|---|
| LÁTEX | Rojo vino desde el primer momento | Naranja zanahoria; no pasa a vino |
| LÁMINAS | Rosa vinoso o lila | Naranja vivo |
| DÓNDE | Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media | Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías |

**LOS DOS**

✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
✓ Siempre bajo pinos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Paxil·le tòxic** MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne. → p. 30


**Enganyapastors de llet groga** TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 39

**COMPRUEBE** Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.





TÓXICA ●●○ MEDIA

# Fredolic metzinós

*Tricholoma pardinum*


Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.


Sombrero escamoso y pie robusto y lleno.


Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

E F M A M J J **A S O** N D Láminas Sin anillo Sin volva 800–2000 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).
! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
! Olor a harina.

**OLOR** A harina.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

**DÓNDE** Con abeto blanco, haya y pino silvestre. Bosques de montaña.

**SE CONFUNDE CON**


**Fredolic** COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 21


**Fredolic gros** COMESTIBLE Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

**COMPRUEBE** Tamaño y escamas.






COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Pet de llop

*Lycoperdon perlatum* · pedo de lobo · bejín

*Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.*


Joven, blanco y lleno de verrugas: el momento de recolectarlo.


De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden.


Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

E F M A M J J **A S O N D** Interior Sin anillo Sin volva 0–2000 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.
✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.
✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

**DÓNDE** Bosques de todo tipo y sus bordes.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Farinera borda** MORTAL Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie). → p. 31


**Pota de cavall groga** TÓXICA Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.





MORTAL ●●○ MEDIA

# Farinera pudent

*Amanita virosa*

*Mortal (amatoxinas).*


Toda blanca, con anillo y volva.


Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría...


Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

E F M A M J J **A S O** N D Láminas Con anillo **Con volva** 500–1800 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
! Volva blanca en saco.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

**DÓNDE** Con haya y abedul. Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

**SE CONFUNDE CON**


**Bola de neu** COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva.

**COMPRUEBE** **Láminas y base.**

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*groguet*

# Verderol

*Tricholoma equestre* · seta de los caballeros


Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.


Debajo: láminas amarillo azufre.


Sombrero amarilleto con escamitas oscuras en el...

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1700 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Láminas amarillo azufre intenso.
! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.
! Pie amarillo.
**OLOR** A harina débil.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

**SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO** Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura; en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria.

**DÓNDE** Con pino piñonero, silvestre y rodeno. Pinares sobre suelo arenoso.

**SE CONFUNDE CON**


**Fredolic gros** COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras.


**Farinera borda** MORTAL Láminas blancas, anillo y volva. → p. 31

**COMPRUEBE** Sombrero.





COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*llora morada*

# Llora

*Russula cyanoxantha* · carbonera

*Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).*




Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.


Carbonera (R. cyanoxantha)

E F M A M **J J A S O N** D Láminas Sin anillo Sin volva 50–1700 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).
✓ Sin anillo ni volva.
✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

**DÓNDE** Con haya, castaño, encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Farinera borda** MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 31

- ***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.


**Cualbra morada** NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante. → p. 40

**COMPRUEBE** Base del pie (desentiérrela) y anillo.







MORTAL ●●○ MEDIA

# Cogomassa

*Amanita verna*







E F M **A M J** J A **S O** N D Láminas Con anillo **Con volva** 0–900 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta enteramente blanca.
! Volva blanca en saco en la base.
! Anillo membranoso blanco.
! Láminas blancas, libres.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y alcornoque. Encinares y robledales mediterráneos.

**SE CONFUNDE CON**


**Moixernó** COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina. → p. 23


**Camperol** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 19

**COMPRUEBE** **Base y pie.**





COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

*negret*

# Fredolic

*Tricholoma terreum* · negrilla · ratón


En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.


Debajo


Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.
✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.
**OLOR** Débil, no harinoso.

**DÓNDE** Con pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero. Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Fredolic metzinós** TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas como un dibujo de tigre; olor a harina; láminas con reflejos verde amarillentos. → p. 47

- ***Tricholoma virgatum / T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo; carne amarga o picante; láminas con arista punteada de negro en T.
- ***Inocybe (varias especies grises)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada parda), olor espermático o terroso.

**COMPRUEBE** Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *greixa*

# Peu de rata de pi

*Sparassis crispa* · seta coliflor · barba de cabra

*Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.*


Una bola como una coliflor, al pie de un pino.


De cerca


Crema pálido, entre la pinaza.

E F M A M J J A **S O N** D · Ramificado · Sin anillo · Sin volva · 100–1800 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.
✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.
✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y rodeno. Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Peu de rata bord** TÓXICA Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios. → p. 43


**Peu de rata col-i-flor** CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

**COMPRUEBE** Forma de las ramas.



TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Reig bord

*Amanita muscaria* · matamoscas · falsa oronja

*Tóxica (neurotóxica). Los tratamientos «para destoxificarla» no son seguros.*


Sombrero rojo con verrugas blancas y pie blanco.


Debajo


Joven: cubierta de verrugas, como una bola.

E F M A M J J **A S O N** D · Láminas · Con anillo · **Con volva** · 300–2200 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero rojo con verrugas blancas (que la lluvia puede borrar).
! Láminas y pie BLANCOS.
! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO) Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia; vómitos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, abedul, abeto blanco y pino negro. Bosques de montaña sobre suelo ácido.

**SE CONFUNDE CON**


**Ou de reig** COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca. → p. 16

**COMPRUEBE** Láminas y pie.





COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Pimpinella morada

*Lepista nuda* · pie azul


En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.


Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.


De cerca: láminas y pie violetas.

**E F M A** M J J A S **O N D** · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1800 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
✓ Sin cortina ni anillo.
✓ Olor afrutado o perfumado.

**OLOR** Afrutado, perfumado.

**DÓNDE** Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

- ***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)*** TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.


**Barret de bruixa** TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas.


***Mycena pura*** TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano.

**COMPRUEBE** Esporada y parte alta del pie.



MORTAL ●●○ MEDIA *cogoma borda*

# Farinera borda

*Amanita phalloides* · oronja verde · amanita mortal


Adulta: sombrero verde oliva, anillo como una falda y volva en la base.


Debajo: láminas BLANCAS y anillo colgante.


Láminas blancas y base con volva

E F M A M **J J** A S **O N** D · Láminas · Con anillo · **Con volva** · 0–1500 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
! Láminas BLANCAS, libres.
! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO) Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos; tras una aparente mejoría, daño hepático grave a partir del segundo o tercer día, que puede requerir trasplante o causar la muerte.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente, alcornoque, castaño y haya. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**SE CONFUNDE CON**


**Llora verda** COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.


**Llora** COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 7

TÓXICA ●●○ MEDIA

*reig bru*

# Pixacà

*Amanita pantherina* · amanita pantera


Sombrero pardo con verrugas blancas, anillo y bulbo en la base.


Debajo: láminas blancas y anillo liso.


Margen del sombrero estriado y anillo colgante.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 0–1900 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.
! Base del pie en bulbo con un reborde (como un calcetín enrollado) y 1–2 anillos por encima.
! Anillo liso, sin estrías por arriba.
! La carne NO enrojece.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, alternancia de excitación y somnolencia; vómitos; en casos graves convulsiones y coma.

**DÓNDE** Con pino silvestre, roble pubescente, haya y encina. Bosques de coníferas y planifolios.

**SE CONFUNDE CON**


**Apagallums** COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 17


**Vinosa** CONDICIONADA En la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas, el anillo está estriado por arriba y las verrugas son grisáceas o rosadas.

**COMPRUEBE** Pie y base.





COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*sureny*

# Cep

*Boletus edulis* · boleto · hongo blanco


En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.


Jóvenes, redondos como tapones de corcho


Ceps recolectados en la cesta de mimbre.

E F M A M J J A S O N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva — 600–2000 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

**SABOR** Suave, a avellana.

**DÓNDE** Con haya, castaño, roble albar, pino silvestre y abeto blanco y otros. Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Matagent** TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente. → p. 41


**Molleric amarg** NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.


**Mataparent amarg** NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

**COMPRUEBE** Poros y pie.







MORTAL ●●○ MEDIA

*paxil enrotllat*

# Paxil·le tòxic

*Paxillus involutus* · paxilo


Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia dentro.


Margen del sombrero muy enrollado.


Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1900 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.
! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.
! Sin látex.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

**SÍNDROME HEMOLÍTICO (PAXÍLICO)** Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y fallo renal.

**DÓNDE** Con abedul, pino silvestre, encina y castaño. Bosques variados, también parques; prefiere suelos ácidos.

**SE CONFUNDE CON**


**Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo. → p. 6


**Pinetell** COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 6





COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*bolet de Sant Jordi*

# Moixernó

*Calocybe gambosa* · perrechico · seta de San Jorge







E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 400–2000 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

**OLOR** Intenso a harina fresca.

**DÓNDE** Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


***Inosperma erubescens*** MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 36


**Cogomassa** MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 32


**Fals carlet** TÓXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 50

**COMPRUEBE** Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*molleric granellut*

# Molleric

*Suillus granulatus* · boleto granulado

*Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).*


En su punto: sombrero pardo brillante, pie amarillento, en grupo bajo pinos.


Poros amarillos con gotitas blancas


Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

E F M A M J J A S O N D · Tubos · Sin anillo · Sin volva · 0–1800 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino carrasco, silvestre, laricio, piñonero y rodeno. Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Molleric pebrer** NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.


**Molleric** COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.


**Molleric calçat** COMESTIBLE Anillo membranoso grande en el pie.

**COMPRUEBE** Color de los poros.





TÓXICA ●●○ MEDIA

# Peu de rata bord

*Ramaria formosa*

*Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).*


Forma de coral, ramas rosa anaranjado.


Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.


Puntas de las ramas amarillentas.

E F M A M J J A S O N D · Ramificado · Sin anillo · Sin volva · 200–1600 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.
! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

**SABOR** Algo amargo (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

**DÓNDE** Con haya, roble pubescente y castaño. Bosques de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**


**Peu de rata de pi** COMESTIBLE Lóbulos aplanados crema, en pinos. →p. 8


**Peu de rata col-i-flor** CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

**COMPRUEBE** Forma.





COMESTIBLE ●●○ MEDIA


*llenega*

# Llenega negra

*Hygrophorus latitabundus* · babosa negra

*latitabundus o H. limacinus). Retire el mucílago al limpiarla.*


En su punto: sombrero pardo oliva, brillante y viscoso.


Láminas blancas y pie blanco con puntitos.


Joven

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 100–1500 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.
✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.
✓ Esporada blanca.

**DÓNDE** Con pino carrasco, laricio y silvestre. Pinaza de pinares calizos; los sombreros viscosos quedan cubiertos de agujas pegadas.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Llenega borda** NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.


**Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE Láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo intenso.


**Llenega blanca** COMESTIBLE Sombrero blanco crema.

**COMPRUEBE** Color de las láminas maduras y esporada.





CONDICIONADA ●●○ MEDIA

*rabassola*

# Múrgola

*Morchella esculenta* · colmenilla · cagarria

*Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.*







E F M A M J J A S O N D · Alvéolos · Sin anillo · Sin volva · 0–1600 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.
✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

**DÓNDE** Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Bolet de greix** MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. →p. 38

- ***Verpa bohemica*** TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.


**Múrgola** CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

NO COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*rossinyol ataronjat*

# Fals rossinyol

*Hygrophoropsis aurantiaca* · falso rebozuelo

*No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.*


Todo naranja, con láminas verdaderas.


Debajo


De cerca: láminas blandas naranja intenso.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1800 m

TÓXICAS

**RASGOS DE ALARMA**

! Láminas verdaderas: finas, apretadas, bifurcadas varias veces, naranja vivo.
! Carne delgada y blanda, no compacta.
! Sombrero aterciopelado naranja a pardo anaranjado.

GRAVEDAD ●○○ **Leve.** No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

**DÓNDE** Con pino silvestre y rodeno. Pinares, sobre restos de madera y acículas.

**SE CONFUNDE CON**


**Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas), carne gruesa y firme, color yema de huevo. → p. 12


**Círgola d'olivera** TÓXICA Omphalotus crece en grandes ramilletes sobre madera de olivo, encina o castaño y es mucho más carnoso. → p. 49

**COMPRUEBE** Parte inferior: pase el dedo; los pliegues no se separan como láminas.



COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*pota de perdiu*


# Cama de perdiu

*Chroogomphus rutilus*

*Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.*


En su punto: sombrero rojizo y láminas ocre que bajan por el pie.


Debajo


Carne y pie de color naranja salmón.

COMESTIBLES

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1800 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero. Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Cortinari metzinós** MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 37


**Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca. → p. 42


**Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

**COMPRUEBE** Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.





COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Pollancró

*Cyclocybe cylindracea* · seta de chopo

*Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).*







COMESTIBLES

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1200 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

**DÓNDE** Con chopo negro y álamo blanco. Riberas, choperas y parques.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Galerina marginada** MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos. → p. 35


**Bolet de pi** TÓXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo.

**COMPRUEBE** Tamaño y árbol.



COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Carlet

*Hygrophorus russula*

*Puede amargar ligeramente.*


En su punto: sombreros rosados con salpicaduras vinosas, firmes.


Debajo


Láminas algo decurrentes y pie blanco manchado.

COMESTIBLES

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1300 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.
✓ Bajo encinas y robles.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y quejigo. Hojarasca de encinares calizos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Fals carlet** TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia. → p. 50


**Cualbra morada** NO COMESTIBLE Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos. → p. 40

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas maduras.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *vaqueta*

# Rossinyol

*Cantharellus cibarius* · rebozuelo · cabrito


En su punto: todo amarillo yema, carnoso, con el margen ondulado.


Debajo


De cerca

E F M A M **J J A S O N** D · Pliegues · Sin anillo · Sin volva · 50–1800 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, castaño, haya y roble albar y otros. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Cortinari metzinós** MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 37


**Gírgola d'olivera** TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 49


**Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda. → p. 42

**COMPRUEBE** Parte inferior.



TÓXICA ●○○ FÁCIL *mataparent de Satanàs*

# Matagent

*Rubroboletus satanas* · boleto de Satanás


Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.


Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.


De cerca: poros rojo anaranjado.

E F M A M J **J A S O** N D · Tubos · Sin anillo · Sin volva · 100–1300 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
! Poros rojos o rojo anaranjados.
! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
! La carne azulea débilmente al corte.

**OLOR** Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (A VECES INTENSO)** Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal; puede requerir atención hospitalaria por deshidratación.

**DÓNDE** Con roble pubescente, encina, castaño y haya. Bosques claros y cálidos de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**


**Cep d'estiu** COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.


**Sureny fosc** COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

**COMPRUEBE** Poros y corte.





COMESTIBLE ●●○ MEDIA *carrereta*

# Cama-sec

*Marasmius oreades* · senderuela · carrerilla

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.*


En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.


La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.


Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

E F M **A M J** J A **S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–2200 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

**OLOR** Débil, a almendra amarga.

**DÓNDE** Corros de hierba más verde o más seca en prados.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Lepiota metzinosa** MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 34


**Clitocibe blanc** TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 48

• ***Inocybe (especies de prado)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

**COMPRUEBE** Sombrero.



COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Gírgola de panical

*Pleurotus eryngii* · seta de cardo

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*


En su punto: sombrero pardo, carnoso, y láminas que bajan por el pie.


Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.


Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

E F M **A M** J J A S **O N D** · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1200 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.
✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

**DÓNDE** Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Clitocibe blanc** TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 48


**Fals carlet** TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 50

**COMPRUEBE** Color y base.

NO COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

*escaldabec vinós*

# Cualbra morada

*Russula torulosa*


Sombrero púrpura oscuro y pie teñido de púrpura, bajo pinos.


Debajo: láminas crema y pie rosa púrpura.


De lado: pie teñido de púrpura.

E F M A M J J A S **O** **N** **D** · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1600 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.
! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.
! Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

**SABOR** Muy picante (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

**DÓNDE** Con pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero. Pinares mediterráneos y de montaña media.

**SE CONFUNDE CON**


**Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que verdean y pie hueco con hoyuelos. → p. 6


**Llora** COMESTIBLE La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas, sabor suave y crece bajo planifolios. → p. 7

**COMPRUEBE** Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.





COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*trompeta*

# Trompeta de la mort

*Craterellus cornucopioides* · trompeta de los muertos · trompeta negra

*Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).*


En su punto: negras, firmes y en grupo.


Mire por dentro


Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D** · Liso · Sin anillo · Sin volva · 100–1600 m

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.
✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).
✓ Carne delgada y elástica.

**DÓNDE** Con haya, encina, castaño, roble pubescente y albar. Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**


**Orella de gat negra** CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

- ***Craterellus cinereus*** COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

**COMPRUEBE** Forma general.





## Cómo montar el cuaderno

1. **Imprime a doble cara**, «voltear por el borde largo», a **tamaño real (100 %)**.
2. **Corta** todas las hojas por la mitad, por la línea de puntos ✂.
3. **Ordena las mitades** por el número pequeño de abajo: la 1 encima del todo, con los números a la vista.
4. **Dobla el montón** por la mitad, hacia atrás, para que la primera página quede por fuera.
5. **Grapa por el pliegue** (2 grapas) o cóselo con hilo por 3 agujeros.

Esta media hoja sobra: puedes tirarla o usarla de punto de libro.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *rossinyol de pi*

# Camagroc

*Craterellus lutescens* · angula de monte · trompeta amarilla

*Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).*


En su punto: pies amarillos y sombreros pardos, en grupo entre el musgo.


Debajo no hay láminas


Pie amarillo y hueco.

E F M A M J J A S **O** **N** **D** · Liso · Sin anillo · Sin volva · 300–1800 m

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y abeto blanco. Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON


**Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo. → p. 42


**Camagroc** COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado.

**COMPRUEBE** Parte inferior y pie.




TÓXICA ●○○ FÁCIL *pinetell bord*

# Enganyapastors de llet groga

*Lactarius chrysorrheus*


Enganyapastors (L. zonarius): tiene zonas como el rovelló, pero látex blanco.


Láminas crema, sin manchas verdes.


Pinetell bord

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D** · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1300 m

### RASGOS DE ALARMA

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.
! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.
! No se mancha de verde.

**SABOR** Picante y amargo (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, en general de evolución favorable.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bosques de Quercus y castañares, también mezclados con pinos.

### SE CONFUNDE CON


**Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos. → p. 6


**Pinetell** COMESTIBLE El pinetell tiene látex naranja y láminas naranja vivo que verdean. → p. 6

**COMPRUEBE** Látex.