# Árboles y sus setas

## Abeto blanco

**avet** · *Abies alba*

*Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.*

**BUSQUE** Boleto *6*, Rebozuelo *9*, Angula de monte *11*, Lengua de vaca *12*

**CUIDADO** Falsa colmenilla *50*, Amanita pantera y matamoscas *33*, Fredolic metzinós *37*

## Alcornoque

**surera** · *Quercus suber*

*Árbol de copa amplia y verde grisácea.*

**BUSQUE** Carbonera *4*, Rebozuelo *9*, Oronja *13*

**CUIDADO** Oronja verde *43*, Cogomassa *44*, Enganyapastors *26*, Pota de cavall groga *31*

## Roble pubescente

**roure martinenc** · *Quercus pubescens*

*Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las...*

**BUSQUE** Carbonera *4*, Trompeta de los muertos *10*, Lengua de vaca *12*, Oronja *13*, Babosa negra y carlet *21*

**CUIDADO** Oronja verde *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Boleto de Satanás *29*, Peu de rata bord *32*

## Haya

**faig** · *Fagus sylvatica*

*Árbol alto de corteza lisa y gris.*

**BUSQUE** Carbonera *4*, Boleto *6*, Rebozuelo *9*, Trompeta de los muertos *10*, Lengua de vaca *12*

**CUIDADO** Oronja verde *43*, Farinera pudent *45*, Boleto de Satanás *29*, Peu de rata bord *32*, Amanita pantera y matamoscas *33*, Fredolic metzinós *37*

## Castaño

**castanyer** · *Castanea sativa*

*Árbol grande de copa amplia.*

**BUSQUE** Carbonera *4*, Boleto *6*, Rebozuelo *9*, Trompeta de los muertos *10*, Lengua de vaca *12*, Oronja *13*

**CUIDADO** Paxilo *42*, Oronja verde *43*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Boleto de Satanás *29*, Pota de cavall groga *31*







# Setas *esenciales*

*de Cataluña*

Las **54** que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

**25** COMESTIBLES **20** TÓXICAS **9** MORTALES

**Ante la duda, no la recolecte.**

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

TÓXICA

# Clitocibe blanc

*Clitocybe rivulosa* · candeleta

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N D**

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas a crema, bajan por el pie ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prados 0–2000 m; sobre todo 300–1000 m

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 15 min – 2 h **Síndrome muscarínico**

Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

⚠ Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.

⚠ Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).

⚠ Esporada blanca (no rosada).

**SE CONFUNDE CON**

**Senderuela** COMESTIBLE → p. 22

El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes.



**Molinera** COMESTIBLE

Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor...



**Champiñón silvestre** COMESTIBLE → p. 16

Láminas libres rosadas a pardas.

🔍 **Compruebe:** Láminas.





COMESTIBLE

# Barbuda

*Coprinus comatus* · bolet de tinta

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A **S O N D**

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas → rosadas → negras ✓ **Anillo** fino, se desliza ✕ **Volva** **Esporada** negra

En prados 0–1500 m; sobre todo 200–1000 m

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).

✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.

✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Bolet de femer** TÓXICA

Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas.

**Coprí garsa** NO COMESTIBLE

Sombrero negro con placas blancas, como una urraca.

🔍 **Compruebe:** Color y superficie del sombrero.

ANTES DE SALIR

# Las 12 reglas

1. Recolecte solo lo que conoce a fondo.
2. Saque la seta entera, con la base del pie.
3. Revise cada ejemplar, uno a uno.
4. No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.
5. Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.
6. Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.
7. No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata...).
8. Las apps de fotos orientan, pero no deciden.
9. Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.
10. Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.
11. Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.
12. Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.

## CÓMO MIRAR UNA SETA




1. **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.
2. **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.
3. **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?
4. **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?
5. **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?
6. **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

**Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE**

## CÓMO LEER LAS FICHAS

| | |
|---|---|
| COMESTIBLE · TÓXICA · MORTAL | Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen. |
| ●●○ Media | Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil. |
| E F M A M J J A **S O N** D | Meses en que sale; en claro, solo algunos años. |
| ✓ ✗ ◐ | Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte. |
| | Dónde: pinos y abetos, árboles de hoja ancha, prados, madera, altitud. |
| | Olor, cuándo salen los síntomas y qué comprobar antes de cogerla. |
| ●●○ Grave | En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal. |
| → p. 12 | Página de la seta con la que se confunde. |

**EMPIEZAN EN LA PÁGINA** Comestibles 3 · Tóxicas 26 · Mortales 42 · Árboles 51

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.



DÓNDE BUSCAR

# Árboles y sus setas

*Reconocer el árbol por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.*

### Pino carrasco — pi blanc · *Pinus halepensis*

*Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido.*

**BUSQUE** Níscalos 3, Boleto granulado 7, Cama de perdiu 8, Negrilla 18, Babosa negra y carlet 21

**CUIDADO** Cualbra morada 28

### Pino piñonero — pi pinyer · *Pinus pinea*

*Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.*

**BUSQUE** Níscalos 3, Boleto granulado 7, Cama de perdiu 8, Negrilla 18

**CUIDADO** Pota de cavall groga 31, Seta de los caballeros 36, Cualbra morada 28

### Pino laricio — pinassa · *Pinus nigra subsp. salzmannii*

*Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.*

**BUSQUE** Níscalos 3, Seta coliflor 5, Boleto granulado 7, Cama de perdiu 8, Angula de monte 11, Negrilla 18

**CUIDADO** Cualbra morada 28

### Pino silvestre — pi roig · *Pinus sylvestris*

*Copa irregular y alta.*

**BUSQUE** Níscalos 3, Seta coliflor 5, Boleto 6, Boleto granulado 7, Cama de perdiu 8, Rebozuelo 9

**CUIDADO** Paxilo 42, Falsa colmenilla 50, Amanita pantera y matamoscas 33, Seta de los caballeros 36, Fredolic metzinós 37, Cualbra morada 28

### Encina — alzina · *Quercus ilex*

*Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate.*

**BUSQUE** Carbonera 4, Rebozuelo 9, Trompeta de los muertos 10, Lengua de vaca 12, Oronja 13, Babosa negra y carlet 21

**CUIDADO** Paxilo 42, Oronja verde 43, Cogomassa 44, Cortinari metzinós 49, Enganyapastors 26, Boleto de Satanás 29



COMESTIBLE

# Champiñón silvestre

*Agaricus campestris* · camperol

●●○ **MEDIA** E F M A **M J** J A **S O N** D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** rosa vivo → pardo chocolate ✓**Anillo** fino, se pierde pronto ✗**Volva** **Esporada** pardo chocolate

En prados · 0–2000 m; sobre todo 200–1000 m

- ✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
- ✓ Sin volva en la base.
- ✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
- ✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cogomassa** MORTAL → p. 44
Láminas siempre blancas y volva en saco.

**Bola de neu pudent** TÓXICA → p. 35
Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base...

**Fals carlet** TÓXICA → p. 39
Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón.

🔍 **Compruebe:** Láminas y base.

TÓXICA

# Fredolic metzinós

*Tricholoma pardinum*

●●○ **MEDIA** E F M A M J J **A S O** N D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blanquecinas, reflejo verdoso ✗**Anillo** ✗**Volva** **Esporada** blanca

Abeto blanco y pino silvestre · Haya · 800–2000 m de altitud

**OLOR** A harina.

⚠ ●●○ **Grave** · síntomas a las 30 min – 3 h · **Síndrome gastrointestinal**
Irrita el estómago y el intestino.

- ⚠ Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas...
- ⚠ Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
- ⚠ Olor a harina.

**SE CONFUNDE CON**

**Negrilla** COMESTIBLE → p. 18
El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a...

**Capuchina** COMESTIBLE
Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

🔍 **Compruebe:** Tamaño y escamas.



MORTALES

MORTAL

# Falsa colmenilla

*Gyromitra esculenta* · bolet de greix · murga

●○○ FÁCIL

E F M **A** **M** **J** J A S O N D

**CÓMO ES** ✕ **Láminas** sombrero arrugado, como un cerebro

Pino silvestre, abeto blanco y pino negro · Sobre madera

600–2200 m; sobre todo 1000–1800 m

⚠ ●●● **Mortal** · síntomas a las 6–12 h · **Síndrome giromitriano**

Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

⚠ Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

⚠ Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

**SE CONFUNDE CON**

**Colmenilla** CONDICIONADA → p. 25

La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una...

**Colmenilla negra** CONDICIONADA

Alvéolos en hileras y un solo hueco.

🔍 **Compruebe:** Corte longitudinal.

COMESTIBLES

# Níscalos

*Lactarius sanguifluus* y *L. deliciosus* · rovelló, pinetell

●●○ MEDIA

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** ✕ Anillo ✕ Volva ✓ **Látex**

| | Níscalo de sangre | Níscalo |
|---|---|---|
| LÁTEX | Rojo vino desde el primer momento | Naranja zanahoria; no pasa a vino |
| LÁMINAS | Rosa vinoso o lila | Naranja vivo |
| DÓNDE | Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media | Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías |

0–2100 m de altitud

**LOS DOS**

✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.

✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.

✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.

✓ Siempre bajo pinos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Paxilo** MORTAL → p. 42

Sin látex; se mancha de pardo (no de verde).

**Enganyapastors de llet groga** TÓXICA → p. 26

Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema.

**Enganyapastors** TÓXICA → p. 26

Látex blanco inmutable y muy picante; láminas crema.

🔍 **Compruebe:** Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.

TÓXICAS

TÓXICA

# Seta de los caballeros

*Tricholoma equestre* · verderol · groguet

●○○ FÁCIL

E F M A M J J A S **O** **N** **D**

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** amarillo azufre ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pino piñonero, silvestre y rodeno · En prados · 0–1700 m; sobre todo 400–1500 m

**OLOR** A harina débil.

⚠ ●●○ **Grave** · síntomas a las 24–72 h · **Síndrome rabdomiolítico**

Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

⚠ Láminas amarillo azufre intenso.

⚠ Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.

⚠ Pie amarillo.

**SE CONFUNDE CON**

**Capuchina** COMESTIBLE

Sombrero gris con fibras negras.

**Oronja verde** MORTAL → p. 43

Láminas blancas, anillo y volva.

🔍 **Compruebe:** Sombrero.

COMESTIBLES

COMESTIBLE

# Pedo de lobo

*Lycoperdon perlatum* · pet de llop

●○○ FÁCIL

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** **D**

**CÓMO ES** ✕ **Láminas** una bola: por dentro, blanca y firme

En prados · 0–2000 m; sobre todo 400–1100 m

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un...

✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Oronja verde** MORTAL → p. 43

Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de...

**Pota de cavall groga** TÓXICA → p. 31

Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa.

🔍 **Compruebe:** Corte longitudinal.

COMESTIBLE

# Carbonera

*Russula cyanoxantha* · llora · llora morada

●●○ **MEDIA**

E F M A M **J J** A **S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas, flexibles y grasas ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Haya, castaño, encina y alcornoque y otros — 50–1700 m; sobre todo 300–1100 m

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi...

✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Oronja verde** MORTAL → p. 43
Anillo y volva en la farinera borda.

***Russula sardonia*** TÓXICA
Láminas amarillo limón, pie violáceo.

**Cualbra morada** NO COMESTIBLE → p. 28
Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura.

**Compruebe:** Base del pie (desentiérrela) y anillo.

MORTAL

# Cortinari metzinós

*Cortinarius orellanus* · bolet de mantellina

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** amarillo anaranjadas → herrumbre ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes ✕ **Volva** **Esporada** pardo herrumbre

Roble pubescente, castaño y encina — 100–1500 m de altitud

**OLOR** Débil a rábano.

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 2–15 días **Síndrome orellánico**
Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

⚠ Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
⚠ Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
⚠ Esporada pardo herrumbre.
⚠ Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

**SE CONFUNDE CON**

**Rebozuelo** COMESTIBLE → p. 9
El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas.

**Camagroc** COMESTIBLE
Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

**Cama de perdiu** COMESTIBLE → p. 8
Láminas decurrentes y esporada negra; bajo pinos.

**Compruebe:** Parte inferior.

COMESTIBLE

# Negrilla

*Tricholoma terreum* · fredolic · negret

●●● **DIFÍCIL**

E F M A M J J A S **O N D**

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas a gris pálido ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero — 0–1800 m; sobre todo 300–1000 m

**OLOR** Débil, no harinoso.

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso.
✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Fredolic metzinós** TÓXICA → p. 37
Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con...

***Tricholoma virgatum* / *T. sciodes*** TÓXICA
Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo.

***Inocybe* (varias especies grises)** TÓXICA
Sombrero fibroso agrietado radialmente.

**Compruebe:** Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

TÓXICA

# Bola de neu pudent

*Agaricus xanthodermus*

●○○ **FÁCIL**

E F M A **M J** J A **S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** rosadas → pardas ✓ **Anillo** grueso ✕ **Volva** **Esporada** pardo chocolate

En prados — 0–1500 m; sobre todo 200–500 m

**OLOR** Desagradable (tinta, fenol).

⚠ ●○○ **Moderada** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**
Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.
⚠ Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.
⚠ Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

**SE CONFUNDE CON**

**Champiñón silvestre** COMESTIBLE → p. 16
No amarillea y huele bien.

**Bola de nieve** COMESTIBLE
Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo.

**Compruebe:** Base del pie.





MORTAL

# *Inosperma erubescens*

MORTALES

●●○ **MEDIA**

E F M A **M J J** A S O N D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blanquecinas → pardas, manchas rojas ✕**Anillo** ✕**Volva** **Esporada** parda

En prados · 0–1500 m de altitud

⚠ ●●● **Mortal** · síntomas a las 15 min – 2 h · **Síndrome muscarínico**

Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

⚠ Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.

⚠ Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.

⚠ Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

**SE CONFUNDE CON**

**Perrechico** COMESTIBLE → p. 20

El moixernó tiene sombrero liso carnoso.

**Compruebe:** Sombrero, manchas rojas y olor.

COMESTIBLES

COMESTIBLE

# Seta coliflor

*Sparassis crispa* · peu de rata de pi · greixa

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A **S O N** D

**CÓMO ES** ✕**Láminas** lóbulos rizados, como una coliflor **Esporada** blanca a crema

Pino silvestre, laricio y rodeno · Sobre madera

100–1800 m; sobre todo 300–1500 m

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una...

✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.

✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Peu de rata bord** TÓXICA → p. 32

Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas...

**Coliflor rosa** CONDICIONADA

Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

**Compruebe:** Forma de las ramas.

TÓXICA

# Lepiota pudent

*Lepiota cristata*

TÓXICAS

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blancas ✓**Anillo** fino, frágil ✕**Volva** **Esporada** blanca

En prados · 0–1600 m; sobre todo 300–1000 m

⚠ ●○○ **Moderada** · síntomas a las 30 min – 3 h · **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.

⚠ Olor desagradable, a goma o gas.

⚠ Láminas blancas, libres; anillo frágil.

**SE CONFUNDE CON**

**Parasol** COMESTIBLE → p. 14

Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado.

**Compruebe:** Tamaño.

COMESTIBLES

COMESTIBLE

# Pie azul

*Lepista nuda* · pimpinella morada

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A S **O N D**

**CÓMO ES** ✓**Láminas** violeta lila ✕**Anillo** ✕**Volva** **Esporada** rosada pálida

En prados · 0–1800 m; sobre todo 300–1000 m · **OLOR** Afrutado, perfumado.

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.

✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).

✓ Sin cortina ni anillo.

✓ Olor afrutado o perfumado.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)*** TÓXICA

Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes.

**Barret de bruixa** TÓXICA → p. 41

Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso.

***Mycena pura*** TÓXICA → p. 41

Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano.

**Compruebe:** Esporada y parte alta del pie.

COMESTIBLE

# Boleto

*Boletus edulis* · cep · sureny

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O** N D

**CÓMO ES** ✓**Tubos** blancos, luego amarillo verdosos ✗**Anillo** ✗**Volva** **Esporada** pardo oliva

Pino silvestre, abeto blanco y pícea · Haya, castaño y roble albar

600–2000 m; sobre todo 900–1700 m · **SABOR** Suave, a avellana.

- ✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
- ✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
- ✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Boleto de Satanás** TÓXICA → p. 29

Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo...

**Boleto amargo** NO COMESTIBLE

Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso.

**Pie rojo amargo** NO COMESTIBLE

Poros amarillos que azulean y pie rojo.

🔍 **Compruebe:** Poros y pie.



MORTAL

# Galerina marginada

*Galerina marginata* · galerina metzinosa

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N D**

**CÓMO ES** ✓**Láminas** amarillentas → pardo herrumbre ✓**Anillo** fino ✗**Volva** **Esporada** pardo herrumbre

Sobre madera · 0–2000 m; sobre todo 400–1300 m

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- ⚠ Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
- ⚠ Anillo fino pardo en el pie.
- ⚠ Esporada pardo herrumbre.
- ⚠ Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

**SE CONFUNDE CON**

**Seta de chopo** COMESTIBLE → p. 24

Mayor y sobre chopos.

***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE

Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

**Armilaria** CONDICIONADA

Mayor, escamas oscuras, esporada blanca.

🔍 **Compruebe:** Tamaño y árbol.

COMESTIBLE

# Perrechico

*Calocybe gambosa* · moixernó · bolet de Sant Jordi

●●○ **MEDIA**

E F M **A M J** J A S O N D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blancas a crema, muy juntas ✗**Anillo** ✗**Volva** **Esporada** blanca

En prados · 400–2000 m; sobre todo 500–1200 m · **OLOR** Intenso a harina fresca.

- ✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
- ✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
- ✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
- ✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Inosperma erubescens*** MORTAL → p. 48

Sombrero cónico fibroso agrietado.

**Cogomassa** MORTAL → p. 44

Anillo y volva en saco; láminas libres.

**Fals carlet** TÓXICA → p. 39

Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño.

🔍 **Compruebe:** Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

TÓXICAS

# Amanita pantera y matamoscas

*Amanita pantherina* y *A. muscaria* · pixacà, reig bord

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** ✓**Anillo** ✓**Volva** **Esporada** blanca

| | Amanita pantera | Matamoscas |
|---|---|---|
| SOMBRERO | Pardo; verrugas blanco puro, en círculos | Rojo o naranja, más grande |
| BASE | Bulbo con reborde, como un calcetín | Bulbo con anillos de volva |
| DÓNDE | Pinares, robledales, hayedos, encinares | Pinares y abedulares de montaña |

0–2200 m de altitud

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome panterínico**

Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

**RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS**

- ⚠ Verrugas blancas en el sombrero (la lluvia puede borrarlas).
- ⚠ Láminas y pie blancos; bulbo en la base.

**SE CONFUNDE CON**

**Parasol** COMESTIBLE → p. 14

Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado.

**Oronja** COMESTIBLE → p. 13

El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en...

**Vinosa** CONDICIONADA

En la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas.

🔍 **Compruebe:** Láminas blancas, anillo y volva: descártela (la oronja las tiene amarillas).

MORTAL

# Lepiota metzinosa

*Lepiota brunneoincarnata* · palometa

MORTALES

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A S O N D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blancas a crema ◑**Anillo** solo una zona algodonosa ✕**Volva** **Esporada** blanca

En prados 0–900 m; sobre todo por debajo de 300 m

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

⚠ Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
⚠ Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
⚠ Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
⚠ Láminas blancas, libres.

**SE CONFUNDE CON**

**Parasol** COMESTIBLE → p. 14

El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y...

**Senderuela** COMESTIBLE → p. 22

El cama-sec tiene láminas espaciadas.

**Champiñón silvestre** COMESTIBLE → p. 16

Láminas rosadas y luego pardas.

**Compruebe:** Tamaño, anillo y pie.

COMESTIBLES

COMESTIBLE

# Boleto granulado

*Suillus granulatus* · molleric · molleric granellut

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A S O N D

**CÓMO ES** ✓**Tubos** amarillos, con gotitas de jóvenes ✕**Anillo** ✕**Volva** **Esporada** pardo ocre

Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero y otros 0–1800 m; sobre todo 400–1500 m

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Boleto picante** NO COMESTIBLE

Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante.

**Molleric de bou** SIN INTERÉS

Poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes.

**Molleric** COMESTIBLE

Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras...

**Compruebe:** Color de los poros.

TÓXICAS

TÓXICA

# Peu de rata bord

*Ramaria formosa*

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A S O N D

**CÓMO ES** ✕**Láminas** ramas, como un coral **Esporada** ocre

Haya, roble pubescente y castaño 200–1600 m; sobre todo 300–1000 m

**SABOR** Algo amargo (no la pruebe).

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.
⚠ Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

**SE CONFUNDE CON**

**Seta coliflor** COMESTIBLE → p. 5

Lóbulos aplanados crema, en pinos.

**Coliflor rosa** CONDICIONADA

Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

**Compruebe:** Forma.

COMESTIBLES

COMESTIBLES

# Babosa negra y carlet

*Hygrophorus latitabundus* y *H. russula* · llenega negra

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A S O N D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** ◑**Anillo** ✕**Volva** **Esporada** blanca

| | Babosa negra | Carlet |
|---|---|---|
| SOMBRERO | Pardo oscuro a casi negro, con mucha baba | Rosa vinoso con manchas, poco viscoso |
| LÁMINAS | Blancas, espaciadas | Blancas, se manchan de vinoso |
| PIE | Abajo, con una funda de baba gris | Robusto, con manchas vinosas |
| DÓNDE | Bajo pinos, en suelo calizo | Bajo encinas y robles |

0–1500 m de altitud

**LOS DOS**

✓ Láminas blancas, gruesas y céreas: como de cera al tocarlas.
✓ Esporada blanca.
✓ Salen tarde: de octubre a diciembre.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Fals carlet** TÓXICA → p. 39

Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón...

**Llenega borda** NO COMESTIBLE

Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre).

**Cualbra morada** NO COMESTIBLE → p. 28

Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas.

**Compruebe:** Láminas blancas: si con la edad se vuelven rosa salmón o pardo herrumbre, no es ninguna de las dos.

COMESTIBLE

# Cama de perdiu

*Chroogomphus rutilus* · pota de perdiu

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N D**

**CÓMO ES** ✓**Láminas** gruesas, ocre → púrpura negruzco ◑**Anillo** solo una cortina en los jóvenes ✕**Volva** **Esporada** negra o gris negruzca

Pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero · 0–1800 m; sobre todo 400–1200 m

- ✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
- ✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
- ✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
- ✓ Bajo pinos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49
Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes.

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

**Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE
Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

🔍 **Compruebe:** Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

MORTAL

# Farinera pudent

*Amanita virosa*

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O** N D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blancas ✓**Anillo** blanco, frágil ✓**Volva** en saco **Esporada** blanca

Haya y abedul · 500–1800 m de altitud

⚠ ●●● **Mortal** · síntomas a las 6–24 h · **Síndrome faloidiano**
Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- ⚠ Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
- ⚠ Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
- ⚠ Volva blanca en saco.

**SE CONFUNDE CON**

**Bola de nieve** COMESTIBLE
Láminas rosadas a pardas, sin volva.

🔍 **Compruebe:** Láminas y base.







COMESTIBLE

# Senderuela

*Marasmius oreades* · cama-sec · carrereta

●●○ **MEDIA**

E F M **A M J** J A **S O N** D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** crema, muy separadas ✕**Anillo** ✕**Volva** **Esporada** blanca

En prados · 0–2200 m; sobre todo 200–1400 m · **OLOR** Débil, a almendra amarga.

- ✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
- ✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
- ✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
- ✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Lepiota metzinosa** MORTAL → p. 46
Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas.

**Clitocibe blanc** TÓXICA → p. 38
Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes.

***Inocybe* (especies de prado)** TÓXICA
Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

🔍 **Compruebe:** Sombrero.





TÓXICA

# Pota de cavall groga

*Scleroderma citrinum*

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES** ✕**Láminas** una bola: por dentro, negra violácea

Pino piñonero · Alcornoque, encina y castaño · 0–1200 m; sobre todo 200–1000 m

⚠ ●●○ **Grave** · síntomas a las 30 min – 3 h · **Síndrome gastrointestinal**
Irrita el estómago y el intestino.

- ⚠ Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.
- ⚠ Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

**SE CONFUNDE CON**

**Pedo de lobo** COMESTIBLE → p. 17
El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes.

**Bejín gigante** COMESTIBLE
Interior blanco uniforme y piel fina.

**Trufa negra** COMESTIBLE
La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas...

🔍 **Compruebe:** Corte longitudinal.

MORTAL

# Cogomassa

*Amanita verna*

●●○ **MEDIA**

E F M **A M J** J A S O N D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blancas ✓**Anillo** blanco ✓**Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

Encina, roble pubescente y alcornoque · 0–900 m de altitud

⚠ ●●● **Mortal** · síntomas a las 6–24 h · **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- ⚠ Seta enteramente blanca.
- ⚠ Volva blanca en saco en la base.
- ⚠ Anillo membranoso blanco.
- ⚠ Láminas blancas, libres.

**SE CONFUNDE CON**

**Perrechico** COMESTIBLE → p. 20

El moixernó no tiene volva ni anillo.

**Champiñón silvestre** COMESTIBLE → p. 16

Láminas rosadas y luego pardas; sin volva.

**Farinera** CONDICIONADA

Mayor, harinosa, de otoño en caliza.

🔍 **Compruebe:** Base y pie.

COMESTIBLE

# Rebozuelo

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

●○○ **FÁCIL**

E F M A M **J J A S O N** D

**CÓMO ES** ✓**Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✗**Anillo** ✗**Volva** **Esporada** crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco · Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Cortinari metzinós** MORTAL → p. 49

Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.

**Seta de olivo** TÓXICA → p. 30

Láminas verdaderas, finas y apretadas.

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30

Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

🔍 **Compruebe:** Parte inferior.

Seta de olivo

Falso rebozuelo

Falso rebozuelo



TÓXICAS

# Falsos rebozuelos

*Hygrophoropsis aurantiaca* y *Omphalotus olearius* · fals rossinyol, gírgola d'olivera

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A **S O N D**

**CÓMO ES** ✓**Láminas** ✗**Anillo** ✗**Volva** **Esporada** blanca a crema

| | Falso rebozuelo | Seta de olivo |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Pequeño (2–8 cm), carne delgada y blanda | Grande (5–15 cm) y carnoso |
| CÓMO SALE | Suelto, en la pinaza o sobre madera podrida de pino | En ramilletes de pies unidos, sobre tocones y raíces de olivo, encina o castaño |

0–1800 m de altitud

⚠ ●●○ **Grave** · síntomas a las 30 min – 3 h · **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

**RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS**

- ⚠ Láminas verdaderas: finas, apretadas y que bajan por el pie.
- ⚠ Todo naranja: sombrero, láminas y pie.
- ⚠ Pase el dedo por debajo: las láminas se separan; los pliegues del rebozuelo, no.

**SE CONFUNDE CON**

**Rebozuelo** COMESTIBLE → p. 9

El rossinyol tiene pliegues gruesos.

🔍 **Compruebe:** Debajo del sombrero: láminas finas, falso; pliegues gruesos y romos, rebozuelo.

COMESTIBLE

# Seta de cardo

*Pleurotus eryngii* · gírgola de panical

●●○ **MEDIA**

E F M **A M** J J A S **O N D**

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blanquecinas, bajan por el pie ✗**Anillo** ✗**Volva** **Esporada** blanca

En prados · 0–1200 m de altitud

- ✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre)...
- ✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
- ✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Clitocibe blanc** TÓXICA → p. 38

Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo.

**Fals carlet** TÓXICA → p. 39

Láminas rosa salmón, en bosque.

🔍 **Compruebe:** Color y base.

COMESTIBLE

# Trompeta de los muertos

*Craterellus cornucopioides* · trompeta de la mort · trompeta

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A **S O N D**

**CÓMO ES** ✕ **Láminas** por fuera lisa, gris ceniza **Esporada** blanca

Haya, encina, castaño y roble pubescente y otros — 100–1600 m; sobre todo 200–700 m

- ✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.
- ✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).
- ✓ Carne delgada y elástica.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Orella de gat negra** CONDICIONADA

Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con...

***Craterellus cinereus*** COMESTIBLE

Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

**Compruebe:** Forma general.

MORTAL

# Oronja verde

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N D**

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m — **OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- ⚠ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ⚠ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ⚠ Láminas BLANCAS, libres.
- ⚠ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde** COMESTIBLE

La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4

Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**Bola de nieve** COMESTIBLE

Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

**Compruebe:** Base y pie.

COMESTIBLE

# Seta de chopo

*Cyclocybe cylindracea* · pollancró

●●○ **MEDIA**

E F M **A M J** J A **S O N** D

**CÓMO ES** ✓ **Láminas** crema → pardo tabaco ✓ **Anillo** membranoso ✕ **Volva** **Esporada** pardo tabaco

Chopo negro y álamo blanco — En prados — Sobre madera

0–1200 m; sobre todo por debajo de 300 m

- ✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
- ✓ Anillo membranoso en el pie.
- ✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
- ✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Galerina marginada** MORTAL → p. 47

Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre.

**Bolet de pi** TÓXICA → p. 40

Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso.

**Compruebe:** Tamaño y árbol.

TÓXICA

# Boleto de Satanás

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J **J A S O** N D

**CÓMO ES** ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** pardo oliva

Roble pubescente, encina, castaño y haya — 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

**OLOR** Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 30 min – 6 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

- ⚠ Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ⚠ Poros rojos o rojo anaranjados.
- ⚠ Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ⚠ La carne azulea débilmente al corte.

**SE CONFUNDE CON**

**Boleto reticulado** COMESTIBLE

El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la...

**Boleto negro** COMESTIBLE

Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

**Compruebe:** Poros y corte.

MORTAL

# Paxilo

*Paxillus involutus* · paxil·le tòxic · paxil enrotllat

MORTALES

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** ocre, se manchan de pardo ✕**Anillo** ✕**Volva** **Esporada** pardo ocre

Pino silvestre · Abedul, encina y castaño · 0–1900 m; sobre todo 400–1400 m

⚠ ●●● **Mortal** · síntomas a las 1–3 h · **Síndrome hemolítico**

Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

⚠ Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.
⚠ Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con...
⚠ Sin látex.

**SE CONFUNDE CON**

**Níscalo de sangre** COMESTIBLE → p. 3

El rovelló tiene látex rojo vino y verdea.

**Níscalo** COMESTIBLE → p. 3

Látex naranja y manchas verdes en el pinetell.

**Platera** COMESTIBLE

La pampa es crema ocrácea con mamelón y no se mancha de pardo.

🔍 **Compruebe:** Corte: látex o no.

COMESTIBLE

# Angula de monte

*Craterellus lutescens* · camagroc · rossinyol de pi

COMESTIBLES

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A S **O N D**

**CÓMO ES** ✕**Láminas** casi liso, rosado anaranjado **Esporada** blanca a crema

Pino silvestre, laricio y abeto blanco · 300–1800 m; sobre todo 600–1100 m

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Falso rebozuelo** NO COMESTIBLE → p. 30

Láminas finas y apretadas; pie macizo.

**Camagroc** COMESTIBLE

Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas.

🔍 **Compruebe:** Parte inferior y pie.

NO COMESTIBLE

# Cualbra morada

*Russula torulosa* · escaldabec vinós

TÓXICAS

●●● **DIFÍCIL**

E F M A M J J A S **O N D**

**CÓMO ES** ✓**Láminas** crema pálido, frágiles ✕**Anillo** ✕**Volva** **Esporada** crema

Pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero · 0–1600 m; sobre todo 300–900 m

**SABOR** Muy picante (no la pruebe).

⚠ ●○○ **Leve**

Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

⚠ Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.
⚠ Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
⚠ Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.
⚠ Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

**SE CONFUNDE CON**

**Níscalo de sangre** COMESTIBLE → p. 3

El rovelló tiene látex rojo vino.

**Carbonera** COMESTIBLE → p. 4

La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas.

**Escaldabec de pineda** NO COMESTIBLE

Sombrero rojo sangre o rosado, sin tonos púrpura oscuro.

🔍 **Compruebe:** Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.



CONDICIONADA

# Colmenilla

*Morchella esculenta* · múrgola · rabassola

COMESTIBLES

●●○ **MEDIA**

E F **M A M** J J A S O N D

**CÓMO ES** ✕**Láminas** sombrero con alvéolos, como un panal **Esporada** crema ocrácea

En prados · 0–1600 m; sobre todo 200–1200 m

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta...
✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Falsa colmenilla** MORTAL → p. 50

Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no...

***Verpa bohemica*** TÓXICA

Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta.

**Colmenilla negra** CONDICIONADA

Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente.

🔍 **Compruebe:** Corte longitudinal.

COMESTIBLES

COMESTIBLE

# Lengua de vaca

*Hydnum repandum* · llengua de bou · llémena

●○○ FÁCIL

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

CÓMO ES ✓ **Aguijones** blandos, crema anaranjados ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pino silvestre y abeto blanco · Encina, haya, castaño y roble pubescente

0–1800 m; sobre todo 400–1000 m · SABOR Suave; amargo en ejemplares viejos.

- Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
- Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
- Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Hydnellum* / *Sarcodon***
NO COMESTIBLE

Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos.

**Picornell de pi**
COMESTIBLE

Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el...

**Compruebe:** Consistencia de la carne.

TÓXICAS

# Pequeñas con muscarina

*Inocybe geophylla* y *Mycena pura*

●●○ MEDIA

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** **D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** ✕ Anillo ✕ Volva

| | Barret de bruixa | Mycena pura |
|---|---|---|
| COLOR | Blanco sedoso, a veces lila | Lila o rosado; borde con rayas |
| FORMA | Cónico, con pico; fibras que se agrietan | Acampanado; pie hueco y frágil |
| OLOR | A tierra | A rábano |

0–2000 m de altitud

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 15 min – 2 h **Síndrome muscarínico**
Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS**

- ⚠ Pequeñas: de 1 a 5 cm.
- ⚠ En la hojarasca de pinares, hayedos y bosques mixtos.

**SE CONFUNDE CON**

**Pie azul**
COMESTIBLE → p. 19

Mucho mayor y carnosa.

**Senderuela**
COMESTIBLE → p. 22

Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema.

**Pimpinella morada petita**
SIN INTERÉS

Láminas gruesas, sin olor a rábano.

**Compruebe:** Tamaño: el pie azul es grande, carnoso y huele a fruta.

TÓXICAS

TÓXICAS

# Enganyapastors

*Lactarius zonarius* y *L. chrysorrheus* · pinetell bord, rovelló bord

●○○ FÁCIL

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** **D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** ✕ Anillo ✕ Volva ✓ **Látex** **Esporada** crema

| | Enganyapastors | De llet groga |
|---|---|---|
| LÁTEX | Blanco, no cambia; muy picante | Blanco que amarillea en segundos |
| SOMBRERO | Crema a naranja pálido, con zonas | Ocre salmón pálido, con zonas |

0–1300 m de altitud

⚠ ●○○ **Moderada** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**
Irrita el estómago y el intestino.

**RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS**

- ⚠ Látex BLANCO al cortar (en los níscalos es rojo vino o naranja).
- ⚠ Láminas crema que no se manchan de verde.
- ⚠ Bajo encinas, alcornoques y robles; no bajo pinos.

**SE CONFUNDE CON**

**Níscalo**
COMESTIBLE → p. 3

Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos.

**Níscalo de sangre**
COMESTIBLE → p. 3

Látex rojo vino; bajo pinos.

**Compruebe:** Corte el pie: si el látex es blanco, descártela.







TÓXICA

TÓXICAS

# Falso níscalo

*Lactarius torminosus* · cabra de beç · lleterol de beç

●○○ FÁCIL

E F M A M J J **A** **S** **O** N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** crema rosado ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex** blanco **Esporada** crema

Abedul · 500–1900 m; sobre todo por debajo de 1600 m

⚠ ●○○ **Moderada** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**
Irrita el estómago y el intestino.

- ⚠ Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
- ⚠ Látex blanco que no cambia.
- ⚠ Siempre bajo abedules.

**SE CONFUNDE CON**

**Níscalo**
COMESTIBLE → p. 3

Margen liso, látex naranja; bajo pinos.

**Pinetell d'avet**
COMESTIBLE

Margen liso, látex naranja; bajo abetos.

**Compruebe:** Margen y látex.

TÓXICAS

TÓXICA

# Bolet de pi

*Hypholoma fasciculare*

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** amarillas → verdosas ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** pardo violácea

En prados · Sobre madera · 0–2000 m; sobre todo 400–1100 m

⚠ ●●○ **Grave** · síntomas a las de 30 minutos a varias horas

**Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

- ⚠ Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
- ⚠ Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
- ⚠ Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

**SE CONFUNDE CON**

**Seta de chopo** COMESTIBLE → p. 24

Crema, anillo membranoso, en chopos.

**Armilaria** CONDICIONADA

Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

🔍 **Compruebe:** Color.



COMESTIBLES

COMESTIBLE

# Oronja

*Amanita caesarea* · ou de reig · reig

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** amarillo dorado ✓ **Anillo** amarillo, colgante ✓ **Volva** blanca, grande, en saco **Esporada** blanca

Encina, alcornoque, roble pubescente y castaño · 50–1100 m; sobre todo 200–700 m

- ✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
- ✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
- ✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
- ✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Oronja verde** MORTAL → p. 43

Al cortar el huevo de arriba abajo.

**Matamoscas** TÓXICA → p. 33

Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero...

***Amanita crocea*** CONDICIONADA

Sin anillo; láminas blancas o crema.

🔍 **Compruebe:** Corte longitudinal del huevo.





## Cómo montar el cuaderno

1. **Imprime a doble cara**, «voltear por el borde largo», a **tamaño real (100 %)**.
2. **Corta** todas las hojas por la mitad, por la línea de puntos ✂.
3. **Ordena las mitades** por el número pequeño de abajo: la 1 encima del todo, con los números a la vista.
4. **Dobla el montón** por la mitad, hacia atrás, para que la primera página quede por fuera.
5. **Grapa por el pliegue** (2 grapas) o cóselo con hilo por 3 agujeros.

Esta media hoja sobra: puedes tirarla o usarla de punto de libro.



COMESTIBLE

# Parasol

*Macrolepiota procera* · apagallums · cogomella

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** blancas a crema ✓**Anillo** doble, se desliza ✕**Volva** **Esporada** blanca

En prados 0–1800 m; sobre todo 200–1100 m **OLOR** Agradable, a avellana.

- ✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central...
- ✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
- ✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
- ✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Lepiota metzinosa**
MORTAL → p. 46
Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas.

**Amanita pantera**
TÓXICA → p. 33
Volva en la base y anillo fijo; pie liso.

**Apagallums**
CONDICIONADA
Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al...

**Compruebe:** Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

TÓXICA

# Fals carlet

*Entoloma sinuatum* · carlet bord

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N** D

**CÓMO ES** ✓**Láminas** amarillentas → rosa salmón ✕**Anillo** ✕**Volva** **Esporada** rosada

Roble pubescente, haya y castaño 100–1500 m; sobre todo 200–800 m

**OLOR** A harina rancia.

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 30 min – 4 h **Síndrome gastrointestinal**
Irrita el estómago y el intestino.

- ⚠ Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
- ⚠ Esporada rosada.
- ⚠ Olor a harina rancia.
- ⚠ Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

**SE CONFUNDE CON**

**Carlet**
COMESTIBLE → p. 21
El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas.

**Perrechico**
COMESTIBLE → p. 20
Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas.

**Pardilla**
TÓXICA
Láminas crema decurrentes.

**Compruebe:** Color del sombrero y de las láminas.