Setas *esenciales*

de Cataluña



Las **54** que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES **20** TÓXICAS **9** MORTALES

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.**
2. **Saque la seta entera, con la base del pie.**
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.**
4. **No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.**
5. **Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.**
6. **Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.**
7. **No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata…).**
8. **Las apps de fotos orientan, pero no deciden.**
9. **Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.**
10. **Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.**
11. **Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.**
12. **Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.**

CÓMO MIRAR UNA SETA



1. **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.
2. **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.
3. **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?
4. **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?
5. **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?
6. **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

CÓMO LEER LAS FICHAS

COMESTIBLE · TÓXICA · MORTAL	Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen.
●●○ Media	Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil.
E F M A M J J A **S O N** D	Meses en que sale; en claro, solo algunos años.
✓ ✕ ◑	Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte.
	Dónde: pinos y abetos, árboles de hoja ancha, prados, madera, altitud.
	Olor, cuándo salen los síntomas y qué comprobar antes de cogerla.
●●○ Grave	En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal.
→ *p. 12*	Página de la seta con la que se confunde.

EMPIEZAN EN LA PÁGINA — **Comestibles** *3* · **Tóxicas** *26* · **Mortales** *42* · **Árboles** *51*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.

COMESTIBLES

Níscalos

Lactarius sanguifluus y *L. deliciosus* · rovelló, pinetell

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

	Níscalo de sangre	Níscalo
LÁTEX	Rojo vino desde el primer momento	Naranja zanahoria; no pasa a vino
LÁMINAS	Rosa vinoso o lila	Naranja vivo
DÓNDE	Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media	Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías

▲ 0–2100 m de altitud

LOS DOS

- ✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
- ✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
- ✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
- ✓ Siempre bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Paxilo
MORTAL → p. 42

Sin látex; se mancha de pardo (no de verde).

Enganyapastors de llet groga
TÓXICA → p. 26

Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema.

Enganyapastors
TÓXICA → p. 26

Látex blanco inmutable y muy picante; láminas crema.

Compruebe: Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.

COMESTIBLE

Carbonera

Russula cyanoxantha · llora · llora morada

●●○ **MEDIA**

E F M A M **J J** A S O N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas, flexibles y grasas ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Haya, castaño, encina y alcornoque y otros — 50–1700 m; sobre todo 300–1100 m

- ✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi...
- ✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde
MORTAL → p. 43

Anillo y volva en la farinera borda.

Russula sardonia
TÓXICA

Láminas amarillo limón, pie violáceo.

Cualbra morada
NO COMESTIBLE
→ p. 28

Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura.

Compruebe: Base del pie (desentiérrela) y anillo.

COMESTIBLE

Seta coliflor

Sparassis crispa · peu de rata de pi · greixa

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A **S O N** D

CÓMO ES ✕ **Láminas** lóbulos rizados, como una coliflor **Esporada** blanca a crema

Pino silvestre, laricio y rodeno — Sobre madera

100–1800 m; sobre todo 300–1500 m

- Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una...
- Color crema a amarillo pálido; carne elástica.
- En la base de pinos o junto a tocones de pino.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Peu de rata bord
TÓXICA → p. 32

Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas...

Coliflor rosa
CONDICIONADA

Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

Compruebe: Forma de las ramas.

COMESTIBLE

Boleto

Boletus edulis · cep · sureny

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A** **S** **O** N D

CÓMO ES ✓ **Tubos** blancos, luego amarillo verdosos ✗ **Anillo** ✗ **Volva** **Esporada** pardo oliva

Pino silvestre, abeto blanco y pícea — Haya, castaño y roble albar

600–2000 m; sobre todo 900–1700 m — **SABOR** Suave, a avellana.

- ✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
- ✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
- ✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto de Satanás
TÓXICA → p. 29

Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo...

Boleto amargo
NO COMESTIBLE

Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso.

Pie rojo amargo
NO COMESTIBLE

Poros amarillos que azulean y pie rojo.

Compruebe: Poros y pie.

COMESTIBLE

Boleto granulado

Suillus granulatus · molleric · molleric granellut

●○○ **FÁCIL**

E F M A **M** J J A **S** **O** **N** D

CÓMO ES ✓ **Tubos** amarillos, con gotitas de jóvenes ✗ **Anillo** ✗ **Volva** **Esporada** pardo ocre

Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero y otros · 0–1800 m; sobre todo 400–1500 m

- ✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
- ✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
- ✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
- ✓ Bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Boleto picante
NO COMESTIBLE

Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante.

Molleric de bou
SIN INTERÉS

Poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes.

Molleric
COMESTIBLE

Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras...

Compruebe: Color de los poros.

COMESTIBLE

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus · pota de perdiu

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** gruesas, ocre → púrpura negruzco ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes ✕ **Volva** **Esporada** negra o gris negruzca

Pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero 0–1800 m; sobre todo 400–1200 m

- ✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
- ✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
- ✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
- ✓ Bajo pinos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49
Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes.

Falso rebozuelo
NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

Cama de perdiu mucosa
COMESTIBLE
Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

Compruebe: Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ **FÁCIL**

E F M A M **J J** A S O N D

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco · Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.

Seta de olivo
TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.

Falso rebozuelo
NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

Compruebe: Parte inferior.

COMESTIBLE

Trompeta de los muertos

Craterellus cornucopioides · trompeta de la mort · trompeta

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✕ **Láminas** por fuera lisa, gris ceniza **Esporada** blanca

Haya, encina, castaño y roble pubescente y otros — 100–1600 m; sobre todo 200–700 m

- Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.
- Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).
- Carne delgada y elástica.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Orella de gat negra
CONDICIONADA

Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con...

Craterellus cinereus
COMESTIBLE

Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

Compruebe: Forma general.

COMESTIBLE

Angula de monte

Craterellus lutescens · camagroc · rossinyol de pi

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✕ **Láminas** casi liso, rosado anaranjado **Esporada** blanca a crema

Pino silvestre, laricio y abeto blanco 300–1800 m; sobre todo 600–1100 m

- Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
- Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
- Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Falso rebozuelo
NO COMESTIBLE
→ p. 30
Láminas finas y apretadas; pie macizo.

Camagroc
COMESTIBLE
Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas.

Compruebe: Parte inferior y pie.

COMESTIBLE

Lengua de vaca

Hydnum repandum · llengua de bou · llémena

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A **S O N D**

CÓMO ES ✓ **Aguijones** blandos, crema anaranjados ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pino silvestre y abeto blanco · Encina, haya, castaño y roble pubescente

0–1800 m; sobre todo 400–1000 m · **SABOR** Suave; amargo en ejemplares viejos.

- ✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
- ✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
- ✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Hydnellum* / *Sarcodon
NO COMESTIBLE

Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos.

Picornell de pi
COMESTIBLE

Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el...

Compruebe: Consistencia de la carne.

COMESTIBLE

Oronja

Amanita caesarea · ou de reig · reig

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O** N D

CÓMO ES ✓**Láminas** amarillo dorado ✓**Anillo** amarillo, colgante ✓**Volva** blanca, grande, en saco **Esporada** blanca

Encina, alcornoque, roble pubescente y castaño — 50–1100 m; sobre todo 200–700 m

- ✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
- ✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
- ✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
- ✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde
MORTAL → p. 43

Al cortar el huevo de arriba abajo.

Matamoscas
TÓXICA → p. 33

Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero...

Amanita crocea
CONDICIONADA

Sin anillo; láminas blancas o crema.

Compruebe: Corte longitudinal del huevo.

COMESTIBLE

Parasol

Macrolepiota procera · apagallums · cogomella

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas a crema ✓ **Anillo** doble, se desliza ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prados 0–1800 m; sobre todo 200–1100 m **OLOR** Agradable, a avellana.

- ✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central...
- ✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
- ✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
- ✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Lepiota metzinosa
MORTAL → p. 46

Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas.

Amanita pantera
TÓXICA → p. 33

Volva en la base y anillo fijo; pie liso.

Apagallums
CONDICIONADA

Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al...

Compruebe: Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

COMESTIBLE

Barbuda

Coprinus comatus · bolet de tinta

●○○ **FÁCIL**

E F **M** **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas → rosadas → negras ✓ **Anillo** fino, se desliza ✗ **Volva** **Esporada** negra

En prados 0–1500 m; sobre todo 200–1000 m

- ✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).
- ✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
- ✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Bolet de femer TÓXICA

Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas.

Coprí garsa NO COMESTIBLE

Sombrero negro con placas blancas, como una urraca.

Compruebe: Color y superficie del sombrero.

COMESTIBLE

Champiñón silvestre

Agaricus campestris · camperol

●●○ **MEDIA**

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** rosa vivo → pardo chocolate ✓ **Anillo** fino, se pierde pronto ✗ **Volva** **Esporada** pardo chocolate

En prados — 0–2000 m; sobre todo 200–1000 m

- ✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
- ✓ Sin volva en la base.
- ✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
- ✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cogomassa
MORTAL → p. 44

Láminas siempre blancas y volva en saco.

Bola de neu pudent
TÓXICA → p. 35

Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base...

Fals carlet
TÓXICA → p. 39

Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón.

Compruebe: Láminas y base.

COMESTIBLE

Pedo de lobo

Lycoperdon perlatum · pet de llop

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J **A S O N D**

CÓMO ES ✕ **Láminas** una bola: por dentro, blanca y firme

En prados 0–2000 m; sobre todo 400–1100 m

- ✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme.
- ✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un...
- ✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Oronja verde
MORTAL → p. 43

Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de...

Pota de cavall groga
TÓXICA → p. 31

Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa.

Compruebe: Corte longitudinal.

COMESTIBLE

Negrilla

Tricholoma terreum · fredolic · negret

●●● **DIFÍCIL**

E F M A M J J A S **O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas a gris pálido ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero — 0–1800 m; sobre todo 300–1000 m

OLOR Débil, no harinoso.

- ✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso.
- ✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
- ✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
- ✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Fredolic metzinós
TÓXICA → p. 37
Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con...

Tricholoma virgatum* / *T. sciodes
TÓXICA
Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo.

***Inocybe* (varias especies grises)**
TÓXICA
Sombrero fibroso agrietado radialmente.

Compruebe: Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

COMESTIBLE

Pie azul

Lepista nuda · pimpinella morada

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** violeta lila ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** rosada pálida

En prados 0–1800 m; sobre todo 300–1000 m **OLOR** Afrutado, perfumado.

- ✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
- ✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
- ✓ Sin cortina ni anillo.
- ✓ Olor afrutado o perfumado.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)
TÓXICA
Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes.

Barret de bruixa
TÓXICA → p. 41
Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso.

Mycena pura
TÓXICA → p. 41
Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano.

Compruebe: Esporada y parte alta del pie.

COMESTIBLE

Perrechico

Calocybe gambosa · moixernó · bolet de Sant Jordi

●●○ **MEDIA**

E F M **A** **M** **J** J A S **O** N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas a crema, muy juntas ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prados · 400–2000 m; sobre todo 500–1200 m · **OLOR** Intenso a harina fresca.

- ✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
- ✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
- ✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
- ✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Inosperma erubescens
MORTAL → p. 48

Sombrero cónico fibroso agrietado.

Cogomassa
MORTAL → p. 44

Anillo y volva en saco; láminas libres.

Fals carlet
TÓXICA → p. 39

Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño.

Compruebe: Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLES

Babosa negra y carlet

Hygrophorus latitabundus y *H. russula* · llenega negra

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A S **O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ Volva **Esporada** blanca

	Babosa negra	Carlet
SOMBRERO	Pardo oscuro a casi negro, con mucha baba	Rosa vinoso con manchas, poco viscoso
LÁMINAS	Blancas, espaciadas	Blancas, se manchan de vinoso
PIE	Abajo, con una funda de baba gris	Robusto, con manchas vinosas
DÓNDE	Bajo pinos, en suelo calizo	Bajo encinas y robles

0–1500 m de altitud

LOS DOS

- ✓ Láminas blancas, gruesas y céreas: como de cera al tocarlas.
- ✓ Esporada blanca.
- ✓ Salen tarde: de octubre a diciembre.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Fals carlet
TÓXICA → p. 39

Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón...

Llenega borda
NO COMESTIBLE

Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre).

Cualbra morada
NO COMESTIBLE
→ p. 28

Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas.

Compruebe: Láminas blancas: si con la edad se vuelven rosa salmón o pardo herrumbre, no es ninguna de las dos.

COMESTIBLE

Senderuela

Marasmius oreades · cama-sec · carrereta

●●○ **MEDIA**

E F M **A M J** J A **S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** crema, muy separadas ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prados · 0–2200 m; sobre todo 200–1400 m · **OLOR** Débil, a almendra amarga.

- ✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
- ✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
- ✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
- ✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Lepiota metzinosa
MORTAL → p. 46
Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas.

Clitocibe blanc
TÓXICA → p. 38
Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes.

***Inocybe* (especies de prado)**
TÓXICA
Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

Compruebe: Sombrero.

COMESTIBLE

Seta de cardo

Pleurotus eryngii · gírgola de panical

●●○ **MEDIA**

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** blanquecinas, bajan por el pie ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prados 0–1200 m de altitud

- ✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre)...
- ✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
- ✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Clitocibe blanc
TÓXICA → p. 38

Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo.

Fals carlet
TÓXICA → p. 39

Láminas rosa salmón, en bosque.

Compruebe: Color y base.

COMESTIBLE

Seta de chopo

Cyclocybe cylindracea · pollancró

●●○ **MEDIA**

E F M **A M J** J A **S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** crema → pardo tabaco ✓ **Anillo** membranoso ✗ **Volva** **Esporada** pardo tabaco

Chopo negro y álamo blanco · En prados · Sobre madera

0–1200 m; sobre todo por debajo de 300 m

- Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
- Anillo membranoso en el pie.
- Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
- Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Galerina marginada
MORTAL → p. 47

Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre.

Bolet de pi
TÓXICA → p. 40

Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso.

Compruebe: Tamaño y árbol.

CONDICIONADA

Colmenilla

Morchella esculenta · múrgola · rabassola

●●○ **MEDIA**

E F **M** **A** **M** J J A S O N D

CÓMO ES ✕ **Láminas** sombrero con alvéolos, como un panal **Esporada** crema ocrácea

En prados 0–1600 m; sobre todo 200–1200 m

- ✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
- ✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta...
- ✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Falsa colmenilla
MORTAL → p. 50

Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no...

Verpa bohemica
TÓXICA

Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta.

Colmenilla negra
CONDICIONADA

Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente.

Compruebe: Corte longitudinal.

TÓXICAS

Enganyapastors

Lactarius zonarius y *L. chrysorrheus* · pinetell bord, rovelló bord

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J **A S O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** ✕ Anillo ✕ Volva ✓ **Látex** **Esporada** crema

	Enganyapastors	De llet groga
LÁTEX	Blanco, no cambia; muy picante	Blanco que amarillea en segundos
SOMBRERO	Crema a naranja pálido, con zonas	Ocre salmón pálido, con zonas

0–1300 m de altitud

⚠ ●○○ **Moderada** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

⚠ Látex BLANCO al cortar (en los níscalos es rojo vino o naranja).

⚠ Láminas crema que no se manchan de verde.

⚠ Bajo encinas, alcornoques y robles; no bajo pinos.

SE CONFUNDE CON

Níscalo COMESTIBLE → p. 3

Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos.

Níscalo de sangre COMESTIBLE → p. 3

Látex rojo vino; bajo pinos.

🔍 **Compruebe:** Corte el pie: si el látex es blanco, descártela.

TÓXICA

Falso níscalo

Lactarius torminosus · cabra de beç · lleterol de beç

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J **A S O** N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** crema rosado ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex** blanco **Esporada** crema

Abedul 500–1900 m; sobre todo por debajo de 1600 m

Moderada síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

- Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
- Látex blanco que no cambia.
- Siempre bajo abedules.

SE CONFUNDE CON

Níscalo
COMESTIBLE → p. 3

Margen liso, látex naranja; bajo pinos.

Pinetell d'avet
COMESTIBLE

Margen liso, látex naranja; bajo abetos.

Compruebe: Margen y látex.

NO COMESTIBLE

Cualbra morada

Russula torulosa · escaldabec vinós

●●● **DIFÍCIL**

E F M A M J J A S **O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** crema pálido, frágiles ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema

Pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero

0–1600 m; sobre todo 300–900 m

SABOR Muy picante (no la pruebe).

Leve ●○○

Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

- Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.
- Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
- Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.
- Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

SE CONFUNDE CON

Níscalo de sangre
COMESTIBLE → p. 3

El rovelló tiene látex rojo vino.

Carbonera
COMESTIBLE → p. 4

La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas.

Escaldabec de pineda
NO COMESTIBLE

Sombrero rojo sangre o rosado, sin tonos púrpura oscuro.

Compruebe: Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.

TÓXICA

Boleto de Satanás

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs

TÓXICAS

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J **J A S O** N D

CÓMO ES ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** pardo oliva

Roble pubescente, encina, castaño y haya 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 30 min – 6 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
⚠ Poros rojos o rojo anaranjados.
⚠ Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
⚠ La carne azulea débilmente al corte.

SE CONFUNDE CON

Boleto reticulado
COMESTIBLE

El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la...

Boleto negro
COMESTIBLE

Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

Compruebe: Poros y corte.

TÓXICAS

Falsos rebozuelos

Hygrophoropsis aurantiaca y *Omphalotus olearius* · fals rossinyol, gírgola d'olivera

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A **S O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** ✗ Anillo ✗ Volva **Esporada** blanca a crema

	Falso rebozuelo	Seta de olivo
TAMAÑO	Pequeño (2–8 cm), carne delgada y blanda	Grande (5–15 cm) y carnoso
CÓMO SALE	Suelto, en la pinaza o sobre madera podrida de pino	En ramilletes de pies unidos, sobre tocones y raíces de olivo, encina o castaño

0–1800 m de altitud

Grave síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

- Láminas verdaderas: finas, apretadas y que bajan por el pie.
- Todo naranja: sombrero, láminas y pie.
- Pase el dedo por debajo: las láminas se separan; los pliegues del rebozuelo, no.

SE CONFUNDE CON

Rebozuelo
COMESTIBLE → p. 9

El rossinyol tiene pliegues gruesos.

Compruebe: Debajo del sombrero: láminas finas, falso; pliegues gruesos y romos, rebozuelo.

TÓXICA

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✕ **Láminas** una bola: por dentro, negra violácea

Pino piñonero · Alcornoque, encina y castaño · 0–1200 m; sobre todo 200–1000 m

⚠ ●●○ **Grave** · síntomas a las 30 min – 3 h · **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

⚠ Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

SE CONFUNDE CON

Pedo de lobo
COMESTIBLE → p. 17

El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes.

Bejín gigante
COMESTIBLE

Interior blanco uniforme y piel fina.

Trufa negra
COMESTIBLE

La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas...

Compruebe: Corte longitudinal.

TÓXICA

Peu de rata bord

Ramaria formosa

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✕ **Láminas** ramas, como un coral **Esporada** ocre

Haya, roble pubescente y castaño — 200–1600 m; sobre todo 300–1000 m

SABOR Algo amargo (no la pruebe).

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

⚠ Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

SE CONFUNDE CON

Seta coliflor
COMESTIBLE → p. 5

Lóbulos aplanados crema, en pinos.

Coliflor rosa
CONDICIONADA

Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

Compruebe: Forma.

TÓXICAS

Amanita pantera y matamoscas

Amanita pantherina y *A. muscaria* · pixacà, reig bord

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva** **Esporada** blanca

	Amanita pantera	Matamoscas
SOMBRERO	Pardo; verrugas blanco puro, en círculos	Rojo o naranja, más grande
BASE	Bulbo con reborde, como un calcetín	Bulbo con anillos de volva
DÓNDE	Pinares, robledales, hayedos, encinares	Pinares y abedulares de montaña

0–2200 m de altitud

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome panterínico**

Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

⚠ Verrugas blancas en el sombrero (la lluvia puede borrarlas).

⚠ Láminas y pie blancos; bulbo en la base.

SE CONFUNDE CON

Parasol COMESTIBLE → p. 14

Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado.

Oronja COMESTIBLE → p. 13

El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en...

Vinosa CONDICIONADA

En la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas.

Compruebe: Láminas blancas, anillo y volva: descártela (la oronja las tiene amarillas).

TÓXICA

Lepiota pudent

Lepiota cristata

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** fino, frágil ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prados 0–1600 m; sobre todo 300–1000 m

⚠ ●○○ **Moderada** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.

⚠ Olor desagradable, a goma o gas.

⚠ Láminas blancas, libres; anillo frágil.

SE CONFUNDE CON

Parasol
COMESTIBLE → p. 14

Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado.

Compruebe: Tamaño.

TÓXICA

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

●○○ **FÁCIL**

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** rosadas → pardas ✓ **Anillo** grueso ✕ **Volva** **Esporada** pardo chocolate

En prados · 0–1500 m; sobre todo 200–500 m · **OLOR** Desagradable (tinta, fenol).

⚠ ●○○ **Moderada** · síntomas a las 30 min – 3 h · **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.

⚠ Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

⚠ Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

SE CONFUNDE CON

Champiñón silvestre
COMESTIBLE → p. 16

No amarillea y huele bien.

Bola de nieve
COMESTIBLE

Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo.

Compruebe: Base del pie.

TÓXICA

Seta de los caballeros

Tricholoma equestre · verderol · groguet

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A S **O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** amarillo azufre ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pino piñonero, silvestre y rodeno · En prados · 0–1700 m; sobre todo 400–1500 m

OLOR A harina débil.

⚠ ●●○ **Grave** · síntomas a las 24–72 h · **Síndrome rabdomiolítico**

Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

⚠ Láminas amarillo azufre intenso.

⚠ Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.

⚠ Pie amarillo.

SE CONFUNDE CON

Capuchina
COMESTIBLE

Sombrero gris con fibras negras.

Oronja verde
MORTAL → p. 43

Láminas blancas, anillo y volva.

Compruebe: Sombrero.

TÓXICA

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O** N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blanquecinas, reflejo verdoso ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Abeto blanco y pino silvestre · Haya · 800–2000 m de altitud

OLOR A harina.

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

- ⚠ Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas...
- ⚠ Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
- ⚠ Olor a harina.

SE CONFUNDE CON

Negrilla
COMESTIBLE → p. 18

El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a...

Capuchina
COMESTIBLE

Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

🔍 **Compruebe:** Tamaño y escamas.

TÓXICA

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa · candeleta

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas a crema, bajan por el pie ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prados 0–2000 m; sobre todo 300–1000 m

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las 15 min – 2 h **Síndrome muscarínico**

Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

⚠ Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.

⚠ Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).

⚠ Esporada blanca (no rosada).

SE CONFUNDE CON

Senderuela COMESTIBLE → p. 22

El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes.

Molinera COMESTIBLE

Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor...

Champiñón silvestre COMESTIBLE → p. 16

Láminas libres rosadas a pardas.

Compruebe: Láminas.

TÓXICA

Fals carlet

Entoloma sinuatum · carlet bord

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** amarillentas → rosa salmón ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** rosada

Roble pubescente, haya y castaño — 100–1500 m; sobre todo 200–800 m

OLOR A harina rancia.

●●○ Grave — síntomas a las 30 min – 4 h — **Síndrome gastrointestinal**

Irrita el estómago y el intestino.

- Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
- Esporada rosada.
- Olor a harina rancia.
- Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

SE CONFUNDE CON

Carlet
COMESTIBLE → p. 21

El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas.

Perrechico
COMESTIBLE → p. 20

Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas.

Pardilla
TÓXICA

Láminas crema decurrentes.

Compruebe: Color del sombrero y de las láminas.

TÓXICA

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

●○○ **FÁCIL**

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** amarillas → verdosas ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** pardo violácea

En prados · Sobre madera · 0–2000 m; sobre todo 400–1100 m

⚠ ●●○ **Grave** síntomas a las de 30 minutos a varias horas

Síndrome gastrointestinal

Irrita el estómago y el intestino.

⚠ Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.

⚠ Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.

⚠ Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

SE CONFUNDE CON

Seta de chopo
COMESTIBLE → p. 24

Crema, anillo membranoso, en chopos.

Armilaria
CONDICIONADA

Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

Compruebe: Color.

TÓXICAS

Pequeñas con muscarina

Inocybe geophylla y *Mycena pura*

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

	Barret de bruixa	Mycena pura
COLOR	Blanco sedoso, a veces lila	Lila o rosado; borde con rayas
FORMA	Cónico, con pico; fibras que se agrietan	Acampanado; pie hueco y frágil
OLOR	A tierra	A rábano

0–2000 m de altitud

⚠ ●●○ **Grave** 🕒 síntomas a las 15 min – 2 h **Síndrome muscarínico**

Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS

⚠ Pequeñas: de 1 a 5 cm.

⚠ En la hojarasca de pinares, hayedos y bosques mixtos.

SE CONFUNDE CON

Pie azul
COMESTIBLE → p. 19

Mucho mayor y carnosa.

Senderuela
COMESTIBLE → p. 22

Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema.

Pimpinella morada petita
SIN INTERÉS

Láminas gruesas, sin olor a rábano.

🔍 **Compruebe:** Tamaño: el pie azul es grande, carnoso y huele a fruta.

MORTAL

Paxilo

Paxillus involutus · paxil·le tòxic · paxil enrotllat

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** ocre, se manchan de pardo ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** pardo ocre

Pino silvestre · Abedul, encina y castaño · 0–1900 m; sobre todo 400–1400 m

⚠ ●●● **Mortal** · síntomas a las 1–3 h · **Síndrome hemolítico**

Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

⚠ Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

⚠ Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con...

⚠ Sin látex.

SE CONFUNDE CON

Níscalo de sangre
COMESTIBLE → p. 3

El rovelló tiene látex rojo vino y verdea.

Níscalo
COMESTIBLE → p. 3

Látex naranja y manchas verdes en el pinetell.

Platera
COMESTIBLE

La pampa es crema ocrácea con mamelón y no se mancha de pardo.

Compruebe: Corte: látex o no.

MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m **OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

Mortal ●●● síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- Láminas BLANCAS, libres.
- Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE

La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...

Carbonera COMESTIBLE → p. 4

Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE

Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

Compruebe: Base y pie.

MORTAL

Cogomassa

Amanita verna

●●○ **MEDIA**

E F M **A M J** J A **S O** N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

Encina, roble pubescente y alcornoque — 0–900 m de altitud

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

⚠ Seta enteramente blanca.
⚠ Volva blanca en saco en la base.
⚠ Anillo membranoso blanco.
⚠ Láminas blancas, libres.

SE CONFUNDE CON

Perrechico COMESTIBLE → p. 20

El moixernó no tiene volva ni anillo.

Champiñón silvestre COMESTIBLE → p. 16

Láminas rosadas y luego pardas; sin volva.

Farinera CONDICIONADA

Mayor, harinosa, de otoño en caliza.

Compruebe: Base y pie.

MORTAL

Farinera pudent

Amanita virosa

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J **A S O** N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, frágil ✓ **Volva** en saco **Esporada** blanca

Haya y abedul — 500–1800 m de altitud

⚠ ●●● **Mortal** — síntomas a las 6–24 h — **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- ⚠ Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
- ⚠ Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
- ⚠ Volva blanca en saco.

SE CONFUNDE CON

Bola de nieve
COMESTIBLE

Láminas rosadas a pardas, sin volva.

Compruebe: Láminas y base.



MORTAL

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata · palometa

●●○ **MEDIA**

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas a crema ◑ **Anillo** solo una zona algodonosa ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prados 0–900 m; sobre todo por debajo de 300 m

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

⚠ Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
⚠ Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
⚠ Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
⚠ Láminas blancas, libres.

SE CONFUNDE CON

Parasol
COMESTIBLE → p. 14

El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y...

Senderuela
COMESTIBLE → p. 22

El cama-sec tiene láminas espaciadas.

Champiñón silvestre
COMESTIBLE → p. 16

Láminas rosadas y luego pardas.

Compruebe: Tamaño, anillo y pie.

MORTAL

Galerina marginada

Galerina marginata · galerina metzinosa

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** amarillentas → pardo herrumbre ✓ **Anillo** fino ✗ **Volva** **Esporada** pardo herrumbre

Sobre madera 0–2000 m; sobre todo 400–1300 m

●●● Mortal síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
- Anillo fino pardo en el pie.
- Esporada pardo herrumbre.
- Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

SE CONFUNDE CON

Seta de chopo
COMESTIBLE → p. 24

Mayor y sobre chopos.

Kuehneromyces mutabilis
COMESTIBLE

Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

Armilaria
CONDICIONADA

Mayor, escamas oscuras, esporada blanca.

Compruebe: Tamaño y árbol.



MORTAL

Inosperma erubescens

●●○ **MEDIA**

E F M A **M** **J** **J** A S O N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blanquecinas → pardas, manchas rojas ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** parda

En prados 0–1500 m de altitud

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 15 min – 2 h **Síndrome muscarínico**

Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

⚠ Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.

⚠ Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.

⚠ Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

SE CONFUNDE CON

Perrechico
COMESTIBLE → p. 20

El moixernó tiene sombrero liso carnoso.

🔍 **Compruebe:** Sombrero, manchas rojas y olor.

MORTAL

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus · bolet de mantellina

●●○ **MEDIA**

E F M A M J J A **S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** amarillo anaranjadas → herrumbre ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes ✕ **Volva** **Esporada** pardo herrumbre

Roble pubescente, castaño y encina — 100–1500 m de altitud

OLOR Débil a rábano.

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 2–15 días **Síndrome orellánico**

Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

- ⚠ Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
- ⚠ Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
- ⚠ Esporada pardo herrumbre.
- ⚠ Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

SE CONFUNDE CON

Rebozuelo
COMESTIBLE → p. 9

El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas.

Camagroc
COMESTIBLE

Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

Cama de perdiu
COMESTIBLE → p. 8

Láminas decurrentes y esporada negra; bajo pinos.

Compruebe: Parte inferior.

MORTAL

Falsa colmenilla

Gyromitra esculenta · bolet de greix · murga

●○○ **FÁCIL**

E F M **A** **M** **J** J A S O N D

CÓMO ES ✕ **Láminas** sombrero arrugado, como un cerebro

Pino silvestre, abeto blanco y pino negro — Sobre madera

600–2200 m; sobre todo 1000–1800 m

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 6–12 h **Síndrome giromitriano**

Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

⚠ Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

⚠ Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

SE CONFUNDE CON

Colmenilla
CONDICIONADA
→ p. 25

La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una...

Colmenilla negra
CONDICIONADA

Alvéolos en hileras y un solo hueco.

Compruebe: Corte longitudinal.

Árboles y sus setas

Reconocer el árbol por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.

HOJA

TRONCO

Pino carrasco

pi blanc · *Pinus halepensis*

Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido.

BUSQUE Níscalos *3*, Boleto granulado *7*, Cama de perdiu *8*, Negrilla *18*, Babosa negra y carlet *21*

CUIDADO Cualbra morada *28*

HOJA

TRONCO

Pino piñonero

pi pinyer · *Pinus pinea*

Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.

BUSQUE Níscalos *3*, Boleto granulado *7*, Cama de perdiu *8*, Negrilla *18*

CUIDADO Pota de cavall groga *31*, Seta de los caballeros *36*, Cualbra morada *28*

HOJA

TRONCO

Pino laricio

pinassa · *Pinus nigra subsp. salzmannii*

Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.

BUSQUE Níscalos *3*, Seta coliflor *5*, Boleto granulado *7*, Cama de perdiu *8*, Angula de monte *11*, Negrilla *18*

CUIDADO Cualbra morada *28*

HOJA

TRONCO

Pino silvestre

pi roig · *Pinus sylvestris*

Copa irregular y alta.

BUSQUE Níscalos *3*, Seta coliflor *5*, Boleto *6*, Boleto granulado *7*, Cama de perdiu *8*, Rebozuelo *9*

CUIDADO Paxilo *42*, Falsa colmenilla *50*, Amanita pantera y matamoscas *33*, Seta de los caballeros *36*, Fredolic metzinós *37*, Cualbra morada *28*

HOJA

TRONCO

Encina

alzina · *Quercus ilex*

Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate.

BUSQUE Carbonera *4*, Rebozuelo *9*, Trompeta de los muertos *10*, Lengua de vaca *12*, Oronja *13*, Babosa negra y carlet *21*

CUIDADO Paxilo *42*, Oronja verde *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Boleto de Satanás *29*

Árboles y sus setas

HOJA

TRONCO

Abeto blanco

avet · *Abies alba*

Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.

BUSQUE Boleto *6*, Rebozuelo *9*, Angula de monte *11*, Lengua de vaca *12*

CUIDADO Falsa colmenilla *50*, Amanita pantera y matamoscas *33*, Fredolic metzinós *37*

HOJA

TRONCO

Alcornoque

surera · *Quercus suber*

Árbol de copa amplia y verde grisácea.

BUSQUE Carbonera *4*, Rebozuelo *9*, Oronja *13*

CUIDADO Oronja verde *43*, Cogomassa *44*, Enganyapastors *26*, Pota de cavall groga *31*

HOJA

TRONCO

Roble pubescente

roure martinenc · *Quercus pubescens*

Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las...

BUSQUE Carbonera *4*, Trompeta de los muertos *10*, Lengua de vaca *12*, Oronja *13*, Babosa negra y carlet *21*

CUIDADO Oronja verde *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Boleto de Satanás *29*, Peu de rata bord *32*

HOJA

TRONCO

Haya

faig · *Fagus sylvatica*

Árbol alto de corteza lisa y gris.

BUSQUE Carbonera *4*, Boleto *6*, Rebozuelo *9*, Trompeta de los muertos *10*, Lengua de vaca *12*

CUIDADO Oronja verde *43*, Farinera pudent *45*, Boleto de Satanás *29*, Peu de rata bord *32*, Amanita pantera y matamoscas *33*, Fredolic metzinós *37*

HOJA

TRONCO

Castaño

castanyer · *Castanea sativa*

Árbol grande de copa amplia.

BUSQUE Carbonera *4*, Boleto *6*, Rebozuelo *9*, Trompeta de los muertos *10*, Lengua de vaca *12*, Oronja *13*

CUIDADO Paxilo *42*, Oronja verde *43*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Boleto de Satanás *29*, Pota de cavall groga *31*