1

CUARTA RONDA · LA F3 SIN ICONOS DE RASGOS

Rebozuelo: las cinco maquetas

La misma ficha (comestibles) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F3 Columna de iconos



F3a Todo a lo ancho



F3b Dos columnas



F3c Parecidas al lado



F3d Banda de color



F3a

Todo a lo ancho

Las tres fotos y el texto a todo el ancho

La F3 sin la columna de iconos: los rasgos en una sola línea con su ✓ o ✗, y debajo dónde, peligro, cómo reconocerla y las parecidas en tres columnas con foto. Si sobra sitio, las fotos crecen.

A FAVOR

- Sin huecos: el texto ocupa todo el ancho.
- Las fotos se llevan el sitio que sobra.

EN CONTRA

- Las líneas son largas.
- Los rasgos, en texto (más pequeños que los iconos).







COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✗ **Anillo** ✗ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco · Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49

Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo TÓXICA → p. 30

Láminas verdaderas, finas y apretadas.



Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30

Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

Compruebe: Parte inferior.







MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m · OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

●●● Mortal síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- ⚠ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ⚠ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ⚠ Láminas BLANCAS, libres.
- ⚠ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde COMESTIBLE

La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...



Carbonera COMESTIBLE → p. 4

Sin volva ni anillo; láminas flexibles.



Bola de nieve COMESTIBLE

Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

Compruebe: Base y pie.

Lámina 2 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 6.

F3b

Dos columnas

Bloques que se reparten solos

Los rasgos en una línea y, debajo, los bloques (dónde, peligro, cómo reconocerla, parecidas y compruebe) en dos columnas que se reparten solas para que acaben a la misma altura.

A FAVOR

- Líneas cortas y sin huecos.
- Cada bloque entero en una columna.

EN CONTRA

- El orden de lectura baja por una columna y sigue en la otra.
- Las parecidas pueden quedar partidas de su título si no caben.







COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL

E F M A M **J J A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m
- **OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo
TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.



Falso rebozuelo
NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

Compruebe: Parte inferior.







MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA

E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m
- **OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

⚠ ●●● **Mortal**
síntomas a las 6–24 h
Síndrome faloidiano
Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

RASGOS DE ALARMA

- ⚠ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ⚠ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ⚠ Láminas BLANCAS, libres.
- ⚠ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde
COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está…



Carbonera
COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.



Bola de nieve
COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

Compruebe: Base y pie.

Lámina 3 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 6.

F3c

Parecidas al lado

La columna izquierda, para las que se le parecen

La columna de la izquierda ya no lleva iconos: lleva las setas con que se confunde, con foto redonda grande, una debajo de otra. A la derecha, los rasgos en una línea, dónde, peligro, cómo reconocerla y compruebe.

A FAVOR

- Las parecidas se ven mucho: fotos grandes.
- La columna se reparte en toda la altura: sin hueco abajo.

EN CONTRA

- La columna de la derecha es más estrecha.
- Si solo hay una o dos parecidas, quedan muy separadas.







COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL

E F M A M **J J A S O N** D

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo
TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.



Falso rebozuelo
NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ Volva **Esporada** crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m
OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

Compruebe: Parte inferior.







MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA

E F M A M J J **A S O N** D

SE CONFUNDE CON



Gorro verde
COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...



Carbonera
COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.



Bola de nieve
COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m
OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

⚠ ●●● **Mortal** síntomas a las 6–24 h
Síndrome faloidiano
Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

⚠ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
⚠ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
⚠ Láminas BLANCAS, libres.
⚠ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

Compruebe: Base y pie.

Lámina 4 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 6.

F3d

Banda de color

Fotos limpias y el nombre debajo

Las tres fotos sin nada encima y, justo debajo, una banda del color del grupo con el nombre, la etiqueta, la dificultad y los meses. Luego todo a lo ancho, como la F3a.

A FAVOR


- Las fotos se ven enteras, sin el nombre encima.
- La banda de color dice el grupo de un vistazo.

EN CONTRA

- La banda ocupa algo de alto.
- Gasta más tinta.







Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE · ●○○ FÁCIL

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco · Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49

Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo TÓXICA → p. 30

Láminas verdaderas, finas y apretadas.



Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30

Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

Compruebe: Parte inferior.







Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

MORTAL · ●●○ MEDIA

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros · 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

Mortal ●●● · síntomas a las 6–24 h · **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- Láminas BLANCAS, libres.
- Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde COMESTIBLE

La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...



Carbonera COMESTIBLE → p. 4

Sin volva ni anillo; láminas flexibles.



Bola de nieve COMESTIBLE

Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

Compruebe: Base y pie.

Lámina 5 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 6.

6

CUARTA RONDA · LA F3 SIN ICONOS DE RASGOS

Boleto de Satanás: las cinco maquetas

La misma ficha (tóxicas) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F3 Columna de iconos



F3a Todo a lo ancho



F3b Dos columnas



F3c Parecidas al lado



F3d Banda de color



7

CUARTA RONDA · LA F3 SIN ICONOS DE RASGOS

Oronja verde: las cinco maquetas

La misma ficha (mortales) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F3 Columna de iconos



F3a Todo a lo ancho



F3b Dos columnas



F3c Parecidas al lado



F3d Banda de color



8

TERCERA RONDA · LA F CON ICONOS

Rebozuelo: las cuatro maquetas

La misma ficha (comestibles) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F Foto alta



F1 Foto alta con iconos



F2 Tira de fotos



F3 Columna de iconos



F1

Foto alta con iconos

Fotos pequeñas grandes y fila de iconos

La F con las dos fotos pequeñas mucho más grandes. Los rasgos pasan a iconos (láminas, anillo, volva, látex, esporada) con una marca verde o roja; dónde, altitud y olor, cada uno con su icono; las parecidas, con foto.

A FAVOR

- Se ve de un vistazo si tiene anillo o volva.
- Casi nada de texto seguido: frases cortas, una por línea.

EN CONTRA

- Hay que aprender los iconos (van en la página de «Antes de salir»).
- Algo menos de detalle que la F.






Lámina 9 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 12.

F2

Tira de fotos

Las tres fotos grandes y ficha técnica


La foto grande arriba y, debajo, las otras dos a todo el ancho, igual de grandes entre sí. Luego una ficha técnica en dos columnas: los rasgos en iconos a la izquierda y dónde y cuándo a la derecha.

A FAVOR

- Las fotos pequeñas, las más grandes de todas las propuestas.
- Ficha ordenada como una tabla.

EN CONTRA

- Las fotos ocupan media página larga: menos sitio para las parecidas.
- En las fichas largas se quita el detalle de las diferencias.



COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta





●○○ FÁCIL

E F M A M J J A S O N D

Pliegues gruesos, del color del sombrero

Sin anillo

Sin volva

Esporada crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco

Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

- Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.
- Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49

Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo TÓXICA → p. 30

Láminas verdaderas, finas y apretadas.



Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30

Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

Compruebe: Parte inferior.



MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda





●●○ MEDIA

E F M A M J J A S O N D

Láminas blancas

Anillo blanco, colgante

Volva blanca, en saco

Esporada blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

Mortal ●●● síntomas a las 6–24 h **Síndrome faloidiano**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

- Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- Láminas BLANCAS, libres.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde COMESTIBLE



Carbonera COMESTIBLE → p. 4

Compruebe: Base y pie.

Lámina 10 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 12.

F3

Columna de iconos

Tres fotos arriba y los rasgos al lado

Las tres fotos juntas arriba, a sangre (la grande y dos a su lado). Debajo, una columna estrecha con los rasgos en iconos, uno debajo de otro, y al lado el resto: dónde, cómo reconocerla, peligro y parecidas.

A FAVOR

- Los rasgos siempre en el mismo sitio, como una tabla para repasar.
- Las tres fotos se ven a la vez.

EN CONTRA

- La columna de texto es más estrecha.
- Foto principal algo más estrecha que en F1.



COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL

E F M A M **J J A S O N** D

Pliegues gruesos, del color del sombrero

Sin anillo

Sin volva

Esporada crema rosada pálida

Pino silvestre y abeto blanco

Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

Compruebe: Parte inferior.



MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA

E F M A M J J **A S O N** D

Láminas blancas

Anillo blanco, colgante

Volva blanca, en saco

Esporada blanca

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

⚠ ●●● Mortal · síntomas a las 6–24 h

Síndrome faloidiano

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

⚠ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).

⚠ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

⚠ Láminas BLANCAS, libres.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está…

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

Compruebe: Base y pie.

Lámina 11 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 12.

12

TERCERA RONDA · LA F CON ICONOS

Boleto de Satanás: las cuatro maquetas

La misma ficha (tóxicas) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F Foto alta



F1 Foto alta con iconos



F2 Tira de fotos



F3 Columna de iconos



13

TERCERA RONDA · LA F CON ICONOS

Oronja verde: las cuatro maquetas

La misma ficha (mortales) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F Foto alta




F1 Foto alta con iconos



F2 Tira de fotos



F3 Columna de iconos



14

SEGUNDA RONDA · FOTO GRANDE

Rebozuelo: las seis maquetas

La misma ficha (comestibles) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F Foto alta



G Marco clásico



H Arco y medallones




I Álbum de campo



J Modernista



K Foto de fondo



F

Foto alta

Foto grande y texto en dos columnas

Media página de foto a sangre, con el nombre encima y las otras dos fotos montadas sobre el borde. Debajo, todo el texto seguido y apretado, en dos columnas.

A FAVOR

- La foto más grande con casi todo el texto.
- Sencilla: sirve igual para todas las setas.

EN CONTRA

- Texto pequeño y seguido, sin listas.
- Gasta tinta (foto a sangre).




COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta





●○○ FÁCIL E F M A M **J J A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.



MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda





●●○ MEDIA E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

DÓNDE Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla. **SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE La llora verde no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

Lámina 15 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 21.

G

Marco clásico

Doble filete con esquinas

Como una lámina de libro antiguo: un marco de doble filete con las esquinas hacia dentro y un rizo en cada una, el nombre centrado con una orla y las fotos con paspartú.

A FAVOR

- Elegante, de libro de verdad.
- El marco no gasta casi tinta.

EN CONTRA

- El marco quita unos milímetros a cada lado.
- Algo menos de texto que F.

COMESTIBLE · ●○○ FÁCIL

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta







E F M A M **J J A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ Anillo ✕ Volva **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

— 9 —

MORTAL · ●●○ MEDIA

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda







E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

DÓNDE Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla. **SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

— 43 —

Lámina 16 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 21.

H

Arco y medallones

Lámina de botánica

La foto principal dentro de un arco con doble filo de color y las otras dos en medallones redondos sobre las esquinas. Nombre centrado con orla y el texto en una columna.

A FAVOR

- Muy decorativa sin recargar.
- La foto grande se ve entera.

EN CONTRA

- El arco recorta las esquinas de la foto.
- Una sola columna: líneas largas.



Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL E F M A M **J J A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m.

CÓMO RECONOCERLA ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.



Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

MORTAL ●●○ MEDIA E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

DÓNDE Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m.

RASGOS DE ALARMA ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla. **SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

Lámina 17 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 21.

I

Álbum de campo

Esquineros, cinta y notas a mano

Como un álbum de fotos o un diario de campo: la foto grande un poco torcida con esquineros, las otras dos pegadas con cinta y notas escritas a mano.

A FAVOR

- Cercana y divertida; parece hecha a mano.
- Fotos grandes.

EN CONTRA

- Las fotos torcidas tapan un poco las otras.
- Menos seria para un libro de seguridad.

Rebozuelo

COMESTIBLE

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

fácil · junio–noviembre



↑ *en su punto*

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ **Anillo** ✕ **Volva** **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49 Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30 Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

Oronja verde

MORTAL

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

media · agosto–noviembre



↑ *adulta*

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

DÓNDE Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla. **SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

Lámina 18 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 21.

J
Modernista

Esquinas con hojas y cinta

Esquinas con latigazos, hojas y bayas del color del grupo (verde, naranja o rojo), la foto con las esquinas de arriba redondeadas y el nombre en una cinta con picos.

A FAVOR

- La más adornada: muy vistosa.
- El color del grupo en el marco avisa sin leer.

EN CONTRA

- Mucho adorno en una página pequeña.
- El texto queda más estrecho.



Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL — E F M A M **J J A S O N** D

CÓMO ES ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero ✕ Anillo ✕ Volva **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE Pino silvestre y abeto blanco; Encina, alcornoque, castaño y haya y otros; 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie. ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo). ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque.
SABOR Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30 Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

9



Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

MORTAL ●●○ MEDIA — E F M A M J J **A S O N D**

CÓMO ES ✓ **Láminas** blancas ✓ **Anillo** blanco, colgante ✓ **Volva** blanca, en saco **Esporada** blanca

DÓNDE Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros; 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base). ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie. ! Láminas BLANCAS, libres. ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.
SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4 Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

43

Lámina 19 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 21.

K

Foto de fondo

Toda la página es la foto

La foto ocupa la página entera; el nombre va arriba, sobre la foto, y el texto en un panel blanco abajo, con las otras dos fotos asomando por encima.

A FAVOR

- La foto más grande posible.
- Muy llamativa al hojear.

EN CONTRA

- Gasta mucha tinta.
- Según la foto, el panel tapa parte de la seta.





Lámina 20 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 21.

21

SEGUNDA RONDA · FOTO GRANDE

Boleto de Satanás: las seis maquetas

La misma ficha (tóxicas) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F Foto alta



G Marco clásico



H Arco y medallones




I Álbum de campo



J Modernista



K Foto de fondo



22

SEGUNDA RONDA · FOTO GRANDE

Oronja verde: las seis maquetas

La misma ficha (mortales) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

F Foto alta



G Marco clásico



H Arco y medallones



I Álbum de campo



J Modernista



K Foto de fondo



23

PRIMERA RONDA

Rebozuelo: las seis maquetas

La misma ficha (comestibles) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

Ahora Ficha completa

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D



En su punto | Debajo | De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

COMESTIBLES

CÓMO ES
✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
✕ **Anillo** ✕ **Volva**
● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m
Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.


CÓMO RECONOCERLA
✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.
OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON
✕ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 49
SE PARECE Tonos anaranjados en planifolios ácidos. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.
✕ **Seta de olivo** girgola d'olivera · *Omphalotus olearius* TÓXICA → p. 30
SE PARECE Color anaranjado, forma de embudo, crecimiento en otoño. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas, finas y apretadas.
✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 30
SE PARECE Naranja, en embudo, en pinares. **SE DISTINGUE** Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

A Foto protagonista



COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL E F M A M **J J A S O N** D

CÓMO ES
✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
✕ **Anillo**
✕ **Volva**
● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m
Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA
✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.
OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON
Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.
Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

B Guía de campo

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D De junio a noviembre



En su punto



Debajo



De cerca

CÓMO ES
✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
✕ **Anillo**
✕ **Volva**
● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m
Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA
✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.
OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO CON
Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.
Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

C Tarjetas

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL



CÓMO ES
✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
✕ **Anillo**
✕ **Volva**
● **Esporada** crema rosada pálida

CUÁNDO
D E F M A M **J J A S O N** D
De junio a noviembre

DÓNDE
Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

CÓMO RECONOCERLA
✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON
Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.
Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies...

COMESTIBLES 9

D Sí o no

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta



E F M A M **J J A S O N** D
Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

ES ELLA SI...
☐ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
☐ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
☐ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DESCÁRTELA SI...
☐ Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre. → **Cortinari metzinós**
☐ Láminas verdaderas, finas y apretadas. → **Seta de olivo**
☐ Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo. → **Falso rebozuelo**

NO LA CONFUNDA



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49 ≠ Seta de olivo TÓXICA → p. 30

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Parte inferior.

COMESTIBLES 9


E Infografía

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta





DÓNDE
Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

ESPORADA
Crema rosada pálida

CÓMO RECONOCERLA
✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

COMESTIBLES 9

Ahora

Ficha completa

La que había antes de la F3a

Cabecera con nombre y meses, tres fotos iguales en fila, «Cómo es / Dónde» en dos columnas y debajo, en texto seguido, cómo reconocerla y las confusiones.

A FAVOR

- Lo dice todo: es la más completa.
- Muy ordenada y regular: todas las fichas se parecen.

EN CONTRA

- Mucho texto pequeño; cuesta encontrar algo de un vistazo.
- Las fotos son pequeñas para A6.

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D



En su punto



Debajo



De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

CÓMO ES

✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
✗ **Anillo** ✗ **Volva**
● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 49
SE PARECE Tonos anaranjados en planifolios ácidos. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

✗ **Seta de olivo** gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius* TÓXICA → p. 30
SE PARECE Color anaranjado, forma de embudo, crecimiento en otoño. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas, finas y apretadas.

✗ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 30
SE PARECE Naranja, en embudo, en pinares. **SE DISTINGUE** Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES

Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J **A S O N** D



Adulta



Debajo



Láminas blancas y base con volva

CÓMO ES

✓ **Láminas** blancas
✓ **Anillo** blanco, colgante
✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
! Láminas BLANCAS, libres.
! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde
llora verda · *Russula virescens*
COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está…

≈ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 4
SE DISTINGUE Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE Base y pie.

MORTALES

Lámina 24 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm).
Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 30.

A

Foto protagonista

Como una revista

Una foto grande a sangre arriba, con el nombre encima; dos fotos pequeñas en la esquina. Una banda de color con la dificultad y los meses, y el texto debajo, más corto.

A FAVOR

- Se reconoce la seta al pasar las páginas.
- Muy atractiva; el color del grupo se ve enseguida.

EN CONTRA

- Cabe menos texto: se quitan detalles si no caben.
- Gasta más tinta (foto a sangre).



COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL — E F M A M **J J A S O N** D

CÓMO ES

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ Anillo
- ✗ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.



MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA — E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE Base y pie.

Lámina 25 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm).
Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 30.

B

Guía de campo

Columna de fotos

Como las guías de campo clásicas: las tres fotos en una columna a la izquierda, con su pie y dónde sale; a la derecha, todo el texto en una columna estrecha, fácil de leer.

A FAVOR

- Líneas cortas: se lee más rápido.
- Las fotos van con su explicación al lado del texto.

EN CONTRA

- Fotos más pequeñas que en A.
- La columna de texto se llena antes en las fichas largas.

Rebozuelo

COMESTIBLE
●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D De junio a noviembre


En su punto


Debajo


De cerca

CÓMO ES

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ Anillo
- ✗ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

Oronja verde

MORTAL
●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J **A S O N** D De agosto a noviembre


Adulta


Debajo


Láminas blancas y base con volva

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

Lámina 26 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm).
Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 30.

C

Tarjetas

Cada cosa en su caja

Cabecera de color y cada bloque en una tarjeta: cómo es, cuándo (rueda de meses), dónde, cómo reconocerla y las confusiones con su foto redonda.

A FAVOR

- Se encuentra cada dato enseguida, siempre en el mismo sitio.
- Las confusiones llevan foto.

EN CONTRA

- Las cajas ocupan sitio: menos texto.
- Más «de app» que de libro.

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE · ●○○ FÁCIL







CÓMO ES

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ Anillo
- ✗ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

CUÁNDO



De junio a noviembre

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies…

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

MORTAL · ●●○ MEDIA







CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

CUÁNDO



De agosto a noviembre

DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.



Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Lámina 27 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 30.

D

Sí o no

Lista para el monte

Pensada para usarla con la seta en la mano: casillas para marcar lo que se ve (es ella si… / descártela si…), las parecidas foto contra foto y lo que hay que comprobar antes de cogerla.

A FAVOR

- Obliga a mirar cada rasgo: la más segura.
- Las confusiones, foto contra foto.

EN CONTRA

- Menos descripción (sombrero, pie…).
- En las tóxicas cambia la columna de la derecha: «Si se come…».

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE
●○○ FÁCIL







E F M A M **J J A S O N** D

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

ES ELLA SI…

- ☐ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ☐ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ☐ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DESCÁRTELA SI…

- ☐ Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre. → **Cortinari metzinós**
- ☐ Láminas verdaderas, finas y apretadas. → **Seta de olivo**
- ☐ Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo. → **Falso rebozuelo**

NO LA CONFUNDA



≠



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49



≠



Seta de olivo TÓXICA → p. 30

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Parte inferior.

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

MORTAL
●●○ MEDIA







E F M A M J J **A S O N D**

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

SEÑALES DE ALARMA

- ☐ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ☐ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ☐ Láminas BLANCAS, libres.
- ☐ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SI SE COME…

●●● **Mortal**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

Síndrome faloidiano. Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12).

NO LA CONFUNDA



≠



Gorro verde COMESTIBLE

≠



Carbonera COMESTIBLE → p. 4

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Base y pie.

Lámina 28 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm).
Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 30.

E

Infografía

Dibujo con flechas

Un dibujo de la seta con flechas a sus partes (sombrero, debajo, anillo, pie, volva), una tira de fotos, la rueda de meses y las confusiones en tres columnas con foto.

A FAVOR

- Enseña a mirar las partes: muy didáctica.
- Anillo y volva saltan a la vista (o que no los tiene).

EN CONTRA


- El dibujo es esquemático: no sirve para las setas con formas raras (bolas, corales, colmenillas).
- Menos texto de reconocimiento.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta





DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

ESPORADA

Crema rosada pálida

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo
TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.




Falso rebozuelo
NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

MORTAL ●●○ MEDIA

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda





DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

ESPORADA

Blanca

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde
COMESTIBLE



Carbonera
COMESTIBLE → p. 4



Bola de nieve
COMESTIBLE

Lámina 29 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm).
Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 30.

30

PRIMERA RONDA

Boleto de Satanás: las seis maquetas

La misma ficha (tóxicas) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

Ahora Ficha completa

Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs

E F M A M J **J A S O** N D



Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo. | Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo. | Al cortarla o tocarla, la carne azulea.

CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON



Boleto reticulado cep d'estiu · *Boletus reticulatus* COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.



Boleto negro sureny fosc · *Boletus aereus* COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

TÓXICAS 29

A Foto protagonista



TÓXICA

Boleto de Satanás

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs

●○○ FÁCIL E F M A M J **J A S O** N D

CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON

Boleto reticulado COMESTIBLE
El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.

Boleto negro COMESTIBLE
Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

TÓXICAS 29

B Guía de campo

Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs

E F M A M J **J A S O** N D De julio a octubre



Sombrero blanquecino y pie hinchado...



Debajo



Al cortarla o tocarla, la carne azulea.

CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

OLOR Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

SE CONFUNDE CON

Boleto reticulado COMESTIBLE
El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.

Boleto negro COMESTIBLE
Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

COMPRUEBE Poros y corte.

TÓXICAS 29

C Tarjetas

Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs



CÓMO ES
- ✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo oliva

CUÁNDO



De julio a octubre

DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ! La carne azulea débilmente al corte.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SE CONFUNDE CON



Boleto reticulado COMESTIBLE
El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.



Boleto negro COMESTIBLE
Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

TÓXICAS 29

D Sí o no

Boleto de Satanás

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs




E F M A M J **J A S O** N D Roble pubescente, encina, castaño y haya

SEÑALES DE ALARMA
- ☐ Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ☐ Poros rojos o rojo anaranjados.
- ☐ Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
- ☐ La carne azulea débilmente al corte.

SI SE COME...
●●○ Grave
Irrita el estómago y el intestino.
Síndrome gastrointestinal. Síntomas entre 30 minutos y 6 horas.

NO LA CONFUNDA



Boleto reticulado COMESTIBLE | Boleto negro COMESTIBLE

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Poros y corte.

TÓXICAS 29


E Infografía

TÓXICA ●○○ FÁCIL

Boleto de Satanás

Rubroboletus satanas · matagent · mataparent de Satanàs





DÓNDE
- Roble pubescente, encina, castaño y haya
- 100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

ESPORADA
Pardo oliva

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

SÍNDROME GASTROINTESTINAL Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

RASGOS DE ALARMA
- ! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
- ! Poros rojos o rojo anaranjados.
- ! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.

SE CONFUNDE CON



Boleto reticulado COMESTIBLE



Boleto negro COMESTIBLE

TÓXICAS 29

31

PRIMERA RONDA

Oronja verde: las seis maquetas

La misma ficha (mortales) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

Ahora Ficha completa

Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J A S O N D



Adulta · Debajo · Láminas blancas y base con volva

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde *Ilora verda* · *Russula virescens* COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está…

≠ **Carbonera** *Ilora* · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 4
SE DISTINGUE Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE Base y pie.

MORTALES

A Foto protagonista



MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE Base y pie.

MORTALES


B Guía de campo

Oronja verde


MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J A S O N D De agosto a noviembre



Adulta



Debajo



Láminas blancas y base con volva

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

MORTALES

C Tarjetas

Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda



CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

CUÁNDO

De agosto a noviembre

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

MORTALES

D Sí o no

Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda



E F M A M J J A S O N D · Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

SEÑALES DE ALARMA
- ☐ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ☐ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ☐ Láminas BLANCAS, libres.
- ☐ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SI SE COME…

●●● **Mortal**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

Síndrome faloidiano. Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12).

NO LA CONFUNDA



Gorro verde COMESTIBLE ≠ Carbonera COMESTIBLE → p. 4

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Base y pie.

MORTALES


E Infografía

MORTAL ●●○ MEDIA

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda





DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

ESPORADA
○ Blanca

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde COMESTIBLE · Carbonera COMESTIBLE → p. 4 · Bola de nieve COMESTIBLE

MORTALES