Bolets *essencials*

de Catalunya







Els **54** que cal conèixer: com reconèixer-los, on i quan surten, i amb què no confondre'ls.

25 COMESTIBLES · **20** TÒXICS · **9** MORTALS

Davant el dubte, no el reculli.

Emergències **112**
Toxicologia 24 h **91 562 04 20**

ABANS DE SORTIR

Les 12 regles

1. Reculli només el que coneix a fons.
2. Tregui el bolet sencer, amb la base del peu.
3. Revisi cada exemplar, un per un.
4. No barregi espècies; els dubtosos, a part i en paper.
5. Llenci els vells, cucats, xops o glaçats.
6. Cistell rígid i ventilat; mai bosses de plàstic.
7. No es cregui les proves casolanes (all, cullera de plata...).
8. Les apps de fotos orienten, però no decideixen.
9. Davant el dubte, consulti un micòleg amb el bolet sencer.
10. Cuini'ls sempre: molts són tòxics en cru.
11. Guardi'n un de cru de cada espècie fins l'endemà.
12. Eviti cunetes, zones industrials i camps tractats.

COM MIRAR UN BOLET



1. **Barret.** Color, textura (llisa, escatosa, viscosa) i marge.
2. **A sota.** Làmines, porus, plecs o agulles. Color, i si baixen pel peu.
3. **Anell.** En té? Fix o es desplaça?
4. **Peu.** Ple o buit, fibrós o trencadís. Dibuixos?
5. **Base.** Tregui'l sencer i furgui: hi ha volva?
6. **Carn.** Talli'l: làtex? Canvia de color? Olor?

Làmines blanques + anell + volva = DESCART

COM LLEGIR LES FITXES

COMESTIBLE TÒXIC MORTAL	Què és. El mateix color va a la pestanya del marge.
●●○ Mitjana	Dificultat per reconèixer-lo: fàcil, mitjana o difícil.
G F M A M J J A S O N D	Mesos en què surt; en clar, només alguns anys.
✓ ✗ ◐	Com és: ho té, no ho té, només en part.
	On: pins i avets, arbres de fulla ampla, prats, fusta, altitud.
	Olor, quan surten els símptomes i què comprovar abans de collir-lo.
●●○ Greu	En els tòxics: lleu, moderada, greu o mortal.
→ *p. 12*	Pàgina del bolet amb què es confon.

COMENCEN A LA PÀGINA **Comestibles** *3* **Tòxics** *26* **Mortals** *42* **Arbres** *51*

Fotos d'iNaturalist i Wikimedia Commons amb llicència Creative Commons o de domini públic; l'autor i la llicència de cadascuna, a la seva fitxa de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (les dels bolets sense fitxa, als crèdits de la guia essencial). Ús personal o sense ànim de lucre.



COMESTIBLES

Rovelló i pinetell

Lactarius sanguifluus i *L. deliciosus* · níscalo de sangre, níscalo

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** ✗ Anell ✗ Volva ✓ **Làtex**

	Rovelló	Pinetell
LÀTEX	Vermell vi des del primer moment	Taronja pastanaga; no passa a vi
LÀMINES	Rosa vinós o lila	Taronja viu
ON	Pi blanc i pi pinyer, sovint en sòl calcari; de la costa a la muntanya mitjana	Pi roig i pinassa: pinedes més fresques i de muntanya, obagues

0–2100 m d'altitud

TOTS DOS

- ✓ Làmines que es taquen de verd en tocar-les.
- ✓ Peu curt i buit, amb clotets més foscos.
- ✓ Làtex de color en tallar-lo: si és blanc, descarti'l.
- ✓ Sempre sota pins.

COMPTE: ES CONFON AMB

Paxil·le tòxic
MORTAL → p. 42

Sense làtex; es taca de bru (no de verd).

Enganyapastors de llet groga
TÒXIC → p. 26

Làtex BLANC que grogueja en segons; làmines crema; no verdeja.

Enganyapastors
TÒXIC → p. 26

Làtex blanc immutable i molt picant; làmines crema.

Comprovi: Talli el peu i miri el color del làtex en el primer moment.

COMESTIBLE

Llora

Russula cyanoxantha · carbonera

●●○ **MITJANA**

G F M A M **J J A S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques, flexibles i greixoses ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** blanca

Faig, castanyer, alzina i surera i altres 50–1700 m; sobretot 300–1100 m

✓ Làmines blanques, flexibles i greixoses al tacte: en passar-hi el dit es dobleguen sense trencar-se...

✓ Carn blanca, ferma, de sabor suau.

COMPTE: ES CONFON AMB

Farinera borda
MORTAL → p. 43

Anell i volva a la farinera borda.

Russula sardonia
TÒXIC

Làmines groc llimona, peu violaci, sota pins i molt picant.

Cualbra morada
NO COMESTIBLE
→ p. 28

Làmines crema que s'esmicolen; peu tenyit de porpra.

Comprovi: Base del peu (desenterri-la) i anell.

COMESTIBLE

Peu de rata de pi

Sparassis crispa · seta coliflor · barba de cabra

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A **S O N** D

COM ÉS ✕ **Làmines** lòbuls arrissats, com una coliflor **Esporada** blanca a crema

Pi roig, pinassa i pinastre · Sobre fusta · 100–1800 m; sobretot 300–1500 m

- ✓ Massa arrodonida de 10–40 cm formada per lòbuls aplanats i ondulats com fideus amples o una...
- ✓ Color crema a groc pàl·lid; carn elàstica.
- ✓ A la base de pins o al costat de soques de pi.

COMPTE: ES CONFON AMB

Peu de rata bord
TÒXIC → p. 32

Branques cilíndriques erectes rosat ataronjades amb puntes...

Peu de rata col-i-flor
CONDICIONAT

Branques gruixudes amb puntes rosades i tronc blanc.

Comprovi: Forma de les branques.

COMESTIBLE

Cep

Boletus edulis · boleto · hongo blanco

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O** N D

COM ÉS ✓ **Tubs** blancs, després groc verdosos ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** bru oliva

Pi roig, avet i pícea · Faig, castanyer i roure de fulla gran

600–2000 m; sobretot 900–1700 m · GUST Suau, d'avellana.

- ✓ Tubs i porus blancs en els joves, després grocs i verd oliva; MAI vermells ni ataronjats.
- ✓ Carn blanca que no canvia de color en tallar-la (no blaveja).
- ✓ Peu gruixut, blanquinós o bru clar, amb un retícul fi i blanc almenys a la part alta.

COMPTE: ES CONFON AMB

Matagent
TÒXIC → p. 29

Barret blanquinós grisenc, porus vermells i peu amb reticle...

Molleric amarg
NO COMESTIBLE

Porus que es tornen rosats; retícul bru fosc i gruixut.

Mataparent amarg
NO COMESTIBLE

Porus grocs que blavegen i peu vermell.

Comprovi: Porus i peu.

COMESTIBLE

Molleric

Suillus granulatus · boleto granulado

●○○ **FÀCIL**

G F M A **M** J J A **S** **O** **N** D

COM ÉS ✓ **Tubs** grocs, amb gotetes quan són joves ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** bru ocre

Pi blanc, roig, pinassa i pi pinyer i altres — 0–1800 m; sobretot 400–1500 m

- ✓ Barret molt viscós, groc ataronjat a bru.
- ✓ Porus petits, grocs, que exsuden gotetes lletoses en els exemplars joves.
- ✓ Peu SENSE anell, amb granulacions (puntets) a la part alta.
- ✓ Sota pins.

COMPTE: ES CONFON AMB

Molleric pebrer
NO COMESTIBLE

Porus bru canyella a vermellosos; carn molt picant.

Molleric de bou
SENSE INTERÈS

Porus grans i angulosos, compostos, una mica decurrents.

Molleric
COMESTIBLE

Miceli rosat a la base del peu i barret amb fibres radials...

Comprovi: Color dels porus.

COMESTIBLE

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** gruixudes, ocre → porpra negrós ◑ **Anell** només una cortina en els joves
✕ Volva **Esporada** negra o gris negrosa

Pi roig, blanc, pinassa i pi pinyer — 0–1800 m; sobretot 400–1200 m

- ✓ Làmines decurrents, espaiades, ocre al principi i després gris porpra a negroses.
- ✓ Esporada negra o gris negrosa (no bruna ni rovellada).
- ✓ Base del peu amb carn groc ataronjada.
- ✓ Sota pins.

COMPTE: ES CONFON AMB

Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49
Esporada bru rovellat (no negra), làmines no decurrents.

Fals rossinyol
NO COMESTIBLE → p. 30
Làmines fines, atapeïdes i bifurcades, taronja viu.

Cama de perdiu mucosa
COMESTIBLE
Barret gris bru molt mucilaginós i carn blanca.

Comprovi: Esporada i unió de les làmines al peu; arbre.

COMESTIBLE

Rossinyol

Cantharellus cibarius · rebozuelo · cabrito

●○○ **FÀCIL**

G F M A M **J J** A S O N D

COM ÉS ✓ **Plecs** gruixuts, del color del barret ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** crema rosat pàl·lid

Pi roig i avet · Alzina, surera, castanyer i faig i altres

50–1800 m; sobretot 400–1300 m

OLOR Afruitada, d'albercoc. **GUST** Suau o una mica picant.

- ✓ Per sota NO té làmines: té plecs gruixuts, baixos i roms, bifurcats, que baixen pel peu.
- ✓ Carn blanca o groc pàl·lid, gruixuda, ferma i fibrosa (s'esfilagarsa com pit de pollastre).
- ✓ Creix a terra, aïllat o en grups, mai en ramells sobre fusta.

COMPTE: ES CONFON AMB

Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49

Làmines veritables que es tornen bru rovellat.

Gírgola d'olivera
TÒXIC → p. 30

Làmines vertaderes, fines i atapeïdes.

Fals rossinyol
NO COMESTIBLE → p. 30

Làmines fines, atapeïdes i bifurcades, taronja viu.

Comprovi: Part inferior.

COMESTIBLE

Trompeta de la mort

Craterellus cornucopioides · trompeta de los muertos · trompeta negra

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

COM ÉS ✕ **Làmines** per fora llisa, gris cendra **Esporada** blanca

Faig, alzina, castanyer i roure martinenc i altres

100–1600 m; sobretot 200–700 m

- ✓ Forma de trompeta o embut buit fins a la base.
- ✓ Cara interna negra a bru fosc; cara externa gris cendra.
- ✓ Carn prima i elàstica.

COMPTE: ES CONFON AMB

Orella de gat negra
CONDICIONAT

Barret en forma de sella de muntar i peu solcat amb costelles.

Craterellus cinereus
COMESTIBLE

Cara externa amb plecs ben marcats i peu massís.

Comprovi: Forma general.

COMESTIBLE

Camagroc

Craterellus lutescens · angula de monte · trompeta amarilla

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✕ **Làmines** gairebé llis, rosat ataronjat **Esporada** blanca a crema

Pi roig, pinassa i avet 300–1800 m; sobretot 600–1100 m

- ✓ Peu buit, groc ataronjat viu.
- ✓ Part inferior gairebé llisa o amb venes molt baixes, de color rosat ataronjat a groc.
- ✓ Barret en embut, bru amb tons ataronjats.

COMPTE: ES CONFON AMB

Fals rossinyol
NO COMESTIBLE
→ p. 30

Làmines fines i atapeïdes; peu massís.

Camagroc
COMESTIBLE

Venes ben marcades i bifurcades, grisenques o groguenques.

Comprovi: Part inferior i peu.

COMESTIBLE

Llengua de bou

Hydnum repandum · llengua de vaca · gamuza

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A S O N D

COM ÉS ✓ **Agulles** tous, crema ataronjats ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** blanca

Pi roig i avet · Alzina, faig, castanyer i roure martinenc

0–1800 m; sobretot 400–1000 m · **GUST** Suau; amarg en exemplars vells.

- ✓ Sota el barret té agulles toves i fràgils (no làmines ni porus).
- ✓ Carn blanca, trencadissa, que grogueja o es torna ataronjada en fregar-la.
- ✓ Barret carnós crema ataronjat, sense tons bruns foscos.

COMPTE: ES CONFON AMB

Hydnellum / Sarcodon
NO COMESTIBLE

Carn dura, fibrosa o suberosa; colors bruns.

Picornell de pi
COMESTIBLE

Més petit i taronja vermellós; agulles que no baixen pel peu.

Comprovi: Consistència de la carn.

COMESTIBLE

Ou de reig

Amanita caesarea · oronja · amanita de los césares

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O** N D

COM ÉS ✓ **Làmines** groc daurat ✓ **Anell** groc, penjant ✓ **Volva** blanca, gran, en sac **Esporada** blanca

Alzina, surera, roure martinenc i castanyer — 50–1100 m; sobretot 200–700 m

- ✓ Làmines GROGUES (no blanques).
- ✓ Peu groc amb anell groc penjant.
- ✓ Volva blanca, gran, gruixuda i en forma de sac a la base: cal veure-la sencera.
- ✓ Barret taronja vermellós a taronja, normalment sense berrugues blanques.

COMPTE: ES CONFON AMB

Farinera borda
MORTAL → p. 43

En tallar l'ou de dalt a baix, el barret en formació és...

Reig bord
TÒXIC → p. 33

Làmines i peu BLANCS; berrugues blanques al barret (poden...

Amanita crocea
CONDICIONAT

Sense anell; làmines blanques o crema.

Comprovi: Tall longitudinal de l'ou.



COMESTIBLE

Apagallums

Macrolepiota procera · parasol · galamperna

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques a crema ✓ **Anell** doble, es desplaça ✗ **Volva** **Esporada** blanca

En prats · 0–1800 m; sobretot 200–1100 m · **OLOR** Agradable, d'avellana.

- ✓ Barret gran, de més de 10 cm obert, amb esquames brunes sobre fons crema i un mugró central bru i...
- ✓ Peu alt i prim amb dibuix en bandes brunes (com pell de serp).
- ✓ Anell doble, gruixut, que es pot desplaçar amunt i avall pel peu.
- ✓ Sense volva; carn blanca que NO envermelleix al tall.

COMPTE: ES CONFON AMB

Lepiota metzinosa
MORTAL → p. 46

Barret de 2–6 cm, esquames rosat vinoses.

Pixacà
TÒXIC → p. 33

Volva a la base i anell fix; peu llis.

Apagallums
CONDICIONAT

Peu llis sense bandes; carn que es torna taronja vermellosa...

Comprovi: Mida: no culli mai «apagallums» de menys de 10 cm.

COMESTIBLE

Bolet de tinta

Coprinus comatus · barbuda · matacandil

●○○ **FÀCIL**

G F **M** **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques → rosades → negres ✓ **Anell** fi, es desplaça ✗ **Volva** **Esporada** negra

En prats — 0–1500 m; sobretot 200–1000 m

- ✓ Barret alt i cilíndric, blanc, cobert d'esquames llanoses que s'aixequen (com una perruca).
- ✓ Làmines blanques que passen a rosades i es liqüen en tinta negra des de la vora.
- ✓ Peu blanc, buit, amb un anell fi que llisca.

COMPTE: ES CONFON AMB

Bolet de femer
TÒXIC

Barret gris, llis o amb estries, sense esquames llanoses.

Coprí garsa
NO COMESTIBLE

Barret negre amb plaques blanques, com una garsa.

Comprovi: Color i superfície del barret.

COMESTIBLE

Camperol

Agaricus campestris · champiñón silvestre · seta de campo

●●○ **MITJANA**

G F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** rosa viu → bru xocolata ✓ **Anell** fi, es perd aviat ✗ **Volva** **Esporada** bru xocolata

En prats 0–2000 m; sobretot 200–1000 m

- ✓ Làmines lliures, ROSA VIU en els joves i bru xocolata a negroses després (mai blanques).
- ✓ Sense volva a la base.
- ✓ La carn no grogueja en fregar-la ni en tallar la base del peu.
- ✓ Olor agradable de xampinyó (no de tinta ni de fenol).

COMPTE: ES CONFON AMB

Cogomassa
MORTAL → p. 44
Làmines sempre blanques i volva en sac.

Bola de neu pudent
TÒXIC → p. 35
Grogueja intensament en fregar-lo i al tall de la base del...

Fals carlet
TÒXIC → p. 39
Sense anell; làmines groguenques que passen a rosa salmó.

Comprovi: Làmines i base.

COMESTIBLE

Pet de llop

Lycoperdon perlatum · pedo de lobo · bejín

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J **A S O N D**

COM ÉS ✕ **Làmines** una bola: per dins, blanca i ferma

En prats 0–2000 m; sobretot 400–1100 m

- ✓ Talli cada exemplar de dalt a baix: l'interior ha de ser blanc, compacte i uniforme.
- ✓ Forma de pera o de bombeta, coberta de petites espines còniques que es desprenen i deixen un...
- ✓ En la maduresa s'obre un porus a la part superior per on surten les espores.

COMPTE: ES CONFON AMB

Farinera borda
MORTAL → p. 43

En tallar l'ou d'amanita es veu dibuixat el contorn d'un...

Pota de cavall groga
TÒXIC → p. 31

Interior negre violaci i pell gruixuda esquamosa.

Comprovi: Tall longitudinal.

COMESTIBLE

Fredolic

Tricholoma terreum · negrilla · ratón

●●● DIFÍCIL

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques a gris pàl·lid ◑ **Anell** només una cortina en els joves ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pi blanc, roig, pinassa i pi pinyer — 0–1800 m; sobretot 300–1000 m

OLOR Feble, no farinosa.

- ✓ Barret gris ratolí, feltrat o amb esquametes fines, amb un mugró obtús.
- ✓ Làmines blanc grisenques, escotades a tocar del peu, sense tons groc verdosos.
- ✓ Carn prima, fràgil, sense olor apreciable de farina ni sabor amarg.
- ✓ Sota pins, en grups nombrosos.

COMPTE: ES CONFON AMB

Fredolic metzinós
TÒXIC → p. 37

Molt més robust i carnós; barret blanc grisenc amb esquames...

Tricholoma virgatum* / *T. sciodes
TÒXIC

Barret llis amb fibres radials negres i mugró punxegut.

***Inocybe* (varias especies grises)**
TÒXIC

Barret fibrós esquerdat radialment.

Comprovi: Esquames del barret, gruix de la carn, olor.

COMESTIBLE

Pimpinella morada

Lepista nuda · pie azul

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A S O N D

COM ÉS ✓ **Làmines** violeta lila ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** rosada pàl·lida

En prats · 0–1800 m; sobretot 300–1000 m · **OLOR** Afruitat, perfumat.

- ✓ Làmines violàcies o lila, atapeïdes, que se separen fàcilment de la carn del barret.
- ✓ Esporada rosada pàl·lida (MAI bru rovellat).
- ✓ Sense cortina ni anell.
- ✓ Olor afruitada o perfumada.

COMPTE: ES CONFON AMB

Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)
TÒXIC

Cortina (teranyina) entre el barret i el peu en els exemplars...

Barret de bruixa
TÒXIC → p. 41

Petita (2–4 cm), barret cònic sedós.

Mycena pura
TÒXIC → p. 41

Petita i fràgil, peu buit prim, olor de rave.

Comprovi: Esporada i part alta del peu.

COMESTIBLE

Moixernó

Calocybe gambosa · perrechico · seta de San Jorge

●●○ **MITJANA**

G F M **A** **M** **J** J A S **O** N D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques a crema, molt atapeïdes ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** blanca

En prats · 400–2000 m; sobretot 500–1200 m · **OLOR** Intensa, de farina fresca.

- ✓ Surt a la PRIMAVERA (abril–juny), sovint en rotllanes.
- ✓ Làmines blanques a crema, MOLT atapeïdes i estretes.
- ✓ Forta olor de farina fresca o de cogombre.
- ✓ Sense anell ni volva; carn blanca, gruixuda i ferma.

COMPTE: ES CONFON AMB

Inosperma erubescens
MORTAL → p. 48

Barret cònic fibrós clivellat; tot el bolet es taca de...

Cogomassa
MORTAL → p. 44

Anell i volva en sac; làmines lliures.

Fals carlet
TÒXIC → p. 39

Làmines que passen a rosa salmó, espaiades; creix a la tardor.

Comprovi: Barret, taques vermelles i làmines madures.

COMESTIBLES

Llenega negra i carlet

Hygrophorus latitabundus i *H. russula* · babosa negra

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** ◑ **Anell** ✕ Volva **Esporada** blanca

	Llenega negra	Carlet
BARRET	Bru fosc a gairebé negre, amb molta bava	Rosa vinós amb taques, poc viscós
LÀMINES	Blanques, espaiades	Blanques, es taquen de vinós
PEU	A baix, amb una funda de bava grisa	Robust, amb taques vinoses
ON	Sota pins, en sòl calcari	Sota alzines i roures

0–1500 m d'altitud

TOTS DOS

- ✓ Làmines blanques, gruixudes i cèries: com de cera en tocar-les.
- ✓ Esporada blanca.
- ✓ Surten tard: d'octubre a desembre.

COMPTE: ES CONFON AMB

Fals carlet
TÒXIC → p. 39

Barret gris ocraci i làmines que es tornen rosa salmó...

Llenega borda
NO COMESTIBLE

Làmines que es tornen bru rovellat (esporada rovellada).

Cualbra morada
NO COMESTIBLE
→ p. 28

Carn trencadissa com el guix, làmines no ceroses.

Comprovi: Làmines blanques: si amb l'edat es tornen rosa salmó o bru rovell, no és cap dels dos.

COMESTIBLE

Cama-sec

Marasmius oreades · senderuela · carrerilla

●●○ **MITJANA**

G F M **A M J** J A **S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** crema, molt separades ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–2200 m; sobretot 200–1400 m **OLOR** Feble, d'ametlla amarga.

- ✓ Peu prim, flexible i molt coriaci: es pot retorçar sense que es trenqui.
- ✓ Làmines blanquinoses a crema, MOLT ESPAIADES, que no baixen pel peu.
- ✓ Barret ocre amb un mugró ample, que empal·lideix en assecar-se.
- ✓ En prats i pastures, en rotllanes o fileres.

COMPTE: ES CONFON AMB

Lepiota metzinosa
MORTAL → p. 46

Barret amb esquames vinoses i peu amb bandes.

Clitocibe blanc
TÒXIC → p. 38

Blanca gebrada, làmines atapeïdes i decurrents.

***Inocybe* (especies de prado)**
TÒXIC

Barret fibrós esquerdat i làmines que es tornen brunes.

Comprovi: Barret.

COMESTIBLE

Gírgola de panical

Pleurotus eryngii · seta de cardo

●●○ **MITJANA**

G F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D**

COM ÉS ✓ **Làmines** blanquinoses, baixen pel peu ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–1200 m d'altitud

- ✓ Creix a terra en prats secs, unida a l'arrel d'un panical (Eryngium campestre) mort: segueixi el...
- ✓ Làmines decurrents, blanquinoses a crema.
- ✓ Barret bru grisenc, sovint excèntric; sense anell ni volva.

COMPTE: ES CONFON AMB

Clitocibe blanc
TÒXIC → p. 38

Blanca gebrada, petita, sense relació amb arrels de card.

Fals carlet
TÒXIC → p. 39

Làmines rosa salmó, en bosc.

Comprovi: Color i base.

COMESTIBLE

Pollancró

Cyclocybe cylindracea · seta de chopo

●●○ **MITJANA**

G F M **A M J** J A **S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** crema → bru tabac ✓ **Anell** membranós ✕ **Volva** **Esporada** bru tabac

Pollancre i àlber · En prats · Sobre fusta

0–1200 m; sobretot per sota de 300 m

- ✓ Pomells sobre soques o troncs de pollancres, àlbers o salzes.
- ✓ Anell membranós al peu.
- ✓ Làmines crema que es tornen de color bru tabac (esporada bruna).
- ✓ Barret de crema a bru clar amb el centre més fosc, sovint esquerdat.

COMPTE: ES CONFON AMB

Galerina marginada
MORTAL → p. 47

Més petita, barret llis color de mel, esporada rovellada.

Bolet de pi
TÒXIC → p. 40

Groc sofre, làmines verdoses, sense anell membranós, amarg.

Comprovi: Mida i arbre.

CONDICIONAT

Múrgola

Morchella esculenta · colmenilla · cagarria

●●○ **MITJANA**

G F **M** **A** **M** J J A S O N D

COM ÉS ✕ **Làmines** barret amb alvèols, com una bresca **Esporada** crema ocràcia

En prats 0–1600 m; sobretot 200–1200 m

- ✓ Barret en forma de bresca amb alvèols profunds separats per costelles.
- ✓ Talli-la de dalt a baix: és BUIDA, amb una sola cavitat contínua des de la punta del barret fins a...
- ✓ El barret està unit al peu per la vora inferior (no penja com una faldilla).

COMPTE: ES CONFON AMB

Bolet de greix
MORTAL → p. 50

Barret en forma de cervell amb circumvolucions (no alvèols).

Verpa bohemica
TÒXIC

Barret lliure com un didal, unit només per la punta.

Múrgola
CONDICIONAT

Costelles fosques, alvèols alineats verticalment.

Comprovi: Tall longitudinal.

TÒXICS

Enganyapastors

Lactarius zonarius i *L. chrysorrheus* · pinetell bord, rovelló bord

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J **A S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** ✗ Anell ✗ Volva ✓ **Làtex** **Esporada** crema

	Enganyapastors	De llet groga
LÀTEX	Blanc, no canvia; molt picant	Blanc que grogueja en segons
BARRET	Crema a taronja pàl·lid, amb zones	Ocre salmó pàl·lid, amb zones

0–1300 m d'altitud

⚠ ●○○ **Moderada** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

SENYALS D'ALARMA DE TOTS DOS

⚠ Làtex BLANC en tallar-lo (en el rovelló i el pinetell és vermell vi o taronja).

⚠ Làmines crema que no es taquen de verd.

⚠ Sota alzines, suros i roures; no sota pins.

ES CONFON AMB

Pinetell
COMESTIBLE → p. 3

Làtex taronja i làmines taronja que verdegen; sota pins.

Rovelló
COMESTIBLE → p. 3

Làtex vermell vi; sota pins.

🔍 **Comprovi:** Talli el peu: si el làtex és blanc, descarti'l.

TÒXIC

Cabra de beç

Lactarius torminosus · falso níscalo

●○○ FÀCIL

G F M A M J J **A** **S** **O** N D

COM ÉS ✓ **Làmines** crema rosat ✗ **Anell** ✗ **Volva** ✓ **Làtex** blanc **Esporada** crema

Bedoll 500–1900 m; sobretot per sota de 1600 m

⚠ ●○○ **Moderada** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Marge del barret molt pelut, com una barba.

⚠ Làtex blanc que no canvia.

⚠ Sempre sota bedolls.

ES CONFON AMB

Pinetell COMESTIBLE → p. 3

Marge llis, làtex taronja; sota pins.

Pinetell d'avet COMESTIBLE

Marge llis, làtex taronja; sota avets.

Comprovi: Marge i làtex.

NO COMESTIBLE

Cualbra morada

Russula torulosa

●●● DIFÍCIL

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** crema pàl·lid, fràgils ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** crema

Pi blanc, pinassa, pi roig i pinyer — 0–1600 m; sobretot 300–900 m

GUST Molt picant (no la tasti).

⚠ ●○○ **Lleu**

Les rússules picants poden causar trastorns gastrointestinals si es consumeixen.

- ⚠ Barret porpra, vinós o violaci fosc, sovint amb el centre més fosc o olivaci; brillant.
- ⚠ Peu tenyit de porpra o rosa vinós, ferm.
- ⚠ Làmines crema, que s'esmicolen en passar-hi el dit; sense làtex.
- ⚠ Sota pins, sobretot en sòl calcari.

ES CONFON AMB

Rovelló
COMESTIBLE → p. 3

El rovelló té làtex vermell vi, làmines rosa vinós que...

Llora
COMESTIBLE → p. 4

La carbonera té làmines blanques flexibles i greixoses.

Escaldabec de pineda
NO COMESTIBLE

Barret vermell sang o rosat, sense tons porpra fosc.

🔍 **Comprovi:** Talli una làmina: la rússula no deixa anar cap gota.

TÒXIC

Matagent

Rubroboletus satanas · boleto de Satanás

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J **J A S O** N D

COM ÉS ✓ **Tubs** porus vermells, blavegen en tocar-los ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** bru oliva

Roure martinenc, alzina, castanyer i faig · 100–1300 m; sobretot 500–1100 m

OLOR Desagradable, de carronya, en exemplars vells.

⚠ ●●○ **Greu** · símptomes al cap de 30 min – 6 h · **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

- ⚠ Barret blanquinós, gris clar o gris olivaci (mai bru fosc).
- ⚠ Porus vermells o de color vermell ataronjat.
- ⚠ Peu molt gruixut i bulbós, vermell a la zona mitjana amb retícul vermell.
- ⚠ La carn blaveja feblement al tall.

ES CONFON AMB

Cep d'estiu COMESTIBLE

El cep d'estiu té porus blancs o groc verdosos i la carn no...

Sureny fosc COMESTIBLE

Barret fosc, porus blancs o grocs, carn immutable.

Comprovi: Porus i tall.

TÒXICS

Falsos rossinyols

Hygrophoropsis aurantiaca i *Omphalotus olearius* · falso rebozuelo, seta de olivo

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** blanca a crema

	Fals rossinyol	Gírgola d'olivera
MIDA	Petit (2–8 cm), carn prima i tova	Gran (5–15 cm) i carnós
COM SURT	Solt, a la pinassa o sobre fusta podrida de pi	En ramells de peus units, sobre soques i arrels d'olivera, alzina o castanyer

0–1800 m d'altitud

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

SENYALS D'ALARMA DE TOTS DOS

⚠ Làmines vertaderes: fines, atapeïdes i que baixen pel peu.

⚠ Tot taronja: barret, làmines i peu.

⚠ Passi el dit per sota: les làmines se separen; els plecs del rossinyol, no.

ES CONFON AMB

Rossinyol
COMESTIBLE → p. 9

El rossinyol té plecs gruixuts, baixos i roms (no làmines...

Comprovi: Sota el barret: làmines fines, fals; plecs gruixuts i roms, rossinyol.

TÒXIC

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✕ **Làmines** una bola: per dins, negra violàcia

Pi pinyer Surera, alzina i castanyer 0–1200 m; sobretot 200–1000 m

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Tall de dalt a baix: interior negre violaci, ferm, marbrejat de blanc, des de molt jove.

⚠ Pell gruixuda (2–4 mm), dura, de color groc ocraci i clivellada en esquames.

ES CONFON AMB

Pet de llop
COMESTIBLE → p. 17

El pet de llop és blanc i tou per dins en els exemplars joves.

Pet de llop gegant
COMESTIBLE

Interior blanc uniforme i pell fina.

Tòfona negra
COMESTIBLE

La tòfona és subterrània, de pell negra amb berrugues...

🔍 **Comprovi:** Tall longitudinal.

TÒXIC

Peu de rata bord

Ramaria formosa

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✕ **Làmines** branques, com un corall **Esporada** ocre

Faig, roure martinenc i castanyer — 200–1600 m; sobretot 300–1000 m

GUST Una mica amarg (no la tasti).

⚠ ●●○ **Greu** — símptomes al cap de 30 min – 3 h — **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Fong coral·liforme de branques de color rosat ataronjat o salmó amb les puntes grogues.

⚠ Carn blanca que pot ennegrir-se o prendre tons vinosos.

ES CONFON AMB

Peu de rata de pi
COMESTIBLE → p. 5

Lòbuls aplanats crema, en pins.

Peu de rata col-i-flor
CONDICIONAT

Puntes rosades o vinoses sobre branques blanques.

Comprovi: Forma.

TÒXICS

Pixacà i reig bord

Amanita pantherina i *A. muscaria* · amanita pantera, matamoscas

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** ✓ **Anell** ✓ **Volva** **Esporada** blanca

	Pixacà	Reig bord
BARRET	Bru; berrugues blanc pur, en cercles	Vermell o taronja, més gran
BASE	Bulb amb vora, com un mitjó	Bulb amb anells de volva
ON	Pinedes, rouredes, fagedes, alzinars	Pinedes i bedollars de muntanya

0–2200 m d'altitud

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome panterínica**

Àcid iboteni i muscimol: actuen sobre el cervell.

SENYALS D'ALARMA DE TOTS DOS

⚠ Berrugues blanques al barret (la pluja les pot esborrar).

⚠ Làmines i peu blancs; bulb a la base.

ES CONFON AMB

Apagallums COMESTIBLE → p. 14

Sense volva; anell doble mòbil; peu atigrat.

Ou de reig COMESTIBLE → p. 13

L'ou de reig té les làmines i el peu GROCS i una volva en sac...

Vinosa CONDICIONAT

En la vinosa, la carn i les ferides es tornen vermelloses.

Comprovi: Làmines blanques, anell i volva: descarti'l (el reig les té grogues).

TÒXIC

Lepiota pudent

Lepiota cristata

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques ✓ **Anell** fi, fràgil ✗ **Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–1600 m; sobretot 300–1000 m

⚠ ●○○ **Moderada** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Bolet petit (2–5 cm) de barret blanc amb un disc central bru vermellós i esquames concèntriques.

⚠ Olor desagradable, de goma o gas.

⚠ Làmines blanques, lliures; anell fràgil.

ES CONFON AMB

Apagallums
COMESTIBLE → p. 14

Mida molt més gran, anell doble mòbil, peu atigrat.

Comprovi: Mida.

TÒXIC

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

●○○ FÀCIL

G F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** rosades → brunes ✓ **Anell** gruixut ✗ **Volva** **Esporada** bru xocolata

En prats 0–1500 m; sobretot 200–500 m OLOR Desagradable (tinta, fenol).

⚠ ●○○ **Moderada** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ En tallar la base del peu, la carn es torna GROC CROM a l'instant.

⚠ Olor de tinta, fenol o iode, més forta en cuinar-lo.

⚠ Grogueja intensament en fregar la vora del barret.

ES CONFON AMB

Camperol
COMESTIBLE → p. 16

No grogueja i fa bona olor.

Bola de neu
COMESTIBLE

Olor d'anís; la base no es torna groc crom.

Comprovi: Base del peu.

TÒXIC

Verderol

Tricholoma equestre · seta de los caballeros

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** groc sofre ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pi pinyer, roig i pinastre · En prats · 0–1700 m; sobretot 400–1500 m

OLOR De farina, feble.

⚠ ●●○ **Greu** · símptomes al cap de 24–72 h · **Síndrome rabdomiolítica**

Destrueix els músculs, també el del cor, si es menja diversos dies seguits.

⚠ Làmines groc sofre intens.

⚠ Barret groc verdós a groc brunenc, amb esquametes brunes al centre.

⚠ Peu groc.

ES CONFON AMB

Fredolic gros
COMESTIBLE

Barret gris amb fibres negres.

Farinera borda
MORTAL → p. 43

Làmines blanques, anell i volva.

Comprovi: Barret.

TÒXIC

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O** N D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanquinoses, amb reflex verdós ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Avet i pi roig · Faig · 800–2000 m d'altitud · **OLOR** De farina.

⚠ ●●○ **Greu** · símptomes al cap de 30 min – 3 h · **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

- ⚠ Tricoloma gran i carnós de barret blanquinós gris cobert d'esquames gris fosc o brunes (dibuix de...
- ⚠ Làmines blanquinoses amb reflexos verd groguencs, de vegades amb gotes.
- ⚠ Olor de farina.

ES CONFON AMB

Fredolic COMESTIBLE → p. 18

El fredolic és petit, fràgil, afeltrat i sense olor de farina.

Fredolic gros COMESTIBLE

Barret amb fibres radials llises, no esquames.

Comprovi: Mida i esquames.

TÒXIC

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques a crema, baixen pel peu ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–2000 m; sobretot 300–1000 m

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 15 min – 2 h **Síndrome muscarínica**

Muscarina: suor, saliva i llàgrimes a raig, i el pols es torna lent.

⚠ Bolet petit (2–5 cm) blanc, d'aspecte gebrat o pruïnós, de vegades amb zones concèntriques.

⚠ Làmines blanques a crema, DECURRENTS (baixen pel peu).

⚠ Esporada blanca (no rosada).

ES CONFON AMB

Cama-sec
COMESTIBLE → p. 22

El cama-sec té les làmines espaiades no decurrents.

Moixernó blanc de tardor
COMESTIBLE

Làmines que es tornen rosades, esporada rosada i forta olor...

Camperol
COMESTIBLE → p. 16

Làmines lliures rosades a brunes.

Comprovi: Làmines.

TÒXIC

Fals carlet

Entoloma sinuatum

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** groguenques → rosa salmó ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** rosada

Roure martinenc, faig i castanyer 100–1500 m; sobretot 200–800 m

OLOR De farina rància.

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 4 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Làmines groguenques en els joves que es tornen ROSA SALMÓ en madurar.

⚠ Esporada rosada.

⚠ Olor de farina rància.

⚠ Bolet gran gris ocraci, carnós, sense anell ni volva.

ES CONFON AMB

Carlet
COMESTIBLE → p. 21

El carlet té el barret rosa vinós amb taques.

Moixernó
COMESTIBLE → p. 20

Làmines molt atapeïdes que no es tornen rosades.

Pardilla
TÒXIC

Làmines crema decurrents.

Comprovi: Color del barret i de les làmines.

TÒXIC

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A S O N D

COM ÉS ✓ **Làmines** grogues → verdoses ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** bru violaci

En prats · Sobre fusta · 0–2000 m; sobretot 400–1100 m

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 minuts a diverses hores

Síndrome gastrointestinal

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Rams densos sobre soques de planifolis i coníferes.

⚠ Barret groc sofre amb el centre ataronjat.

⚠ Làmines groc sofre que es tornen verdoses i després bru violàcies.

ES CONFON AMB

Pollancró
COMESTIBLE → p. 24

Crema, anell membranós, en pollancres.

Alzinoi
CONDICIONAT

Anell blanc, esporada blanca, esquametes fosques.

Comprovi: Color.

TÒXICS

Petits amb muscarina

Inocybe geophylla i *Mycena pura*

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** ✕ Anell ✕ Volva

	Barret de bruixa	Mycena pura
COLOR	Blanc sedós, de vegades lila	Lila o rosat; vora amb ratlles
FORMA	Cònic, amb punxa; fibres que s'esquerden	Acampanat; peu buit i fràgil
OLOR	A terra	A rave

0–2000 m d'altitud

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 15 min – 2 h **Síndrome muscarínica**

Muscarina: suor, saliva i llàgrimes a raig, i el pols es torna lent.

SENYALS D'ALARMA DE TOTS DOS

⚠ Petits: d'1 a 5 cm.

⚠ A la fullaraca de pinedes, fagedes i boscos mixtos.

ES CONFON AMB

Pimpinella morada COMESTIBLE → p. 19

Molt més gran i carnosa.

Cama-sec COMESTIBLE → p. 22

Prat, peu tenaç, làmines espaiades crema.

Pimpinella morada petita SENSE INTERÈS

Làmines gruixudes, sense olor de rave.

🔍 **Comprovi:** Mida: el peu blau és gran, carnós i fa olor de fruita.

MORTAL

Paxil·le tòxic

Paxillus involutus · paxilo

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** ocre, es taquen de bru ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** bru ocre

Pi roig · Bedoll, alzina i castanyer · 0–1900 m; sobretot 400–1400 m

⚠ ●●● **Mortal** · símptomes al cap de 1–3 h · **Síndrome hemolítica**

Després de menjar-lo diverses vegades, el cos ataca la seva pròpia sang i poden fallar els ronyons.

⚠ Marge del barret fortament enrotllat, feltrat o acanalat.

⚠ Làmines decurrents, groc ocraci, que es taquen de bru en tocar-les i se separen amb facilitat de la...

⚠ Sense làtex.

ES CONFON AMB

Rovelló COMESTIBLE → p. 3

El rovelló té làtex vermell vi i verdeja.

Pinetell COMESTIBLE → p. 3

Làtex taronja i taques verdes en el pinetell.

Pampa COMESTIBLE

La pampa és crema ocràcia amb mugró i no es taca de bru.

Comprovi: En tallar: làtex o no.

MORTAL

Farinera borda

Amanita phalloides · oronja verda · amanita mortal

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques ✓ **Anell** blanc, penjant ✓ **Volva** blanca, en sac **Esporada** blanca

Alzina, roure martinenc, surera i castanyer i altres — 0–1500 m; sobretot 300–1000 m

OLOR Feble de jove; dolçastra i desagradable de vell.

●●● Mortal símptomes al cap de 6–24 h **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

- Volva blanca membranosa en sac a la base (sovint enterrada: desenterri sempre la base).
- Anell blanc membranós penjant a la part alta del peu.
- Làmines BLANQUES, lliures.
- Barret verd oliva a verd groguenc amb fibres radials fosques; pot ser gairebé blanc.

ES CONFON AMB

Llora verda COMESTIBLE

La llora verda no té volva ni anell i la seva cutícula està...

Llora COMESTIBLE → p. 4

Sense volva ni anell; làmines flexibles.

Bola de neu COMESTIBLE

Làmines rosades i després bru negroses; sense volva.

Comprovi: Base i peu.

MORTAL

Cogomassa

Amanita verna

●●○ **MITJANA**

G F M **A M J** J A S O N D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques ✓ **Anell** blanc ✓ **Volva** blanca, en sac **Esporada** blanca

Alzina, roure martinenc i surera — 0–900 m d'altitud

Mortal ●●● símptomes al cap de 6–24 h **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

- Bolet totalment blanc.
- Volva blanca en sac a la base.
- Anell membranós blanc.
- Làmines blanques, lliures.

ES CONFON AMB

Moixernó
COMESTIBLE → p. 20

El moixernó no té volva ni anell.

Camperol
COMESTIBLE → p. 16

Làmines rosades i després brunes; sense volva.

Farinera
CONDICIONAT

Més gran, farinosa, de tardor sobre calcària.

Comprovi: Base i peu.

MORTAL

Farinera pudent

Amanita virosa

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O** N D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques ✓ **Anell** blanc, fràgil ✓ **Volva** en sac **Esporada** blanca

Faig i bedoll 500–1800 m d'altitud

⚠ ●●● **Mortal** símptomes al cap de 6–24 h **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

⚠ Bolet blanc de barret cònic o acampanat, sovint asimètric.
⚠ Peu blanc cobert de serrells llanosos, amb anell fràgil.
⚠ Volva blanca en sac.

ES CONFON AMB

Bola de neu
COMESTIBLE

Làmines de rosades a brunes, sense volva.

Comprovi: Làmines i base.

MORTAL

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata

●●○ **MITJANA**

G F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques a crema ◑ **Anell** només una zona cotonosa ✕ **Volva** **Esporada** blanca

En prats — 0–900 m; sobretot per sota de 300 m

⚠ ●●● **Mortal** — símptomes al cap de 6–24 h — **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

- ⚠ Bolet petit: barret de 2–6 cm.
- ⚠ Barret amb esquames concèntriques de color bru vinós sobre fons rosat.
- ⚠ Peu amb bandes o esquames de color bru rosat sota una zona anular poc marcada.
- ⚠ Làmines blanques, lliures.

ES CONFON AMB

Apagallums COMESTIBLE → p. 14

L'apagallums fa més de 10 cm, té un anell doble mòbil i el...

Cama-sec COMESTIBLE → p. 22

El cama-sec té làmines espaiades.

Camperol COMESTIBLE → p. 16

Làmines rosades i després brunes.

🔍 **Comprovi:** Mida, anell i peu.



MORTAL

Galerina marginada

Galerina marginata

●●○ MITJANA

G F M A M J J A S O N D

COM ÉS ✓ **Làmines** groguenques → bru rovell ✓ **Anell** fi ✗ Volva **Esporada** bru rovellat

Sobre fusta 0–2000 m; sobretot 400–1300 m

⚠ ●●● **Mortal** símptomes al cap de 6–24 h **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

- ⚠ Bolet petit bru (1,5–5 cm) sobre fusta, en grups.
- ⚠ Anell fi bru al peu.
- ⚠ Esporada bru rovellat.
- ⚠ Barret llis, de color mel a bru, que canvia de color en assecar-se (higròfan).

ES CONFON AMB

Pollancró
COMESTIBLE → p. 24

Més gran i sobre pollancres.

Kuehneromyces mutabilis
COMESTIBLE

Peu amb esquametes per sota de l'anell (no fibres platejades).

Alzinoi
CONDICIONAT

Més gran, esquames fosques, esporada blanca.

🔍 **Comprovi:** Mida i arbre.



MORTAL

Inosperma erubescens

●●○ **MITJANA**

G F M A **M** **J** **J** A S O N D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanquinoses → brunes, taques vermelles ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** bruna

En prats 0–1500 m d'altitud

⚠ ●●● **Mortal** símptomes al cap de 15 min – 2 h **Síndrome muscarínica**

Muscarina: suor, saliva i llàgrimes a raig, i el pols es torna lent.

⚠ Barret de cònic a acampanat, de blanquinós a crema, fibrós i esquerdat radialment.

⚠ Tot el bolet es taca de vermell amb el frec o l'edat.

⚠ Làmines blanquinoses que es tornen brunes (esporada bruna).

ES CONFON AMB

Moixernó
COMESTIBLE → p. 20

El moixernó té el barret llis i carnós.

Comprovi: Barret, taques vermelles i olor.

MORTAL

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** groc ataronjades → rovell ◑ **Anell** només una cortina en els joves ✕ **Volva** **Esporada** bru rovellat

Roure martinenc, castanyer i alzina · 100–1500 m d'altitud · **OLOR** Feble, de rave.

⚠ ●●● **Mortal** · símptomes al cap de 2–15 dies · **Síndrome orellànica**

Orellanina: destrueix els ronyons, dies o setmanes després de menjar-lo.

- ⚠ Barret bru ataronjat a lleonat, sec, fibrós o finament esquamós.
- ⚠ Làmines gruixudes, espaiades, groc ataronjades que es tornen bru rovellat.
- ⚠ Esporada bru rovellat.
- ⚠ Peu groguenc fibrós, sense bulb ni anell membranós (restes de cortina).

ES CONFON AMB

Rossinyol COMESTIBLE → p. 9

El rossinyol té plecs gruixuts i roms, no làmines.

Camagroc COMESTIBLE

Peu buit i plecs en lloc de làmines.

Cama de perdiu COMESTIBLE → p. 8

Làmines decurrents i esporada negra; sota pins.

🔍 **Comprovi:** Part inferior.

MORTAL

Bolet de greix

Gyromitra esculenta · falsa colmenilla · bonete

●○○ FÀCIL

G F M **A** **M** **J** J A S O N D

COM ÉS ✕ **Làmines** barret arrugat, com un cervell

Pi roig, avet i pi negre · Sobre fusta · 600–2200 m; sobretot 1000–1800 m

⚠ ●●● **Mortal** · símptomes al cap de 6–12 h · **Síndrome giromitriana**

Giromitrina: danya el fetge i el sistema nerviós; cuinar-lo o assecar-lo no el fa segur.

⚠ Barret bru vermellós en forma de cervell, amb circumvolucions, NO amb alvèols.

⚠ En tallar-la, diverses cavitats irregulars al barret i al peu.

ES CONFON AMB

Múrgola
CONDICIONAT → p. 25

La múrgola té alvèols de bresca i és buida.

Múrgola
CONDICIONAT

Alvèols en fileres i un sol buit.

Comprovi: Tall longitudinal.

Arbres i els seus bolets

Reconèixer l'arbre per la fulla i el tronc ajuda a saber què buscar.


FULLA

TRONC

Pi blanc

pino carrasco · *Pinus halepensis*

Capçada clara, irregular i d'un verd grisenc pàl·lid.

BUSQUI Rovelló i pinetell *3*, Molleric *7*, Cama de perdiu *8*, Fredolic *18*, Llenega negra i carlet *21*

COMPTE Cualbra morada *28*

FULLA


TRONC

Pi pinyer

pino piñonero · *Pinus pinea*

Copa ampla en forma de para-sol o ombrel·la, inconfusible en arbres adults aïllats.

BUSQUI Rovelló i pinetell *3*, Molleric *7*, Cama de perdiu *8*, Fredolic *18*

COMPTE Pota de cavall groga *31*, Verderol *36*, Cualbra morada *28*

FULLA


TRONC

Pinassa

pino laricio · *Pinus nigra subsp. salzmannii*

Pi de capçada densa i verd molt fosc, alt i recte als rodals madurs.

BUSQUI Rovelló i pinetell *3*, Peu de rata de pi *5*, Molleric *7*, Cama de perdiu *8*, Camagroc *11*, Fredolic *18*

COMPTE Cualbra morada *28*

FULLA

TRONC

Pi roig

pino silvestre · *Pinus sylvestris*

Capçada irregular i alta.

BUSQUI Rovelló i pinetell *3*, Peu de rata de pi *5*, Cep *6*, Molleric *7*, Cama de perdiu *8*, Rossinyol *9*

COMPTE Paxi·lle tòxic *42*, Bolet de greix *50*, Pixacà i reig bord *33*, Verderol *36*, Fredolic metzinós *37*, Cualbra morada *28*

FULLA


TRONC

Alzina

encina · *Quercus ilex*

Arbre perennifoli de capçada densa, arrodonida i verd fosc mat.

BUSQUI Llora *4*, Rossinyol *9*, Trompeta de la mort *10*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*, Llenega negra i carlet *21*

COMPTE Paxi·lle tòxic *42*, Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*

Arbres i els seus bolets

FULLA

TRONC

Avet

abeto blanco · *Abies alba*

Conífera alta de capçada cònica regular i verd fosc, en obagues fresques.

BUSQUI Cep *6*, Rossinyol *9*, Camagroc *11*, Llengua de bou *12*

COMPTE Bolet de greix *50*, Pixacà i reig bord *33*, Fredolic metzinós *37*

FULLA

TRONC

Surera

alcornoque · *Quercus suber*

Arbre de capçada àmplia i verd grisenca.

BUSQUI Llora *4*, Rossinyol *9*, Ou de reig *13*

COMPTE Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Enganyapastors *26*, Pota de cavall groga *31*

FULLA

TRONC

Roure martinenc

roble pubescente · *Quercus pubescens*

Roure de talla mitjana, sovint marcescent: conserva a l'hivern bona part de les...

BUSQUI Llora *4*, Trompeta de la mort *10*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*, Llenega negra i carlet *21*

COMPTE Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*, Peu de rata bord *32*


FULLA

TRONC

Faig

haya · *Fagus sylvatica*

Arbre alt d'escorça llisa i grisa.

BUSQUI Llora *4*, Cep *6*, Rossinyol *9*, Trompeta de la mort *10*, Llengua de bou *12*

COMPTE Farinera borda *43*, Farinera pudent *45*, Matagent *29*, Peu de rata bord *32*, Pixacà i reig bord *33*, Fredolic metzinós *37*

FULLA

TRONC

Castanyer

castaño · *Castanea sativa*

Arbre gran de capçada àmplia.

BUSQUI Llora *4*, Cep *6*, Rossinyol *9*, Trompeta de la mort *10*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*

COMPTE Paxiłle tòxic *42*, Farinera borda *43*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*, Pota de cavall groga *31*