Bolets *essencials*

de Catalunya



Els **54** que cal conèixer: com reconèixer-los, on i quan surten, i amb què no confondre'ls.

25 COMESTIBLES **20** TÒXICS **9** MORTALS

Davant el dubte, no el reculli.

Emergències **112**
Toxicologia 24 h **91 562 04 20**

ABANS DE SORTIR

Les 12 regles

1. **Reculli només el que coneix a fons.**
2. **Tregui el bolet sencer, amb la base del peu.**
3. **Revisi cada exemplar, un per un.**
4. **No barregi espècies; els dubtosos, a part i en paper.**
5. **Llenci els vells, cucats, xops o glaçats.**
6. **Cistell rígid i ventilat; mai bosses de plàstic.**
7. **No es cregui les proves casolanes (all, cullera de plata…).**
8. **Les apps de fotos orienten, però no decideixen.**
9. **Davant el dubte, consulti un micòleg amb el bolet sencer.**
10. **Cuini'ls sempre: molts són tòxics en cru.**
11. **Guardi'n un de cru de cada espècie fins l'endemà.**
12. **Eviti cunetes, zones industrials i camps tractats.**

COM MIRAR UN BOLET



1. **Barret.** Color, textura (llisa, escatosa, viscosa) i marge.
2. **A sota.** Làmines, porus, plecs o agulles. Color, i si baixen pel peu.
3. **Anell.** En té? Fix o es desplaça?
4. **Peu.** Ple o buit, fibrós o trencadís. Dibuixos?
5. **Base.** Tregui'l sencer i furgui: hi ha volva?
6. **Carn.** Talli'l: làtex? Canvia de color? Olor?

Làmines blanques + anell + volva = DESCART

COM LLEGIR LES FITXES

COMESTIBLE · TÒXIC · MORTAL	Què és. El mateix color va a la pestanya del marge.
●●○ Mitjana	Dificultat per reconèixer-lo: fàcil, mitjana o difícil.
G F M A M J J A **S O N** D	Mesos en què surt; en clar, només alguns anys.
✓ ✗ ◑	Com és: ho té, no ho té, només en part.
	On: pins i avets, arbres de fulla ampla, prats, fusta, altitud.
	Olor, quan surten els símptomes i què comprovar abans de collir-lo.
●●○ Greu	En els tòxics: lleu, moderada, greu o mortal.
→ *p. 12*	Pàgina del bolet amb què es confon.

COMENCEN A LA PÀGINA **Comestibles** *3* · **Tòxics** *26* · **Mortals** *42* · **Arbres** *51*

Fotos d'iNaturalist i Wikimedia Commons amb llicència Creative Commons o de domini públic; l'autor i la llicència de cadascuna, a la seva fitxa de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (les dels bolets sense fitxa, als crèdits de la guia essencial). Ús personal o sense ànim de lucre.



COMESTIBLES

Rovelló i pinetell

Lactarius sanguifluus i *L. deliciosus* · níscalo de sangre, níscalo

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓**Làmines** ✗**Anell** ✗**Volva** ✓**Làtex**

	Rovelló	Pinetell
LÀTEX	Vermell vi des del primer moment	Taronja pastanaga; no passa a vi
LÀMINES	Rosa vinós o lila	Taronja viu
ON	Pi blanc i pi pinyer, sovint en sòl calcari; de la costa a la muntanya mitjana	Pi roig i pinassa: pinedes més fresques i de muntanya, obagues

0–2100 m d'altitud

TOTS DOS

- ✓ Làmines que es taquen de verd en tocar-les.
- ✓ Peu curt i buit, amb clotets més foscos.
- ✓ Làtex de color en tallar-lo: si és blanc, descarti'l.
- ✓ Sempre sota pins.

COMPTE: ES CONFON AMB

Paxil·le tòxic
MORTAL → p. 42

Sense làtex; es taca de bru (no de verd).

Enganyapastors de llet groga
TÒXIC → p. 26

Làtex BLANC que grogueja en segons; làmines crema; no verdeja.

Enganyapastors
TÒXIC → p. 26

Làtex blanc immutable i molt picant; làmines crema.

Comprovi: Talli el peu i miri el color del làtex en el primer moment.

COMESTIBLE

Llora

Russula cyanoxantha · carbonera

●●○ **MITJANA**

G F M A M **J J A S O N** D

COM ÉS ✓**Làmines** blanques, flexibles i greixoses ✕**Anell** ✕**Volva** **Esporada** blanca

Faig, castanyer, alzina i surera i altres — 50–1700 m; sobretot 300–1100 m

✓ Làmines blanques, flexibles i greixoses al tacte: en passar-hi el dit es dobleguen sense trencar-se...

✓ Carn blanca, ferma, de sabor suau.

COMPTE: ES CONFON AMB

Farinera borda
MORTAL → p. 43

Anell i volva a la farinera borda.

Russula sardonia
TÒXIC

Làmines groc llimona, peu violaci, sota pins i molt picant.

Cualbra morada
NO COMESTIBLE
→ p. 28

Làmines crema que s'esmicolen; peu tenyit de porpra.

Comprovi: Base del peu (desenterri-la) i anell.

COMESTIBLE

Peu de rata de pi

Sparassis crispa · seta coliflor · barba de cabra

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A **S O N** D

COM ÉS ✕ **Làmines** lòbuls arrissats, com una coliflor **Esporada** blanca a crema

Pi roig, pinassa i pinastre · Sobre fusta · 100–1800 m; sobretot 300–1500 m

- ✓ Massa arrodonida de 10–40 cm formada per lòbuls aplanats i ondulats com fideus amples o una...
- ✓ Color crema a groc pàl·lid; carn elàstica.
- ✓ A la base de pins o al costat de soques de pi.

COMPTE: ES CONFON AMB

Peu de rata bord
TÒXIC → p. 32

Branques cilíndriques erectes rosat ataronjades amb puntes...

Peu de rata col-i-flor
CONDICIONAT

Branques gruixudes amb puntes rosades i tronc blanc.

Comprovi: Forma de les branques.

COMESTIBLE

Cep

Boletus edulis · boleto · hongo blanco

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O** N D

COM ÉS ✓ **Tubs** blancs, després groc verdosos ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** bru oliva

Pi roig, avet i pícea · Faig, castanyer i roure de fulla gran

600–2000 m; sobretot 900–1700 m · **GUST** Suau, d'avellana.

- ✓ Tubs i porus blancs en els joves, després grocs i verd oliva; MAI vermells ni ataronjats.
- ✓ Carn blanca que no canvia de color en tallar-la (no blaveja).
- ✓ Peu gruixut, blanquinós o bru clar, amb un retícul fi i blanc almenys a la part alta.

COMPTE: ES CONFON AMB

Matagent
TÒXIC → p. 29

Barret blanquinós grisenc, porus vermells i peu amb reticle...

Molleric amarg
NO COMESTIBLE

Porus que es tornen rosats; retícul bru fosc i gruixut.

Mataparent amarg
NO COMESTIBLE

Porus grocs que blavegen i peu vermell.

Comprovi: Porus i peu.

COMESTIBLE

Molleric

Suillus granulatus · boleto granulado

●○○ **FÀCIL**

G F M A **M** J J A **S** **O** **N** D

COM ÉS ✓**Tubs** grocs, amb gotetes quan són joves ✗**Anell** ✗**Volva** **Esporada** bru ocre

Pi blanc, roig, pinassa i pi pinyer i altres 0–1800 m; sobretot 400–1500 m

- ✓ Barret molt viscós, groc ataronjat a bru.
- ✓ Porus petits, grocs, que exsuden gotetes lletoses en els exemplars joves.
- ✓ Peu SENSE anell, amb granulacions (puntets) a la part alta.
- ✓ Sota pins.

COMPTE: ES CONFON AMB

Molleric pebrer
NO COMESTIBLE

Porus bru canyella a vermellosos; carn molt picant.

Molleric de bou
SENSE INTERÈS

Porus grans i angulosos, compostos, una mica decurrents.

Molleric
COMESTIBLE

Miceli rosat a la base del peu i barret amb fibres radials...

Comprovi: Color dels porus.

COMESTIBLE

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** gruixudes, ocre → porpra negrós ◑ **Anell** només una cortina en els joves
✕ **Volva** **Esporada** negra o gris negrosa

Pi roig, blanc, pinassa i pi pinyer 0–1800 m; sobretot 400–1200 m

- ✓ Làmines decurrents, espaiades, ocre al principi i després gris porpra a negroses.
- ✓ Esporada negra o gris negrosa (no bruna ni rovellada).
- ✓ Base del peu amb carn groc ataronjada.
- ✓ Sota pins.

COMPTE: ES CONFON AMB

Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49
Esporada bru rovellat (no negra), làmines no decurrents.

Fals rossinyol
NO COMESTIBLE → p. 30
Làmines fines, atapeïdes i bifurcades, taronja viu.

Cama de perdiu mucosa
COMESTIBLE
Barret gris bru molt mucilaginós i carn blanca.

Comprovi: Esporada i unió de les làmines al peu; arbre.



COMESTIBLE

Rossinyol

Cantharellus cibarius · rebozuelo · cabrito

●○○ **FÀCIL**

G F M A M **J J** A S O N D

COM ÉS ✓**Plecs** gruixuts, del color del barret ✕**Anell** ✕**Volva** **Esporada** crema rosat pàl·lid

Pi roig i avet · Alzina, surera, castanyer i faig i altres

50–1800 m; sobretot 400–1300 m

OLOR Afruitada, d'albercoc. **GUST** Suau o una mica picant.

✓ Per sota NO té làmines: té plecs gruixuts, baixos i roms, bifurcats, que baixen pel peu.

✓ Carn blanca o groc pàl·lid, gruixuda, ferma i fibrosa (s'esfilagarsa com pit de pollastre).

✓ Creix a terra, aïllat o en grups, mai en ramells sobre fusta.

COMPTE: ES CONFON AMB

Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49

Làmines veritables que es tornen bru rovellat.

Gírgola d'olivera
TÒXIC → p. 30

Làmines vertaderes, fines i atapeïdes.

Fals rossinyol
NO COMESTIBLE → p. 30

Làmines fines, atapeïdes i bifurcades, taronja viu.

Comprovi: Part inferior.

COMESTIBLE

Trompeta de la mort

Craterellus cornucopioides · trompeta de los muertos · trompeta negra

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✕ **Làmines** per fora llisa, gris cendra **Esporada** blanca

Faig, alzina, castanyer i roure martinenc i altres — 100–1600 m; sobretot 200–700 m

- Forma de trompeta o embut buit fins a la base.
- Cara interna negra a bru fosc; cara externa gris cendra.
- Carn prima i elàstica.

COMPTE: ES CONFON AMB

Orella de gat negra
CONDICIONAT

Barret en forma de sella de muntar i peu solcat amb costelles.

Craterellus cinereus
COMESTIBLE

Cara externa amb plecs ben marcats i peu massís.

Comprovi: Forma general.

COMESTIBLE

Camagroc

Craterellus lutescens · angula de monte · trompeta amarilla

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✕ **Làmines** gairebé llis, rosat ataronjat **Esporada** blanca a crema

Pi roig, pinassa i avet 300–1800 m; sobretot 600–1100 m

- Peu buit, groc ataronjat viu.
- Part inferior gairebé llisa o amb venes molt baixes, de color rosat ataronjat a groc.
- Barret en embut, bru amb tons ataronjats.

COMPTE: ES CONFON AMB

Fals rossinyol
NO COMESTIBLE
→ p. 30

Làmines fines i atapeïdes; peu massís.

Camagroc
COMESTIBLE

Venes ben marcades i bifurcades, grisenques o groguenques.

Comprovi: Part inferior i peu.

COMESTIBLE

Llengua de bou

Hydnum repandum · lengua de vaca · gamuza

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Agulles** tous, crema ataronjats ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pi roig i avet · Alzina, faig, castanyer i roure martinenc

0–1800 m; sobretot 400–1000 m · **GUST** Suau; amarg en exemplars vells.

- ✓ Sota el barret té agulles toves i fràgils (no làmines ni porus).
- ✓ Carn blanca, trencadissa, que grogueja o es torna ataronjada en fregar-la.
- ✓ Barret carnós crema ataronjat, sense tons bruns foscos.

COMPTE: ES CONFON AMB

Hydnellum* / *Sarcodon
NO COMESTIBLE

Carn dura, fibrosa o suberosa; colors bruns.

Picornell de pi
COMESTIBLE

Més petit i taronja vermellós; agulles que no baixen pel peu.

Comprovi: Consistència de la carn.

COMESTIBLE

Ou de reig

Amanita caesarea · oronja · amanita de los césares

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A** **S** **O** N D

COM ÉS ✓**Làmines** groc daurat ✓**Anell** groc, penjant ✓**Volva** blanca, gran, en sac **Esporada** blanca

Alzina, surera, roure martinenc i castanyer — 50–1100 m; sobretot 200–700 m

- ✓ Làmines GROGUES (no blanques).
- ✓ Peu groc amb anell groc penjant.
- ✓ Volva blanca, gran, gruixuda i en forma de sac a la base: cal veure-la sencera.
- ✓ Barret taronja vermellós a taronja, normalment sense berrugues blanques.

COMPTE: ES CONFON AMB

Farinera borda
MORTAL → p. 43

En tallar l'ou de dalt a baix, el barret en formació és...

Reig bord
TÒXIC → p. 33

Làmines i peu BLANCS; berrugues blanques al barret (poden...

Amanita crocea
CONDICIONAT

Sense anell; làmines blanques o crema.

Comprovi: Tall longitudinal de l'ou.

COMESTIBLE

Apagallums

Macrolepiota procera · parasol · galamperna

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓**Làmines** blanques a crema ✓**Anell** doble, es desplaça ✗**Volva** **Esporada** blanca

En prats · 0–1800 m; sobretot 200–1100 m · **OLOR** Agradable, d'avellana.

- ✓ Barret gran, de més de 10 cm obert, amb esquames brunes sobre fons crema i un mugró central bru i...
- ✓ Peu alt i prim amb dibuix en bandes brunes (com pell de serp).
- ✓ Anell doble, gruixut, que es pot desplaçar amunt i avall pel peu.
- ✓ Sense volva; carn blanca que NO envermelleix al tall.

COMPTE: ES CONFON AMB

Lepiota metzinosa
MORTAL → p. 46

Barret de 2–6 cm, esquames rosat vinoses.

Pixacà
TÒXIC → p. 33

Volva a la base i anell fix; peu llis.

Apagallums
CONDICIONAT

Peu llis sense bandes; carn que es torna taronja vermellosa...

Comprovi: Mida: no culli mai «apagallums» de menys de 10 cm.

COMESTIBLE

Bolet de tinta

Coprinus comatus · barbuda · matacandil

●○○ **FÀCIL**

G F **M** **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques → rosades → negres ✓ **Anell** fi, es desplaça ✗ **Volva** **Esporada** negra

En prats 0–1500 m; sobretot 200–1000 m

- ✓ Barret alt i cilíndric, blanc, cobert d'esquames llanoses que s'aixequen (com una perruca).
- ✓ Làmines blanques que passen a rosades i es liqüen en tinta negra des de la vora.
- ✓ Peu blanc, buit, amb un anell fi que llisca.

COMPTE: ES CONFON AMB

Bolet de femer
TÒXIC

Barret gris, llis o amb estries, sense esquames llanoses.

Coprí garsa
NO COMESTIBLE

Barret negre amb plaques blanques, com una garsa.

Comprovi: Color i superfície del barret.

COMESTIBLE

Camperol

Agaricus campestris · champiñón silvestre · seta de campo

●●○ **MITJANA**

G F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** rosa viu → bru xocolata ✓ **Anell** fi, es perd aviat ✗ **Volva** **Esporada** bru xocolata

En prats 0–2000 m; sobretot 200–1000 m

- ✓ Làmines lliures, ROSA VIU en els joves i bru xocolata a negroses després (mai blanques).
- ✓ Sense volva a la base.
- ✓ La carn no grogueja en fregar-la ni en tallar la base del peu.
- ✓ Olor agradable de xampinyó (no de tinta ni de fenol).

COMPTE: ES CONFON AMB

Cogomassa
MORTAL → p. 44

Làmines sempre blanques i volva en sac.

Bola de neu pudent
TÒXIC → p. 35

Grogueja intensament en fregar-lo i al tall de la base del...

Fals carlet
TÒXIC → p. 39

Sense anell; làmines groguenques que passen a rosa salmó.

Comprovi: Làmines i base.

COMESTIBLE

Pet de llop

Lycoperdon perlatum · pedo de lobo · bejín

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J **A S O N D**

COM ÉS ✕ **Làmines** una bola: per dins, blanca i ferma

En prats — 0–2000 m; sobretot 400–1100 m

- ✓ Talli cada exemplar de dalt a baix: l'interior ha de ser blanc, compacte i uniforme.
- ✓ Forma de pera o de bombeta, coberta de petites espines còniques que es desprenen i deixen un...
- ✓ En la maduresa s'obre un porus a la part superior per on surten les espores.

COMPTE: ES CONFON AMB

Farinera borda
MORTAL → p. 43

En tallar l'ou d'amanita es veu dibuixat el contorn d'un...

Pota de cavall groga
TÒXIC → p. 31

Interior negre violaci i pell gruixuda esquamosa.

Comprovi: Tall longitudinal.

COMESTIBLE

Fredolic

Tricholoma terreum · negrilla · ratón

●●● **DIFÍCIL**

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✓**Làmines** blanques a gris pàl·lid ◑ **Anell** només una cortina en els joves ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pi blanc, roig, pinassa i pi pinyer — 0–1800 m; sobretot 300–1000 m

OLOR Feble, no farinosa.

- ✓ Barret gris ratolí, feltrat o amb esquametes fines, amb un mugró obtús.
- ✓ Làmines blanc grisenques, escotades a tocar del peu, sense tons groc verdosos.
- ✓ Carn prima, fràgil, sense olor apreciable de farina ni sabor amarg.
- ✓ Sota pins, en grups nombrosos.

COMPTE: ES CONFON AMB

Fredolic metzinós
TÒXIC → p. 37
Molt més robust i carnós; barret blanc grisenc amb esquames...

Tricholoma virgatum* / *T. sciodes
TÒXIC
Barret llis amb fibres radials negres i mugró punxegut.

***Inocybe* (varias especies grises)**
TÒXIC
Barret fibrós esquerdat radialment.

Comprovi: Esquames del barret, gruix de la carn, olor.

COMESTIBLE

Pimpinella morada

Lepista nuda · pie azul

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A S O N D

COM ÉS ✓ **Làmines** violeta lila ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** rosada pàl·lida

En prats · 0–1800 m; sobretot 300–1000 m · **OLOR** Afruitat, perfumat.

- ✓ Làmines violàcies o lila, atapeïdes, que se separen fàcilment de la carn del barret.
- ✓ Esporada rosada pàl·lida (MAI bru rovellat).
- ✓ Sense cortina ni anell.
- ✓ Olor afruitada o perfumada.

COMPTE: ES CONFON AMB

Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)
TÒXIC

Cortina (teranyina) entre el barret i el peu en els exemplars...

Barret de bruixa
TÒXIC → p. 41

Petita (2–4 cm), barret cònic sedós.

Mycena pura
TÒXIC → p. 41

Petita i fràgil, peu buit prim, olor de rave.

Comprovi: Esporada i part alta del peu.

COMESTIBLE

Moixernó

Calocybe gambosa · perrechico · seta de San Jorge

●●○ **MITJANA**

G F M **A** **M** **J** J A S **O** N D

COM ÉS ✓**Làmines** blanques a crema, molt atapeïdes ✗**Anell** ✗**Volva** **Esporada** blanca

En prats · 400–2000 m; sobretot 500–1200 m · **OLOR** Intensa, de farina fresca.

- ✓ Surt a la PRIMAVERA (abril–juny), sovint en rotllanes.
- ✓ Làmines blanques a crema, MOLT atapeïdes i estretes.
- ✓ Forta olor de farina fresca o de cogombre.
- ✓ Sense anell ni volva; carn blanca, gruixuda i ferma.

COMPTE: ES CONFON AMB

Inosperma erubescens
MORTAL → p. 48

Barret cònic fibrós clivellat; tot el bolet es taca de...

Cogomassa
MORTAL → p. 44

Anell i volva en sac; làmines lliures.

Fals carlet
TÒXIC → p. 39

Làmines que passen a rosa salmó, espaiades; creix a la tardor.

Comprovi: Barret, taques vermelles i làmines madures.

COMESTIBLES

Llenega negra i carlet

Hygrophorus latitabundus i *H. russula* · babosa negra

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✓**Làmines** ◑ **Anell** ✕ Volva **Esporada** blanca

	Llenega negra	Carlet
BARRET	Bru fosc a gairebé negre, amb molta bava	Rosa vinós amb taques, poc viscós
LÀMINES	Blanques, espaiades	Blanques, es taquen de vinós
PEU	A baix, amb una funda de bava grisa	Robust, amb taques vinoses
ON	Sota pins, en sòl calcari	Sota alzines i roures

0–1500 m d'altitud

TOTS DOS

- ✓ Làmines blanques, gruixudes i cèries: com de cera en tocar-les.
- ✓ Esporada blanca.
- ✓ Surten tard: d'octubre a desembre.

COMPTE: ES CONFON AMB

Fals carlet
TÒXIC → p. 39

Barret gris ocraci i làmines que es tornen rosa salmó...

Llenega borda
NO COMESTIBLE

Làmines que es tornen bru rovellat (esporada rovellada).

Cualbra morada
NO COMESTIBLE
→ p. 28

Carn trencadissa com el guix, làmines no ceroses.

Comprovi: Làmines blanques: si amb l'edat es tornen rosa salmó o bru rovell, no és cap dels dos.

COMESTIBLE

Cama-sec

Marasmius oreades · senderuela · carrerilla

●●○ **MITJANA**

G F M **A M J** J A **S O N** D

COM ÉS ✓**Làmines** crema, molt separades ✕**Anell** ✕**Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–2200 m; sobretot 200–1400 m **OLOR** Feble, d'ametlla amarga.

- ✓ Peu prim, flexible i molt coriaci: es pot retorçar sense que es trenqui.
- ✓ Làmines blanquinoses a crema, MOLT ESPAIADES, que no baixen pel peu.
- ✓ Barret ocre amb un mugró ample, que empal·lideix en assecar-se.
- ✓ En prats i pastures, en rotllanes o fileres.

COMPTE: ES CONFON AMB

Lepiota metzinosa
MORTAL → p. 46

Barret amb esquames vinoses i peu amb bandes.

Clitocibe blanc
TÒXIC → p. 38

Blanca gebrada, làmines atapeïdes i decurrents.

Inocybe (especies de prado)
TÒXIC

Barret fibrós esquerdat i làmines que es tornen brunes.

Comprovi: Barret.

COMESTIBLE

Gírgola de panical

Pleurotus eryngii · seta de cardo

●●○ **MITJANA**

G F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D**

COM ÉS ✓ **Làmines** blanquinoses, baixen pel peu ✗ **Anell** ✗ **Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–1200 m d'altitud

- ✓ Creix a terra en prats secs, unida a l'arrel d'un panical (Eryngium campestre) mort: segueixi el...
- ✓ Làmines decurrents, blanquinoses a crema.
- ✓ Barret bru grisenc, sovint excèntric; sense anell ni volva.

COMPTE: ES CONFON AMB

Clitocibe blanc
TÒXIC → p. 38

Blanca gebrada, petita, sense relació amb arrels de card.

Fals carlet
TÒXIC → p. 39

Làmines rosa salmó, en bosc.

Comprovi: Color i base.

COMESTIBLE

Pollancró

Cyclocybe cylindracea · seta de chopo

●●○ **MITJANA**

G F M **A M J** J A **S O N** D

COM ÉS ✓**Làmines** crema → bru tabac ✓**Anell** membranós ✕**Volta** **Esporada** bru tabac

Pollancre i àlber · En prats · Sobre fusta

0–1200 m; sobretot per sota de 300 m

- ✓ Pomells sobre soques o troncs de pollancres, àlbers o salzes.
- ✓ Anell membranós al peu.
- ✓ Làmines crema que es tornen de color bru tabac (esporada bruna).
- ✓ Barret de crema a bru clar amb el centre més fosc, sovint esquerdat.

COMPTE: ES CONFON AMB

Galerina marginada
MORTAL → p. 47

Més petita, barret llis color de mel, esporada rovellada.

Bolet de pi
TÒXIC → p. 40

Groc sofre, làmines verdoses, sense anell membranós, amarg.

Comprovi: Mida i arbre.

CONDICIONAT

Múrgola

Morchella esculenta · colmenilla · cagarria

●●○ **MITJANA**

G F **M** **A** **M** J J A S O N D

COM ÉS ✕ **Làmines** barret amb alvèols, com una bresca **Esporada** crema ocràcia

En prats 0–1600 m; sobretot 200–1200 m

- ✓ Barret en forma de bresca amb alvèols profunds separats per costelles.
- ✓ Talli-la de dalt a baix: és BUIDA, amb una sola cavitat contínua des de la punta del barret fins a...
- ✓ El barret està unit al peu per la vora inferior (no penja com una faldilla).

COMPTE: ES CONFON AMB

Bolet de greix
MORTAL → p. 50

Barret en forma de cervell amb circumvolucions (no alvèols).

Verpa bohemica
TÒXIC

Barret lliure com un didal, unit només per la punta.

Múrgola
CONDICIONAT

Costelles fosques, alvèols alineats verticalment.

Comprovi: Tall longitudinal.

TÒXICS

Enganyapastors

Lactarius zonarius i *L. chrysorrheus* · pinetell bord, rovelló bord

●○○ FÀCIL

G F M A M J J **A S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** ✗ Anell ✗ Volva ✓ **Làtex** **Esporada** crema

	Enganyapastors	De llet groga
LÀTEX	Blanc, no canvia; molt picant	Blanc que grogueja en segons
BARRET	Crema a taronja pàl·lid, amb zones	Ocre salmó pàl·lid, amb zones

0–1300 m d'altitud

⚠ ●○○ **Moderada** 🕒 símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

SENYALS D'ALARMA DE TOTS DOS

⚠ Làtex BLANC en tallar-lo (en el rovelló i el pinetell és vermell vi o taronja).

⚠ Làmines crema que no es taquen de verd.

⚠ Sota alzines, suros i roures; no sota pins.

ES CONFON AMB

Pinetell
COMESTIBLE → p. 3

Làtex taronja i làmines taronja que verdegen; sota pins.

Rovelló
COMESTIBLE → p. 3

Làtex vermell vi; sota pins.

🔍 **Comprovi:** Talli el peu: si el làtex és blanc, descarti'l.

TÒXIC

Cabra de beç

Lactarius torminosus · falso níscalo

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J **A S O** N D

COM ÉS ✓ **Làmines** crema rosat ✗ **Anell** ✗ **Volva** ✓ **Làtex** blanc **Esporada** crema

Bedoll 500–1900 m; sobretot per sota de 1600 m

⚠ ●○○ **Moderada** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Marge del barret molt pelut, com una barba.
⚠ Làtex blanc que no canvia.
⚠ Sempre sota bedolls.

ES CONFON AMB

Pinetell COMESTIBLE → p. 3

Marge llis, làtex taronja; sota pins.

Pinetell d'avet COMESTIBLE

Marge llis, làtex taronja; sota avets.

🔍 **Comprovi:** Marge i làtex.

NO COMESTIBLE

Cualbra morada

Russula torulosa

●●● **DIFÍCIL**

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** crema pàl·lid, fràgils ✕ **Anell** ✕ **Volta** **Esporada** crema

Pi blanc, pinassa, pi roig i pinyer — 0–1600 m; sobretot 300–900 m

GUST Molt picant (no la tasti).

⚠ ●○○ **Lleu**

Les rússules picants poden causar trastorns gastrointestinals si es consumeixen.

- ⚠ Barret porpra, vinós o violaci fosc, sovint amb el centre més fosc o olivaci; brillant.
- ⚠ Peu tenyit de porpra o rosa vinós, ferm.
- ⚠ Làmines crema, que s'esmicolen en passar-hi el dit; sense làtex.
- ⚠ Sota pins, sobretot en sòl calcari.

ES CONFON AMB

Rovelló
COMESTIBLE → p. 3

El rovelló té làtex vermell vi, làmines rosa vinós que...

Llora
COMESTIBLE → p. 4

La carbonera té làmines blanques flexibles i greixoses.

Escaldabec de pineda
NO COMESTIBLE

Barret vermell sang o rosat, sense tons porpra fosc.

Comprovi: Talli una làmina: la rússula no deixa anar cap gota.

TÒXIC

Matagent

Rubroboletus satanas · boleto de Satanás

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J **J A S O** N D

COM ÉS ✓ **Tubs** porus vermells, blavegen en tocar-los ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** bru oliva

Roure martinenc, alzina, castanyer i faig 100–1300 m; sobretot 500–1100 m

OLOR Desagradable, de carronya, en exemplars vells.

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 6 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Barret blanquinós, gris clar o gris olivaci (mai bru fosc).

⚠ Porus vermells o de color vermell ataronjat.

⚠ Peu molt gruixut i bulbós, vermell a la zona mitjana amb retícul vermell.

⚠ La carn blaveja feblement al tall.

ES CONFON AMB

Cep d'estiu COMESTIBLE

El cep d'estiu té porus blancs o groc verdosos i la carn no...

Sureny fosc COMESTIBLE

Barret fosc, porus blancs o grocs, carn immutable.

Comprovi: Porus i tall.

TÒXICS

Falsos rossinyols

Hygrophoropsis aurantiaca i *Omphalotus olearius* · falso rebozuelo, seta de olivo

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca a crema

	Fals rossinyol	Gírgola d'olivera
MIDA	Petit (2–8 cm), carn prima i tova	Gran (5–15 cm) i carnós
COM SURT	Solt, a la pinassa o sobre fusta podrida de pi	En ramells de peus units, sobre soques i arrels d'olivera, alzina o castanyer

0–1800 m d'altitud

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

SENYALS D'ALARMA DE TOTS DOS

- ⚠ Làmines vertaderes: fines, atapeïdes i que baixen pel peu.
- ⚠ Tot taronja: barret, làmines i peu.
- ⚠ Passi el dit per sota: les làmines se separen; els plecs del rossinyol, no.

ES CONFON AMB

Rossinyol
COMESTIBLE → p. 9

El rossinyol té plecs gruixuts, baixos i roms (no làmines...

🔍 **Comprovi:** Sota el barret: làmines fines, fals; plecs gruixuts i roms, rossinyol.

TÒXIC

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✕ **Làmines** una bola: per dins, negra violàcia

Pi pinyer · Surera, alzina i castanyer · 0–1200 m; sobretot 200–1000 m

⚠ ●●○ **Greu** · símptomes al cap de 30 min – 3 h · **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Tall de dalt a baix: interior negre violaci, ferm, marbrejat de blanc, des de molt jove.

⚠ Pell gruixuda (2–4 mm), dura, de color groc ocraci i clivellada en esquames.

ES CONFON AMB

Pet de llop COMESTIBLE → p. 17

El pet de llop és blanc i tou per dins en els exemplars joves.

Pet de llop gegant COMESTIBLE

Interior blanc uniforme i pell fina.

Tòfona negra COMESTIBLE

La tòfona és subterrània, de pell negra amb berrugues...

Comprovi: Tall longitudinal.

TÒXIC

Peu de rata bord

Ramaria formosa

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✕ **Làmines** branques, com un corall **Esporada** ocre

Faig, roure martinenc i castanyer 200–1600 m; sobretot 300–1000 m

GUST Una mica amarg (no la tasti).

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Fong coraliforme de branques de color rosat ataronjat o salmó amb les puntes grogues.

⚠ Carn blanca que pot ennegrir-se o prendre tons vinosos.

ES CONFON AMB

Peu de rata de pi
COMESTIBLE → p. 5

Lòbuls aplanats crema, en pins.

Peu de rata col-i-flor
CONDICIONAT

Puntes rosades o vinoses sobre branques blanques.

Comprovi: Forma.

TÒXICS

Pixacà i reig bord

Amanita pantherina i *A. muscaria* · amanita pantera, matamoscas

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓**Làmines** ✓**Anell** ✓**Volva** **Esporada** blanca

	Pixacà	Reig bord
BARRET	Bru; berrugues blanc pur, en cercles	Vermell o taronja, més gran
BASE	Bulb amb vora, com un mitjó	Bulb amb anells de volva
ON	Pinedes, rouredes, fagedes, alzinars	Pinedes i bedollars de muntanya

0–2200 m d'altitud

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome panterínica**

Àcid iboteni i muscimol: actuen sobre el cervell.

SENYALS D'ALARMA DE TOTS DOS

⚠ Berrugues blanques al barret (la pluja les pot esborrar).

⚠ Làmines i peu blancs; bulb a la base.

ES CONFON AMB

Apagallums COMESTIBLE → p. 14

Sense volva; anell doble mòbil; peu atigrat.

Ou de reig COMESTIBLE → p. 13

L'ou de reig té les làmines i el peu GROCS i una volva en sac...

Vinosa CONDICIONAT

En la vinosa, la carn i les ferides es tornen vermelloses.

Comprovi: Làmines blanques, anell i volva: descarti'l (el reig les té grogues).

TÒXIC

Lepiota pudent

Lepiota cristata

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques ✓ **Anell** fi, fràgil ✗ **Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–1600 m; sobretot 300–1000 m

⚠ ●○○ **Moderada** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Bolet petit (2–5 cm) de barret blanc amb un disc central bru vermellós i esquames concèntriques.

⚠ Olor desagradable, de goma o gas.

⚠ Làmines blanques, lliures; anell fràgil.

ES CONFON AMB

Apagallums
COMESTIBLE → p. 14

Mida molt més gran, anell doble mòbil, peu atigrat.

Comprovi: Mida.

TÒXIC

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

●○○ **FÀCIL**

G F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COM ÉS ✓**Làmines** rosades → brunes ✓**Anell** gruixut ✕**Volva** **Esporada** bru xocolata

En prats 0–1500 m; sobretot 200–500 m **OLOR** Desagradable (tinta, fenol).

⚠ ●○○ **Moderada** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ En tallar la base del peu, la carn es torna GROC CROM a l'instant.

⚠ Olor de tinta, fenol o iode, més forta en cuinar-lo.

⚠ Grogueja intensament en fregar la vora del barret.

ES CONFON AMB

Camperol
COMESTIBLE → p. 16

No grogueja i fa bona olor.

Bola de neu
COMESTIBLE

Olor d'anís; la base no es torna groc crom.

Comprovi: Base del peu.

TÒXIC

Verderol

Tricholoma equestre · seta de los caballeros

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A S **O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** groc sofre ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Pi pinyer, roig i pinastre · En prats · 0–1700 m; sobretot 400–1500 m

OLOR De farina, feble.

⚠ ●●○ **Greu** · símptomes al cap de 24–72 h · **Síndrome rabdomiolítica**

Destrueix els músculs, també el del cor, si es menja diversos dies seguits.

⚠ Làmines groc sofre intens.

⚠ Barret groc verdós a groc brunenc, amb esquametes brunes al centre.

⚠ Peu groc.

ES CONFON AMB

Fredolic gros
COMESTIBLE

Barret gris amb fibres negres.

Farinera borda
MORTAL → p. 43

Làmines blanques, anell i volva.

Comprovi: Barret.

TÒXIC

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A** **S** **O** N D

COM ÉS ✓**Làmines** blanquinoses, amb reflex verdós ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** blanca

Avet i pi roig Faig 800–2000 m d'altitud **OLOR** De farina.

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 30 min – 3 h **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Tricoloma gran i carnós de barret blanquinós gris cobert d'esquames gris fosc o brunes (dibuix de...

⚠ Làmines blanquinoses amb reflexos verd groguencs, de vegades amb gotes.

⚠ Olor de farina.

ES CONFON AMB

Fredolic
COMESTIBLE → p. 18

El fredolic és petit, fràgil, afeltrat i sense olor de farina.

Fredolic gros
COMESTIBLE

Barret amb fibres radials llises, no esquames.

Comprovi: Mida i esquames.

TÒXIC

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓**Làmines** blanques a crema, baixen pel peu ✕**Anell** ✕**Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–2000 m; sobretot 300–1000 m

⚠ ●●○ **Greu** símptomes al cap de 15 min – 2 h **Síndrome muscarínica**

Muscarina: suor, saliva i llàgrimes a raig, i el pols es torna lent.

⚠ Bolet petit (2–5 cm) blanc, d'aspecte gebrat o pruïnós, de vegades amb zones concèntriques.
⚠ Làmines blanques a crema, DECURRENTS (baixen pel peu).
⚠ Esporada blanca (no rosada).

ES CONFON AMB

Cama-sec
COMESTIBLE → p. 22

El cama-sec té les làmines espaiades no decurrents.

Moixernó blanc de tardor
COMESTIBLE

Làmines que es tornen rosades, esporada rosada i forta olor...

Camperol
COMESTIBLE → p. 16

Làmines lliures rosades a brunes.

Comprovi: Làmines.

TÒXIC

Fals carlet

Entoloma sinuatum

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N** D

COM ÉS ✓**Làmines** groguenques → rosa salmó ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** rosada

Roure martinenc, faig i castanyer — 100–1500 m; sobretot 200–800 m

OLOR De farina rància.

⚠ ●●○ **Greu** — símptomes al cap de 30 min – 4 h — **Síndrome gastrointestinal**

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Làmines groguenques en els joves que es tornen ROSA SALMÓ en madurar.

⚠ Esporada rosada.

⚠ Olor de farina rància.

⚠ Bolet gran gris ocraci, carnós, sense anell ni volva.

ES CONFON AMB

Carlet
COMESTIBLE → p. 21

El carlet té el barret rosa vinós amb taques.

Moixernó
COMESTIBLE → p. 20

Làmines molt atapeïdes que no es tornen rosades.

Pardilla
TÒXIC

Làmines crema decurrents.

Comprovi: Color del barret i de les làmines.

TÒXIC

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

●○○ **FÀCIL**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** grogues → verdoses ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** bru violaci

En prats · Sobre fusta · 0–2000 m; sobretot 400–1100 m

⚠ ●●○ **Greu** · símptomes al cap de 30 minuts a diverses hores

Síndrome gastrointestinal

Irrita l'estómac i l'intestí.

⚠ Rams densos sobre soques de planifolis i coníferes.

⚠ Barret groc sofre amb el centre ataronjat.

⚠ Làmines groc sofre que es tornen verdoses i després bru violàcies.

ES CONFON AMB

Pollancró
COMESTIBLE → p. 24

Crema, anell membranós, en pollancres.

Alzinoi
CONDICIONAT

Anell blanc, esporada blanca, esquametes fosques.

Comprovi: Color.

TÒXICS

Petits amb muscarina

Inocybe geophylla i *Mycena pura*

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N D**

COM ÉS ✓**Làmines** ✕**Anell** ✕**Volva**

	Barret de bruixa	Mycena pura
COLOR	Blanc sedós, de vegades lila	Lila o rosat; vora amb ratlles
FORMA	Cònic, amb punxa; fibres que s'esquerden	Acampanat; peu buit i fràgil
OLOR	A terra	A rave

0–2000 m d'altitud

Greu ●●○ símptomes al cap de 15 min – 2 h **Síndrome muscarínica**

Muscarina: suor, saliva i llàgrimes a raig, i el pols es torna lent.

SENYALS D'ALARMA DE TOTS DOS

- Petits: d'1 a 5 cm.
- A la fullaraca de pinedes, fagedes i boscos mixtos.

ES CONFON AMB

Pimpinella morada COMESTIBLE → p. 19

Molt més gran i carnosa.

Cama-sec COMESTIBLE → p. 22

Prat, peu tenaç, làmines espaiades crema.

Pimpinella morada petita SENSE INTERÈS

Làmines gruixudes, sense olor de rave.

Comprovi: Mida: el peu blau és gran, carnós i fa olor de fruita.

MORTAL

Paxil·le tòxic

Paxillus involutus · paxilo

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A S O N** D

COM ÉS ✓**Làmines** ocre, es taquen de bru ✕ **Anell** ✕ **Volva** **Esporada** bru ocre

Pi roig · Bedoll, alzina i castanyer · 0–1900 m; sobretot 400–1400 m

⚠ ●●● **Mortal** · símptomes al cap de 1–3 h · **Síndrome hemolítica**

Després de menjar-lo diverses vegades, el cos ataca la seva pròpia sang i poden fallar els ronyons.

⚠ Marge del barret fortament enrotllat, feltrat o acanalat.

⚠ Làmines decurrents, groc ocraci, que es taquen de bru en tocar-les i se separen amb facilitat de la...

⚠ Sense làtex.

ES CONFON AMB

Rovelló COMESTIBLE → p. 3

El rovelló té làtex vermell vi i verdeja.

Pinetell COMESTIBLE → p. 3

Làtex taronja i taques verdes en el pinetell.

Pampa COMESTIBLE

La pampa és crema ocràcia amb mugró i no es taca de bru.

Comprovi: En tallar: làtex o no.

MORTAL

Farinera borda

Amanita phalloides · oronja verda · amanita mortal

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A S O N D

COM ÉS ✓**Làmines** blanques ✓**Anell** blanc, penjant ✓**Volva** blanca, en sac **Esporada** blanca

Alzina, roure martinenc, surera i castanyer i altres · 0–1500 m; sobretot 300–1000 m

OLOR Feble de jove; dolçastra i desagradable de vell.

⚠ ●●● **Mortal** · símptomes al cap de 6–24 h · **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

- ⚠ Volva blanca membranosa en sac a la base (sovint enterrada: desenterri sempre la base).
- ⚠ Anell blanc membranós penjant a la part alta del peu.
- ⚠ Làmines BLANQUES, lliures.
- ⚠ Barret verd oliva a verd groguenc amb fibres radials fosques; pot ser gairebé blanc.

ES CONFON AMB

Llora verda
COMESTIBLE

La llora verda no té volva ni anell i la seva cutícula està...

Llora
COMESTIBLE → p. 4

Sense volva ni anell; làmines flexibles.

Bola de neu
COMESTIBLE

Làmines rosades i després bru negroses; sense volva.

Comprovi: Base i peu.

MORTAL

Cogomassa

Amanita verna

●●○ **MITJANA**

G F M **A M J** J A **S O** N D

COM ÉS ✓ **Làmines** blanques ✓ **Anell** blanc ✓ **Volva** blanca, en sac **Esporada** blanca

Alzina, roure martinenc i surera — 0–900 m d'altitud

⚠ ●●● **Mortal** — símptomes al cap de 6–24 h — **Síndrome falꞏloïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

- ⚠ Bolet totalment blanc.
- ⚠ Volva blanca en sac a la base.
- ⚠ Anell membranós blanc.
- ⚠ Làmines blanques, lliures.

ES CONFON AMB

Moixernó COMESTIBLE → p. 20

El moixernó no té volva ni anell.

Camperol COMESTIBLE → p. 16

Làmines rosades i després brunes; sense volva.

Farinera CONDICIONAT

Més gran, farinosa, de tardor sobre calcària.

Comprovi: Base i peu.

MORTAL

Farinera pudent

Amanita virosa

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J **A** **S** **O** N D

COM ÉS ✓**Làmines** blanques ✓**Anell** blanc, fràgil ✓**Volva** en sac **Esporada** blanca

Faig i bedoll 500–1800 m d'altitud

⚠ ●●● **Mortal** símptomes al cap de 6–24 h **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

⚠ Bolet blanc de barret cònic o acampanat, sovint asimètric.
⚠ Peu blanc cobert de serrells llanosos, amb anell fràgil.
⚠ Volva blanca en sac.

ES CONFON AMB

Bola de neu
COMESTIBLE

Làmines de rosades a brunes, sense volva.

Comprovi: Làmines i base.



MORTAL

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata

●●○ **MITJANA**

G F M **A M** J J A **S O N D**

COM ÉS ✓**Làmines** blanques a crema ◑**Anell** només una zona cotonosa ✕**Volva** **Esporada** blanca

En prats 0–900 m; sobretot per sota de 300 m

⚠ ●●● **Mortal** símptomes al cap de 6–24 h **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

- ⚠ Bolet petit: barret de 2–6 cm.
- ⚠ Barret amb esquames concèntriques de color bru vinós sobre fons rosat.
- ⚠ Peu amb bandes o esquames de color bru rosat sota una zona anular poc marcada.
- ⚠ Làmines blanques, lliures.

ES CONFON AMB

Apagallums COMESTIBLE → p. 14

L'apagallums fa més de 10 cm, té un anell doble mòbil i el...

Cama-sec COMESTIBLE → p. 22

El cama-sec té làmines espaiades.

Camperol COMESTIBLE → p. 16

Làmines rosades i després brunes.

Comprovi: Mida, anell i peu.

MORTAL

Galerina marginada

Galerina marginata

●●○ **MITJANA**

G F M A M J J A **S O N D**

COM ÉS ✓ **Làmines** groguenques → bru rovell ✓ **Anell** fi ✗ **Volva** **Esporada** bru rovellat

Sobre fusta 0–2000 m; sobretot 400–1300 m

⚠ ●●● **Mortal** símptomes al cap de 6–24 h **Síndrome fal·loïdiana**

Amatoxines: destrueixen el fetge. No desapareixen en cuinar-lo, congelar-lo ni assecar-lo.

- ⚠ Bolet petit bru (1,5–5 cm) sobre fusta, en grups.
- ⚠ Anell fi bru al peu.
- ⚠ Esporada bru rovellat.
- ⚠ Barret llis, de color mel a bru, que canvia de color en assecar-se (higròfan).

ES CONFON AMB

Pollancró
COMESTIBLE → p. 24

Més gran i sobre pollancres.

Kuehneromyces mutabilis
COMESTIBLE

Peu amb esquametes per sota de l'anell (no fibres platejades).

Alzinoi
CONDICIONAT

Més gran, esquames fosques, esporada blanca.

🔍 **Comprovi:** Mida i arbre.



MORTAL

Inosperma erubescens

●●○ **MITJANA**

G F M A **M** **J** **J** A S O N D

COM ÉS ✓**Làmines** blanquinoses → brunes, taques vermelles ✕**Anell** ✕**Volva** **Esporada** bruna

En prats 0–1500 m d'altitud

⚠ ●●● **Mortal** símptomes al cap de 15 min – 2 h **Síndrome muscarínica**

Muscarina: suor, saliva i llàgrimes a raig, i el pols es torna lent.

⚠ Barret de còmic a acampanat, de blanquinós a crema, fibrós i esquerdat radialment.

⚠ Tot el bolet es taca de vermell amb el frec o l'edat.

⚠ Làmines blanquinoses que es tornen brunes (esporada bruna).

ES CONFON AMB

Moixernó
COMESTIBLE → p. 20

El moixernó té el barret llis i carnós.

Comprovi: Barret, taques vermelles i olor.



MORTAL

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus

●●○ MITJANA

G F M A M J J A **S** **O** **N** D

COM ÉS ✓ **Làmines** groc ataronjades → rovell ◑ **Anell** només una cortina en els joves ✕ **Volva** **Esporada** bru rovellat

Roure martinenc, castanyer i alzina — 100–1500 m d'altitud — OLOR Feble, de rave.

⚠ ●●● **Mortal** — símptomes al cap de 2–15 dies — **Síndrome orellànica**

Orellanina: destrueix els ronyons, dies o setmanes després de menjar-lo.

- ⚠ Barret bru ataronjat a lleonat, sec, fibrós o finament esquamós.
- ⚠ Làmines gruixudes, espaiades, groc ataronjades que es tornen bru rovellat.
- ⚠ Esporada bru rovellat.
- ⚠ Peu groguenc fibrós, sense bulb ni anell membranós (restes de cortina).

ES CONFON AMB

Rossinyol COMESTIBLE → p. 9

El rossinyol té plecs gruixuts i roms, no làmines.

Camagroc COMESTIBLE

Peu buit i plecs en lloc de làmines.

Cama de perdiu COMESTIBLE → p. 8

Làmines decurrents i esporada negra; sota pins.

🔍 **Comprovi:** Part inferior.

MORTAL

Bolet de greix

Gyromitra esculenta · falsa colmenilla · bonete

●○○ **FÀCIL**

G F M **A** **M** **J** J A S O N D

COM ÉS ✕ **Làmines** barret arrugat, com un cervell

Pi roig, avet i pi negre · Sobre fusta · 600–2200 m; sobretot 1000–1800 m

⚠ ●●● **Mortal** · símptomes al cap de 6–12 h · **Síndrome giromitriana**

Giromitrina: danya el fetge i el sistema nerviós; cuinar-lo o assecar-lo no el fa segur.

⚠ Barret bru vermellós en forma de cervell, amb circumvolucions, NO amb alvèols.

⚠ En tallar-la, diverses cavitats irregulars al barret i al peu.

ES CONFON AMB

Múrgola CONDICIONAT → p. 25

La múrgola té alvèols de bresca i és buida.

Múrgola CONDICIONAT

Alvèols en fileres i un sol buit.

Comprovi: Tall longitudinal.

Arbres i els seus bolets

Reconèixer l'arbre per la fulla i el tronc ajuda a saber què buscar.

FULLA

TRONC

Pi blanc

pino carrasco · *Pinus halepensis*

Capçada clara, irregular i d'un verd grisenc pàl·lid.

BUSQUI Rovelló i pinetell *3*, Molleric *7*, Cama de perdiu *8*, Fredolic *18*, Llenega negra i carlet *21*

COMPTE Cualbra morada *28*

FULLA

TRONC

Pi pinyer

pino piñonero · *Pinus pinea*

Copa ampla en forma de para-sol o ombrel·la, inconfusible en arbres adults aïllats.

BUSQUI Rovelló i pinetell *3*, Molleric *7*, Cama de perdiu *8*, Fredolic *18*

COMPTE Pota de cavall groga *31*, Verderol *36*, Cualbra morada *28*

FULLA

TRONC

Pinassa

pino laricio · *Pinus nigra subsp. salzmannii*

Pi de capçada densa i verd molt fosc, alt i recte als rodals madurs.

BUSQUI Rovelló i pinetell *3*, Peu de rata de pi *5*, Molleric *7*, Cama de perdiu *8*, Camagroc *11*, Fredolic *18*

COMPTE Cualbra morada *28*

FULLA

TRONC

Pi roig

pino silvestre · *Pinus sylvestris*

Capçada irregular i alta.

BUSQUI Rovelló i pinetell *3*, Peu de rata de pi *5*, Cep *6*, Molleric *7*, Cama de perdiu *8*, Rossinyol *9*

COMPTE Paxi·le tòxic *42*, Bolet de greix *50*, Pixacà i reig bord *33*, Verderol *36*, Fredolic metzinós *37*, Cualbra morada *28*

FULLA

TRONC

Alzina

encina · *Quercus ilex*

Arbre perennifoli de capçada densa, arrodonida i verd fosc mat.

BUSQUI Llora *4*, Rossinyol *9*, Trompeta de la mort *10*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*, Llenega negra i carlet *21*

COMPTE Paxi·le tòxic *42*, Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*

Arbres i els seus bolets

FULLA

TRONC

Avet

abeto blanco · *Abies alba*

Conífera alta de capçada cònica regular i verd fosc, en obagues fresques.

BUSQUI Cep *6*, Rossinyol *9*, Camagroc *11*, Llengua de bou *12*

COMPTE Bolet de greix *50*, Pixacà i reig bord *33*, Fredolic metzinós *37*

FULLA

TRONC

Surera

alcornoque · *Quercus suber*

Arbre de capçada àmplia i verd grisenca.

BUSQUI Llora *4*, Rossinyol *9*, Ou de reig *13*

COMPTE Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Enganyapastors *26*, Pota de cavall groga *31*

FULLA

TRONC

Roure martinenc

roble pubescente · *Quercus pubescens*

Roure de talla mitjana, sovint marcescent: conserva a l'hivern bona part de les...

BUSQUI Llora *4*, Trompeta de la mort *10*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*, Llenega negra i carlet *21*

COMPTE Farinera borda *43*, Cogomassa *44*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*, Peu de rata bord *32*

FULLA

TRONC

Faig

haya · *Fagus sylvatica*

Arbre alt d'escorça llisa i grisa.

BUSQUI Llora *4*, Cep *6*, Rossinyol *9*, Trompeta de la mort *10*, Llengua de bou *12*

COMPTE Farinera borda *43*, Farinera pudent *45*, Matagent *29*, Peu de rata bord *32*, Pixacà i reig bord *33*, Fredolic metzinós *37*

FULLA

TRONC

Castanyer

castaño · *Castanea sativa*

Arbre gran de capçada àmplia.

BUSQUI Llora *4*, Cep *6*, Rossinyol *9*, Trompeta de la mort *10*, Llengua de bou *12*, Ou de reig *13*

COMPTE Paxiłle tòxic *42*, Farinera borda *43*, Cortinari metzinós *49*, Enganyapastors *26*, Matagent *29*, Pota de cavall groga *31*