Árboles y sus setas





Abeto blanco

avet · *Abies alba*

Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.

BUSQUE Boleto *5*, Rebozuelo *6*, Angula de monte *7*, Lengua de vaca *8*

CUIDADO Falsa colmenilla *30*, Amanita pantera y matamoscas *21*, Fredolic metzinós *23*





Alcornoque

surera · *Quercus suber*

Árbol de copa amplia y verde grisácea.

BUSQUE Carbonera *4*, Rebozuelo *6*, Oronja *8*

CUIDADO Oronja verde *26*, Cogomassa *27*, Enganyapastors *16*, Pota de cavall groga *19*





Roble pubescente

roure martinenc · *Quercus pubescens*

Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las...

BUSQUE Carbonera *4*, Trompeta de los muertos *7*, Lengua de vaca *8*, Oronja *8*, Babosa negra y carlet *13*

CUIDADO Oronja verde *26*, Cogomassa *27*, Cortinari metzinós *29*, Enganyapastors *16*, Boleto de Satanás *18*, Peu de rata bord *20*





Haya

faig · *Fagus sylvatica*

Árbol alto de corteza lisa y gris.

BUSQUE Carbonera *4*, Boleto *5*, Rebozuelo *6*, Trompeta de los muertos *7*, Lengua de vaca *8*

CUIDADO Oronja verde *26*, Farinera pudent *27*, Boleto de Satanás *18*, Peu de rata bord *20*, Amanita pantera y matamoscas *20*, Fredolic metzinós *23*





Castaño

castanyer · *Castanea sativa*

Árbol grande de copa amplia.

BUSQUE Carbonera *4*, Boleto *5*, Rebozuelo *6*, Trompeta de los muertos *7*, Lengua de vaca *8*, Oronja *8*

CUIDADO Paxilo *26*, Oronja verde *26*, Cortinari metzinós *29*, Enganyapastors *16*, Boleto de Satanás *18*, Pota de cavall groga *19*

CISTELLA SEGURA · CUADERNO MINI · 32 PÁGINAS OTOÑO 2026

Setas *esenciales*

de Cataluña



Las **54** que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES **20** TÓXICAS **9** MORTALES

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**




E F M A M J J A **S O N D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Mycena pura

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Pequeña seta lila, rosada o violácea con el margen estriado.
! Olor a rábano.
! Pie hueco, frágil.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SE CONFUNDE
Pie azul COMESTIBLE → *p. 11*: mucho mayor, carnosa, olor afrutado
Pimpinella morada petita SIN INTERÉS: láminas gruesas, sin olor a rábano




E F M A M J J A **S O N D**

TÓXICA ●●○ Media

Barret de bruixa

Inocybe geophylla

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Pequeña seta blanca sedosa con mamelón agudo.
! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.
! Olor terroso o espermático.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SE CONFUNDE
Pie azul COMESTIBLE → *p. 11*: mucho mayor y carnosa
Senderuela COMESTIBLE → *p. 13*: prado, pie correoso, láminas espaciadas crema

E F M A M J J **A S O N D**




E F M A M J J **A S O N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Parasol

apagallums · *Macrolepiota procera*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un...
✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas.
✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Lepiota metzinosa MORTAL → *p. 28*: sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas.
Amanita pantera TÓXICA → *p. 20*: volva en la base y anillo fijo; pie liso




E F M A M J J **A S O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Barbuda

bolet de tinta · *Coprinus comatus*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan.
✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Bolet de femer TÓXICA: sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas.
Coprí garsa NO COMESTIBLE: sombrero negro con placas blancas, como una urraca.


E F **M A M** J J A **S O N D**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

1. Recolecte solo lo que conoce a fondo.
2. Saque la seta entera, con la base del pie.
3. Revise cada ejemplar, uno a uno.
4. No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.
5. Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.
6. Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.
7. No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata...).
8. Las apps de fotos orientan, pero no deciden.
9. Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.
10. Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.
11. Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.
12. Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.

CÓMO MIRAR UNA SETA



1. **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.
2. **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.
3. **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?
4. **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?
5. **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?
6. **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

CÓMO LEER LAS FICHAS

COMESTIBLE · TÓXICA · MORTAL	Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen.
●●○ Media	Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil.
E F M A M J J A **S O N** D	Meses en que sale; en claro, solo algunos años.
✓ ✗ ◑	Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte.
●○○ Grave	En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal.
→ *p. 12*	Página de la seta con la que se confunde.

EMPIEZAN EN LA PÁGINA ■ **Comestibles** *3* ■ **Tóxicas** *16* ■ **Mortales** *26*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.

DÓNDE BUSCAR

Árboles y sus setas

Reconocer el árbol por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.





Pino carrasco — pi blanc · *Pinus halepensis*

Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido.

BUSQUE Níscalos *3*, Boleto granulado *5*, Cama de perdiu *6*, Negrilla *11*, Babosa negra y carlet *12*

CUIDADO Cualbra morada *17*





Pino piñonero — pi pinyer · *Pinus pinea*

Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.

BUSQUE Níscalos *3*, Boleto granulado *5*, Cama de perdiu *6*, Negrilla *11*

CUIDADO Pota de cavall groga *19*, Seta de los caballeros *22*, Cualbra morada *17*





Pino laricio — pinassa · *Pinus nigra subsp. salzmannii*

Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.

BUSQUE Níscalos *3*, Seta coliflor *4*, Boleto granulado *5*, Cama de perdiu *6*, Angula de monte *7*, Negrilla *11*

CUIDADO Cualbra morada *17*





Pino silvestre — pi roig · *Pinus sylvestris*

Copa irregular y alta.

BUSQUE Níscalos *3*, Seta coliflor *4*, Boleto *5*, Boleto granulado *5*, Cama de perdiu *6*, Rebozuelo *6*

CUIDADO Paxilo *26*, Falsa colmenilla *30*, Amanita pantera y matamoscas *20*, Seta de los caballeros *22*, Fredolic metzinós *23*, Cualbra morada *17*





Encina — alzina · *Quercus ilex*

Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate.

BUSQUE Carbonera *4*, Rebozuelo *6*, Trompeta de los muertos *7*, Lengua de vaca *8*, Oronja *8*, Babosa negra y carlet *13*

CUIDADO Paxilo *26*, Oronja verde *26*, Cogomassa *27*, Cortinari metzinós *29*, Enganyapastors *16*, Boleto de Satanás *18*



COMESTIBLE ●●○ Media

Champiñón silvestre


camperol · *Agaricus campestris*

✓ Láminas ✓ Anillo ✗ Volva

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después.
✓ Sin volva en la base.
✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Cogomassa MORTAL → *p. 27*: láminas siempre blancas y volva en saco
Bola de neu pudent TÓXICA → *p. 22*: amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del...



E F M A **M J** J A **S O N** D



COMESTIBLE ●○○ Fácil

Pedo de lobo

pet de llop · *Lycoperdon perlatum*

✗ Láminas

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo.
✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden...
✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Oronja verde MORTAL → *p. 26*: al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una...
Pota de cavall groga TÓXICA → *p. 19*: interior negro violáceo y piel gruesa escamosa



E F M A M J J **A S O N D**



TÓXICA ●●○ Media

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

✓ Láminas ✗ Anillo ✗ Volva

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o...
! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
! Olor a harina.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con abeto blanco, haya y pino silvestre.

SE CONFUNDE
Negrilla COMESTIBLE → *p. 11*: el fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina
Capuchina COMESTIBLE: sombrero con fibras radiales lisas, no escamas



E F M A M J J **A S O** N D



TÓXICA ●●○ Media

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa

✓ Láminas ✗ Anillo ✗ Volva

! Seta pequeña blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.
! Láminas blancas a crema, DECURRENTES.
! Esporada blanca.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Senderuela COMESTIBLE → *p. 13*: el cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes.
Molinera COMESTIBLE: láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a...



E F M A M J J A **S O N D**





E F M A M J J A S O N D

MORTAL ●○○ Fácil

Falsa colmenilla

bolet de greix · *Gyromitra esculenta*

✕ Láminas

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.
! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

●●● **Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

DÓNDE Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. Sobre madera.

SE CONFUNDE
Colmenilla CONDICIONADA → *p. 15*: la colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola...
Colmenilla negra CONDICIONADA: alvéolos en hileras y un solo hueco

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

Llame ahora

112 Emergencias **91 562 04 20** Toxicología 24 h

→ **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.
→ **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.
→ **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.
→ **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.
→ **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Níscalo de sangre

rovelló · *Lactarius sanguifluus*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva ✓ Látex

✓ Látex rojo vino desde el primer instante, sin pasar por naranja.
✓ Láminas rosa vinoso o lila vinoso, que se manchan de verde.
✓ Pie corto, hueco, del color del sombrero, con hoyuelos más oscuros.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y piñonero y otros.

CUIDADO
Paxilo MORTAL → *p. 26*: sin látex; se mancha de pardo (no de verde).
Enganyapastors de llet groga TÓXICA → *p. 16*: látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Níscalo

pinetell · *Lactarius deliciosus*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva ✓ Látex

✓ Látex naranja zanahoria al cortar, que no se vuelve rojo vino en los primeros minutos.
✓ Láminas naranja vivo que se manchan de verde.
✓ Pie hueco, naranja, con hoyuelos más oscuros.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y negro y otros.

CUIDADO
Paxilo MORTAL → *p. 26*: sin látex; se mancha de pardo (no de verde).
Falso níscalo TÓXICA → *p. 17*: margen muy peludo, látex blanco y picante; bajo abedules





E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

✓ Láminas ✓ Anillo ✕ Volva

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.
! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.
! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Champiñón silvestre COMESTIBLE → *p. 10*: no amarillea y huele bien
Bola de nieve COMESTIBLE: olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo





E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Seta de los caballeros

verderol · *Tricholoma equestre*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Láminas amarillo azufre intenso.
! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.
! Pie amarillo.

●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

DÓNDE Con pino piñonero, silvestre y rodeno. En prados.

SE CONFUNDE
Capuchina COMESTIBLE: sombrero gris con fibras negras
Oronja verde MORTAL → *p. 26*: láminas blancas, anillo y volva





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●● Difícil

Negrilla

fredolic · *Tricholoma terreum*

✓ Láminas ◑ Anillo ✕ Volva

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso.
✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre y laricio y otros.

CUIDADO
Fredolic metzinós TÓXICA → *p. 23*: mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con...
Tricholoma virgatum / T. sciodes TÓXICA: sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo.





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Pie azul


pimpinella morada · *Lepista nuda*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida.
✓ Sin cortina ni anillo.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Cortinarius violáceus (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...) TÓXICA: cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes.
Barret de bruixa TÓXICA → *p. 24*: pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso.





E F M A M **J J A S O N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Carbonera

llora · *Russula cyanoxantha*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse.
✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

DÓNDE Con haya, castaño y encina y otros.

CUIDADO
Oronja verde MORTAL → *p. 26*: anillo y volva en la farinera borda.
Russula sardonia TÓXICA: láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante





E F M A M J J A S **O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Seta coliflor


peu de rata de pi · *Sparassis crispa*

✕ **Láminas**

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos...
✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.
✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y rodeno. Sobre madera.

CUIDADO
Peu de rata bord TÓXICA → *p. 20*: ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas...
Coliflor rosa CONDICIONADA: ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco





E F M A **M J J** A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Inosperma erubescens

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas.

●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Perrechico COMESTIBLE → *p. 12*: el moixernó tiene sombrero liso carnoso.





E F M A M J J A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
! Esporada pardo herrumbre.

●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

DÓNDE Con roble pubescente, castaño y encina.

SE CONFUNDE
Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 6*: el rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas
Camagroc COMESTIBLE: pie hueco y pliegues en lugar de láminas





E F M **A M J** J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Perrechico

moixernó · *Calocybe gambosa*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sale en PRIMAVERA, a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Inosperma erubescens MORTAL → *p. 29*: sombrero cónico fibroso agrietado.
Cogomassa MORTAL → *p. 27*: anillo y volva en saco; láminas libres





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Babosa negra

llenega negra · *Hygrophorus latitabundus*

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.
✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre.

CUIDADO
Llenega borda NO COMESTIBLE: láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre).
Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE: láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo...





E F M A M J **A S O N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Matamoscas

reig bord · *Amanita muscaria*


✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Sombrero rojo con verrugas blancas.
! Láminas y pie BLANCOS.
! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

DÓNDE Con pino silvestre, abedul y abeto blanco y otros.

SE CONFUNDE
Oronja COMESTIBLE → *p. 8*: el ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco...





E F M A M J J **A S O N** D

TÓXICA ●●○ Media

Lepiota pudent

Lepiota cristata

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

! Seta pequeña de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
! Olor desagradable, a goma o gas.
! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Parasol COMESTIBLE → *p. 9*: tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado





E F M A M J J A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata

✓ Láminas ◑ Anillo ✕ Volva

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Parasol COMESTIBLE → *p. 9*: el apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie...
Senderuela COMESTIBLE → *p. 13*: el cama-sec tiene láminas espaciadas.





E F M A M J J A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Galerina marginada

Galerina marginata

✓ Láminas ✓ Anillo ✕ Volva

! Pequeña seta parda sobre madera, en grupos.
! Anillo fino pardo en el pie.
! Esporada pardo herrumbre.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Sobre madera.

SE CONFUNDE
Seta de chopo COMESTIBLE → *p. 14*: mayor y sobre chopos
Kuehneromyces mutabilis COMESTIBLE: pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas)





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Boleto

cep · *Boletus edulis*

✓ Tubos ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva.
✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla.
✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte...

DÓNDE Con haya, castaño y roble albar y otros.

CUIDADO
Boleto de Satanás TÓXICA → *p. 18*: sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo...
Boleto amargo NO COMESTIBLE: poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso.





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Boleto granulado

molleric · *Suillus granulatus*

✓ Tubos ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones en la parte alta.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre y laricio y otros.

CUIDADO
Boleto picante NO COMESTIBLE: poros pardo canela a rojizos; carne muy picante.
Molleric de bou SIN INTERÉS: poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes.





E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Peu de rata bord

Ramaria formosa

✕ Láminas

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.
! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con haya, roble pubescente y castaño.

SE CONFUNDE
Seta coliflor COMESTIBLE → *p. 4*: lóbulos aplanados crema, en pinos
Coliflor rosa CONDICIONADA: puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas





E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Amanita pantera

pixacà · *Amanita pantherina*

✓ Láminas ✓ Anillo ✓ Volva

! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.
! Base del pie en bulbo con un reborde y 1–2 anillos por encima.
! Anillo liso, sin estrías por arriba.

●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

DÓNDE Con pino silvestre, roble pubescente y haya y otros.

SE CONFUNDE
Parasol COMESTIBLE → *p. 9*: sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado
Vinosa CONDICIONADA: en la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas.





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Carlet

Hygrophorus russula

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo.

CUIDADO
Fals carlet TÓXICA → *p. 25*: sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón...
Cualbra morada NO COMESTIBLE → *p. 17*: carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Senderuela

cama-sec · *Marasmius oreades*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Lepiota metzinosa MORTAL → *p. 28*: sombrero con escamas vinosas y pie con bandas
Clitocibe blanc TÓXICA → *p. 23*: blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes.





E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Cama de perdiu


Chroogomphus rutilus

✓ Láminas ◑ Anillo ✕ Volva

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca.
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco y laricio y otros.

CUIDADO
Cortinari metzinós MORTAL → *p. 29*: esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes.
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → *p. 18*: láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.





E F M A M **J J A S O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Rebozuelo

rossinyol · *Cantharellus cibarius*

✓ Pliegues ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Por debajo NO tiene láminas.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa.
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DÓNDE Con encina, alcornoque y castaño y otros.

CUIDADO
Cortinari metzinós MORTAL → *p. 29*: láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.
Seta de olivo TÓXICA → *p. 19*: láminas verdaderas, finas y apretadas.





E F M **A M J** J A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Cogomassa

Amanita verna

✓ Láminas ✓ Anillo ✓ Volva

! Seta enteramente blanca.
! Volva blanca en saco en la base.
! Anillo membranoso blanco.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque.

SE CONFUNDE
Perrechico COMESTIBLE → *p. 12*: el moixernó no tiene volva ni anillo.
Champiñón silvestre COMESTIBLE → *p. 10*: láminas rosadas y luego pardas; sin volva





E F M **A S** O N D

MORTAL ●●○ Media

Farinera pudent

Amanita virosa

✓ Láminas ✓ Anillo ✓ Volva

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
! Volva blanca en saco.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con haya y abedul.

SE CONFUNDE
Bola de nieve COMESTIBLE: láminas rosadas a pardas, sin volva





E F M **A M** J J A S **O N D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Seta de cardo

gírgola de panical · *Pleurotus eryngii*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor muerto.
✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Clitocibe blanc TÓXICA → *p. 23*: blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo
Fals carlet TÓXICA → *p. 25*: láminas rosa salmón, en bosque





E F M **A M J** J A **S O N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Seta de chopo

pollancró · *Cyclocybe cylindracea*

✓ Láminas ✓ Anillo ✕ Volva

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco.

DÓNDE Con chopo negro y álamo blanco. En prados y sobre madera.

CUIDADO
Galerina marginada MORTAL → *p. 28*: más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre.
Bolet de pi TÓXICA → *p. 25*: amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo





E F M A M J J A **S O N D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Seta de olivo

gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*


✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina.
! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.
! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con olivo, encina y castaño y otros. Sobre madera.

SE CONFUNDE
Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 6*: el rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en...





E F M A M J J A **S O N D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum


✕ Láminas

! Corte de arriba abajo.
! Piel gruesa, dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con alcornoque, encina y castaño y otros.

SE CONFUNDE
Pedo de lobo COMESTIBLE → *p. 10*: el pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes
Bejín gigante COMESTIBLE: interior blanco uniforme y piel fina





E F M A M J J **A S O N** D

MORTAL ●●○ Media

Paxilo

paxil·le tòxic · *Paxillus involutus*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.
! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan...
! Sin látex.

●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

DÓNDE Con abedul, pino silvestre y encina y otros.

SE CONFUNDE
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 3*: el rovelló tiene látex rojo vino y verdea.
Níscalo COMESTIBLE → *p. 3*: látex naranja y manchas verdes en el pinetell





E F M A M J J **A S O N** D

MORTAL ●●○ Media

Oronja verde

farinera borda · *Amanita phalloides*


✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Volva blanca membranosa en saco en la base.
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
! Láminas BLANCAS, libres.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque y otros.

SE CONFUNDE
Gorro verde COMESTIBLE: la llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...
Carbonera COMESTIBLE → *p. 4*: sin volva ni anillo; láminas flexibles





E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Trompeta de los muertos

trompeta de la mort · *Craterellus cornucopioides*

✗ **Láminas**

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.
✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada.
✓ Carne delgada y elástica.

DÓNDE Con haya, encina y castaño y otros.

CUIDADO
Orella de gat negra CONDICIONADA: sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con...
Craterellus cinereus COMESTIBLE: cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo





E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Angula de monte

camagroc · *Craterellus lutescens*

✗ **Láminas**

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y abeto blanco.

CUIDADO
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → *p. 18*: láminas finas y apretadas; pie macizo
Camagroc COMESTIBLE: venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas.





E F M A M J **J A S O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Boleto de Satanás

matagent · *Rubroboletus satanas*

✓ **Tubos** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo.
! Poros rojos o rojo anaranjados.
! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con roble pubescente, encina y castaño y otros.

SE CONFUNDE
Boleto reticulado COMESTIBLE: el cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la...
Boleto negro COMESTIBLE: sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable





E F M A M J J A **S O N D**

NO COMESTIBLE ●○○ Fácil

Falso rebozuelo

fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Láminas verdaderas: finas, apretadas, bifurcadas varias veces, naranja vivo.
! Carne delgada y blanda, no compacta.
! Sombrero aterciopelado naranja a pardo anaranjado.

●○○ **Leve.** No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

DÓNDE Con pino silvestre y rodeno. Sobre madera.

SE CONFUNDE
Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 6*: el rossinyol tiene pliegues gruesos.
Seta de olivo TÓXICA → *p. 19*: omphalotus crece en grandes ramilletes sobre madera de olivo.





E F **M A M** J J A S O N D

CONDICIONADA ●●○ Media

Colmenilla

múrgola · *Morchella esculenta*

✗ **Láminas**

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
✓ Córtela de arriba abajo.
✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Falsa colmenilla MORTAL → *p. 30*: sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos).
Verpa bohemica TÓXICA: sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta.

ANTES DE COGERLA

La edad cuenta

Una comestible vieja, agusanada o pasada también intoxica: cójala joven y firme. (Níscalo de sangre)













E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Lengua de vaca


llengua de bou · *Hydnum repandum*

✓ **Aguijones** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles.
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

DÓNDE Con encina, haya y castaño y otros.

CUIDADO
Hydnellum / Sarcodon NO COMESTIBLE: carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos.
Picornell de pi COMESTIBLE: más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie





E F M A M J J **A S O** N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Oronja

ou de reig · *Amanita caesarea*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

✓ Láminas AMARILLAS.
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

CUIDADO
Oronja verde MORTAL → *p. 26*: al cortar el huevo de arriba abajo.
Matamoscas TÓXICA → *p. 21*: láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden...





E F M A M J J A **S O N** D

TÓXICA ●●○ Media

Fals carlet

Entoloma sinuatum

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con roble pubescente, haya y castaño.

SE CONFUNDE
Carlet COMESTIBLE → *p. 13*: el carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas.
Perrechico COMESTIBLE → *p. 12*: láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas.





E F M A M J J A **S O N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados y sobre madera.

SE CONFUNDE
Seta de chopo COMESTIBLE → *p. 14*: crema, anillo membranoso, en chopos
Armilaria CONDICIONADA: anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras





E F M A M J J A **S O N D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Enganyapastors de llet groga

Lactarius chrysorrheus

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.
! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.
! No se mancha de verde.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

SE CONFUNDE
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 3*: el rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos
Níscalo COMESTIBLE → *p. 3*: el pinetell tiene látex naranja y láminas naranja vivo que...





E F M A M J J **A S O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Enganyapastors

Lactarius zonarius

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

! Látex blanco que no cambia de color.
! Láminas crema, sin manchas verdes.
! Bajo robles y encinas, no bajo pinos.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo.

SE CONFUNDE
Níscalo COMESTIBLE → *p. 3*: látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 3*: látex rojo vino; bajo pinos





E F M A M J J **A S O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Falso níscalo

cabra de beç · *Lactarius torminosus*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**


! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
! Látex blanco que no cambia.
! Siempre bajo abedules.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con abedul.

SE CONFUNDE
Níscalo COMESTIBLE → *p. 3*: margen liso, látex naranja; bajo pinos
Pinetell d'avet COMESTIBLE: margen liso, látex naranja; bajo abetos





E F M A M J J A **S O** N D

NO COMESTIBLE ●●● Difícil

Cualbra morada

Russula torulosa

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo.
! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.

●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre y otros.

SE CONFUNDE
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 3*: el rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que...
Carbonera COMESTIBLE → *p. 4*: la carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas.