QUADERN DE CAMP · CATALUNYA · TARDOR

Cistella *Segura*

Llibre d'exploració dels bolets de tardor

47 bolets dels boscos catalans, cadascun a la seva pàgina: com és de jove, en el seu punt, vell i passat; com canvia de color; on viu; i amb quin bessó perillós no l'has de confondre.


Rovelló


Farinera borda


Cep


Bolet de tinta


Reig bord


Camagroc


Pet de llop


Gírgola d'olivera


Pimpinella

Si dubtes, no te'l mengis. Emergències: **112**

Informació Toxicològica (24 h): **91 562 04 20**

ÍNDEX

Què hi ha en aquest quadern

Cap. 1 **Abans de sortir** Regles i material

Cap. 2	**Com es llegeix un bolet**	Parts i clau
Cap. 3	**L'edat d'un bolet**	Jove, bo, vell
Cap. 4	**Quan sortir: la pluja**	Calculadora
Cap. 5	**Colors que canvien**	14 canvis
Cap. 6	**El llibre dels bolets**	47 bolets
Cap. 7	**Les meves troballes**	Montnegre, 18/10
Cap. 8	**Cara a cara**	15 parelles
Cap. 9	**A la cuina i a casa**	
Cap. 10	**Entrena l'ull**	Test
Cap. 11	**Descarts ràpids i mites**	
Cap. 12	**Abans de menjar-te'l**	Llista
Cap. 13	**Si algú es troba malament**	SOS

Capítol 1

Abans de sortir

Cada tardor hi ha intoxicacions greus a Catalunya, gairebé sempre per confondre un bolet conegut amb un bessó. Aquestes són les regles dels boletaires amb experiència.

Només et menges el que reconeixes al 100%

Ni un 90%, ni "em sembla que sí". Un sol exemplar de farinera borda pot matar una persona adulta.

Aprèn pocs bolets, però a fons

Comença pels de nivell 1. Afegeix-ne un o dos cada temporada, sempre amb algú que en sàpiga.

Arrenca sencers els que no coneguis

La volva (el sac de la base) sovint queda enterrada. Els que ja coneixes bé, talla'ls amb ganivet.

Cistella de vímet, mai bossa de plàstic

A la bossa s'aixafen i fermenten. Porta els dubtosos a part, en una capsa.

Cap truc casolà funciona

Ni la moneda de plata, ni l'all, ni que se'l mengin els cargols. Mira el capítol 11.

Fes-los revisar

Les associacions micològiques i les exposicions de bolets de tardor revisen cistelles.

Sempre cuinats, i amb mesura

Cap bolet silvestre cru. Amb nens, embarassades o gent gran, encara més prudència.

Només exemplars sans

Fora els vells, aigualits, cucats, florits, glaçats o de vores de carretera. Ho veuràs al capítol 3.

Guarda'n un de cru a la nevera

Si menges una espècie per primer cop, guarda'n un exemplar. Si hi ha intoxicació, els metges sabran què és.

Respecta el bosc

Res de rastells. Deixa els petits, tapa el forat, endú-te'n només el que menjaràs i informa't de les normes locals.

Cistella de vímet
Deixa respirar els bolets i escampa espores mentre camines.

Ganivet amb raspall
Per tallar i netejar la terra allà mateix.

Capsa per als dubtosos
Separats de la resta, per ensenyar-los a algú que en sàpiga.

Mòbil carregat
Obre aquest llibre a casa abans de sortir: al bosc sovint no hi ha cobertura.

Roba de colors vius
A la tardor hi ha batudes de senglar. Fes-te veure.

Digues on vas
Avisa algú de la zona i l'hora de tornada.

●○○

Nivell 1 · Fàcil

Té un tret inconfusible i no té cap bessó perillós a Catalunya.

●●○

Nivell 2 · Compte

Té un bessó tòxic. Cal comprovar 2 o 3 trets en cada exemplar.

●●●

Nivell 3 · Expert

Es pot confondre amb un bolet mortal. Només amb un expert al costat.

Capítol 2

Com es llegeix un bolet

Abans de mirar el color, aprèn on mirar. Aquestes parts són les pistes que trobaràs a totes les pàgines del llibre.



Les parts que has de mirar en cada bolet. La volva sovint queda enterrada: per això cal arrencar sencers els bolets que no coneixes.



Barret

La part de dalt. Mira'n el color, la textura (llisa, escatosa, llefiscosa) i la vora.

Llora i carbonera · fitxa →



Làmines

Fulles primes sota el barret. El seu color i si baixen pel peu són pistes clau.

Camperol · fitxa →



Porus

Una esponja en lloc de làmines: és el grup dels ceps i mollerics.

Molleric · fitxa →



Plecs

Venes gruixudes i baixes que semblen làmines però no ho són. Típiques del rossinyol.

Rossinyol · fitxa →



Agullons

Punxetes toves sota el barret. La llengua de bou.

Llengua de bou · fitxa →



Anell

Una faldilla o collaret al peu, resta del vel que protegia les làmines.

Apagallums · fitxa →



Volva

Un sac a la base del peu, sovint enterrat. Senyal d'amanita: arrenca sempre el bolet sencer.

Farinera borda · fitxa →



Cortina

Un tel com de teranyina entre el barret i el peu dels joves. Senyal de cortinari.

Cortinari metzinós · fitxa →



Llet

Els lactaris treuen un suc en tallar-los. El seu color separa el rovelló dels tòxics.

Lactaris de llet blanca · fitxa →



Interior (gleba)

Els bolets en forma de bola s'han de tallar: el color de dins diu si són bons.

Pet de llop · fitxa →

Capítol 3

L'edat d'un bolet

Un mateix bolet canvia molt en pocs dies. Jove i ferm és el millor moment; vell, aigualit o cucat, fins i tot un comestible et pot fer mal. I massa jove, de vegades no es pot identificar.

Bolet de tinta: de blanc a tinta en un dia



Jove

Dos exemplars joves a la fullaraca. Làmines encara blanques per dins.



En el seu punt

Jove, blanc i tancat com un ou allargat: és el moment de collir-lo.



Vell

Comença a obrir-se i la vora es torna negra: ja no el cullis.



Passat

Del tot desfet en una pasta negra. Així acaba sempre, en poques hores.

Pet de llop: tallat, el color de dins mana



Jove

Grup de joves, blancs i ferms.




De prop

Talla'l de dalt a baix: per dins ha de ser BLANC i compacte.



Vell

Obert per dalt: ja treu les espores com un fum.



Vell

Vell: per dins s'ha tornat marró i en pols.

Cep: el millor és el jove




Jove

Joves, rodons com taps de suro: són els més ferms i els millors.



En el seu punt

En el seu punt: barret marró, carnós, i peu gruixut i clar.



Vell

Vell: porus verd oliva i tous com una esponja. Deixa'l al bosc.



Passat

Rosegat i amb forats: dins hi haurà cucs.

Rovelló: del taronja al verd




Jove

Jove i ferm, amb la vora encara corbada cap avall.



En el seu punt

En el seu punt: barret taronja amb cercles més foscos.



Vell

Vell: tot tacat de verd i rovell, tou. Deixa'l.

Camperol: les làmines marquen l'edat




Jove

Jove: rodó i blanc, entre l'herba del prat. Gira'l per veure les làmines.



En el seu punt

En el seu punt: barret blanc i làmines rosades.



Vell

Vell: làmines marró xocolata, gairebé negres, i carn tova. Deixa'l.

Fredolic: de petit i ferm a esquinçat



Jove

Jove i petit: cap a la cistella sencer.



En el seu punt

En el seu punt: grisos, petits i en grup sota els pins.



Vell

Vell: barret pla, esquinçat i ennegrit. Deixa'l.



Passat

Tou, brut i descompost: no el cullis.

Senyals que un bolet està passat



Porus verds i tous

En els boletus, una esponja verdosa que s'enfonsa amb el dit vol dir que és vell.



Forats i rosegades

Llimacs i cucs: si per fora està foradat, per dins també.



Negre i desfet

Làmines que es tornen negres i líquides: el bolet de tinta ja no serveix.



Per dins marró o en pols

Un pet de llop que per dins no és blanc ja no es menja.



Descolorit

Els colors s'apaguen i el bolet ja no es reconeix bé.



Esquinçat i ennegrit

Vores trencades, taques fosques i carn tova.

Massa petit o tancat? Un bolet molt jove encara no mostra els trets que el diferencien. I recorda: un "ou" blanc al bosc pot ser una farinera borda. No cullis mai ous tancats.

Capítol 4

Quan sortir: la pluja i els dies

Els bolets no surten el dia que plou, sinó dies després. Cada espècie triga una mica diferent: uns apareixen en una setmana i d'altres es fan esperar tres. Aquí tens el millor moment per anar a buscar cada comestible.

Una pluja de debò

Compta amb 20–30 litres per m² en un o dos dies, o diverses pluges suaus seguides. Quatre gotes no fan sortir res: la terra ha de quedar xopa.

Comença a comptar quan para

Els dies d'aquesta secció van des que acaba la pluja forta. Si torna a ploure, el compte s'allarga.

Ni massa calor ni gelades

Amb temperatures suaus (10–20 °C) surten bé. Vent sec, sol fort o una gelada els paren en sec.

Una segona onada

Si plou de nou 2–3 setmanes després, molts tornen a sortir. Torna al mateix lloc.

De pressa

3–10 dies després de la pluja



Bolet de tinta

3–6 dies · millor el dia 4



Surt de pressa a prats i vorades, amb humitat. Cull-lo tancat i cuina'l el mateix dia.

Temporada: abr–maig i set–nov · fitxa →



Cama-sec

3–7 dies · millor el dia 5



Pluges suaus de primavera i tardor. Quan s'asseca, reviu amb la pluja següent.

Temporada: abr–juny i set–nov · fitxa →



Camperol

4–8 dies · millor el dia 6

0 10 20 30 dies

Prats i clarianes amb pluja i temperatura suau.

Temporada: maig–juny i set–nov · fitxa →



Pet de llop

5–9 dies · millor el dia 7

0 10 20 30 dies

Sol sortir en grups després de pluges tèbies.

Temporada: jul–nov · fitxa →



Apagallums

5–10 dies · millor el dia 7

0 10 20 30 dies

Clarianes i marges. Creix de pressa: en dos dies passa de tancat a obert.

Temporada: ag–nov · fitxa →

Una setmana o dues 7–16 dies després de la pluja



Molleric

7–12 dies · millor el dia 9

0 10 20 30 dies

Pinedes. Surt aviat i en quantitat, però també es fa vell de pressa.

Temporada: set–nov · fitxa →



Bola de neu

7–12 dies · millor el dia 9

0 10 20 30 dies

Prats i ombra de les arbredes, amb pluges de tardor.

Temporada: juny–nov · fitxa →



Llora i carbonera

7–12 dies · millor el dia 9



Boscos de caducifolis. Vol calor: surt a final d'estiu i principi de tardor.

Temporada: juny–oct · fitxa →



Gírgoles

7–14 dies · millor el dia 10



La d'olm i la de panical surten després de pluges, a primavera i tardor, amb fred suau.

Temporada: oct–des · fitxa →



Farinera

7–14 dies · millor el dia 10



Vol calor humida: surt després de tempestes d'estiu i setembre.

Temporada: set–nov · fitxa →




Ou de reig

8–14 dies · millor el dia 11




Necessita calor i pluja: agost–octubre. Amb fred no surt.

Temporada: ag–oct · fitxa →




Cep

8–14 dies · millor el dia 10



Els de tardor 10–14 dies; els d'estiu, amb calor, 7–10. Si fa fred, tarden més.

Temporada: ag–nov · fitxa →



Carlet

10–16 dies · millor el dia 12



Pinedes humides, a mitjan tardor.

Temporada: oct–des · fitxa →

Els que fan esperar 10–25 dies després de la pluja



Rovelló i pinetell

10–18 dies · millor el dia 14



Pinedes. Les pluges d'octubre són les bones; si fa fred, tarda més.

Temporada: set–nov · fitxa →



Rossinyol

10–18 dies · millor el dia 13



Estiu i tardor, amb humitat mantinguda. Un cop surt, en fa durant setmanes.

Temporada: juny–nov · fitxa →



Llengua de bou

10–20 dies · millor el dia 14



Boscos de fulla caduca i pins. Aguanta bé les primeres fredors.

Temporada: set–des · fitxa →



Cama de perdiu

10–20 dies · millor el dia 14



Pinedes, ben entrada la tardor.

Temporada: set–des · fitxa →



Fredolic

12–20 dies · millor el dia 15



Amb els primers freds de novembre. Aguanta fins i tot amb tramuntana.

Temporada: oct–des · fitxa →



Trompeta de la mort

15–25 dies · millor el dia 20

0 10 20 30 dies

Boscos humits i ombrívols. Necessita setmanes d'humitat, no només un ruixat.

Temporada: ag–nov · fitxa →



Camagroc

15–25 dies · millor el dia 20

0 10 20 30 dies

Novembre i desembre, amb molta humitat. Aguanta bé el fred suau.

Temporada: oct–des · fitxa →



Llenega negra

15–25 dies · millor el dia 20

0 10 20 30 dies

Final de tardor, amb fred i humitat.

Temporada: set–nov · fitxa →



Pimpinella morada

15–25 dies · millor el dia 20

0 10 20 30 dies

Últim bolet de l'any: surt amb fred i fullaraca humida, fins i tot a l'hivern.

Temporada: oct–des · fitxa →

Són dies orientatius. Canvien segons l'altitud, el sòl, l'orientació i l'any. A l'ombra i a més alçada tarden més. Pregunta sempre a la gent del lloc. I recorda: els bolets tòxics surten els mateixos dies que els bons, així que el calendari no et diu mai si un bolet es pot menjar.

Capítol 5

Colors que canvien

Molts bolets canvien de color quan els talles, quan els toques o quan envelleixen. Alguns canvis són normals; d'altres són un avís clar.



Llet que es torna groga

Pinetell bord. Llet blanca que es torna groga en pocs segons.

Tòxic: deixa'l

Lactaris de llet blanca · fitxa →



Taques verdes

El rovelló es taca de verd on es toca o quan és vell.

Normal en el rovelló

Rovelló i pinetell · fitxa →



Carn que es torna blava

Molts boletus de porus vermells blavegen en tallar-los.

Senyal per deixar-lo

Matagent · fitxa →



Groc canari en rascar

La base de la bola de neu pudent es torna groga a l'instant.

Tòxic: deixa'l

Bola de neu pudent · fitxa →



Per dins negre

Una bola que per dins és negra o violàcia és un escleroderma.

Tòxic: deixa'l

Escleroderma · fitxa →



Volva taronja

Una amanita blanca amb la volva taronja és Amanita proxima.

Danya els ronyons

Amanita proxima · fitxa →



Es desfà en tinta

Bolet de tinta i bolet de femer: de vells, negres i líquids.

Massa vell

Bolet de tinta · fitxa →



Taques marrons en tocar-lo

Les làmines del paxil enrotllat es tornen marrons on les toques.

Perillós

Paxil enrotllat · fitxa →



Làmines rosa que passen a xocolata

El camperol jove té làmines rosa; el vell, marró fosc.

Indica l'edat

Camperol · fitxa →



Làmines que passen a rosa salmó

El fals carlet té làmines rosades d'adult.

Tòxic: deixa'l

Fals carlet · fitxa →



Perd el violeta

La pimpinella morada es torna marró rosada amb l'edat.

Més difícil de reconèixer

Pimpinella morada · fitxa →



Perd les berrugues

La pluja pot rentar les berrugues blanques del reig bord.

Ara sembla un ou de reig!

Reig bord · fitxa →



Carn que es torna vinosa

La carn taronja de la cama de perdiu es torna color vi en coure-la.

Normal en la cama de perdiu

Cama de perdiu · fitxa →



S'asseca i reviu

El cama-sec s'asseca al sol i torna a inflar-se amb la pluja.

Normal en el cama-sec

Cama-sec · fitxa →

Capítol 6

El llibre dels bolets

Una fitxa per bolet, amb fotos de cada edat. Toca un nom per anar a la seva fitxa.

Els fàcils

Rovelló i pinetell **Trompeta de la mort** **Camagroc** **Llengua de bou** **Molleric** **Bolet de tinta**

Compte, que tenen bessó

Cep **Rossinyol** **Fredolic** **Llenega negra** **Carlet** **Cama-sec** **Apagallums** **Gírgoles** **Cama de perdiu** **Pet de llop**

Només amb experts

Ou de reig **Llora i carbonera** **Pimpinella morada** **Camperol** **Bola de neu** **Farinera**

Els mortals

Farinera borda **Farinera pudent** **Lepiotes petites** **Galerina marginada** **Cortinari metzinós** **Paxil enrotllat**

Els tòxics

Reig bord **Pixacà** **Amanita proxima** **Fredolic metzinós** **Fals carlet** **Gírgola d'olivera** **Lactaris de llet blanca** **Matagent** **Escleroderma** **Clitocibes blancs** **Inocybe** **Verderol** **Bola de neu pudent** **Bolet de femer** **Peu de rata bord** **Escaldabecs**

No valen la pena

Rossinyol ataronjat **Molleric amarg** **Paloma vermellosa**

Capítol I

Els fàcils

Nivell 1. Bolets amb un tret inconfusible i sense bessons perillosos. Per aquí comença tot boletaire.






Rovelló i pinetell · 4 | Trompeta de la mort · 5 | Camagroc · 6 | Llen

RUSSULALS

Lactarius sanguifluus · L. deliciosus



En el seu punt: barret taronja amb cercles més foscos.

Rovelló i pinetell

També: esclata-sang, vinader

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●○○ Nivell 1 · Fàcil

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

És el bolet més buscat de Catalunya. Després de les pluges d'octubre, busca taques taronja sota la pinassa: si en tallar-lo en surt llet taronja o vermella, ja el tens.

TRUC CLAU

Talla'l pel peu: si la llet és taronja o vermella, és del grup del rovelló. Si és blanca, fora.

COMPROVA-HO ABANS DE COLLIR-LO

1. Trenca'l o talla'l: ha de sortir llet taronja o vermell vi, mai blanca.
2. Espera uns minuts: la zona tallada es torna verda.
3. Mira el peu: taronja, buit per dins i sovint amb clotets més foscos.
4. Mira les làmines: taronja o color vi, mai blanques ni crema.
5. Mira on és: sota pins, sempre.

Després de la pluja: surt entre 10 i 18 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 14.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–15 cm, convex i després en embut, taronja, sovint amb cercles concèntrics més foscos; es taca de verd. Els cercles no sempre hi són: el rovelló (L. sanguifluus) en pot tenir pocs o cap.
A sota	Làmines atapeïdes, taronja (color vi en el rovelló), que baixen una mica pel peu i es taquen de verd.
Peu	Curt, gruixut i buit, taronja, sovint amb clotets més foscos.
Carn	Trencadissa com un guix. Treu llet taronja pastanaga o vermell vi que verdeja.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA




Jove

Jove i ferm, amb la vora encara corbada cap avall.




En el seu punt

En el seu punt: barret taronja amb cercles més foscos.



Vell

Vell: tot tacat de verd i rovell, tou. Deixa'l.



Passat

Passat i descompost: ni el toquis.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Gira'l: làmines taronja atapeïdes i peu amb clotets més foscos.



DE PROP

Els clotets taronja del peu (escrobícules), típics del pinetell.



DE PROP

Làmines de color vi: rovelló de llet vermella (L. sanguifluus o L. vinosus).



CANVI DE COLOR

Taques verdes al barret: és normal, no vol dir que estigui fet malbé.

CONFUSIONS PERILLOSES



Lactaris de llet blanca (bolet de cabra, pinetell bord, enganyapastors): llet blanca. L'enganyapastors (L. zonarius) té cercles com el rovelló. Tòxics.

Fitxa: Lactaris de llet blanca →



Rússules taronges o vermelles: no fan llet, tenen el peu blanc i llis i es trenquen com un guix. Es confonen amb un rovelló sense cercles.

Fitxa: Escaldabecs →



Paxil enrotllat: no fa llet i es taca de marró. Perillós.

Fitxa: Paxil enrotllat →

ON VIU

Pinedes de pi pinyer, pi blanc i pi roig, des de la costa fins al Pirineu. Sovint mig amagat sota la pinassa.

D'ON VE EL NOM

Lactarius, de lac (llet): treu llet en tallar-lo. Deliciosus, deliciós; sanguifluus, que vessa sang.

CONSELL

Si no compleix les cinc comprovacions, no te l'enduguis: els cercles del barret no serveixen per decidir. El nom canvia segons la comarca: a molts llocs 'rovelló' és L. sanguifluus i 'pinetell' L. deliciosus, i a d'altres al revés. Fixa't en la llet. Poden tenyir l'orina de vermell: és normal i no fa mal.

CANTHAREL·LALS

Craterellus cornucopioides



En el seu punt: negres, ferms i en grup.

Trompeta de la mort

També: trompeta negra, orella d'ase

● COMESTIBLE · MOLT BO ●○○ Nivell 1 · Fàcil

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Plecs o llis

Negra com el carbó i amagada entre les fulles seques. Costa de veure la primera; quan la trobes, mira al voltant, perquè mai va sola.

> **TRUC CLAU**
> Un embut negre i buit sense làmines: cap bolet tòxic s'hi assembla.

Després de la pluja: surt entre 15 i 25 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 20.

DESCRIPCIÓ

Barret	Trompeta o embut de 3–10 cm, buit fins a la base, negre o gris fosc, amb la vora ondulada.
A sota	Per fora és llisa o una mica arrugada, gris cendra. Sense làmines.
Peu	No en té de diferenciat: tot el bolet és un tub buit que s'estreny cap a baix.
Carn	Prima, elàstica i fosca, amb olor agradable.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Joves entre la molsa, amb la vora encara regular.



En el seu punt

En el seu punt: negres, ferms i en grup.



Vell

Vella: es torna marró grisenca, tova i esquinçada.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Mira per dins: és buida fins a baix, com una trompeta.



DE PROP

Per fora és grisa i llisa, sense làmines.



ON VIU

Així la trobaràs: camuflada entre les fulles seques.



A LA CISTELLA

Una bona collita a la cistella de vímet.

CONFUSIONS PERILLOSES

Trompeta grisa (Craterellus cinereus): té plecs per fora. També comestible.

ON VIU

Rouredes, castanyedes i fagedes humides, entre la fullaraca.

D'ON VE EL NOM

Craterellus, petita copa; cornucopioides, en forma de corn de l'abundància.

CONSELL

S'asseca molt bé i en pols perfuma arrossos i salses.

CANTHAREL·LALS

Craterellus lutescens



En el seu punt: peus grocs i barrets marrons, en grup entre la molsa.

Camagroc

● COMESTIBLE · MOLT BO ●○○ Nivell 1 · Fàcil

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: oct–des

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Plecs o llis

Quan les pinedes es tornen humides i fredes, el terra s'omple de peus grocs. On n'hi ha un, n'hi ha cent.

TRUC CLAU

Peu groc i buit + barret marró en embut + sense làmines = camagroc.

Després de la pluja: surt entre 15 i 25 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 20.

DESCRIPCIÓ

Barret	2–6 cm, en embut, marró fosc i amb la vora ondulada.
A sota	Llisa o amb plecs suaus i baixos, de color salmó groguenc. Sense làmines.
Peu	Groc taronja intens, buit i sovint aplanat.
Carn	Prima i elàstica. Olor afruitada.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA




Jove

Jove: barret petit i arrodonit, peu groc intens.



En el seu punt

En el seu punt: peus grocs i barrets marrons, en grup entre la molsa.



Vell

Vell: barret fosc, tou i arrugat. Deixa'l.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota no té làmines: és llis o amb plecs suaus i pàl·lids.



DE PROP

Peu groc i buit per dins.



ON VIU

Surt en colònies grans a les pinedes humides.



A LA CISTELLA

Camagrocs a la cistella.

CONFUSIONS PERILLOSES

Camagroc gris (Craterellus tubaeformis): plecs més marcats i peu més apagat. També comestible.



Rossinyol ataronjat: té làmines de veritat i és tot taronja.
Fitxa: Rossinyol ataronjat →

ON VIU

Pinedes humides amb molsa, sovint a prop de rierols i a l'obaga. Surt en colònies grans.

D'ON VE EL NOM

Craterellus, petita copa; lutescens, que tira a groc, pel color del peu.

CONSELL

És dels millors per assecar.

CANTHAREL·LALS

Hydnum repandum



En el seu punt: barret crema, carnós i irregular.

Llengua de bou

També: llémena

● COMESTIBLE · BO ●○○ Nivell 1 · Fàcil

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–des

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Agullons

Gira'l i sorpresa: en lloc de làmines té punxetes toves, com la llengua d'un gat. És dels més fàcils de reconèixer.

TRUC CLAU

Gira'l: si a sota hi ha punxetes, és de la família de la llengua de bou. Cap bolet amb agullons és mortal.

Després de la pluja: surt entre 10 i 20 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 14.

DESCRIPCIÓ

Barret	4–12 cm, irregular i gruixut, color crema, carn o ataronjat pàl·lid.
A sota	Agullons tous i fràgils, del mateix color, que baixen una mica pel peu.
Peu	Curt, gruixut, blanquinós, sovint descentrat.
Carn	Blanca, ferma i trencadissa. Amarga en els exemplars vells.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: petit, ferm i blanquinós.



En el seu punt

En el seu punt: barret crema, carnós i irregular.



Vell

Gran i vell: es taca de groc taronja i amarga.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota té agullons (punxetes toves), no làmines.



DE PROP

Agullons i peu blanc, curt i gruixut.



ON VIU

També surt a les pinedes, entre la pinassa.

CONFUSIONS PERILLOSES

Sarcodon i Hydnellum (barret escatós o surat): amargs i durs, no comestibles.

ON VIU

Alzinars, rouredes, fagedes i pinedes. Sovint en rotllanes.

D'ON VE EL NOM

Hydnum, nom grec d'un bolet comestible; repandum, amb la vora ondulada i girada.

CONSELL

La llengua de bou blanca (Hydnum albidum) també és comestible. Els exemplars grans amarguen: cull-los joves.



En el seu punt: barret marró brillant, peu groguenc, en grup sota els pins.

Molleric

També: pinetell de calceta (S. luteus)

● COMESTIBLE · ACCEPTABLE ●○○ Nivell 1 · Fàcil

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Porus

Un bolet de pineda amb una esponja groga a sota i el barret enganxós. No és el més fi, però és fàcil i abundant.

TRUC CLAU

Bolet amb esponja groga a sota i barret enganxós, sota pins.

Després de la pluja: surt entre 7 i 12 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 9.

DESCRIPCIÓ

Barret	4–10 cm, marró groguenc o rogenc, llefiscós i brillant quan és humit; la pell es pela.
A sota	Porus petits i grocs que en els joves deixen anar gotetes blanques.
Peu	Groc pàl·lid amb granulacions; sense anell (el pinetell de calceta en té).
Carn	Groga pàl·lida i tova, no canvia de color.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: barret arrodonit i ferm. El millor moment.



En el seu punt

En el seu punt: barret marró brillant, peu groguenc, en grup sota els pins.



Vell

Vell: porus grans, verdosos i tous com una esponja mullada.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Porus grocs amb gotetes blanques: típic del molleric jove.



DE PROP

A sota té porus (com una esponja), no làmines.



DE PROP

Pinetell de calceta (S. luteus): té un anell al peu.



ON VIU

Sempre a prop de pins: aquí, al costat d'una pinya.

CONFUSIONS PERILLOSES



Boletus de porus vermells (matagent): descarta'ls tots.

Fitxa: Matagent →



Molleric amarg: porus rosats i gust molt amarg.

Fitxa: Molleric amarg →

ON VIU

Pinedes, sovint en grans quantitats després de les pluges.

D'ON VE EL NOM

Suillus, de sus (porc), per la textura greixosa; granulatus, amb granets al peu.

CONSELL

Pela el barret i treu els porus. A algunes persones els fa efecte laxant.

AGARICALS

Coprinus comatus



Jove, blanc i tancat com un ou allargat: és el moment de collir-lo.

Bolet de tinta

● COMESTIBLE · MOLT BO (JOVE) ●○○ Nivell 1 · Fàcil

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: abr–maig i set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

Surt blanc com un ou allargat i en poques hores es desfà en tinta negra. Cal ser ràpid: només és bo quan està ben blanc.

> **TRUC CLAU**
> Cull-lo només amb les làmines totalment blanques i cuina'l el mateix dia.

Després de la pluja: surt entre 3 i 6 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 4.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–15 cm d'alt, cilíndric com un ou allargat, blanc amb escates llanoses; la vora es torna negra.
A sota	Làmines molt atapeïdes, blanques, després rosades i finalment negres i líquides.
Peu	Alt, blanc i buit, amb un anell petit que es mou.
Carn	Blanca i tendra; es desfà en tinta en poques hores.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA




Jove

Dos exemplars joves a la fullaraca. Làmines encara blanques per dins.



En el seu punt

Jove, blanc i tancat com un ou allargat: és el moment de collir-lo.



Vell

Comença a obrir-se i la vora es torna negra: ja no el cullis.



Vell

Barret obert amb la vora negra: s'està desfent en tinta.



Passat

Del tot desfet en una pasta negra. Així acaba sempre, en poques hores.

MIRA'L DE PROP



CANVI DE COLOR

Al costat: un de vell (negre) i un de jove (blanc). La diferència d'un sol dia.



ON VIU

Surt en prats, marges i clarianes, sovint en grups.

CONFUSIONS PERILLOSES



Bolet de femer: gris i sense escates. Tòxic amb alcohol.

Fitxa: Bolet de femer →

ON VIU

Prats, marges de camins i terres remogudes, sovint en grups.

D'ON VE EL NOM

Coprinus, de kopros (fems), perquè surt en llocs adobats; comatus, amb cabellera, per les escates.

CONSELL

Es fa malbé en poques hores: no aguanta ni a la nevera.

Capítol II

Compte, que tenen bessó

Nivell 2. Bolets bons amb un bessó tòxic. Cada exemplar s'ha de comprovar amb dos o tres trets.









Cep · 11 | Rossinyol · 12 | Fredolic · 13 | Llenega negra · 14 | Carl

Boletus edulis · B. aereus · B. pinophilus



En el seu punt: barret marró, carnós, i peu gruixut i clar.

Cep

També: sureny, sureny fosc (B. aereus)

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Porus

El tresor de les fagedes i rouredes: gros, carnós i perfumat. Abans de collir-lo, gira'l i mira el color dels porus.

TRUC CLAU

Porus blancs o grocs + carn blanca que no blaveja + xarxa clara al peu.

Després de la pluja: surt entre 8 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 10.

DESCRIPCIÓ

Barret	8–25 cm, marró (de crema a gairebé negre), carnós i llis.
A sota	Porus blancs de jove, després grocs i finalment verd oliva. No canvien de color en tocar-los.
Peu	Molt gruixut i panxut, clar, amb una xarxa fina blanquinosa a dalt.
Carn	Blanca i ferma, no canvia en tallar-la. Gust de nou.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA




Jove

Joves, rodons com taps de suro: són els més ferms i els millors.




En el seu punt

En el seu punt: barret marró, carnós, i peu gruixut i clar.



Vell

Vell: porus verd oliva i tous com una esponja. Deixa'l al bosc.



Passat

Rosegat i amb forats: dins hi haurà cucs.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Jove: porus blancs, com cotó. Carn ferma.



DE PROP

Adult: els porus ja són groguencs. Encara és bo si està ferm.



DE PROP

Peu gruixut amb una xarxa fina de color clar.



DE PROP

Sureny fosc (B. aereus): barret gairebé negre. També excel·lent.

CONFUSIONS PERILLOSES



Molleric amarg: porus rosats i xarxa fosca al peu. Molt amarg.

Fitxa: Molleric amarg →



Matagent: porus vermells i carn que blaveja. Tòxic.

Fitxa: Matagent →

ON VIU

Fagedes, rouredes, castanyedes, suredes i pinedes de muntanya.

D'ON VE EL NOM

Boletus, nom llatí dels bolets més apreciats; edulis, comestible; aereus, color de bronze.

CONSELL

És el bolet amb més cucs: talla'l allà mateix i deixa els corcats.

CANTHAREL·LALS

Cantharellus cibarius



En el seu punt: tot groc rovell d'ou, carnós, amb la vora ondulada.

Rossinyol

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: juny–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Plecs o llis

Groc com un rovell d'ou i amb olor d'albercoc. El secret és passar-hi el dit per sota: no té làmines, té plecs.

TRUC CLAU

Passa-hi el dit: els plecs del rossinyol són gruixuts i arrodonits, no làmines fines com pàgines d'un llibre.

Després de la pluja: surt entre 10 i 18 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 13.

DESCRIPCIÓ

Barret	3–10 cm, groc rovell d'ou, primer convex i després en embut, amb la vora ondulada.
A sota	Plecs gruixuts, baixos i bifurcats, del mateix color, que baixen pel peu. No són làmines.
Peu	Ple, ferm, del mateix groc, que s'aprima cap a baix.
Carn	Blanca o groguenca, ferma, s'esfila com el pollastre. Olor d'albercoc.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: petit, ferm i encara amb el barret arrodonit.



En el seu punt

En el seu punt: tot groc rovell d'ou, carnós, amb la vora ondulada.



Vell

Vell: taques fosques i vora esquinçada. Millor deixar-lo.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: plecs gruixuts i bifurcats que baixen pel peu. No són làmines.



DE PROP

De prop: els plecs són baixos i arrodonits, com venes.



DE PROP

De perfil: forma d'embut i plecs fins al peu.



ON VIU


Creix a terra, entre la molsa i la fullaraca. Mai sobre fusta.

CONFUSIONS PERILLOSES



Gírgola d'olivera: taronja intens, làmines fines, en grups sobre soques. Tòxica.

Fitxa: Gírgola d'olivera →



Rossinyol ataronjat: làmines fines i toves, carn tova.

Fitxa: Rossinyol ataronjat →

ON VIU

Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes en sòls àcids; també pinedes. Sempre a terra.

D'ON VE EL NOM

Cantharellus, de kantharos (copa); cibarius, bo per menjar.

Tricholoma terreum



En el seu punt: grisos, petits i en grup sota els pins.

Fredolic

També: negret, brunet

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: oct–des

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

Arriba amb el fred, quan ja no surt gairebé res: petits, grisos i a dotzenes sota els pins. Mira'ls un per un.

TRUC CLAU

Petit, gris, sec al tacte, sense olor i a dotzenes sota els pins quan fa fred.

Després de la pluja: surt entre 12 i 20 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 15.

DESCRIPCIÓ

Barret	3–7 cm, cònic i després pla amb un mamelló, gris ratolí, sec i fibrós com un feltre.
A sota	Làmines blanquinoses o grisenques, separades, amb una osca a tocar del peu.
Peu	Blanc, prim, fràgil i buit, sense anell.
Carn	Prima, blanca o grisenca, gairebé sense olor ni gust.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove i petit: cap a la cistella sencer.



En el seu punt

En el seu punt: grisos, petits i en grup sota els pins.



Vell

Vell: barret pla, esquinçat i ennegrit. Deixa'l.



Passat

Tou, brut i descompost: no el cullis.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines blanquinoses o grisenques i peu blanc.



DE PROP

Barret gris ratolí, sec i com de feltre.



ON VIU


Entre la pinassa, quan comença a fer fred.

CONFUSIONS PERILLOSES



Fredolic metzinós: més gros, escates en cercles, olor de farina, peu ple. Tòxic.

Fitxa: Fredolic metzinós →



Inocybe grisos: barret cònic i esquerdat. Tòxics.

Fitxa: Inocybe →

ON VIU

Pinedes, en grups molt nombrosos. Surt tard, amb les primeres glaçades.

D'ON VE EL NOM

Tricholoma, de thrix (pèl) i loma (vora), per la vora fibrosa; terreum, color de terra.

CONSELL

Com que se'n cullen molts de cop, és fàcil que se n'hi coli un d'una altra espècie. Els fredolics amargs (T. virgatum) tenen el barret punxegut i ratllat.

Hygrophorus latitabundus



En el seu punt: barret marró oliva, brillant i llefiscós.

Llenega negra

També: mocosa, bavós

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

Llefiscosa com un sabó i amb làmines blanques com la cera. Cada any torna a sortir al mateix racó de la pineda.

TRUC CLAU

Si et rellisca dels dits com un sabó i té làmines blanques i ceroses, és una llenega.

Després de la pluja: surt entre 15 i 25 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 20.

DESCRIPCIÓ

Barret	6–12 cm, marró oliva fosc, més fosc al centre, cobert d'una mucositat molt llefiscosa.
A sota	Làmines blanques, gruixudes, separades i ceroses, que baixen una mica pel peu.
Peu	Gruixut, blanc a dalt i llefiscós a la part de baix.
Carn	Blanca i ferma, amb olor suau.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: barret arrodonit i ferm, ple de mucositat.



En el seu punt

En el seu punt: barret marró oliva, brillant i llefiscós.



Vell

Vell: barret pla, tou i amb taques. Deixa'l.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines blanques, gruixudes i separades, com de cera.



DE PROP

Làmines blanques i peu blanc amb puntets.



ON VIU

Sota la pinassa, sovint a la mateixa rodona cada any.



A LA CISTELLA

Llenegues tallades a la cistella: el peu net, sense terra.

CONFUSIONS PERILLOSES

Llenega blanca (Hygrophorus eburneus): tota blanca i llefiscosa. Es pot confondre amb bolets blancs tòxics.



Cortinaris: cortina i làmines color rovell.
Fitxa: Cortinari metzinós →

ON VIU

Pinedes, sobretot de pinassa i pi roig, en sòls calcaris.

D'ON VE EL NOM

Hygrophorus, que porta humitat; latitabundus, que s'amaga, perquè surt mig colgat.

CONSELL

Treu-li la pell del barret: és indigesta i pot amargar.

Hygrophorus russula



En el seu punt: barrets rosats amb esquitxos de vi, ferms.

Carlet

També: escarlet

COMESTIBLE · MOLT BO ●●○ **Nivell 2 · Compte**

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: oct–des

Bosc de fulla **Unit als arbres** **Sota: Làmines**

Tacat de vi i molt ferm, surt en grups grans sota les alzines quan la tardor ja va de baixada.

TRUC CLAU

Làmines blanques tacades de vi + bosc d'alzines a finals de tardor.

Després de la pluja: surt entre 10 i 16 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 12.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–12 cm, carnós, rosat vinós amb esquitxos més foscos.
A sota	Làmines blanques que es taquen de vi, gruixudes, que baixen una mica pel peu.
Peu	Gruixut, ple, blanc tacat de vinós.
Carn	Blanca, molt compacta, una mica amarga.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Joves: més pàl·lids, amb la vora corbada.



En el seu punt

En el seu punt: barrets rosats amb esquitxos de vi, ferms.



Vell

Vell: trencat, tou i ple de taques. Deixa'l.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines blanques que es taquen de rosa vi.



DE PROP

Làmines que baixen una mica pel peu, i peu blanc tacat.



DE PROP

Barret amb esquitxos vinosos, més fosc al centre.



ON VIU

Surt en grups ('escarleteres') sota alzines i roures.

CONFUSIONS PERILLOSES



Fals carlet: làmines rosades i olor de farina rància. Tòxic fort.

Fitxa: Fals carlet →

ON VIU

Alzinars i rouredes, en grups grans ('escarleteres') i rotllanes.

D'ON VE EL NOM

Russula, vermellós: s'*assembla a una rússula vermella.*

CONSELL

Tradicionalment es conserva en sal, vinagre o oli.

Marasmius oreades



En el seu punt: color cuir, ferms, en grup entre l'herba.

Cama-sec

També: carrereta

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: abr–juny i set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

Un bolet petit de prat que fa rotllanes. El seu truc: el peu es retorça com un cordill sense trencar-se.

TRUC CLAU

Retorça el peu dues voltes: el cama-sec no es trenca. Després mira que les làmines siguin molt separades.

Després de la pluja: surt entre 3 i 7 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 5.

DESCRIPCIÓ

Barret	2–5 cm, color cuir o crema, amb un mamelló; s'aclareix en assecar-se.
A sota	Làmines molt separades, crema, que no baixen pel peu.
Peu	Prim, dur i elàstic: es retorça sense trencar-se.
Carn	Prima i blanca, olor suau d'ametlla amarga.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Joves: barret arrodonit amb mamelló.



En el seu punt

En el seu punt: color cuir, ferms, en grup entre l'herba.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

La clau: làmines MOLT separades, color crema.



DE PROP

Làmines separades que no baixen pel peu.



DE PROP

Peu prim, dur i elàstic: es retorça sense trencar-se.



ON VIU

Surt als prats, sovint formant rotllanes.



CANVI DE COLOR

S'asseca sol i es reviu amb l'aigua:
d'aquí el nom de cama-sec.

CONFUSIONS PERILLOSES



Clitocibes blancs: làmines atapeïdes que baixen pel peu. Tòxics, i surten als mateixos prats.
Fitxa: Clitocibes blancs →



Inocybe: barret cònic i esquerdat. Tòxics.
Fitxa: Inocybe →

ON VIU

Prats, pastures i marges de camins.

D'ON VE EL NOM

Marasmius, de marasmos (assecar-se), perquè s'asseca i reviu; oreades, les nimfes de les muntanyes.

CONSELL

Cull-los d'un en un i revisa cada exemplar. Menja només el barret.

Macrolepiota procera



En el seu punt: barret obert i gran, peu alt i prim.

Apagallums

També: paloma, cogomassa

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Prats · Bosc de fulla · Pinedes

Descompon matèria morta · Sota: Làmines

El gegant dels marges i les clarianes: un para-sol amb el peu de pell de serp. Només el culliràs si és ben gran.

TRUC CLAU

Regla dels 15 cm: si el barret obert no fa almenys 15 cm, no el cullis.

Després de la pluja: surt entre 5 i 10 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 7.

DESCRIPCIÓ

Barret	15–30 cm, primer com una baqueta de timbal i després obert com un para-sol, amb escates marrons i un mamelló fosc.
A sota	Làmines blanques, lliures i atapeïdes.
Peu	Alt, prim i buit, amb dibuix de pell de serp i base bulbosa sense volva. Anell doble que llisca.
Carn	Blanca, tendra al barret i fibrosa al peu. Olor de nou.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove i tancat (baqueta de timbal): espera que s'obri per comprovar la mida.



En el seu punt

En el seu punt: barret obert i gran, peu alt i prim.



Vell

Vell: barret girat cap amunt, tou i fosc. Deixa'l.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Peu amb dibuix de pell de serp: la marca de l'apagallums.



DE PROP

A sota: làmines blanques i anell gruixut que es mou.



DE PROP

Compara la mida amb la moneda: com a mínim 15 cm.



ON VIU

Clarianes i marges de camins, sobre la fullaraca.

CONFUSIONS PERILLOSES



Lepiotes petites: menys de 8 cm, anell fràgil. MORTALS.

Fitxa: Lepiotes petites →



Paloma vermellosa: peu llis i carn que es torna vermella.

Fitxa: Paloma vermellosa →

ON VIU

Clarianes, marges de camins, prats i boscos aclarits.

D'ON VE EL NOM

Macrolepiota, lepiota gran (lepis, escata); procera, alta i esvelta.

CONSELL

Menja només el barret, sempre ben cuinat.

AGARICALS

Pleurotus eryngii · P. ostreatus



Gírgola de panical en el seu punt: barret marró, carnós, i làmines que baixen pel peu.

Gírgoles

Gírgola de panical i orellana o gírgola de soca

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: oct–des

Prats · Sobre fusta · Viu sobre plantes o bolets

Sota: Làmines

La de panical neix als camps, enganxada a les arrels d'un card sec. La de soca, en pisos sobre els troncs.

> **TRUC CLAU**
> La de panical neix de les arrels d'un panical; la de soca creix sobre fusta i mai és taronja.

Després de la pluja: surt entre 7 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 10.

DESCRIPCIÓ

Barret	4–12 cm, marró grisenc (panical) o gris en forma d'ostra (soca), carnós, amb la vora enrotllada.
A sota	Làmines blanquinoses que baixen molt pel peu.
Peu	Curt, sovint descentrat o lateral, blanc.
Carn	Blanca, ferma i olorosa.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove, entre l'herba d'un camp.



Jove

Gírgoles de soca joves, sortint de l'escorça.



En el seu punt

Gírgola de panical en el seu punt: barret marró, carnós, i làmines que baixen pel peu.



Vell

Vella: esquinçada i tova. Deixa-la.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines blanquinoses que baixen molt pel peu.



DE PROP

Barret i làmines: el peu sovint surt descentrat.



ON VIU

Gírgola de soca (orellana): en pisos sobre troncs tallats.

CONFUSIONS PERILLOSES



Gírgola d'olivera: taronja intens, sobre oliveres. Tòxica.

Fitxa: Gírgola d'olivera →



Clitocibes de prat: blancs i no surten del panical.

Fitxa: Clitocibes blancs →

ON VIU

La de panical, en camps i ermots, sobre les arrels del panical. La de soca, sobre troncs de plàtans, pollancres o faigs.

D'ON VE EL NOM

Pleurotus, de pleuron (costat) i ous (orella): peu lateral i forma d'orella; eryngii, de l'Eryngium (panical).

Chroogomphus rutilus



Cama de perdiu en el seu punt: barret vermellós i làmines ocre que baixen pel peu.

Cama de perdiu

● COMESTIBLE · BO ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–des

Pinedes Viu sobre plantes o bolets Sota: Làmines

A les pinedes de tardor, un bolet color de coure amb les làmines gruixudes. Quan el cuines, tenyeix el plat de color vi.

TRUC CLAU


Làmines gruixudes que baixen pel peu + carn taronja + sota pins = cama de perdiu.

Després de la pluja: surt entre 10 i 20 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 14.

DESCRIPCIÓ

Barret	4–10 cm, vermell coure o marró vinós, amb un mamelló punxegut; llefiscós quan és humit.
A sota	Làmines gruixudes i separades, ocre, que baixen molt pel peu i s'enfosqueixen fins a negre violaci.
Peu	Del color del barret, groguenc a la base, que s'aprima cap a baix.
Carn	Taronja salmó que es torna vinosa en coure-la.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



En el seu punt

Cama de perdiu en el seu punt: barret vermellós i làmines ocre que baixen pel peu.



Vell

Vella: làmines fosques per les espores negres. Deixa-la.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines gruixudes, separades, que baixen molt pel peu.



DE PROP

Carn i peu de color taronja salmó.



ON VIU

Sempre sota pins, entre la pinassa.



A LA CISTELLA


A la cistella amb altres bolets de pineda.

CONFUSIONS PERILLOSES



Cortinari metzinós: làmines color rovell que no baixen pel peu, sota roures i castanyers. MORTAL.

Fitxa: Cortinari metzinós →



Rossinyol ataronjat: làmines fines i toves, carn prima.

Fitxa: Rossinyol ataronjat →

ON VIU

Pinedes. Viu associada als pins i a les arrels dels mollerics.

D'ON VE EL NOM

Chroogomphus, de chroa (color) i gomphos (clau), per la forma de clau; rutilus, vermell brillant.

CONSELL

Les espores són negres i embruten els altres bolets: porta-la a part a la cistella.

AGARICALS

Lycoperdon perlatum



Jove, blanc i ple de berrugues: és el moment de collir-lo.

Pet de llop

● COMESTIBLE · ACCEPTABLE (JOVE) ●●○ Nivell 2 · Compte

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: jul–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Prats

Descompon matèria morta · Sota: Bola o corall

Una bola blanca coberta de perletes. Jove és bona; vella, quan la trepitges fa un núvol de pols.

TRUC CLAU

Talla'l de dalt a baix: només és bo si per dins és blanc pur i uniforme. Si hi veus la silueta d'un bolet, és un ou d'amanita. Si és negre o violaci, és un escleroderma.

Després de la pluja: surt entre 5 i 9 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 7.

DESCRIPCIÓ

Barret	Cos en forma de pera, 3–8 cm, blanc i cobert de berrugues petites com perles que es desprenen.
A sota	No té làmines ni porus: per dins és una massa blanca i compacta que es torna groga, verdosa i finalment pols marró.
Peu	Curt i ample, fa part del mateix cos.
Carn	Blanca i tova de jove; després esponjosa i en pols.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Grup de joves, blancs i ferms.




En el seu punt

Jove, blanc i ple de berrugues: és el moment de collir-lo.



Vell

Obert per dalt: ja treu les espores com un fum.



Vell

Vell: per dins s'ha tornat marró i en pols.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Talla'l de dalt a baix: per dins ha de ser BLANC i compacte.



DE PROP

Tallat: blanc i uniforme, sense cap silueta de bolet a dins.



DE PROP

De prop: berrugues com perletes que es desprenen.

CONFUSIONS PERILLOSES



Escleroderma: pell gruixuda i dura, per dins negre violaci. Tòxic.

Fitxa: Escleroderma →



Ou d'amanita: tallat, es veu el dibuix d'un bolet a dins. Pot ser MORTAL.

Fitxa: Farinera borda →

ON VIU

Tota mena de boscos, sovint entre la fullaraca i la molsa.

D'ON VE EL NOM

Lycoperdon, de lykos (llop) i perdon (pet), per la pols que treu en esclafar-lo; perlatum, ple de perles.

CONSELL

No en respiris la pols: les espores poden irritar els pulmons.


Capítol III

Només amb experts

Nivell 3. Bolets que es poden confondre amb bolets mortals. Aprèn-los, però no te'ls mengis sense una persona experta al costat.









Ou de reig · 22 | Llora i carbonera · 23 | Pimpinella morada · 24 | C

Amanita caesarea



En el seu punt: barret taronja, peu groc i volva blanca a la base.

Ou de reig

També: reig, reig ver

● COMESTIBLE · EXCEL·LENT ●●● Nivell 3 · Expert

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–oct

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

El bolet dels emperadors romans: taronja, groc i preciós. També és el que més s'assembla a un bolet mortal quan encara és un ou.

TRUC CLAU

Groc, groc, groc: làmines, anell i peu han de ser grocs. Si alguna part és blanca, llença'l.

Després de la pluja: surt entre 8 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 11.

DESCRIPCIÓ

Barret	8–20 cm, taronja vermell intens, llis, sovint amb un tros de volva blanca.
A sota	Làmines GROGUES i lliures.
Peu	Groc, amb anell groc penjant i una volva blanca en forma de sac.
Carn	Blanca, groga sota la pell. Olor suau.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA




Jove

L'ou s'obre i mostra el taronja. Només un expert el pot collir així.



En el seu punt

En el seu punt: barret taronja, peu groc i volva blanca a la base.



Vell

Vell: barret pla i descolorit. Ja no és segur identificar-lo bé.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Ou obert: per dins, làmines GROGUES i barret taronja.



DE PROP

Volva blanca gran com un sac, i làmines grogues.



DE PROP

Làmines i peu grocs. Si fossin blancs, no seria un reig.



ON VIU

Alzinars i rouredes assolellats, a final d'estiu i principi de tardor.

CONFUSIONS PERILLOSES



Reig bord: làmines i peu BLANCS. Tòxic.

Fitxa: Reig bord →



Farinera borda en fase d'ou: per fora és idèntica. MORTAL.

Fitxa: Farinera borda →

ON VIU

Alzinars, suredes, rouredes i castanyedes assolellats.

D'ON VE EL NOM

Amanita, nom grec d'uns bolets del mont Amanus; caesarea, dels cèsars, que el tenien per un menjar d'emperador.

CONSELL

No cullis mai ous tancats. Només amb una persona experta al costat.

RUSSULALS

Russula virescens · R. cyanoxantha



Llora en el seu punt: barret verd que s'esquerda en mosaic.

Llora i carbonera

També: llora verda, llores

● COMESTIBLE · MOLT BO ●●● Nivell 3 · Expert

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: juny–oct

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

Verda i esquerdada com un mosaic. És bona, però és verda com la farinera borda: només per a qui ja la coneix bé.

TRUC CLAU


Arrenca-la sencera: sense anell, sense volva i trencament com de guix. Si dubtes d'un sol tret, deixa-la.

Després de la pluja: surt entre 7 i 12 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 9.

DESCRIPCIÓ

Barret	6–14 cm, verd clapat i esquerdat en mosaic (llora) o violeta, blau i verd (carbonera).
A sota	Làmines blanques i atapeïdes; en la carbonera són flexibles i no es trenquen.
Peu	Blanc i ferm, SENSE anell i SENSE volva.
Carn	Blanca, es trenca com un guix. Gust suau.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: barret arrodonit, verd pàl·lid i ferm.



En el seu punt

Llora en el seu punt: barret verd que s'esquerda en mosaic.



Vell

Vella i rosegada: deixa-la.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines blanques i peu blanc. Ni anell ni volva.



DE PROP

Peu blanc i llis fins a baix, sense sac a la base.



DE PROP

Carbonera (R. cyanoxantha): barret violeta grisós amb tons verds.



ON VIU

Alzinars, rouredes i fagedes, entre la fullaraca.

CONFUSIONS PERILLOSES



Farinera borda: barret verd oliva, anell i volva. MORTAL.

Fitxa: Farinera borda →



Escaldabecs: barret vermell i gust molt picant.

Fitxa: Escaldabecs →

ON VIU

Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes.

D'ON VE EL NOM

Russula, vermellós (moltes ho són); virescens, que verdeja; cyanoxantha, blava i groga.



En el seu punt: tota violeta, carnosa i amb el peu gruixut.

Pimpinella morada

● COMESTIBLE · BO (SEMPRE CUINADA) ●●● Nivell 3 · Expert

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: oct–des

Pinedes · Bosc de fulla · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

Tota violeta i amb olor de fruita, apareix a final de tardor entre les fulles. Sempre cuinada, i amb l'esporada feta.

TRUC CLAU

Fes l'esporada: deixa el barret unes hores sobre paper. Rosa pàl·lid = pimpinella; marró rovell = cortinari.

Després de la pluja: surt entre 15 i 25 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 20.

DESCRIPCIÓ

Barret	6–15 cm, violeta que passa a marró lilós, llis i humit.
A sota	Làmines atapeïdes, violetes, que es tornen terroses amb l'edat.
Peu	Gruixut, violeta i fibrós, sense anell ni cortina.
Carn	Lilosa i tendra, olor afruitada.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: barret violeta intens i vora corbada.



En el seu punt

En el seu punt: tota violeta, carnosa i amb el peu gruixut.



Vell

Vella i descolorida: ja no es reconeix bé. Deixa-la.



Passat

Passada, tova i esquinçada.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines violetes i atapeïdes. Sense cortina.



DE PROP

De prop: làmines i peu violetes.



CANVI DE COLOR

Amb l'edat el barret perd el violeta i es torna marró rosat.



ON VIU

Pinedes i fullaraca acumulada, a finals de tardor.

CONFUSIONS PERILLOSES



Cortinaris violetes: cortina i esporada marró rovell. Alguns molt tòxics.

Fitxa: Cortinari metzinós →



Inocybe de tons lila: petites i amb barret cònic.

Fitxa: Inocybe →

ON VIU

Pinedes, alzinars, fullaraca acumulada i compost.

D'ON VE EL NOM

Lepista, de lepastē (copa); nuda, nua, sense vel.

CONSELL

Crua és tòxica: cuina-la sempre bé.

AGARICALS

Agaricus campestris



En el seu punt: barret blanc i làmines rosades.

Camperol

Xampinyó silvestre

● COMESTIBLE · BO ●●● Nivell 3 · Expert

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: maig–juny i set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

El xampinyó dels prats. És bo i conegut, però té bessons blancs mortals: mira'n sempre les làmines i la base.

TRUC CLAU

Rasca la base del peu: si es torna groc canari, fora. Si les làmines són blanques, fora.

Després de la pluja: surt entre 4 i 8 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 6.

DESCRIPCIÓ

Barret	4–10 cm, blanc sedós, primer rodó i després convex.
A sota	Làmines lliures, rosa viu de jove i marró xocolata de vell. Mai blanques en un exemplar obert.
Peu	Curt i blanc, amb un anell fi que desapareix. Sense volva.
Carn	Blanca que roseja en tallar-la. Olor agradable.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: rodó i blanc, entre l'herba del prat. Gira'l per veure les làmines.



En el seu punt

En el seu punt: barret blanc i làmines rosades.



Vell

Vell: làmines marró xocolata, gairebé negres, i carn tova. Deixa'l.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Làmines ROSA i anell senzill. Mai blanques en un exemplar obert.



DE PROP

Gira'l sempre: làmines rosades i peu blanc sense volva.



ON VIU

Prats i pastures, sovint on hi pastura bestiar.

CONFUSIONS PERILLOSES



Bola de neu pudent: groc en rascar-lo i olor de tinta.

Fitxa: Bola de neu pudent →



Farinera pudent: tota blanca, làmines blanques i volva. MORTAL.

Fitxa: Farinera pudent →

ON VIU

Prats i pastures, sovint on hi ha bestiar.

D'ON VE EL NOM

Agaricus, del grec agarikon; campestris, dels camps.

AGARICALS

Agaricus arvensis



Bola de neu: barrets blancs i làmines rosa grisenc.

Bola de neu

Xampinyó d'anís

● COMESTIBLE · BO ●●● Nivell 3 · Expert

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: juny–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

Gran i blanca com una bola de neu, fa olor d'anís. Però té bessons blancs que fan mal, i un que mata.

TRUC CLAU

Olor d'anís + groc suau en fregar el barret. Si la base del peu es torna groc intens i fa olor de tinta, és la bola de neu pudent.

Després de la pluja: surt entre 7 i 12 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 9.

DESCRIPCIÓ

Barret	8–20 cm, blanc, que es torna una mica groguenc en fregar-lo; rodó i després convex.
A sota	Làmines lliures, blanc grisenc, després rosa grisenc i finalment marró xocolata.
Peu	Blanc i robust, amb un anell gran que a sota té una roda dentada.
Carn	Blanca, olor d'anís o d'ametlla amarga.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: rodona i blanca com una bola de neu.



En el seu punt

Bola de neu: barrets blancs i làmines rosa grisenc.



Vell

Vella: làmines marró xocolata. Deixa-la.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Làmines rosa grisenc. Mai blanques en un exemplar obert.



DE PROP

Anell gran amb una roda dentada a la cara de sota.



ON VIU

Prats i pastures, sovint en grups.

CONFUSIONS PERILLOSES



Bola de neu pudent: groc canari a la base i olor de tinta. Tòxic.

Fitxa: Bola de neu pudent →



Farinera pudent: làmines sempre blanques i volva. MORTAL.

Fitxa: Farinera pudent →

ON VIU

Prats, pastures i marges.

D'ON VE EL NOM

Agaricus, del grec agarikon; arvensis, dels camps de conreu.

CONSELL

Arrenca-la sencera: si a la base hi ha un sac (volva), no és un xampinyó.

Amanita ovoidea



Farinera: gran, tota blanca, amb una volva blanca i gruixuda.

Farinera

També: cul blanc

● COMESTIBLE · ACCEPTABLE · NO RECOMANABLE ●●● Nivell 3 · Expert

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

Una amanita blanca i grossa dels boscos calcaris. En alguns pobles es menja, però s'assembla massa a dues amanites que fan mal.

TRUC CLAU

La volva ha de ser BLANCA. Si té tons taronja o rovell, és Amanita proxima.

Després de la pluja: surt entre 7 i 14 dies després d'una bona pluja; el millor, cap al dia 10.

DESCRIPCIÓ

Barret	10–25 cm, blanc, gruixut, amb la vora coberta de restes farinoses que pengen.
A sota	Làmines lliures, blanques o crema.
Peu	Robust, blanc i farinós, amb un anell cremós que es desfà. Volva blanca, gruixuda i gran.
Carn	Blanca i ferma, olor feble.

AL LLARG DE LA SEVA VIDA



Jove

Jove: surt de terra com un ou blanc. Així no es pot identificar.



En el seu punt

Farinera: gran, tota blanca, amb una volva blanca i gruixuda.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Làmines crema i peu farinós.



DE PROP

Vora del barret amb restes farinoses que pengen.



DE PROP

Anell cremós que es desfà i volva gran.



ON VIU

Pinedes i alzinars de terra calcària.

CONFUSIONS PERILLOSES



Amanita proxima: volva taronja rovellada i anell membranós. Danya els ronyons.

Fitxa: Amanita proxima →



Farinera pudent: més esvelta, tota blanca. MORTAL.

Fitxa: Farinera pudent →

ON VIU

Pinedes i alzinars de terra calcària.

D'ON VE EL NOM

Amanita, nom grec d'uns bolets del mont Amanus; ovoidea, en forma d'ou, pel barret jove.

CONSELL

Els micòlegs desaconsellen collir-la si no tens molta experiència.

Capítol IV

Els mortals

Aprèn-te aquests abans que cap comestible. Els seus símptomes triguen hores o dies, i quan arriben el fetge o els ronyons ja estan danyats.









Farinera borda · 29 · Farinera pudent · 30 · Lepiotes petites · 31 · G



Farinera borda adulta: barret verd oliva, anell com una faldilla i volva a la base.

Farinera borda

També: cogoma borda, pentinella borda

● MORTAL

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern
	■	■	

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

La responsable de gairebé totes les morts per bolets. No fa olor estranya ni té mal gust, i per això és tan perillosa.

Què fa: Un sol exemplar pot matar un adult. Els símptomes triguen de 6 a 24 hores; després hi ha una millora falsa mentre el fetge falla.

COM EVITAR-LO

Làmines blanques + anell + volva = fora. Renta't les mans després de tocar-la.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–15 cm, verd oliva, groguenc o blanquinós, amb fibres radials fosques; sense berrugues.
A sota	Làmines BLANQUES, lliures i atapeïdes.
Peu	Blanc amb taques en zig-zag, anell blanc com una faldilla i VOLVA blanca en forma de sac.
Carn	Blanca; olor dolça que amb l'edat es torna desagradable.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Sortint de l'ou: el sac blanc (volva) embolica la base.



JOVE

Jove: barret arrodonit i volva gran. Ja és mortal.



DE PROP

A sota: làmines BLANQUES i anell penjant.



DE PROP

Làmines blanques i la base amb volva: la combinació que mata.



VARIACIÓ

El barret pot ser groc verdós...



VARIACIÓ

...gairebé blanc o beix...



VARIACIÓ

...o verd pàl·lid. El color no serveix per descartar-la.

ES CONFON AMB



Llora i carbonera (sense anell ni volva).

Fitxa: Llora i carbonera →



Ou de reig en fase d'ou (groc per dins).

Fitxa: Ou de reig →



Camperol (làmines rosades o marrons).

Fitxa: Camperol →

ON VIU

Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes; de vegades pinedes.

D'ON VE EL NOM

Phalloides, en forma de fal·lus, per com surt de l'ou.



Farinera pudent: tota blanca, amb anell i volva.

Farinera pudent

També: àngel destructor

● MORTAL

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

Tota blanca, elegant i mortal. Si trobes un bolet blanc amb anell i volva, deixa'l i renta't les mans.

Què fa: Mateixes toxines que la farinera borda. Mortal.

COM EVITAR-LO

Un bolet tot blanc amb làmines blanques no és mai per a qui comença.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–10 cm, tot blanc, cònic de jove, una mica viscós.
A sota	Làmines blanques i lliures.
Peu	Blanc i escatós, amb anell fràgil i volva en sac.
Carn	Blanca, olor desagradable.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Jove sortint de l'ou: ja és mortal.



DE PROP

Làmines blanques. Un xampinyó obert les tindria rosa o marrons.



DE PROP

Peu blanc i fibrós amb restes d'anell.



DE PROP

De jove a vella: tots els exemplars són blancs de dalt a baix.



ON VIU

Boscos de muntanya, sovint entre la molsa.

ES CONFON AMB



Camperol (làmines rosades o marrons).

Fitxa: Camperol →



Bola de neu (olor d'anís, sense volva).

Fitxa: Bola de neu →

ON VIU

Boscos de muntanya, coníferes i fagedes, en sòls àcids.

D'ON VE EL NOM

Virosa, verinosa.



Lepiota brunneoincarnata: petita, barret amb escates marró rosat.

Lepiotes petites

També: lepiota metzinosa

● MORTAL

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Bosc de fulla · Prats · Descompon matèria morta

Sota: Làmines

Semblen apagallums en miniatura, però algunes porten el mateix verí que la farinera borda.

Què fa: El 2011 un home de Mataró va morir per una L. brunneoincarnata.

COM EVITAR-LO

Qualsevol 'apagallums' petit és una lepiota fins que no es demostri el contrari.

DESCRIPCIÓ

Barret	2–8 cm, amb escates marró rosat o vinós sobre fons clar, més fosc al centre.
A sota	Làmines blanques i lliures.
Peu	Curt, amb bandes escatoses rosades; anell fràgil o només una zona marcada.
Carn	Blanca o rosada, olor afruitada.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Peu rosat amb bandes, i làmines blanques.



DE PROP

Barret amb escates en cercles, més fosc al centre.



DE PROP

Grup d'exemplars: tots fan menys de 8 cm.



DE PROP

Lepiota cristata: blanca, amb escates marrons i un botó fosc al centre.



DE PROP

L. cristata de prop: un apagallums en miniatura. Mai el cullis.

ES CONFON AMB



Apagallums (més de 15 cm, anell mòbil, pell de serp).

Fitxa: Apagallums →

ON VIU

Alzinars, rouredes, marges de camins, jardins i parcs.

D'ON VE EL NOM

Lepiota, de lepis (escata) i ous (orella); brunneoincarnata, marró i color de carn.



Galerina marginada: bolets marró mel en grup sobre fusta molsosa.

Galerina marginada

● MORTAL

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–des

Sobre fusta · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

Un bolet marró petit que creix sobre la fusta. Sembla inofensiu i porta verí mortal.

Què fa: Mateixes toxines que la farinera borda. Mortal.

COM EVITAR-LO

No cullis bolets marrons petits que surten de la fusta.

DESCRIPCIÓ

Barret	2–6 cm, marró mel, llis i brillant quan és humit, amb la vora estriada.
A sota	Làmines marró rovell.
Peu	Prim, marró i fibrós, amb un anell petit.
Carn	Prima, olor de farina.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Peu prim amb un anell petit. Barret llis i brillant.



DE PROP

Làmines marró rovell i barret ataronjat.



DE PROP

Petita i prima: cap aquí la mida d'un dit.



ON VIU

Sobre soques i branques mortes de pi. Mai cullis bolets marrons de la fusta.

ES CONFON AMB

Bolets de soca comestibles: sense experiència, impossibles de separar.

ON VIU

Sobre fusta morta, sobretot de coníferes, sovint en grups.

D'ON VE EL NOM

Galerina, de galerus (un barret de pell); marginata, amb la vora marcada.



Cortinari metzinós: barret taronja rovellat, sec i fibrós.

Cortinari metzinós

● MORTAL

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–oct

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

Taronja rovell i discret. El seu verí ataca els ronyons i pot trigar dues setmanes a fer-se notar.

Què fa: Destrueix els ronyons. Els símptomes poden trigar de 2 a 17 dies.

COM EVITAR-LO

Làmines color rovell + restes de teranyina al peu = fora.

DESCRIPCIÓ

Barret	3–8 cm, taronja rovellat, sec i fibrós.
A sota	Làmines separades i gruixudes, color rovell.
Peu	Groguenc i fibrós, amb restes de cortina.
Carn	Groguenca, olor de rave.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Làmines color rovell, separades.



DE PROP

Peu groguenc i fibrós, amb restes de cortina.



DE PROP


Diversos exemplars: tots taronja rovell, de dalt a baix.



ON VIU

Entre la fullaraca de roures i castanyers.

ES CONFON AMB



Cama de perdiu (làmines que baixen pel peu, sota pins).

Fitxa: Cama de perdiu →



Pimpinella morada.

Fitxa: Pimpinella morada →

ON VIU

Rouredes, castanyedes i bosc mixt en sòls àcids.

D'ON VE EL NOM

Cortinarius, per la cortina com de teranyina que tenen els joves.



Paxil enrotllat: barrets marrons en grup, amb la vora corbada cap endins.

Paxil enrotllat

● MORTAL

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

Abans se'n menjava. Ara se sap que, menjat diverses vegades, pot provocar una reacció que destrueix la sang.

Què fa: Cru és tòxic. Menjat diverses vegades pot destruir la sang i els ronyons. Hi ha hagut morts.

COM EVITAR-LO

Si les làmines es tornen marrons quan les fregues, deixa'l.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–15 cm, marró, amb la vora molt enrotllada cap endins.
A sota	Làmines crema que baixen pel peu, es taquen de marró en tocar-les i se separen fàcilment.
Peu	Curt i marró, que es taca en tocar-lo.
Carn	Groguenca que s'enfosqueix.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Vora del barret molt enrotllada cap a dins.



DE PROP

A sota: làmines crema que baixen pel peu.



VARIACIÓ

On el toques, les làmines es taquen de marró.



VARIACIÓ

Exemplar tacat de marró a les làmines i al peu.

ES CONFON AMB



Rovellons vells (el paxil no fa llet).

Fitxa: Rovelló i pinetell →

ON VIU

Pinedes, bedollars i boscos mixtos.

D'ON VE EL NOM

Paxillus, petita estaca; involutus, enrotllat, per la vora.

Capítol V

Els tòxics

No solen matar, però fan passar molt malament. Molts són bessons de bolets bons.









Reig bord · 36 Pixacà · 37 Amanita proxima · 38 Fredolic metzi

Amanita muscaria



Reig bord: barret vermell amb berrugues blanques i peu blanc.

Reig bord

També: reig foll, matamosques

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

El bolet dels contes, vermell amb pigues blanques. Bonic de mirar i tòxic de menjar.

Què fa: Entre 30 minuts i 3 hores: vòmits, confusió, agitació, al·lucinacions.

COM EVITAR-LO

Si les làmines o el peu són blancs, no és un ou de reig.

DESCRIPCIÓ

Barret	8–20 cm, vermell o taronja amb berrugues blanques que la pluja pot treure.
A sota	Làmines BLANQUES i lliures.
Peu	Blanc, amb anell blanc i base bulbosa amb anells de volva.
Carn	Blanca, groguenca sota la pell.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Jove: tot cobert de berrugues, com una bola.



DE PROP

A sota: làmines BLANQUES i anell blanc. L'ou de reig les té grogues.



VARIACIÓ

La pluja li ha tret les berrugues: ara s'assembla a l'ou de reig. Mira les làmines!



VARIACIÓ

També n'hi ha de color taronja o groguenc.



ON VIU

Pinedes i fagedes de muntanya, a la tardor.

ES CONFON AMB



Ou de reig (làmines i peu grocs).

Fitxa: Ou de reig →

ON VIU

Pinedes, fagedes i bedollars de muntanya.

D'ON VE EL NOM

Muscaria, de musca (mosca): antigament s'usava per matar mosques.

Amanita pantherina



Pixacà: barret marró amb berrugues blanques, anell i bulb a la base.

Pixacà

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

El cosí marró del reig bord, i més perillós encara. Berrugues blanques i un rodet a la base.

Què fa: Com el reig bord però més fort: confusió, agitació i convulsions.

COM EVITAR-LO

Per a qui comença: cap amanita.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–12 cm, marró amb berrugues blanques petites i regulars; vora estriada.
A sota	Làmines blanques i lliures.
Peu	Blanc, anell llis i base bulbosa amb un rodet de volva.
Carn	Blanca, no canvia.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Jove: barret fosc esquitxat de berrugues blanques.



DE PROP

A sota: làmines blanques i anell llis.



DE PROP

Vora del barret estriada i anell penjant.



DE PROP

Base amb bulb i un rodet de volva: típic del pixacà.



VARIACIÓ

Vell i rentat per la pluja, ha perdut les berrugues.

ES CONFON AMB

Vinosa (Amanita rubescens): la carn es torna rosa vi. Només per a experts.

ON VIU

Pinedes, alzinars i rouredes.

D'ON VE EL NOM

Pantherina, de pantera, per les taques blanques.



Amanita proxima: sembla una farinera, però la volva és TARONJA rovellada.

Amanita proxima

● TÒXIC

Primavera	Estiu	**Tardor**	Hivern

Surt: set–nov

Pinedes **Bosc de fulla** **Unit als arbres** **Sota: Làmines**

La bessona de la farinera. Només la delata el color taronja de la volva, que sovint queda enterrada.

Què fa: Danya els ronyons. Primer dóna vòmits i diarrees (unes 8–14 hores després) i en dos o tres dies pot aparèixer una insuficiència renal.


COM EVITAR-LO

Arrenca sempre les amanites senceres i mira el color de la volva.

DESCRIPCIÓ

Barret	8–15 cm, blanc o crema, amb restes farinoses a la vora.
A sota	Làmines blanques i lliures.
Peu	Blanc, amb anell membranós que penja i volva amb tons TARONJA o rovell.
Carn	Blanca.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

La clau: volva amb tons taronja o rovell.



DE PROP

Exemplars joves: totes les volves són taronja.



DE PROP

Anell membranós que penja, no cremós.



DE PROP

Arrenca-la sempre sencera per veure la volva.



DE PROP

Làmines blanques.

ES CONFON AMB



Farinera (volva blanca, anell cremós).

Fitxa: Farinera →

ON VIU

Pinedes i alzinars mediterranis.

D'ON VE EL NOM

Proxima, propera, perquè és gairebé igual que la farinera.

Tricholoma pardinum



Fredolic metzinós: barrets grisos coberts d'escates fosques en cercles.

Fredolic metzinós

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

El fals fredolic de la muntanya alta: més gros, escatós i amb olor de farina.

Què fa: Vòmits i diarrees molt forts que poden durar dies.

COM EVITAR-LO

Si fa olor de farina i és gros i robust, no és un fredolic.

DESCRIPCIÓ

Barret	6–12 cm, gris amb escates fosques en cercles.
A sota	Làmines blanquinoses, a vegades amb reflexos grocs o verds.
Peu	Gruixut, ple i blanc.
Carn	Blanca i ferma, olor forta de farina.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Jove: barret escatós i peu molt gruixut.



DE PROP

Barret escatós i peu robust i ple: res a veure amb el fredolic prim.



DE PROP


A sota: làmines blanquinoses i peu gruixut.



DE PROP

Molt més gros que un fredolic: fins a 12 cm de barret.

ES CONFON AMB



Fredolic (petit, prim, sense olor).

Fitxa: Fredolic →

ON VIU

Fagedes i avetoses de muntanya.

D'ON VE EL NOM

Tricholoma, de thrix (pèl) i loma (vora); pardinum, de pardus (lleopard), per les escates.

Entoloma sinuatum



Fals carlet: bolets grossos, de barret blanquinós i sedós, en grup.

Fals carlet

També: carlet bord

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Làmines

Gros, blanc i amb aspecte de 'bon bolet'. Les làmines rosades el delaten.

Què fa: Vòmits i diarrees violents. Causa moltes intoxicacions.

COM EVITAR-LO

Làmines rosades + olor de farina = fora.

DESCRIPCIÓ

Barret	6–20 cm, blanc grisenc o beix, llis i sedós, amb la vora ondulada.
A sota	Làmines groguenques de joves que passen a rosa salmó.
Peu	Gruixut, blanc i ple.
Carn	Blanca i gruixuda, olor de farina rància.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Joves: carnosos i blancs, amb aspecte de 'bon bolet'. Compte.



DE PROP

Làmines de color crema rosat, que amb l'edat es tornen rosa salmó.



DE PROP

Adult: làmines rosa salmó i peu gruixut. Fa olor de farina rància.



DE PROP

Làmines rosades: el senyal per deixar-lo.




DE PROP

Pot fer fins a 20 cm: és dels bolets tòxics més grossos.

ES CONFON AMB



Carlet.
Fitxa: Carlet →



Camperol.
Fitxa: Camperol →

ON VIU

Rouredes, alzinars i fagedes, sovint a prop de rierols.

D'ON VE EL NOM

Entoloma, de entos (dins) i loma (vora), per la vora enrotllada; sinuatum, sinuós.

Omphalotus olearius



Gírgola d'olivera: un ram de bolets taronja sobre una soca.

Gírgola d'olivera

També: bolet d'oliu

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–des

Sobre fusta · Bosc de fulla · Viu sobre plantes o bolets

Sota: Làmines

Un ram taronja al peu d'una olivera. Sembla un rossinyol, però té làmines de veritat i fa vomitar.

Què fa: Vòmits molt forts i rampes en poca estona.

COM EVITAR-LO

Taronja + làmines + sobre fusta en grup = gírgola d'olivera.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–12 cm, taronja intens, en embut i ondulat.
A sota	Làmines fines i atapeïdes, taronja, que baixen pel peu. A les fosques fan una llum verdosa.
Peu	Taronja, sovint units en ram a la base.
Carn	Taronja i fibrosa.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines fines i atapeïdes de veritat, no plecs com el rossinyol.



DE PROP

Làmines que baixen pel peu i peus units a la base.



ON VIU

Al peu d'una olivera: el lloc típic.



DE PROP

Pot fer rams enormes: aquí, amb una mà per comparar.

ES CONFON AMB



Rossinyol.

Fitxa: Rossinyol →



Gírgoles.

Fitxa: Gírgoles →

ON VIU

En grups sobre soques i arrels d'olivera, alzina o castanyer.

D'ON VE EL NOM

Omphalotus, de omphalos (melic), pel barret enfonsat; olearius, de l'olivera.



Bolet de cabra: barret rosat salmó amb la vora peluda.

Lactaris de llet blanca

Bolet de cabra, pinetell bord, enganyapastors

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

Semblen rovellons, però en tallar-los la llet surt blanca.

Què fa: Gastroenteritis amb vòmits i diarrees.

COM EVITAR-LO

Llet blanca = no és rovelló.

DESCRIPCIÓ

Barret	4–10 cm, rosat salmó amb cercles i vora peluda (bolet de cabra), o crema ataronjat amb zones.
A sota	Làmines crema o rosades, sense taques verdes.
Peu	Curt i buit, del color del barret.
Carn	Treu llet BLANCA: al pinetell bord es torna groga en pocs segons. Gust molt picant.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines pàl·lides i vora llanosa. La llet és blanca.



DE PROP

La vora enrotllada i peluda del bolet de cabra.



VARIACIÓ

Pinetell bord: la llet és blanca i es torna groga en pocs segons.



DE PROP

Enganyapastors (L. zonarius): té cercles com el rovelló, però la llet és blanca.



DE PROP

Làmines crema, sense taques verdes.

ES CONFON AMB



Rovelló i pinetell.

Fitxa: Rovelló i pinetell →

ON VIU

Amb bedolls, roures, castanyers i alzines.

D'ON VE EL NOM

Torminosus, de tormina (còlics); chrysorrheus, que vessa or; zonarius, amb zones.

BOLETALS

Rubroboletus satanas



Matagent: barret blanquinós i peu inflat vermell.

Matagent

També: cep del diable. El nom 'mataparent' es fa servir per a diversos boletus de porus vermells.

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: jul–oct

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Porus

Gros, blanc per dalt i vermell per sota. En tallar-lo, la carn es torna blava.

Què fa: Vòmits forts i diarrees.

COM EVITAR-LO

Boletus amb porus vermells = fora.

DESCRIPCIÓ

Barret	10–25 cm, blanc grisenc, gros i carnós.
A sota	Porus VERMELLS que es tornen blaus en tocar-los.
Peu	Molt gruixut i panxut, groc a dalt i vermell a baix, amb xarxa vermella.
Carn	Groguenca que blaveja; olor desagradable.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Jove: des de dalt només es veu un barret blanc. Gira'l sempre.



DE PROP

A sota: porus VERMELLS i peu vermell. Fora.



DE PROP

De prop: porus vermell taronja.



VARIACIÓ

En tallar-lo o tocar-lo, la carn es torna blava.



VARIACIÓ

Carn blavosa: un senyal per deixar-lo.

ES CONFON AMB



Cep.

Fitxa: Cep →

ON VIU

Alzinars i rouredes en sòls calcaris.

D'ON VE EL NOM

Rubroboletus, boletus vermell; satanas, per la seva fama.



Escleroderma: bola de pell gruixuda, groguenca i escatosa.

Escleroderma

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: jul–nov

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Bola o corall

Sembla un pet de llop, però és dur com una patata i per dins és negre.

Què fa: Vòmits, dolor de panxa i marejos poca estona després de menjar-lo.

COM EVITAR-LO

Talla tots els bolets en forma de bola: blanc per dins = pet de llop; negre o violaci = escleroderma.

DESCRIPCIÓ

Barret	Bola de 3–10 cm, groguenca o marró, amb la pell gruixuda, dura i escatosa.
A sota	Per dins, violaci fosc o negre des de jove, amb vetes blanques; de vell, pols fosca.
Peu	Sense peu, o amb una base curta i arrelada.
Carn	Ferma com una patata; olor forta i desagradable.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Tallat: per dins NEGRE violaci i dur. Un pet de llop és blanc.



DE PROP

Interior fosc amb vetes clares.



DE PROP

Alguns tenen un peu curt i arrelat.



VELL

Vell: s'esquerda i deixa anar pols fosca.



VARIACIÓ

Una espècie gran (S. polyrhizum) s'obre en forma d'estrella.

ES CONFON AMB



Pet de llop (blanc per dins, pell fina).

Fitxa: Pet de llop →

ON VIU

Pinedes i boscos de fulla en sòls àcids o sorrencs.

D'ON VE EL NOM

Scleroderma, de skleros (dur) i derma (pell): té la pell gruixuda i dura.

Clitocybe dealbata · C. rivulosa



Clitocibes blancs: petits, blanquinosos, com coberts de farina.

Clitocibes blancs

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

Petits bolets blancs que surten als mateixos prats que el cama-sec.

Què fa: Suor abundant, salivera, llàgrimes, visió borrosa i diarrea.

COM EVITAR-LO

Bolet blanc petit de prat = fora.

DESCRIPCIÓ

Barret	2–5 cm, blanc com cobert de farina o gebre, pla o una mica enfonsat.
A sota	Làmines atapeïdes, blanquinoses, que baixen pel peu.
Peu	Prim i blanc, que es trenca.
Carn	Prima, olor de farina.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines atapeïdes que baixen pel peu.



DE PROP

Barret blanc, pla o enfonsat, sense mamelló.



ON VIU

Als prats i gespes, de vegades en rotllana com el cama-sec.

ES CONFON AMB



Cama-sec.

Fitxa: Cama-sec →



Gírgola de panical.

Fitxa: Gírgoles →

ON VIU

Prats, gespes i marges, sovint en rotllanes.

D'ON VE EL NOM

Clitocybe, de klitos (pendent) i kybe (cap), pel barret en embut; dealbata, emblanquinada.



Inocybe: bolets petits de barret cònic i fibrós.

Inocybe

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: juny–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Prats · Unit als arbres

Sota: Làmines

Petits, discrets i amb el barret esquerdat. N'hi ha moltíssims i gairebé tots són tòxics.

Què fa: Suors, salivera i diarrea poca estona després.

COM EVITAR-LO

Petit, cònic i esquerdat = fora.

DESCRIPCIÓ

Barret	2–7 cm, cònic o amb mamelló, fibrós i esquerdat radialment.
A sota	Làmines crema que es tornen marró terrós.
Peu	Blanquinós i fibrós.
Carn	Blanca, olor de terra o desagradable.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Barret amb fibres radials que s'esquerden: el senyal típic.



VARIACIÓ

Alguns es taquen de vermell (I. erubescens).



DE PROP

Inocybe geophylla: blancs i petits, amb un mamelló al centre.



VARIACIÓ

N'hi ha de tons lila, que es poden confondre amb la pimpinella.

ES CONFON AMB



Cama-sec.

Fitxa: Cama-sec →



Fredolic.

Fitxa: Fredolic →

ON VIU

Tota mena de boscos, parcs i jardins.

D'ON VE EL NOM

Inocybe, de inos (fibra) i kybe (cap): barret fibrós; erubescens, que s'envermelleix.



Verderol: tot groc verdós, barret, làmines i peu.

Verderol

També: groguet

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: oct–des

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

Abans es venia als mercats. Ara se sap que, menjat diversos dies, pot destruir el múscul.

Què fa: Rabdomiòlisi (destrucció muscular). Hi ha hagut morts a França i Polònia, i des del 2009 no es pot vendre a l'Estat.

COM EVITAR-LO

Si un llibre antic diu que és comestible, ja no ho és.

DESCRIPCIÓ

Barret	5–12 cm, groc verdós amb escates fosques al centre.
A sota	Làmines groc sofre.
Peu	Groc i gruixut.
Carn	Blanca o groguenca, olor de farina.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines grogues sofre.



DE PROP

Barret groguenc amb escates fosques al centre.



ON VIU

Pinedes de terra sorrenca. Abans es menjava: ja no.

ES CONFON AMB



Fredolic (gris, no groc).

Fitxa: Fredolic →

ON VIU

Pinedes en sòls sorrencs.

D'ON VE EL NOM

Equestre, de cavaller, perquè era un bolet de nobles.

Agaricus xanthodermus



Bola de neu pudent: sembla un xampinyó blanc, però la base es torna groga.

Bola de neu pudent

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: maig–juny i set–nov

Prats · Descompon matèria morta · Sota: Làmines

Sembla un xampinyó, però en rascar-lo es torna groc i fa olor de tinta.

Què fa: Vòmits i diarrees.

COM EVITAR-LO

Rasca sempre la base dels xampinyons silvestres.

DESCRIPCIÓ

Barret	6–15 cm, blanc, es taca de groc en fregar-lo.
A sota	Làmines rosa grisenc, després marró fosc.
Peu	Blanc, amb anell gran; la base es torna GROC CANARI en rascar-la.
Carn	Blanca, groga a la base; olor de tinta o de iode.

MIRA'L DE PROP



VARIACIÓ

Tallat de dalt a baix: la base del peu, groc canari.



VARIACIÓ

En rascar la base, groc intens a l'instant.



DE PROP

Làmines rosa grisenc de jove; es confon fàcilment amb el camperol.



DE PROP

Vell: làmines marró fosc.

ES CONFON AMB



Camperol.

Fitxa: Camperol →



Bola de neu.

Fitxa: Bola de neu →

ON VIU

Prats, jardins, marges i parcs.

D'ON VE EL NOM

Xanthodermus, de xanthos (groc) i derma (pell): es torna groc.

Coprinopsis atramentaria



Bolet de femer: barrets grisos en forma de campana, en grup.

Bolet de femer

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: abr–maig i set–nov

Prats · Sobre fusta · Descompon matèria morta

Sota: Làmines

El germà gris del bolet de tinta. Amb una copa de vi, et posarà molt malament.

Què fa: Amb alcohol (fins a 3 dies abans o després): enrogiment, palpitacions, vòmits.

COM EVITAR-LO

Si és gris i llis, no és un bolet de tinta.

DESCRIPCIÓ

Barret	3–7 cm, gris o marró grisenc, en forma de campana, llis, sense escates llanoses.
A sota	Làmines blanques que passen a negres i es desfan.
Peu	Blanc i buit.
Carn	Prima i blanquinosa.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Joves: grisos o marró lila, llisos, sense les escates del bolet de tinta.



VARIACIÓ

Com el bolet de tinta, de vell es torna negre i es desfà.



VARIACIÓ

Del tot desfet en tinta negra.

ES CONFON AMB



Bolet de tinta.

Fitxa: Bolet de tinta →

ON VIU

Prats, jardins i terra rica, sovint prop de soques.

D'ON VE EL NOM

Coprinopsis, semblant a un Coprinus; atramentaria, d'atramentum (tinta).



Peu de rata bord: forma de corall, branques rosa ataronjat.

Peu de rata bord

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Bola o corall

Un corall rosat preciós al terra del bosc. I un laxant molt fort.

Què fa: Diarrees fortes. Distingir els peus de rata és difícil fins i tot per a experts.

COM EVITAR-LO

Per a qui comença, cap peu de rata.

DESCRIPCIÓ

Barret	No en té: és un corall de 8–20 cm amb moltes branques.
A sota	Branques rosa ataronjat amb puntes grogues.
Peu	Base gruixuda i blanquinosa.
Carn	Blanca, amarga.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Base blanca i gruixuda d'on surten les branques.



DE PROP

Puntes de les branques groguenques.



ON VIU

Fagedes i rouredes, entre la molsa.

ES CONFON AMB

Peu de rata col-i-flor (Ramaria botrytis): comestible, però confusible.

ON VIU

Fagedes i rouredes.

D'ON VE EL NOM

Ramaria, de ramus (branca); formosa, bonica.

Russula emetica



Escaldabecs: barret vermell viu i peu blanc, entre la molsa.

Escaldabecs

● TÒXIC

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Pinedes · Unit als arbres · Sota: Làmines

Vermell i brillant, amb un gust que crema la boca.

Què fa: Vòmits i diarrees.

COM EVITAR-LO

Rússula vermella de pineda = fora.

DESCRIPCIÓ

Barret	3–8 cm, vermell viu, llis i brillant.
A sota	Làmines blanques.
Peu	Blanc i fràgil.
Carn	Blanca, gust que crema.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Jove: barret vermell arrodonit.



DE PROP

A sota: làmines blanques. Gust molt picant (no te l'empassis).

ES CONFON AMB



Llora i carbonera.
Fitxa: Llora i carbonera →



Rovelló: fa llet taronja o vermella i té el peu taronja. Una rússula taronja no fa llet.
Fitxa: Rovelló i pinetell →

ON VIU

Pinedes humides i molsoses.

D'ON VE EL NOM

Russula, vermellós; emetica, que fa vomitar.


Capítol VI

No valen la pena

No són perillosos de veritat, però amarguen, cauen malament o s'assemblen massa a d'altres.







Rossinyol ataronjat · 53

Molleric amarg · 54

Paloma vermellosa · 5

Hygrophoropsis aurantiaca



Rossinyol ataronjat: tot taronja, amb làmines de veritat.

Rossinyol ataronjat

També: fals rossinyol

● PRECAUCIÓ

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: set–nov

Pinedes · Sobre fusta · Descompon matèria morta

Sota: Làmines

El fals rossinyol: més taronja, amb làmines fines i carn tova.

Per què no: No és perillós, però és dolent i a algunes persones els cau malament.

COM EVITAR-LO

Làmines fines i toves = no és un rossinyol.

DESCRIPCIÓ

Barret	2–7 cm, taronja, vellutat, en embut.
A sota	Làmines fines, atapeïdes i bifurcades, taronja intens.
Peu	Taronja i prim.
Carn	Prima i tova.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

A sota: làmines fines, atapeïdes i bifurcades. El rossinyol té plecs gruixuts.



DE PROP

De prop: làmines toves de color taronja intens.



ON VIU

Sobre la pinassa i la fusta podrida.

ES CONFON AMB



Rossinyol.

Fitxa: Rossinyol →



Camagroc.

Fitxa: Camagroc →

ON VIU

Pinedes, sobre la pinassa o fusta podrida.

D'ON VE EL NOM

Hygrophoropsis, semblant a un Hygrophorus; aurantiaca, taronja.

Tylopilus felleus



Molleric amarg: sembla un cep, però el peu té una xarxa fosca.

Molleric amarg

● PRECAUCIÓ

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: jul–oct

Pinedes · Bosc de fulla · Unit als arbres · Sota: Porus

Té cara de cep, però un sol exemplar amarga tota la cassola.

Per què no: No és tòxic, però és molt amarg.

COM EVITAR-LO

Porus rosats o xarxa fosca = no és un cep.

DESCRIPCIÓ

Barret	6–15 cm, marró clar.
A sota	Porus blancs que es tornen rosats.
Peu	Gruixut, amb una xarxa marró fosca.
Carn	Blanca i extremadament amarga.

MIRA'L DE PROP



DE PROP

Porus rosats: el cep els té blancs o grocs.



DE PROP

Xarxa marró fosca i gruixuda al peu.



DE PROP

A sota: porus rosa pàl·lid. Tan amarg que espatlla el plat.

ES CONFON AMB



Cep.

Fitxa: Cep →

ON VIU

Pinedes i boscos mixtos en sòls àcids.

D'ON VE EL NOM

Tylopilus, de tylos (bony) i pilos (barret); felleus, de fel: amarg.

Chlorophyllum rhacodes



Paloma vermellosa: escates grosses i peu llis, sense pell de serp.

Paloma vermellosa

● PRECAUCIÓ

Primavera	Estiu	Tardor	Hivern

Surt: ag–nov

Bosc de fulla · Pinedes · Prats

Descompon matèria morta · Sota: Làmines

S'assembla a l'apagallums, però és més gruixuda i té el peu llis.

Per què no: Moltes persones hi tenen problemes digestius. Una espècie semblant de jardins és tòxica.

COM EVITAR-LO

Sense pell de serp al peu = no és un apagallums.

DESCRIPCIÓ

Barret	8–15 cm, amb escates grosses i esparracades sobre fons blanc.
A sota	Làmines blanques.
Peu	Llis i blanc, sense pell de serp, amb base molt bulbosa i anell que es mou.
Carn	Blanca que es torna vermell taronja en tallar-la.

MIRA'L DE PROP



JOVE

Joves tancats, amb una base molt bulbosa.



DE PROP

Peu llis i blanc amb anell: no té el dibuix de l'apagallums.

ES CONFON AMB



Apagallums.

Fitxa: Apagallums →

ON VIU

Boscos, parcs i jardins, en terra rica.

D'ON VE EL NOM

Chlorophyllum, de chloros (verd) i phyllon (fulla); rhacodes, esparracat.

Capítol 7

Les meves troballes

Sortida pel Montnegre-Corredor, 18 d'octubre de 2026. Entre 280 i 620 m, en sauló amb alzines, castanyers i pins. 76 fotos que donen 18 bolets diferents: aquí tens què és cada un i per què no és un altre.

Identificació orientativa a partir de fotos. No te'n mengis cap per això. Per menjar un bolet cal tenir l'exemplar sencer amb la base, olorar-lo, tallar-lo i que el confirmi algú expert, per exemple una associació micològica.

18
bolets diferents en 76 fotos

4
comestibles segons la bibliografia, cap de confirmat

14
tòxics, no comestibles o sense determinar

0
rovellons: les taronges eren rússules i boletus

LA PREGUNTA

Eren rovellons sense cercles?

No. Els bolets taronja sense cercles de les fotos són d'altres espècies. Es pot dir amb molta seguretat, però mai al 100% només amb fotos: per això tens la prova de les cinc comprovacions.




Fotos 28–29 i 61–64 · **troballa 6.** Una rússula: peu blanc i llis, làmines crema, vora del barret amb ratlletes i sense llet. El rovelló té el peu taronja amb clotets i làmines taronja.




Fotos 70–71 · **troballa 9.** Per sota té porus, com una esponja, no làmines. És un boletus petit, res a veure amb el rovelló.

COM SABER QUE ÉS UN ROVELLÓ

1. Trenca'l o talla'l: ha de sortir llet taronja o vermell vi, mai blanca.
2. Espera uns minuts: la zona tallada es torna verda.
3. Mira el peu: taronja, buit per dins i sovint amb clotets més foscos.
4. Mira les làmines: taronja o color vi, mai blanques ni crema.
5. Mira on és: sota pins, sempre.

Els cercles no serveixen per decidir: el rovelló de veritat (*L. sanguifluus*) sovint gairebé no en té. Si en trencar-lo surt **llet blanca**, fora: pot ser l'enganyapastors, que té cercles com el rovelló i és tòxic. Pàgina del rovelló →

Comestibles segons la bibliografia 4 troballes

Cap d'aquests està confirmat. Abans de menjar-te'ls, els ha de veure una persona experta amb l'exemplar sencer.



A la base d'un pi

7 Bolet coliflor

Sparassis crispa

COMESTIBLE DE JOVE SEGONS LA BIBLIOGRAFIA

Confiança alta 14:51 · ≈ 620 m

Per què és aquest

Massa de color crema de lòbuls plans i arrissats, com fulls de lasanya, enganxada a la base d'un pi.

Per què no és...

- **Peus de rata (*Ramaria*)**: tenen branques cilíndriques que acaben en punta, no lòbuls plans. Algunes, com *Ramaria formosa*, són tòxiques.

> **PROVA DE CAMP**
> Toca un lòbul: és una làmina plana i ondulada, no un cilindre.

Al llibre: **Peu de rata bord · fitxa**

Fotos 125147



Pell color albercoc esquerdada i peu vermell, 16:01



Exemplar vell: porus groc oliva grans, 15:16



Jove: peu groc a dalt i vermell a baix, 15:55

9 Boletus de porus grocs i peu vermell

Rheubarbariboletus armeniacus / Xerocomellus

● COMESTIBLE MEDIOCRE SEGONS LA BIBLIOGRAFIA

Confiança mitjana 15:16, 15:55 i 16:01 · 510–590 m

Compte: els boletus tòxics de peu vermell (*Rubroboletus*, *Suillellus*, *Imperator*).

Per què és aquest

Tenen porus (com una esponja) en lloc de làmines. La pell, color albercoc, s'esquerda en mosaic i deixa veure la carn clara. Els porus són groc oliva i el peu vermell rosat. Surten en sòl sorrenc amb alzines i pins.

Per què no és...

- **Matagent i altres boletus de peu vermell**: tenen els porus vermells o taronja. Aquí són grocs.
- **Rovelló**: té làmines, no porus, i fa llet taronja.

PROVA DE CAMP

Mira els porus: grocs en aquest grup, vermells o taronja en els tòxics de peu vermell.

Al llibre: **Matagent · fitxa**

Fotos 131645–131648 · 135513–135515 · 140103–140104



Grup amb peu curt i punxetes



De prop: punxetes còniques

10 Pet de llop

Lycoperdon perlatum

● COMESTIBLE NOMÉS MOLT JOVE ●●● Confiança alta

15:24 · ≈ 560 m

Compte: un ou d'*Amanita* tancat sembla una boleta blanca. Algunes són mortals.

Per què és aquest

Boletes blanques amb un peu curt, cobertes de punxetes còniques que cauen i deixen un dibuix de xarxa.

Per què no és...

- **Escleroderma (nº 13)**: no té punxes, la pell és gruixuda i escatosa i per dins es torna negre violaci.
- **Ou d'*Amanita***: si el talles per la meitat, a dins s'hi veu la silueta d'un bolet.

PROVA DE CAMP

Talla'l de dalt a baix: si per dins és blanc i uniforme, és pet de llop. Si s'hi veu la silueta d'un bolet, és un ou d'Amanita.

Al llibre: **Pet de llop · fitxa** **Farinera borda · fitxa**

Fotos 132356–132400



Porus grocs i peu rosat puntejat



Barret vermell vellutat

18 Boletus vermell de porus grocs

Hortiboletus rubellus (probable)

● COMESTIBLE MEDIOCRE SEGONS LA BIBLIOGRAFIA

Confiança mitjana 16:44 · ≈ 280 m

Per què és aquest

Barret vermell sang i vellutat, porus grocs i peu rosat amb puntets, a l'herba de la vora del camí.

Per què no és...

- **Boletus tòxics de peu vermell**: tenen els porus vermells o taronja.
- **Boletus de peu vermell color albercoc (nº 9)**: tenen la pell esquerdada en mosaic.

> **PROVA DE CAMP**
> Pressiona els porus: s'haurien de tornar blaus.

Al llibre: **Matagent · fitxa**

Fotos 144430–144434

No comestibles, tòxics o sense determinar

14 troballes

Les rússules que no es poden identificar per foto (nº 14, 15 i 16) van aquí: si no saps què és, no es menja.



Exemplar jove sobre sauló, 13:53



Adult en embut, amb la vora blanca, 15:37



Diversos barrets fusionats, molt jove, 14:25

1 Hidnel

Hydnellum sp. (tipus H. concrescens / H. scrobiculatum)

NO COMESTIBLE · Confiança mitjana

13:53, 14:25 i 15:37 · 350–585 m

Per què és aquest

Dur com el suro, amb la vora blanca i cotonosa que creix i engloba branquetes. Els barrets es fusionen entre ells i per sota té agullons en lloc de làmines. Li agrada el sauló.

Per què no és...

- **Llengua de bou (*Hydnum repandum*)**: és carnosa i trencadissa, de color taronja crema uniforme i sense la vora cotonosa.
- ***Thelephora***: és marró xocolata fosc.
- ***Coltricia perennis***: té zones marró rovell i porus en lloc d'agullons.

PROVA DE CAMP

Gira'l: si a sota té agullons i la carn és dura i fibrosa com el suro, és un hidnel.

Al llibre: **Llengua de bou · fitxa**

Fotos 115343–115347 · 122519–122521 · 133741–133742



De costat: làmines blanques i peu curt i gruixut



Barret llefiscós groc oliva sota pins

2 Rússula groc oliva

Russula cf. ochroleuca

NO COMESTIBLE · Confiança mitjana · 14:07 · ≈ 400 m

Compte: recorda la farinera borda (*Amanita phalloides*), que és mortal.

Per què és aquest

Barret llefiscós groc verdós, amb la vora una mica estriada, làmines blanques i peu blanc, curt i gruixut, sense anell a la vista. Sota pins.

Per què no és...

- **Farinera borda (*Amanita phalloides*)**: té la vora llisa amb fibres radials, un peu més esvelt amb anell i una volva en forma de sac a la base. A les fotos no es veu la base, així que no es pot descartar del tot.
- **Llora (*Russula virescens*)**: té la pell seca i esquerdada en plaques verdes.

PROVA DE CAMP

Arrenca-la sencera i mira la base. Si la carn del peu es trenca com un guix i no hi ha ni anell ni volva, és una rússula.

Al llibre: **Farinera borda · fitxa** **Llora i carbonera · fitxa**

Fotos 120731–120733



Barrets desfent-se en tinta negra, 15:23



Des de dalt, amb restes blanques del vel



Exemplar obrint-se, 14:21

3 Coprí garsa

Coprinopsis picacea

● TÒXIC O SOSPITÓS ●●● Confiança mitjana

14:21 i 15:23 · 385–580 m

Per què és aquest

Peu blanc, molt alt i buit. El barret es desfà en una tinta negra que goteja. És fosc, amb plaques blanques del vel, com el plomatge d'una garsa. A les 14:21 se'n veu un obrint-se, amb el centre ocre i la vora plisada que ennegreix.

Per què no és...

- **Bolet de tinta (*Coprinus comatus*)**: és blanc, llanós i allargat, i surt a prats i cunetes.
- **Bolet de femer (*Coprinopsis atramentaria*)**: és gris, sense plaques blanques, i creix en grups atapeïts al costat de soques.

PROVA DE CAMP

Les plaques blanques es desenganxen amb el dit: són restes del vel que embolicava el bolet jove.

Al llibre: **Bolet de tinta · fitxa** **Bolet de femer · fitxa**

Fotos 122119–122123 · 132315–132328



Barret setinat que s'esquinça per la vora, 15:40



Grupet sota alzines, 14:25



Peu fibrós amb escametes marrons

4 Bolets crema de barret fibrós

Inocybe sp. probable (o Hebeloma)

● POTENCIALMENT TÒXIC Confiança baixa

14:25 i 15:40 · 515–570 m

Compte: es cullen per error pensant que són cama-secs. Moltes *Inocybe* porten muscarina.

Per què és aquest

Barret crema i setinat, de fibres radials, que s'esquinça per la vora. Peu fibrós amb escametes marrons. En grupets sota alzines. Sense microscopi no es pot arribar a l'espècie.

Per què no és...

- **Cama-sec (*Marasmius oreades*)**: creix en rotllanes als prats, té les làmines molt separades i un peu tan corretjós que es retorça sense trencar-se.

- *Psathyrella candolleana*: té el peu blanc, llis i molt fràgil, i les làmines acaben marró violaci fosc.

> **PROVA DE CAMP**
> Fes l'esporada (el barret de cap per avall sobre un paper unes hores): marró tabac a Inocybe i Hebeloma; blanca al cama-sec.

Al llibre: **Inocybe · fitxa** **Cama-sec · fitxa**

Fotos 122512–122515 · 134020–134035



Barret vermell, làmines i peu blancs, 15:36



Descolorida per la pluja: blanca amb el centre rosa, 14:32



Forma més ataronjada, 15:48

5 Rússules vermelles

Russula grup emetica / fragilis

● TÒXIC (PICANT) ●●● Confiança mitjana

14:32, 15:36 i 15:48 · 535–590 m

Per què és aquest

Barret vermell o corall, làmines i peu blancs, i carn que es trenca com un guix. La pluja renta el vermell: la de les 14:32 ha quedat blanca amb el centre rosa i la vora acanalada. Les d'aquest grup piquen molt i fan mal de panxa.

Per què no és...

- **Reig bord (*Amanita muscaria*)**: té berrugues blanques al barret, anell al peu i una volva en anells a la base.
- **Ou de reig (*Amanita caesarea*)**: té les làmines i el peu grocs i una volva blanca en sac.

PROVA DE CAMP

Pressiona el peu: a les rússules es trenca com un guix i mai hi ha anell ni volva.

Al llibre: **Escaldabecs · fitxa** **Reig bord · fitxa** **Ou de reig · fitxa**

Fotos 123244–123258 · 133623–133632 · 134854–134855



Barret ocre taronja llefiscós i làmines crema, 15:49



Vora amb solcs com una pinta



Exemplar grisenc trencat: la carn s'esmicola com un guix, 14:41



Grisa pàl·lida de vora estriada, 14:34

6 Rússules pudents de vora acanalada

Russula grup foetens / sororia / amoenolens

NO COMESTIBLE Confiança mitjana

14:34, 14:41, 15:19 i 15:49 · 535–580 m

Compte: la grisa de les 14:34 també encaixa amb l'amanita envainada (*Amanita vaginata*). Cal veure la base.

Per què és aquest

Vora del barret amb solcs com una pinta, barret llefiscós ocre taronja o marró grisenc, i peu blanc que es taca de marró. Solen fer pudor: a ranci, a formatge o a oli.

Per què no és...

- **Rovelló (*Lactarius*)**: fa llet taronja o vermella, té el peu taronja amb clotets i les làmines taronja. Aquesta no fa llet i té el peu blanc.
- **Amanita envainada (*Amanita vaginata*)**: també té la vora estriada, però el peu és més esvelt i fràgil i surt d'una volva en forma de sac.

PROVA DE CAMP

Olora-la: la pudor de ranci o d'ametlla amarga és típica d'aquest grup. I trenca-la: no fa llet.

Al llibre: **Rovelló i pinetell · fitxa**

Fotos 123410–123412 · 124109–124127 · 131916–131917 · 134909–135027



Forma de boletus, tot cobert de feltre



Vist des de dalt

8 Boletus parasitat per una floridura

Hypomyces chrysospermus

NO ES MENJA MAI Confiança alta 15:13 · ≈ 600 m

Per què és aquest

Té forma de boletus, però està deformat i folrat sencer d'un feltre blanc que groguenca, sense porus a la vista. És una floridura que es menja el boletus. Un boletus amb aquesta floridura no es menja mai.

Per què no és...

- **Hidnel (nº 1)**: no té forma de barret sobre un peu, i per sota té agullons.
- **Boletus sa**: té els porus a la vista i la superfície llisa o vellutada, sense feltre.

Fotos 131311–131320



Sobre un tronc mort

11 Repises blanques

Trametes sp. (probable T. hirsuta)

NO COMESTIBLE · Confiança mitjana · 15:26 · ≈ 565 m

Per què és aquest

Repises petites, blanquinoses i amb zones ocre, amb porus blancs per sota, sobre un tronc mort. Són corretjoses.

Per què no és...

- **Cua de gall dindi (*Trametes versicolor*)**: té bandes de molts colors, blavoses o marrons.

Fotos 132613–132614



Cara inferior en laberint



Vista de dalt, sobre un tronc de pi

12 Repisa de porus en laberint

Gloeophyllum sp. (probable)

NO COMESTIBLE · Confiança baixa · 15:35 · ≈ 595 m

Per què és aquest

Repisa marró fosca sobre un tronc de pi, amb la cara inferior en forma de laberint marró.

Per què no és...

- ***Daedalea quercina***: té un laberint molt més gruixut, color suro clar, i creix en roure.

Fotos 133531–133533



Pell gruixuda amb escates poligonals



Exemplars petits; un d'esquerdat

13

Escleroderma

Scleroderma citrinum / verrucosum

TÒXIC · Confiança alta · 15:37 · ≈ 580 m

Per què és aquest

Bola ocre marró sense peu de veritat, de pell gruixuda i trencada en escates poligonals, com pell de rèptil.

Per què no és...

- **Pet de llop (nº 10)**: té punxetes i per dins és blanc i esponjós.
- **Tòfones**: creixen enterrades i fan una olor intensa.

> **PROVA DE CAMP**
> Talla'l: per dins és negre violaci marbrejat, fins i tot de jove.

Al llibre: **Escleroderma · fitxa** **Pet de llop · fitxa**

Fotos 133756–133801



Làmines crema ocre i peu rosa



Barret vermell vi

14 Rússula vinosa de peu rosa

Russula grup xerampelina o d'altres

SENSE DETERMINAR · Confiança baixa · 15:46 · ≈ 540 m

Per què és aquest

Barret vermell vi fosc, làmines crema ocre i peu rosat. Per arribar a l'espècie calen l'olor i l'esporada.

Per què no és...

- **Rússules vermelles picants (nº 5)**: tenen les làmines i el peu blancs.

PROVA DE CAMP

Olora-la: les del grup xerampelina fan olor de marisc o de peix.

Fotos 134600–134603



Peu blanc robust sense anell a la vista



La carn s'esquerda en falques

15 Rússula gran blanc crema

Russula sp.

SENSE DETERMINAR · Confiança baixa · 15:47 · ≈ 540 m

Compte: les amanites blanques (*A. verna*, *A. virosa*), que són mortals.

Per què és aquest

Bolet gran blanc crema, de pell llefiscosa, amb la carn que s'esquerda en falques i un peu blanc robust, sense anell a la vista.

Per què no és...

- **Amanites blanques (*A. verna*, *A. virosa*, *A. ovoidea*)**: tenen anell al peu i volva a la base.

> **PROVA DE CAMP**
> Amb qualsevol bolet gran i blanc, arrenca'l sencer i busca la volva.

Al llibre: **Farinera pudent · fitxa** **Farinera · fitxa**

Fotos 134730–134746



Làmines blanques



Barret porpra llefiscós

16 Rússula violeta

Russula cf. cyanoxantha (carbonera)

● SENSE DETERMINAR (LA CARBONERA ÉS COMESTIBLE)

Confiança baixa 15:55 · ≈ 510 m

Per què és aquest

Barret porpra vinós i llefiscós, làmines blanques i peu blanc rosat, sota alzines i castanyers.

Per què no és...

- ***Russula atropurpurea***: té el centre gairebé negre i les làmines es trenquen en fregar-les.

> **PROVA DE CAMP**
> Passa el dit per les làmines: si es dobleguen com si fossin greixoses, sense trencar-se, és la carbonera. Si es trenquen, és una altra.

Al llibre: **Llora i carbonera · fitxa**

Fotos 135505–135508



Embut blanc brut de terra



Làmines molt atapeïdes

17 Rússula blanca en embut

Russula grup delica / chloroides

NO RECOMANABLE · Confiança mitjana · 16:01 · ≈ 510 m

Per què és aquest

Embut blanc que surt empenyent la terra (per això va tan brut), amb làmines molt atapeïdes i peu curt.

Per què no és...

- ***Lactifluus* blancs (*L. piperatus*, *L. vellereus*)**: en tallar les làmines treuen llet blanca.

PROVA DE CAMP

Fes un tall a les làmines: si surt llet, és un Lactifluus.

Al llibre: **Lactaris de llet blanca · fitxa**

Fotos 140151–140152

Per a la propera sortida

Amb aquestes quatre fotos de cada bolet, la identificació seria molt més segura.

1 · Sencer, amb la base

Arrenca'l i fotografia la base per veure si té volva.

2 · Per sota

Una foto de les làmines, els porus o els agullons.

3 · Tallat

Mira si canvia de color o si fa llet, i de quin color.

4 · Olor i arbre

Apunta l'olor i quin arbre tenia al costat.

Capítol 8


Cara a cara

Les confusions que omplen urgències cada tardor, de la més fàcil a la més difícil. Aprèn-te la clau de cada parella.

Rovelló o lactari de llet blanca?


FÀCIL DE DISTINGIR

La clau: Talla el bolet: la llet ho diu tot.



Rovelló i pinetell

● COMESTIBLE



Lactaris de llet blanca

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Rovelló i pinetell

● COMESTIBLE



Lactaris de llet blanca

● TÒXIC


	Rovelló i pinetell	Lactaris de llet blanca
1 LLET EN TALLAR-LO	Taronja o vermell vi	Blanca; al pinetell bord es torna groga
2 VORA DEL BARRET	Llisa	Peluda i enrotllada (bolet de cabra)
3 ES TACA DE VERD	Sí	No
RESULTAT	**Comestible · Excel·lent**	**Tòxic**

Rovelló sense cercles o rússula?

CAL FIXAR-S'HI


La clau: Trenca'l: la rússula no fa llet i el peu blanc es trenca com un guix.

Al Montnegre vas trobar rússules taronja que semblaven rovellons sense cercles: mira la troballa 6. Veure-la →



Rovelló i pinetell

● COMESTIBLE



Escaldabecs

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Rovelló i pinetell

● COMESTIBLE



Escaldabecs


● TÒXIC

	Rovelló i pinetell	Escaldabecs
1 LLET	Taronja o vermell vi	Cap
2 PEU	Taronja, buit, amb clotets	Blanc i llis
3 LÀMINES	Taronja o color vi, es taquen de verd	Blanques o crema
4 CERCLES AL BARRET	Sovint, però no sempre	Mai
ON	Sota pins	Pins, alzines, castanyers
RESULTAT	**Comestible · Excel·lent**	**Tòxic**

Pet de llop o escleroderma?


FÀCIL DE DISTINGIR

La clau: Talla'l per la meitat: blanc per dins és pet de llop; negre o violaci, escleroderma.



Pet de llop

● COMESTIBLE



Escleroderma

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Pet de llop

● COMESTIBLE



Escleroderma


● TÒXIC

	Pet de llop	Escleroderma
1 PELL	Fina, amb berrugues que es desprenen	Gruixuda, dura i escatosa
2 PER DINS	Blanc i tou (jove)	Negre violaci i dur
OLOR	Suau	Forta i desagradable
RESULTAT	**Comestible · Acceptable (jove)**	**Tòxic**

Cep, matagent o molleric amarg?


FÀCIL DE DISTINGIR

La clau: Mira el color dels porus i talla la carn.




Cep

● COMESTIBLE



Matagent

● TÒXIC



Molleric amarg

● PRECAUCIÓ

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Cep

● COMESTIBLE



Matagent

● TÒXIC



Molleric amarg

● PRECAUCIÓ

	Cep	Matagent	Molleric amarg
1 PORUS	Blancs, després groc verdosos	Vermells	Blancs, després rosats
2 CARN TALLADA	Blanca, no canvia	Es torna blava	Blanca
3 XARXA DEL PEU	Clara	Vermella	Fosca
RESULTAT	**Comestible · Excel·lent**	**Tòxic**	**Precaució**

Rossinyol o gírgola d'olivera?

CAL FIXAR-S'HI

La clau: Plecs gruixuts a terra = rossinyol. Làmines fines en grup sobre fusta = fora.



Rossinyol

COMESTIBLE

Gírgola d'olivera

TÒXIC

Rossinyol ataronjat

PRECAUCIÓ

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Rossinyol

COMESTIBLE



Gírgola d'olivera

TÒXIC



Rossinyol ataronjat


PRECAUCIÓ

	Rossinyol	Gírgola d'olivera	Rossinyol ataronjat
1 SOTA EL BARRET	Plecs gruixuts i bifurcats	Làmines fines i atapeïdes	Làmines fines i toves
2 ON CREIX	A terra	En grups sobre soques	Sobre pinassa o fusta
CARN	Blanca i ferma	Taronja	Tova
RESULTAT	Comestible · Excel·lent	Tòxic	Precaució

Cama-sec o clitocibe blanc?


CAL FIXAR-S'HI

La clau: Làmines molt separades i un peu que es retorça sense trencar-se.



Cama-sec

● COMESTIBLE



Clitocibes blancs

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Cama-sec

● COMESTIBLE



Clitocibes blancs

● TÒXIC


	Cama-sec	Clitocibes blancs
1 COLOR	Cuir o crema	Blanc, com enfarinat
2 LÀMINES	Molt separades, no baixen pel peu	Atapeïdes, baixen pel peu

	Cama-sec	Clitocibes blancs
3 PEU RETORÇAT	No es trenca	Es trenca
RESULTAT	Comestible · Excel·lent	Tòxic

Fredolic o fredolic metzinós?


CAL FIXAR-S'HI

La clau: El metzinós és més gros, escatós, fa olor de farina i viu a la muntanya alta.



Fredolic

● COMESTIBLE



Fredolic metzinós

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Fredolic

● COMESTIBLE



Fredolic metzinós


● TÒXIC

	Fredolic	Fredolic metzinós
1 BARRET	3–7 cm, gris ratolí, feltrat	6–12 cm, escates fosques en cercles
2 PEU	Prim, fràgil, buit	Gruixut, ple
OLOR	Gairebé cap	Farina
RESULTAT	**Comestible · Molt bo**	**Tòxic**

Cama de perdiu o cortinari?


CAL FIXAR-S'HI

La clau: Les làmines de la cama de perdiu són gruixudes i baixen pel peu; les del cortinari, no.



Cama de perdiu

● COMESTIBLE



Cortinari metzinós

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Cama de perdiu

● COMESTIBLE



Cortinari metzinós


● MORTAL

	Cama de perdiu	Cortinari metzinós
1 LÀMINES	Gruixudes, baixen pel peu	Color rovell, no baixen pel peu
2 BARRET	Llefiscós, amb mamelló punxegut	Sec i fibrós
ON	Sota pins	Sota roures i castanyers
RESULTAT	**Comestible · Bo**	**Mortal**

Apagallums o lepiota?


CAL FIXAR-S'HI

La clau: Regla dels 15 cm, anell mòbil i peu de pell de serp.




Apagallums

● COMESTIBLE



Lepiotes petites

● MORTAL



Paloma vermellosa

● PRECAUCIÓ

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Apagallums

● COMESTIBLE



Lepiotes petites

● MORTAL



Paloma vermellosa


● PRECAUCIÓ

	Apagallums	Lepiotes petites	Paloma vermellosa
1 BARRET	15–30 cm	2–8 cm	10–15 cm
2 PEU	Alt, pell de serp	Curt, bandes escatoses	Llis
3 ANELL	Doble, es mou	Fràgil o absent	Doble, es mou
RESULTAT	**Comestible · Molt bo**	**Mortal**	**Precaució**

Carlet o fals carlet?


CAL FIXAR-S'HI

La clau: Làmines blanques tacades de vi, o làmines rosades amb olor de farina.



Carlet

● COMESTIBLE



Fals carlet

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Carlet

● COMESTIBLE



Fals carlet

● TÒXIC


	Carlet	Fals carlet
1 BARRET	Rosat amb taques vinoses	Blanc grisenc o beix

	Carlet	Fals carlet
2 LÀMINES	Blanques tacades de vi	Groguenques, després rosa salmó
OLOR	Suau	Farina rància
RESULTAT	Comestible · Molt bo	Tòxic

Ou de reig, reig bord o farinera borda?


DIFÍCIL · RISC GREU

La clau: Talla l'ou per la meitat: només el reig és taronja i groc per dins.




Ou de reig

● COMESTIBLE



Reig bord

● TÒXIC



Farinera borda

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Ou de reig

● COMESTIBLE



Reig bord

● TÒXIC



Farinera borda


● MORTAL

	Ou de reig	Reig bord	Farinera borda
1 BARRET	Taronja, llis	Vermell amb berrugues	Verd oliva, groguenc o blanc
2 LÀMINES	Grogues	Blanques	Blanques
3 PEU I ANELL	Grocs	Blancs	Blancs
4 VOLVA	Sac blanc gran	Anells al bulb	Sac blanc
RESULTAT	**Comestible · Excel·lent**	**Tòxic**	**Mortal**

Llora o farinera borda?


DIFÍCIL · RISC GREU

La clau: Arrenca-la sencera: la llora no té ni anell ni volva.



Llora i carbonera

● COMESTIBLE



Farinera borda

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Llora i carbonera

● COMESTIBLE



Farinera borda


● MORTAL

	Llora i carbonera	Farinera borda
1 BARRET	Verd clapat, sense fibres	Verd oliva amb fibres
2 ANELL	No	Sí, com una faldilla
3 VOLVA	No	Sí, sovint enterrada
4 PEU TRENCAT	Com un guix	A fibres
RESULTAT	**Comestible · Molt bo**	**Mortal**

Camperol, bola de neu pudent o farinera pudent?


DIFÍCIL · RISC GREU

La clau: Un xampinyó obert té làmines rosades o marrons, mai blanques, i no té volva.




Camperol

● COMESTIBLE



Bola de neu pudent

● TÒXIC



Farinera pudent

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Camperol

● COMESTIBLE



Bola de neu pudent

● TÒXIC



Farinera pudent


● MORTAL

	Camperol	Bola de neu pudent	Farinera pudent
1 LÀMINES	Rosa, després xocolata	Rosa grisenc, després marró	Blanques sempre
2 BASE DEL PEU	Sense volva	Groc canari en rascar-la	Volva en sac
OLOR	De bolet	Tinta o iode	Desagradable
RESULTAT	**Comestible · Bo**	**Tòxic**	**Mortal**

Farinera o Amanita proxima?


DIFÍCIL · RISC GREU

La clau: Arrenca-la i mira la volva: blanca és farinera; taronja rovellada, proxima.



Farinera

● COMESTIBLE



Amanita proxima

● TÒXIC

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Farinera

● COMESTIBLE



Amanita proxima

● TÒXIC


	Farinera	Amanita proxima
1 VOLVA	Blanca i gruixuda	Amb tons taronja o rovell
2 ANELL	Cremós, es desfà	Membranós, penja

	Farinera	Amanita proxima
TOXICITAT	Comestible, no recomanable	Danya els ronyons
RESULTAT	**Comestible · Acceptable · no recomanable**	**Tòxic**

Pimpinella morada o cortinari?


DIFÍCIL · RISC GREU

La clau: Fes l'esporada: rosa pàl·lid és pimpinella, marró rovell és cortinari.



Pimpinella morada

● COMESTIBLE



Cortinari metzinós

● MORTAL

Esquema. Els números assenyalen on has de mirar i són les files de la taula.



Pimpinella morada

● COMESTIBLE



Cortinari metzinós

● MORTAL

	Pimpinella morada	Cortinari metzinós
1 CORTINA	No	Sí, de jove
2 ESPORADA	Rosa pàl·lid	Marró rovell
3 LÀMINES VELLES	Lila terrós	Color rovell
RESULTAT	**Comestible · Bo (sempre cuinada)**	**Mortal**

Capítol 9

A la cuina i a casa

Un bolet ben identificat també es pot fer malbé després. Així es tracten a casa.

Neteja'ls al bosc

Treu la terra amb el ganivet i el raspall abans de posar-los a la cistella. A casa, un drap humit; no els deixis en remull.

A la nevera, poc temps

En una capsa o en paper, mai en plàstic, i menja'ls en un o dos dies.

Per congelar

La majoria es conserven millor si abans els saltes o els escaldes uns minuts.

Per assecar

Ceps a làmines, trompetes, camagrocs i cama-secs s'assequen molt bé a l'aire o a l'assecador.

Sempre ben cuinats

Cap bolet silvestre cru. Alguns, com la pimpinella o la vinosa, són tòxics crus.

Primer tast

Si és el primer cop que menges una espècie, menja'n poca quantitat i guarda'n un exemplar cru a la nevera.

Sense alcohol

El bolet de femer amb alcohol provoca palpitacions i vòmits, fins i tot dies després.


Només el que menjaràs

No cal buidar el bosc. Molts boletaires es posen un màxim d'uns 3 kg per persona i dia.

Capítol 11

Descarts ràpids i mites

No hi ha cap regla per saber si un bolet és bo. Però sí que n'hi ha per saber quan deixar-lo. Si en compleix una, no va a la cistella.



La combinació mortal. Làmines blanques, anell i volva en sac: és una amanita. Si en veus les tres, o fins i tot només la volva, fora de la cistella.

- **Té volva: un sac a la base**
  Amanites. Hi ha la farinera borda i la farinera pudent.

- **Làmines blanques i anell**
  Combinació típica de les amanites mortals.

- **Bolet blanc amb làmines**
  Clitocibes, farinera pudent, lepiotes. Massa risc.

- **"Apagallums" de menys de 15 cm**
  Pot ser una lepiota mortal.

- **Porus vermells o carn que blaveja**
  Matagent i parents.

Lactari amb llet blanca

Només el grup del rovelló té llet taronja o vermella.

Bolet marró petit sobre fusta

Pot ser una galerina, mortal.

Cortina o làmines color rovell

Cortinaris. Alguns destrueixen els ronyons.

Bola que per dins no és blanca

Escleroderma, o un ou d'amanita.

Ram taronja sobre olivera o alzina

Gírgola d'olivera.

Vell, aigualit, cucat o florit

Fins i tot un comestible pot intoxicar quan està passat.

Ou tancat

Per fora, un ou de reig i una farinera borda són iguals.

Recorda: superar els descarts no vol dir que el bolet sigui comestible. Només vol dir que pots continuar comprovant-lo amb la seva pàgina.

FALS

«Si una moneda de plata o un all s'enfosqueixen, el bolet és tòxic.»

La farinera borda no enfosqueix ni la plata ni l'all.

FALS

«Si se'l mengen els cargols o els conills, és bo.»

Els animals mengen farinera borda sense problemes.

FALS

«Els que es pelen fàcilment són comestibles.»

La farinera borda es pela molt bé.

FALS

«Si fa bona olor i té bon gust, no fa mal.»

Els intoxicats per farinera borda expliquen que era bona.

FALS

«Bullir-los o assecar-los treu el verí.»

Les toxines mortals resisteixen la cocció i l'assecat.

FALS

«Si al cap d'una hora estic bé, ja està.»

Els mortals triguen de 6 a 24 hores. Els cortinaris, fins a dues setmanes.

Capítol 12

Abans de menjar-te'l

Repassa aquesta llista amb cada bolet que vulguis cuinar. Si n'hi ha un que no pots marcar, no te'l mengis.

Sé com es diu

En sé el nom i l'he comparat amb la seva pàgina del llibre.

He mirat a sota del barret

Làmines, porus, plecs o agullons, i el seu color.

He vist la base sencera

Sé si té volva o no.

He descartat el seu bessó

He comprovat la clau del cara a cara.

Està jove i sa

Ferm, sense cucs, sense floridura i sense aigua.

Si en tinc el mínim dubte, no me'l menjo

Cap bolet val una nit a urgències.

Capítol 13

Si algú es troba malament

TRUCA

112

Digues que heu menjat bolets silvestres i quan.

Copia el número

SERVEI D'INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA · 24 H

91 562 04 20

Consultes telefòniques d'intoxicacions per a tot l'Estat.

Copia el número

QUAN HAN COMENÇAT ELS SÍMPTOMES?

< 6 h	Normalment digestiva o nerviosa. Cal anar a urgències igualment.
6–24 h	Alerta màxima: farinera borda, lepiotes o galerina. Encara que et trobis millor, el fetge s'està danyant.
2–17 dies	Set intensa i poca orina: cortinari metzinós.

QUÈ FER

- Ves a urgències encara que sembli lleu.
- Porta els bolets que sobrin, crus o cuinats, i les peles.
- Avisa tothom que n'hagi menjat.
- No prenguis remeis casolans ni provoquis el vòmit sense indicació mèdica.

Avís: aquest llibre és una eina d'aprenentatge i no substitueix la revisió d'un micòleg. Els bolets canvien amb l'edat, la pluja i el terreny, i cap foto les mostra totes.

Fonts del text: Generalitat de Catalunya (bolets comestibles i tòxics més freqüents), Història Natural dels Països Catalans (comestibilitat i toxicitat), Ministeri de Justícia (Servei d'Informació Toxicològica). **Obres consultades com a referència**, sense reproduir-ne textos ni fotos: *Guía de setas de Hoyo de Manzanares* (2018), *Guía de setas de Páramos y Valles Palentinos* (2008) i *La Guia dels Bolets Catalans* (dos-a-la-tres.com).

Fotografies: observacions d'iNaturalist amb llicència Creative Commons, la majoria fetes a Catalunya. Cada foto porta el nom de qui la va fer.

Rovelló i pinetell · Quercus morisii · CC BY-NC · observació
Rovelló i pinetell · marahf · CC BY-NC · observació
Rovelló i pinetell · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació
Rovelló i pinetell · stoned_microscopy · CC BY-NC · observació
Rovelló i pinetell · Nico Hernandez · CC BY · observació
Rovelló i pinetell · Cristobal Jimenez · CC BY-NC-ND · observació
Rovelló i pinetell · Izan Lopez Vergel · CC BY-NC · observació
Rovelló i pinetell · Izan Lopez Vergel · CC BY-NC · observació
Trompeta de la mort · yaya_love · CC BY-NC · observació
Trompeta de la mort · Josep Sais i Brucet · CC BY-NC · observació
Trompeta de la mort · pogon · CC BY-NC · observació
Trompeta de la mort · fenneck · CC BY-NC · observació
Trompeta de la mort · hherb · CC BY-NC · observació
Trompeta de la mort · yossarianc · CC BY-NC · observació
Trompeta de la mort · Guille Marín · CC BY-NC · observació
Camagroc · Josep Sais i Brucet · CC BY-NC · observació
Camagroc · mingokt · CC BY-NC · observació
Camagroc · Nico Hernandez · CC BY · observació
Camagroc · polchof · CC BY-NC · observació
Camagroc · nicomanus · CC BY-NC · observació
Camagroc · Nico Hernandez · CC BY · observació
Camagroc · Nico Hernandez · CC BY · observació
Llengua de bou · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació
Llengua de bou · Alba Rovira · CC BY-NC · observació
Llengua de bou · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació
Llengua de bou · Josep Sais i Brucet · CC BY-NC · observació
Llengua de bou · Jacobo Martín · CC BY-NC · observació
Llengua de bou · jonatan_antunez · CC BY-NC · observació
Molleric · Javier A. Canteros · CC BY-NC · observació
Molleric · Sean S · CC BY-NC · observació
Molleric · Sean S · CC BY-NC · observació
Molleric · Quercus morisii · CC BY-NC · observació
Molleric · Ibai Olariaga · CC BY-NC · observació
Molleric · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

Molleric · oriolusoriolus · CC BY-NC · observació

Bolet de tinta · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

Bolet de tinta · jorditb · CC BY-NC · observació

Bolet de tinta · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

Bolet de tinta · Joan Ramon Torrella · CC BY-NC · observació

Bolet de tinta · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

Bolet de tinta · Daniel Fornos Alimbau · CC BY-NC · observació

Bolet de tinta · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

Cep · Carmelo López Abad · CC BY-NC · observació

Cep · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

Cep · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

Cep · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

Cep · hherb · CC BY-NC · observació

Cep · UNIRSE Llavi · CC BY-NC · observació

Cep · Joan Corominas Melian · CC BY-NC · observació

Cep · fr_em · CC BY-NC · observació

Rossinyol · jonatan_antunez · CC BY-NC · observació

Rossinyol · Miguel A. Casado · CC BY-NC · observació

Rossinyol · Marc Riera · CC BY · observació

Rossinyol · David Pereira · CC BY-NC · observació

Rossinyol · Àngel Argüelles · CC BY-NC · observació

Rossinyol · Josep M. Esteve Guilera · CC BY-NC · observació

Rossinyol · oriol3333 · CC BY-NC · observació

Fredolic · josep65 · CC BY-NC · observació

Fredolic · Nico Hernandez · CC BY · observació

Fredolic · Nico Hernandez · CC BY · observació

Fredolic · Nico Hernandez · CC BY · observació

Fredolic · Xavi · CC BY-NC · observació

Fredolic · javixu · CC BY-NC · observació

Fredolic · Nico Hernandez · CC BY · observació

Llenega negra · jl_cc · CC BY-NC · observació

Llenega negra · jl_cc · CC BY-NC · observació

Llenega negra · LaiaGuàrdia · CC BY-NC-ND · observació

Llenega negra · yossarianc · CC BY-NC · observació

Llenega negra · jl_cc · CC BY-NC · observació

Llenega negra · Nico Hernandez · CC BY · observació

Llenega negra · Nico Hernandez · CC BY · observació

Carlet · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

Carlet · Joseba · CC BY-NC · observació

Carlet · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

Carlet · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

Carlet · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

Carlet · Víctor Huete Pelaez · CC BY-NC · observació

Carlet · Cristobal Jimenez · CC BY-NC-ND · observació

Cama-sec · Izan Lopez Vergel · CC BY-NC · observació

Cama-sec · manelor · CC BY-NC-ND · observació

Cama-sec · Experience Matters · CC BY-NC · observació

Cama-sec · yossarianc · CC BY-NC · observació

Cama-sec · Joan Corominas Melian · CC BY-NC · observació

Cama-sec · Peyut · CC BY-NC · observació

Cama-sec · Xavier Béjar · CC BY-ND · observació

Apagallums · victoriadurazo · CC BY-NC · observació

Apagallums · Ángel Argüelles · CC BY-NC · observació

Apagallums · Oriol Sastre · CC BY · observació

Apagallums · Izan Lopez Vergel · CC BY-NC · observació

Apagallums · José Ignacio Márquez Corro · CC BY-NC · observació

Apagallums · Joan Corominas Melian · CC BY-NC · observació

Apagallums · mussolbarrios · CC BY-NC · observació

Gírgoles · toniconca · CC BY-NC · observació

Gírgoles · Purnendu Roy · CC BY-NC · observació

Gírgoles · Nico Hernandez · CC BY · observació

Gírgoles · Javier Royán Martín · CC BY-NC · observació

Gírgoles · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

Gírgoles · Juan José de Haro · CC BY-SA · observació

Gírgoles · Purnendu Roy · CC BY-NC · observació

Cama de perdiu · Jorge Pérez Arienza · CC BY-NC · observació

Cama de perdiu · Assumpta MC · CC BY-NC · observació

Cama de perdiu · Ikrauel · CC BY-NC · observació

Cama de perdiu · Pablo Silvestre Pérez · CC BY-NC · observació

Cama de perdiu · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

Cama de perdiu · Nico Hernandez · CC BY · observació

Pet de llop · guspiralsnuvols · CC BY-NC · observació

Pet de llop · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

Pet de llop · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

Pet de llop · José María Pando · CC BY-NC · observació

Pet de llop · victoriadurazo · CC BY-NC · observació

Pet de llop · guspiralsnuvols · CC BY-NC · observació

Pet de llop · Fatima Carrasco · CC BY-NC · observació

Ou de reig · LaiaGuàrdia · CC BY-NC-ND · observació

Ou de reig · LaiaGuàrdia · CC BY-NC-ND · observació

Ou de reig · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

Ou de reig · Xavier de Pedro Puente · CC BY-NC · observació

Ou de reig · Ikrauel · CC BY-NC · observació

Ou de reig · Xavier de Pedro Puente · CC BY-NC · observació

Ou de reig · marcaluco · CC BY-NC · observació

Llora i carbonera · Javier Martínez Fuentes · CC BY-NC · observació

Llora i carbonera · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

Llora i carbonera · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

Llora i carbonera · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

Llora i carbonera · mussolbarrios · CC BY-NC · observació

Llora i carbonera · tarareare · CC BY-SA · observació

Llora i carbonera · nicomanus · CC BY-NC · observació

Pimpinella morada · Marc · CC BY-NC · observació

Pimpinella morada · Marc · CC BY-NC · observació

Pimpinella morada · no rights reserved · CC0 · observació

Pimpinella morada · Guille Marín · CC BY-NC · observació

Pimpinella morada · hherb · CC BY-NC · observació

Pimpinella morada · marcaluco · CC BY-NC · observació

Pimpinella morada · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

Pimpinella morada · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

Camperol · Jose-Antonio Ortiz-Marzo · CC BY-NC · observació

Camperol · marcaluco · CC BY-NC · observació

Camperol · Jose-Antonio Ortiz-Marzo · CC BY-NC · observació

Camperol · Sarah and Fernando · CC BY-NC · observació

Camperol · kiksalinas-anapri · CC BY-NC · observació

Camperol · Bernat Espigulé · CC BY-NC · observació

Bola de neu · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

Bola de neu · Angel Zofio Leiva · CC BY-NC · observació

Bola de neu · jorge-prieto · CC BY-NC · observació

Bola de neu · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Bola de neu · Jerry Cooper · CC BY · observació

Bola de neu · laurasanchezjimenez · CC BY-NC · observació

Farinera · jl_cc · CC BY-NC · observació

Farinera · Rafael Carbonell Font · CC BY · observació

Farinera · marcaluco · CC BY-NC · observació

Farinera · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

Farinera · Ikrauel · CC BY-NC · observació

Farinera · Adrià Mercader · CC BY-NC · observació

Farinera borda · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

Farinera borda · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

Farinera borda · Josep Sais i Brucet · CC BY-NC · observació

Farinera borda · no rights reserved · CC0 · observació

Farinera borda · polchof · CC BY-NC · observació

Farinera borda · no rights reserved · CC0 · observació

Farinera borda · BrunadelPirineu · CC BY-NC · observació

Farinera borda · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

Farinera pudent · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

Farinera pudent · yossarianc · CC BY-NC · observació

Farinera pudent · Jesse Kalwij · CC BY-NC · observació

Farinera pudent · Rene Weigelt · CC BY-NC · observació

Farinera pudent · Nicolas Schwab · CC BY-NC · observació

Farinera pudent · Вадим Рыбаков · CC BY-NC · observació

Lepiotes petites · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

Lepiotes petites · Jose-Antonio Ortiz-Marzo · CC BY-NC · observació

Lepiotes petites · Víctor Huete Pelaez · CC BY-NC · observació

Lepiotes petites · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Lepiotes petites · santigibertbolets · CC BY-NC · observació

Lepiotes petites · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

Galerina marginada · Mario Vega Pérez · CC BY-NC · observació

Galerina marginada · Mario Vega Pérez · CC BY-NC · observació

Galerina marginada · faluke · CC BY-NC · observació

Galerina marginada · Ángel Fernández Cancio · CC BY-NC · observació

Galerina marginada · Ibai Olariaga · CC BY-NC · observació

Cortinari metzinós · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

Cortinari metzinós · Federico Calledda · CC BY-NC · observació

Cortinari metzinós · ljantos · CC BY-NC · observació

Cortinari metzinós · Marco Floriani · CC BY-NC · observació

Cortinari metzinós · Nicolas Schwab · CC BY-NC · observació

Paxil enrotllat · joxepo · CC BY-NC · observació

Paxil enrotllat · jonatan_antunez · CC BY-NC · observació

Paxil enrotllat · José Luis Romero Rego · CC BY-NC · observació

Paxil enrotllat · Jose Castro · CC BY · observació

Paxil enrotllat · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

Reig bord · graellsia · CC BY-NC · observació

Reig bord · Quercus morisii · CC BY-NC · observació

Reig bord · Вова Протас · CC BY-NC · observació

Reig bord · johnnywiller · CC BY-NC · observació

Reig bord · mavero · CC BY-NC · observació

Reig bord · mmart · CC BY-NC · observació

Pixacà · nicomanus · CC BY-NC · observació

Pixacà · luiS · CC BY-NC · observació

Pixacà · Yves Bas · CC BY · observació

Pixacà · Oriol Sastre · CC BY · observació

Pixacà · josep65 · CC BY-NC · observació

Pixacà · Yves Bas · CC BY · observació

Amanita proxima · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

Amanita proxima · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

Amanita proxima · jorgemartin71 · CC BY-NC · observació

Amanita proxima · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

Amanita proxima · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

Amanita proxima · Pere Valls · CC BY-NC · observació

Fredolic metzinós · Antton Meléndez · CC BY-NC · observació

Fredolic metzinós · jeclerencia · CC BY-NC · observació

Fredolic metzinós · josep65 · CC BY-NC · observació

Fredolic metzinós · josep65 · CC BY-NC · observació

Fredolic metzinós · Guinberteau Jacques · CC BY-NC · observació

Fals carlet · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

Fals carlet · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

Fals carlet · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Fals carlet · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

Fals carlet · Víctor Huete Pelaez · CC BY-NC · observació

Fals carlet · BrunadelPirineu · CC BY-NC · observació

Gírgola d'olivera · Juan Bertrand-Figueroa · CC BY-NC · observació

Gírgola d'olivera · Bernat Espigulé · CC BY-NC · observació

Gírgola d'olivera · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

Gírgola d'olivera · Miquel Rafa · CC BY-NC · observació

Gírgola d'olivera · albadomingo · CC BY-NC · observació

Lactaris de llet blanca · Alba Rovira · CC BY-NC · observació

Lactaris de llet blanca · josep65 · CC BY-NC · observació

Lactaris de llet blanca · David Marcos Vidal · CC BY-NC · observació

Lactaris de llet blanca · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

Lactaris de llet blanca · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

Lactaris de llet blanca · Jacobo Krauel · CC BY-NC · observació

Matagent · ceslal · CC BY-NC · observació

Matagent · hherb · CC BY-NC · observació

Matagent · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

Matagent · J. IGNASI · CC BY-NC · observació

Matagent · Joseba · CC BY-NC · observació

Matagent · Purnendu Roy · CC BY-NC · observació

Escleroderma · Oriol Sastre · CC BY · observació

Escleroderma · nicomanus · CC BY-NC · observació

Escleroderma · alfredoherrero · CC BY-NC · observació

Escleroderma · jorgemartin71 · CC BY-NC · observació

Escleroderma · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

Escleroderma · Claudia Fernández Bagan · CC BY-NC · observació

Clitocibes blancs · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Clitocibes blancs · maricel patino · CC BY-NC · observació

Clitocibes blancs · lovewildlifeforever · CC BY-NC · observació

Clitocibes blancs · Aura Montenegro · CC BY-NC · observació

Inocybe · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Inocybe · Cándido Sos · CC BY-NC · observació

Inocybe · Jose Castro · CC BY · observació

Inocybe · David Marcos Vidal · CC BY-NC · observació

Inocybe · deinonyco · CC BY-NC-SA · observació

Verderol · Felipe Hidalgo · CC BY-NC · observació

Verderol · Sean S · CC BY-NC · observació

Verderol · josep65 · CC BY-NC · observació

Verderol · oriol3333 · CC BY-NC · observació

Bola de neu pudent · joxepo · CC BY-NC · observació

Bola de neu pudent · MAR (Miguel A. Ribes) · CC BY-NC · observació

Bola de neu pudent · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Bola de neu pudent · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Bola de neu pudent · Felipe Castilla Lattke · CC BY-NC · observació

Bolet de femer · jonatan_antunez · CC BY-NC · observació

Bolet de femer · diana_fuir · CC BY-NC · observació

Bolet de femer · ferran garcia mari · CC BY-NC · observació

Bolet de femer · diana_fuir · CC BY-NC · observació

Peu de rata bord · Cordula Bernert · CC BY-NC · observació

Peu de rata bord · Stevan Baluban · CC BY-NC · observació

Peu de rata bord · Philippe Geniez · CC BY-NC · observació

Peu de rata bord · adeline_chartreuse · CC BY-NC · observació

Escaldabecs · noah_siegel · CC BY-NC-SA · observació

Escaldabecs · Vladimir Bryukhov · CC BY-NC · observació

Escaldabecs · Simon M Davies · CC BY-NC · observació

Rossinyol ataronjat · Rubén Pérez-González · CC BY-NC · observació

Rossinyol ataronjat · Enric Gràcia i Barba · CC BY-NC · observació

Rossinyol ataronjat · Rubén Pérez-González · CC BY-NC · observació

Rossinyol ataronjat · Enric Gràcia i Barba · CC BY-NC · observació

Molleric amarg · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Molleric amarg · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Molleric amarg · Javier Marcos Martínez · CC BY-NC · observació

Molleric amarg · Suso Tizón · CC BY-NC-SA · observació

Paloma vermellosa · Luis Ballester · CC BY-NC · observació

Paloma vermellosa · Borja Rodríguez-de-Francisco · CC BY-NC · observació

Paloma vermellosa · Susana Lara Celma · CC BY-NC · observació