

CISTELLA SEGURA · CATALUÑA

# Setas *esenciales*

Las 54 setas que hay que conocer en Cataluña: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES · 20 TÓXICAS · 9 MORTALES

**Ante la duda, no la recolecte.**

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

# Las 12 reglas

*No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.*

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.** Conocer una especie significa saber reconocer todos sus rasgos decisivos y todas las especies peligrosas con las que se confunde.

2. **Extraiga el ejemplar entero.** La base del pie (volva, bulbo, micelio) es imprescindible para descartar amanitas mortales.

3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.** En un mismo corro pueden crecer mezcladas una comestible y una tóxica (por ejemplo, el cama-sec y los clitocibes blancos).

4. **No mezcle especies en la cesta** y lleve las dudosas aparte, envueltas en papel.

5. **Deseche los ejemplares viejos, agusanados, empapados, helados o muy jóvenes.** Los viejos se descomponen y pueden causar intoxicaciones aunque la especie sea comestible; los botones muy jóvenes aún no muestran los rasgos de identificación.

6. **Use una cesta rígida y ventilada**, nunca bolsas de plástico, que aceleran la descomposición.

7. **No crea en pruebas caseras.** El ajo, la cebolla, la cuchara de plata o el perejil no ennegrecen con las setas tóxicas; que una seta la coman animales, que se pele fácilmente, que huela bien, que crezca sobre madera o que cambie de color no dice nada de su toxicidad.

8. **Las aplicaciones de reconocimiento por fotografía son orientativas.** Pueden ayudar a buscar un nombre, nunca a decidir si una seta se come.

9. **Ante cualquier duda, consulte a un micólogo** (sociedades micológicas y sus exposiciones), con el ejemplar entero y fresco, nunca solo con una foto.

10. **Cocine siempre las setas.** Muchas comestibles son tóxicas en crudo o poco hechas: colmenillas, pie azul, armilaria, amanita vinosa, mataparents.

11. **Guarde un ejemplar crudo** de cada especie en la nevera hasta el día siguiente: si alguien se encuentra mal, servirá para identificarla.

12. **Evite lugares contaminados**: cunetas de carreteras, zonas industriales, vertederos, campos tratados.

ANTES DEL NOMBRE

# Cómo mirar una seta

*Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.*




**1 Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

**2 Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

**3 Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

**4 Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

**5 Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

**6 Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

## QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO

**Láminas**
Hojas finas, como un libro

**Tubos**
Una esponja de agujeritos

**Pliegues**
Venas gruesas, no hojas

**Aguijones**
Púas blandas

**Interior**
Una bola: córtela

## LA EDAD CUENTA

*Una comestible vieja o pasada también intoxica. Cójala joven y firme. (Rovelló)*




**Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE**

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

*esclatasang · rovelló d'obaga*

# Rovelló y pinetell

*Lactarius sanguifluus* y *L. deliciosus* · níscalos, rebollones

Rovelló: naranja vinoso, con pocas zonas.

Pinetell: zonas bien marcadas.

Pinetell: láminas naranja vivo.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva **Bajo pinos** 0–2100 m de altitud

| | Rovelló | Pinetell |
|---|---|---|
| LÁTEX | Rojo vino desde el primer momento | Naranja zanahoria; no pasa a vino |
| LÁMINAS | Rosa vinoso o lila | Naranja vivo |
| DÓNDE | Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media | Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías |

**LOS DOS**

- ✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
- ✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
- ✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
- ✓ Siempre bajo pinos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Paxil·le tòxic** MORTAL Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne. → p. 48

**Enganyapastors de llet groga** TÓXICA Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea. → p. 28

**COMPRUEBE** Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Llora

*Russula cyanoxantha* · carbonera

*Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).*

Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.

Carbonera (R. cyanoxantha)

E F M A M **J J A S O N** D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 50–1700 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).
- ✓ Sin anillo ni volva.
- ✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

**DÓNDE** Con haya, castaño, encina, alcornoque y roble pubescente y otros. Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Farinera borda** MORTAL Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles. → p. 49

- ***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.

**Cualbra morada** NO COMESTIBLE Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante. → p. 31

**COMPRUEBE** Base del pie (desentiérrela) y anillo.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *greixa*

# Peu de rata de pi

*Sparassis crispa* · seta coliflor · barba de cabra

*Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.*

Una bola como una coliflor, al pie de un pino.

De cerca

Crema pálido, entre la pinaza.

E F M A M J J A **S O N** D · Ramificado · Sin anillo · Sin volva · 100–1800 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.

✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.

✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y rodeno. **Sobre madera.** Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Peu de rata bord** TÓXICA Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios. → p. 35

**Peu de rata col-i-flor** CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

**COMPRUEBE** Forma de las ramas.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *sureny*

# Cep

*Boletus edulis* · boleto · hongo blanco

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.

Jóvenes, redondos como tapones de corcho

Ceps recolectados en la cesta de mimbre.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Tubos · Sin anillo · Sin volva · 600–2000 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.

✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).

✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

**SABOR** Suave, a avellana.

**DÓNDE** Con haya, castaño, roble albar, pino silvestre y abeto blanco y otros. Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Matagent** TÓXICA Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente. → p. 32

**Molleric amarg** NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.

**Mataparent amarg** NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

**COMPRUEBE** Poros y pie.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*molleric granellut*

# Molleric

*Suillus granulatus* · boleto granulado

*Comestible de calidad discreta («aceptable» para la SCM).*

En su punto: sombrero pardo brillante, pie amarillento, en grupo bajo pinos.

Poros amarillos con gotitas blancas

Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

E F M A M J J A S O N D — Tubos — Sin anillo — Sin volva — 0–1800 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino carrasco, silvestre, laricio, piñonero y rodeno. Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Molleric pebrer** NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.

**Molleric** COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.

**Molleric calçat** COMESTIBLE Anillo membranoso grande en el pie.

**COMPRUEBE** Color de los poros.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*pota de perdiu*

# Cama de perdiu

*Chroogomphus rutilus*

*Comestible aceptable (SCM). Su carne se vuelve vinosa al cocinarla, lo que es normal.*

En su punto: sombrero rojizo y láminas ocre que bajan por el pie.

Debajo


Carne y pie de color naranja salmón.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
✓ Bajo pinos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero. Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Cortinari metzinós** MORTAL Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes, bajo robles y castaños en suelo ácido. → p. 55

**Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca. → p. 33

**Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

**COMPRUEBE** Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *vaqueta*

# Rossinyol

*Cantharellus cibarius* · rebozuelo · cabrito

En su punto: todo amarillo yema, carnoso, con el margen ondulado.

Debajo

De cerca

E F M A M **J J A S O N** D Pliegues Sin anillo Sin volva 50–1800 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, castaño, haya y roble albar y otros. Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Cortinari metzinós** MORTAL Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso. → p. 55

**Gírgola d'olivera** TÓXICA Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño. → p. 43

**Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda. → p. 33

**COMPRUEBE** Parte inferior.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *trompeta*

# Trompeta de la mort

*Craterellus cornucopioides* · trompeta de los muertos · trompeta negra

*Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto: negras, firmes y en grupo.

Mire por dentro

Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

E F M A M J J A **S O N D** Liso Sin anillo Sin volva 100–1600 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.

✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).

✓ Carne delgada y elástica.

**DÓNDE** Con haya, encina, castaño, roble pubescente y albar. Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Orella de gat negra** CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

- ***Craterellus cinereus*** COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

**COMPRUEBE** Forma general.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL *rossinyol de pi*

# Camagroc

*Craterellus lutescens* · angula de monte · trompeta amarilla

*Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).*

En su punto: pies amarillos y sombreros pardos, en grupo entre el musgo.

Debajo no hay láminas

Pie amarillo y hueco.

E F M A M J J A S **O N D** Liso Sin anillo Sin volva 300–1800 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

**DÓNDE** Con pino silvestre, laricio y abeto blanco. Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Fals rossinyol** NO COMESTIBLE Láminas finas y apretadas; pie macizo. → p. 33

**Camagroc** COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado.

**COMPRUEBE** Parte inferior y pie.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Llengua de bou

*Hydnum repandum* · lengua de vaca · gamuza

*Los ejemplares viejos amargan.*

En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.

Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.

Aguijones y pie blanco, corto y grueso.



E F M A M J J A **S O N D** Aguijones Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

**SABOR** Suave; amargo en ejemplares viejos.

**DÓNDE** Con encina, haya, castaño, pino silvestre y abeto blanco y otros. Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

- ***Hydnellum / Sarcodon*** NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.

**Picornell de pi** COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie.

**COMPRUEBE** Consistencia de la carne.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA



# Ou de reig

*Amanita caesarea* · oronja · amanita de los césares

*Comestible excelente. Los «huevos» cerrados no deben recolectarse: en ese estado se confunden con los de la farinera borda y otras amanitas mortales.*

En su punto: sombrero naranja, pie amarillo y volva blanca.

Láminas y pie AMARILLOS; volva blanca en saco.

Joven: sale de un huevo blanco.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas · Con anillo · **Con volva** · 50–1100 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Farinera borda** MORTAL Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso u oliváceo y las láminas blancas. → p. 49

**Reig bord** TÓXICA Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden desaparecer con la lluvia); volva reducida a anillos en la base bulbosa. → p. 37

- ***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal del huevo.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *cogomella*

# Apagallums

*Macrolepiota procera* · parasol · galamperna

En su punto: sombrero abierto y grande, pie alto y delgado.

Pie con dibujo de piel de serpiente

Debajo

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1800 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.
- ✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
- ✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
- ✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

**OLOR** Agradable, a avellana.

**DÓNDE** **En prados.** Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Lepiota metzinosa** MORTAL Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado. → p. 52

**Pixacà** TÓXICA Volva en la base y anillo fijo; pie liso. → p. 36

**Apagallums** CONDICIONADA Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

**COMPRUEBE** Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Bolet de tinta

*Coprinus comatus* · barbuda · matacandil

***Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.***

Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado: el momento de recolectarlo.



Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por...

Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

E F **M A M** J J A **S O N D** Láminas Con anillo Sin volva 0–1500 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).
- ✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
- ✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

**DÓNDE** **En prados.** Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Bolet de femer** TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada.

**Coprí garsa** NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

**COMPRUEBE** Color y superficie del sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Camperol

*Agaricus campestris* · champiñón silvestre · seta de campo

En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.

Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un...

Gírelo siempre

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–2000 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
- ✓ Sin volva en la base.
- ✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
- ✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

**DÓNDE** **En prados.** Pastos con ganado, prados de siega.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Cogomassa** MORTAL Láminas siempre blancas y volva en saco. → p. 50

**Bola de neu pudent** TÓXICA Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol. → p. 39

**Fals carlet** TÓXICA Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques. → p. 45

**COMPRUEBE** Láminas y base.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Pet de llop

*Lycoperdon perlatum* · pedo de lobo · bejín

*Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.*

Joven, blanco y lleno de verrugas: el momento de recolectarlo.



De cerca: verrugas como perlitas que se desprenden.

Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

E F M A M J J **A S O N D** · Interior · Sin anillo · Sin volva · 0–2000 m de altitud

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.
- ✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.
- ✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

**DÓNDE** **En prados.** Bosques de todo tipo y sus bordes.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Farinera borda** MORTAL Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie). → p. 49

**Pota de cavall groga** TÓXICA Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa. → p. 34

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL *negret*

# Fredolic

*Tricholoma terreum* · negrilla · ratón

En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.

Debajo

Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1800 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.
- ✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
- ✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.
- ✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

**OLOR** Débil, no harinoso.

**DÓNDE** Con pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero. Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Fredolic metzinós** TÓXICA Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas oscuras gruesas como un dibujo de tigre; olor a harina; láminas con reflejos verde amarillentos. → p. 41

- ***Tricholoma virgatum / T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo; carne amarga o picante; láminas con arista punteada de negro en T.
- ***Inocybe (varias especies grises)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente, láminas que se vuelven pardas (esporada parda), olor espermático o terroso.

**COMPRUEBE** Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Pimpinella morada

*Lepista nuda* · pie azul

En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.

Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.

De cerca: láminas y pie violetas.

E F M A M J J A S O N D · Láminas · Sin anillo · Sin volva · 0–1800 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
✓ Sin cortina ni anillo.
✓ Olor afrutado o perfumado.

**OLOR** Afrutado, perfumado.

**DÓNDE** **En prados.** Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

- ***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus…)*** TÓXICA Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.

**Barret de bruixa** TÓXICA Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas. → p. 47

***Mycena pura*** TÓXICA Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano. → p. 44

**COMPRUEBE** Esporada y parte alta del pie.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*bolet de Sant Jordi*

# Moixernó

*Calocybe gambosa* · perrechico · seta de San Jorge

E F M **A** **M** **J** J A S **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 400–2000 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.
✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

**OLOR** Intenso a harina fresca.

**DÓNDE** **En prados.** Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Inosperma erubescens*** MORTAL Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina. → p. 54

**Cogomassa** MORTAL Anillo y volva en saco; láminas libres. → p. 50

**Fals carlet** TÓXICA Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño. → p. 45

**COMPRUEBE** Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA



# Llenega negra

*Hygrophorus latitabundus* · babosa negra

*latitabundus o H. limacinus). Retire el mucílago al limpiarla.*

En su punto: sombrero pardo oliva, brillante y viscoso.

Láminas blancas y pie blanco con puntitos.

Joven

E F M A M J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 100–1500 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.
✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.
✓ Esporada blanca.

**DÓNDE** Con pino carrasco, laricio y silvestre. Pinaza de pinares calizos; los sombreros viscosos quedan cubiertos de agujas pegadas.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Llenega borda** NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.

**Cama de perdiu mucosa** COMESTIBLE Láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo intenso.

**Llenega blanca** COMESTIBLE Sombrero blanco crema.

**COMPRUEBE** Color de las láminas maduras y esporada.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Carlet

*Hygrophorus russula*

*Puede amargar ligeramente.*

En su punto: sombreros rosados con salpicaduras vinosas, firmes.

Debajo

Láminas algo decurrentes y pie blanco manchado.

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1300 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.
✓ Bajo encinas y robles.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y quejigo. Hojarasca de encinares calizos.

## CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Fals carlet** TÓXICA Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia. → p. 45

**Cualbra morada** NO COMESTIBLE Carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos. → p. 31

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas maduras.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA *carrereta*

# Cama-sec

*Marasmius oreades* · senderuela · carrerilla

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009), solo el sombrero y bien cocinado; se seca muy bien.*

En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.

La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.

Láminas espaciadas que no bajan por el pie.

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D  Láminas  Sin anillo  Sin volva  0–2200 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

**OLOR** Débil, a almendra amarga.

**DÓNDE** **En prados.** Corros de hierba más verde o más seca en prados.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Lepiota metzinosa** MORTAL Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas. → p. 52

**Clitocibe blanc** TÓXICA Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso. → p. 42

- ***Inocybe (especies de prado)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

**COMPRUEBE** Sombrero.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Gírgola de panical

*Pleurotus eryngii* · seta de cardo

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y láminas que bajan por el pie.

Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.

Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1200 m de altitud

## CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.
- ✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
- ✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

**DÓNDE** **En prados.** Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Clitocibe blanc** TÓXICA Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo. → p. 42

**Fals carlet** TÓXICA Láminas rosa salmón, en bosque. → p. 45

**COMPRUEBE** Color y base.

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Pollancró

*Cyclocybe cylindracea* · seta de chopo

*Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).*

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1200 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

**DÓNDE** Con chopo negro y álamo blanco. **En prados y sobre madera.** Riberas, choperas y parques.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Galerina marginada** MORTAL Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos. → p. 53

**Bolet de pi** TÓXICA Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo. → p. 46

**COMPRUEBE** Tamaño y árbol.

CONDICIONADA ●●○ MEDIA *rabassola*

# Múrgola

*Morchella esculenta* · colmenilla · cagarria

***Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.***

E F **M A M** J J A S O N D · Alvéolos · Sin anillo · Sin volva · 0–1600 m de altitud

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.

✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.

✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

**DÓNDE** **En prados.** Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Bolet de greix** MORTAL Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco. → p. 56

- ***Verpa bohemica*** TÓXICA Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.

**Múrgola** CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

TÓXICA ●○○ FÁCIL *pinetell bord*

# Enganyapastors de llet groga

*Lactarius chrysorrheus*

Enganyapastors (L. zonarius): tiene zonas como el rovelló, pero látex blanco.

Láminas crema, sin manchas verdes.


Pinetell bord

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1300 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.

! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.

! No se mancha de verde.

**SABOR** Picante y amargo (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, en general de evolución favorable.

**DÓNDE** Con encina, alcornoque, roble pubescente y castaño. Bosques de Quercus y castañares, también mezclados con pinos.

**SE CONFUNDE CON**

**Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos. → p. 4

**Pinetell** COMESTIBLE El pinetell tiene látex naranja y láminas naranja vivo que verdean. → p. 4

**COMPRUEBE** Látex.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*enganyapastors d'alzina*

# Enganyapastors

*Lactarius zonarius*

*Tóxica (gastrointestinal) y muy picante. Su sombrero zonado recuerda al del pinetell, de ahí «enganyapastors» (engañapastores).*

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1300 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Látex blanco que no cambia de color.
! Láminas crema, sin manchas verdes.
! Bajo robles y encinas, no bajo pinos.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y quejigo. Encinares y robledales, a menudo sobre caliza.

**SE CONFUNDE CON**

**Pinetell** COMESTIBLE Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos. → p. 4

**Rovelló** COMESTIBLE Látex rojo vino; bajo pinos. → p. 4

**COMPRUEBE** Látex.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*lleterol de beç*

# Cabra de beç

*Lactarius torminosus* · falso níscalo

*Tóxica (gastrointestinal). En algunos países del norte se consume tras tratamientos prolongados: esa práctica no la hace segura.*

Bolet de cabra: sombrero rosado salmón con el margen peludo.

Debajo

El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

E F M A M J J **A S O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 500–1900 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.

! Látex blanco que no cambia.

! Siempre bajo abedules.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

**DÓNDE** Con abedul. Abedulares y bosques con abedul.

**SE CONFUNDE CON**

**Pinetell** COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo pinos. → p. 4

**Pinetell d'avet** COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos.

**COMPRUEBE** Margen y látex.

NO COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

# Cualbra morada

*Russula torulosa*

Sombrero púrpura oscuro y pie teñido de púrpura, bajo pinos.

Debajo: láminas crema y pie rosa púrpura.

De lado: pie teñido de púrpura.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1600 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.

! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.

! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.

! Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

**SABOR** Muy picante (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

**DÓNDE** Con pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero. Pinares mediterráneos y de montaña media.

**SE CONFUNDE CON**

**Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que verdean y pie hueco con hoyuelos. → p. 4

**Llora** COMESTIBLE La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas, sabor suave y crece bajo planifolios. → p. 5

**COMPRUEBE** Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*mataparent de Satanàs*

# Matagent

*Rubroboletus satanas* · boleto de Satanás

Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.

Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.

De cerca: poros rojo anaranjado.

E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D — Tubos · Sin anillo · Sin volva · **100–1300 m de altitud**

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).
! Poros rojos o rojo anaranjados.
! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.
! La carne azulea débilmente al corte.

**OLOR** Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (A VECES INTENSO)** Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal; puede requerir atención hospitalaria por deshidratación.

**DÓNDE** Con roble pubescente, encina, castaño y haya. Bosques claros y cálidos de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Cep d'estiu** COMESTIBLE El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.

**Sureny fosc** COMESTIBLE Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

**COMPRUEBE** Poros y corte.

NO COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Fals rossinyol

*Hygrophoropsis aurantiaca* · falso rebozuelo

*No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.*

Todo naranja, con láminas verdaderas.

Debajo

De cerca: láminas blandas naranja intenso.

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1800 m de altitud



### RASGOS DE ALARMA

! Láminas verdaderas: finas, apretadas, bifurcadas varias veces, naranja vivo.

! Carne delgada y blanda, no compacta.

! Sombrero aterciopelado naranja a pardo anaranjado.

GRAVEDAD ●○○ **Leve.** No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

DÓNDE Con pino silvestre y rodeno. **Sobre madera.** Pinares, sobre restos de madera y acículas.

### SE CONFUNDE CON

**Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas), carne gruesa y firme, color yema de huevo. → p. 10

**Círgola d'olivera** TÓXICA Omphalotus crece en grandes ramilletes sobre madera de olivo, encina o castaño y es mucho más carnoso. → p. 43

COMPRUEBE Parte inferior: pase el dedo; los pliegues no se separan como láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Pota de cavall groga

*Scleroderma citrinum*

Bola de piel gruesa, amarillenta y escamosa.

Cortada

Interior oscuro con vetas claras.

E F M A M J J **A S O N** D ● Interior Sin anillo Sin volva 0–1200 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

**DÓNDE** Con alcornoque, encina, castaño y pino piñonero. Bosques sobre suelo ácido, bordes de camino.

**SE CONFUNDE CON**

**Pet de llop** COMESTIBLE El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes. → p. 18

**Pet de llop gegant** COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina.

**Tòfona negra** COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Peu de rata bord

*Ramaria formosa*

*Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).*

Forma de coral, ramas rosa anaranjado.

Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.

Puntas de las ramas amarillentas.

E F M A M J J **A S O N** D ● Ramificado Sin anillo Sin volva 200–1600 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

**SABOR** Algo amargo (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

**DÓNDE** Con haya, roble pubescente y castaño. Bosques de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Peu de rata de pi** COMESTIBLE Lóbulos aplanados crema, en pinos. → p. 6

**Peu de rata col-i-flor** CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

**COMPRUEBE** Forma.

TÓXICA ●●○ MEDIA

*reig bru*

# Pixacà

*Amanita pantherina* · amanita pantera

Sombrero pardo con verrugas blancas, anillo y bulbo en la base.

Debajo: láminas blancas y anillo liso.

Margen del sombrero estriado y anillo colgante.

E F M A **M** **J** J **A** **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 0–1900 m de altitud

## RASGOS DE ALARMA

! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.

! Base del pie en bulbo con un reborde (como un calcetín enrollado) y 1–2 anillos por encima.

! Anillo liso, sin estrías por arriba.

! La carne NO enrojece.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, alternancia de excitación y somnolencia; vómitos; en casos graves convulsiones y coma.

**DÓNDE** Con pino silvestre, roble pubescente, haya y encina. Bosques de coníferas y planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Apagallums** COMESTIBLE Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado. → p. 15

**Vinosa** CONDICIONADA En la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas, el anillo está estriado por arriba y las verrugas son grisáceas o rosadas.

**COMPRUEBE** Pie y base.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Reig bord

*Amanita muscaria* · matamoscas · falsa oronja

*Tóxica (neurotóxica). Los tratamientos «para destoxificarla» no son seguros.*

Sombrero rojo con verrugas blancas y pie blanco.

Debajo

Joven: cubierta de verrugas, como una bola.

E F M A M J J **A S O N** D  Láminas  Con anillo  **Con volva**  300–2200 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero rojo con verrugas blancas (que la lluvia puede borrar).
! Láminas y pie BLANCOS.
! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones, somnolencia; vómitos.

**DÓNDE** Con pino silvestre, abedul, abeto blanco y pino negro. Bosques de montaña sobre suelo ácido.

**SE CONFUNDE CON**

**Ou de reig** COMESTIBLE El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca. → p. 14

**COMPRUEBE** Láminas y pie.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Lepiota pudent

*Lepiota cristata*

*Tóxica (gastrointestinal). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.*

Lepiota cristata

L. cristata de cerca

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1600 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.

! Olor desagradable, a goma o gas.

! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

**DÓNDE** **En prados.** Hojarasca, jardines y bordes de camino.

**SE CONFUNDE CON**

**Apagallums** COMESTIBLE Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado. → p. 15

**COMPRUEBE** Tamaño.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Bola de neu pudent

*Agaricus xanthodermus*

*Tóxica (gastrointestinal).*

Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.

Láminas rosa grisáceo de joven: se confunde...


Vieja: láminas pardo oscuro.

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.

! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

**OLOR** Desagradable (tinta, fenol).

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

**DÓNDE** **En prados.** Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

**SE CONFUNDE CON**

**Camperol** COMESTIBLE No amarillea y huele bien. → p. 17

**Bola de neu** COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo.

**COMPRUEBE** Base del pie.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*groguet*

# Verderol

*Tricholoma equestre* · seta de los caballeros

Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.

Debajo: láminas amarillo azufre.

Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el...

E F M A M J J A S **O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1700 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Láminas amarillo azufre intenso.

! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.

! Pie amarillo.

**OLOR** A harina débil.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

**SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO** Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura; en casos graves, afectación cardíaca y respiratoria.

**DÓNDE** Con pino piñonero, silvestre y rodeno. **En prados.** Pinares sobre suelo arenoso.

**SE CONFUNDE CON**

**Fredolic gros** COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras.

**Farinera borda** MORTAL Láminas blancas, anillo y volva. → p. 49

**COMPRUEBE** Sombrero.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Fredolic metzinós

*Tricholoma pardinum*

Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.

Sombrero escamoso y pie robusto y lleno

Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 800–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).

! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.

! Olor a harina.

**OLOR** A harina.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

**DÓNDE** Con abeto blanco, haya y pino silvestre. Bosques de montaña.

**SE CONFUNDE CON**

**Fredolic** COMESTIBLE El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina. → p. 19

**Fredolic gros** COMESTIBLE Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

**COMPRUEBE** Tamaño y escamas.

TÓXICA ●●○ MEDIA *candeleta*

# Clitocibe blanc

*Clitocybe rivulosa*

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.
- ! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).
- ! Esporada blanca (no rosada).

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO (COLINÉRGICO)** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

**DÓNDE** **En prados.** Prados, céspedes, claros herbosos.

**SE CONFUNDE CON**

**Cama-sec** COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso. → p. 24

**Moixernó blanc de tardor** COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina.

**COMPRUEBE** Láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL *bolet d'oliu*

# Gírgola d'olivera

*Omphalotus olearius* · seta de olivo

***Tóxica: gastroenteritis intensa. Confusión frecuente con el rossinyol.***

Un ramillete de setas anaranjadas sobre un tocón.



Debajo

Láminas que bajan por el pie y pies unidos en la...

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–1000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina, roble o castaño.

! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.

! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

**DÓNDE** Con olivo, encina, castaño y roble pubescente. **Sobre madera.** Olivares, encinares y castañares; tocones y raíces.

**SE CONFUNDE CON**

**Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en el suelo. → p.10

**COMPRUEBE** Parte inferior y crecimiento.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# *Mycena pura*

*Tóxica (muscarina).*

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Pequeña seta (2–5 cm) lila, rosada o violácea con el margen estriado.

! Olor a rábano.

! Pie hueco, frágil.

**OLOR** A rábano.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, molestias digestivas.

**DÓNDE** Hojarasca y pinaza.

**SE CONFUNDE CON**

**Pimpinella morada** COMESTIBLE Mucho mayor, carnosa, olor afrutado. → p. 20

**Pimpinella morada petita** SIN_INTERES Láminas gruesas, sin olor a rábano.

**COMPRUEBE** Tamaño.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Fals carlet

*Entoloma sinuatum*

Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.

Láminas crema rosado que con la edad pasan a rosa...

Adulto

E F M A M J J A **S O N** D  Láminas  Sin anillo  Sin volva  100–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.
! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

**OLOR** A harina rancia.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL (INTENSO)** Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

**DÓNDE** Con roble pubescente, haya y castaño. Bosques de planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Carlet** COMESTIBLE El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca. → p. 23

**Moixernó** COMESTIBLE Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera. → p. 21

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas.

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Bolet de pi

*Hypholoma fasciculare*

*Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.*

E F M A M J J A **S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

**DÓNDE** **En prados y sobre madera.** Tocones y madera muerta.

**SE CONFUNDE CON**

**Pollancró** COMESTIBLE Crema, anillo membranoso, en chopos. → p. 26

**Alzinoi** CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

**COMPRUEBE** Color.

TÓXICA ●●○ MEDIA

# Barret de bruixa

*Inocybe geophylla*

*Tóxica (muscarina).*

Sombrero con fibras radiales que se agrietan: la señal típica.

Inocybe geophylla

Las hay lilas, que pueden confundirse con la...

E F M A M J J **A S O N D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Pequeña seta (1–4 cm) blanca sedosa (o lila en la variedad lilacina) con mamelón agudo.

! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.

! Olor terroso o espermático.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

**DÓNDE** Bordes de camino en bosques de todo tipo.

**SE CONFUNDE CON**

**Pimpinella morada** COMESTIBLE Mucho mayor y carnosa. → p. 20

**Cama-sec** COMESTIBLE Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema. → p. 24

**COMPRUEBE** Tamaño.

# Paxil·le tòxic

*Paxillus involutus* · paxilo

Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia dentro.

Margen del sombrero muy enrollado.

Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

E F M A M J J **A S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 0–1900 m de altitud



**RASGOS DE ALARMA**

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.

! Sin látex.

**GRAVEDAD ●●● Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

**SÍNDROME HEMOLÍTICO (PAXÍLICO)** Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y fallo renal.

**DÓNDE** Con abedul, pino silvestre, encina y castaño. Bosques variados, también parques; prefiere suelos ácidos.

**SE CONFUNDE CON**

**Rovelló** COMESTIBLE El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo. → p. 4

**Pinetell** COMESTIBLE Látex naranja y manchas verdes en el pinetell. → p. 4

MORTAL ●●○ MEDIA

*cogoma borda*

# Farinera borda

*Amanita phalloides* · oronja verde · amanita mortal

Adulta: sombrero verde oliva, anillo como una falda y volva en la base.

Debajo: láminas BLANCAS y anillo colgante.

Láminas blancas y base con volva

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D  Láminas  Con anillo  **Con volva**  0–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).

! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

! Láminas BLANCAS, libres.

! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos; tras una aparente mejoría, daño hepático grave a partir del segundo o tercer día, que puede requerir trasplante o causar la muerte.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente, alcornoque, castaño y haya. Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

**SE CONFUNDE CON**

**Llora verda** COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

**Llora** COMESTIBLE Sin volva ni anillo; láminas flexibles. → p. 5

MORTAL ●●○ MEDIA

# Cogomassa

*Amanita verna*

E F M **A** **M** J A S O N D  Láminas  Con anillo  **Con volva**  0–900 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta enteramente blanca.
! Volva blanca en saco en la base.
! Anillo membranoso blanco.
! Láminas blancas, libres.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

**DÓNDE** Con encina, roble pubescente y alcornoque. Encinares y robledales mediterráneos.

**SE CONFUNDE CON**

**Moixernó** COMESTIBLE El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina. → p. 21

**Camperol** COMESTIBLE Láminas rosadas y luego pardas; sin volva. → p. 17

**COMPRUEBE** **Base y pie.**

MORTAL ●●○ MEDIA

# Farinera pudent

*Amanita virosa*

*Mortal (amatoxinas).*

Toda blanca, con anillo y volva.

Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría...

Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

E F M A M J J **A** **S** **O** N D — Láminas — Con anillo — **Con volva** — 500–1800 m de altitud

## RASGOS DE ALARMA

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
! Volva blanca en saco.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

**DÓNDE** Con haya y abedul. Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

**SE CONFUNDE CON**

**Bola de neu** COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva.

**COMPRUEBE** **Láminas y base.**

MORTAL ●●○ MEDIA *palometa*

# Lepiota metzinosa

*Lepiota brunneoincarnata*

Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.

Pie rosado con bandas y láminas blancas.

Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el...

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D** Láminas Sin anillo Sin volva 0–900 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.
! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.
! Láminas blancas, libres.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**DÓNDE** **En prados.** Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino.

**SE CONFUNDE CON**

**Apagallums** COMESTIBLE El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado. → p. 15

**Cama-sec** COMESTIBLE El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas. → p. 24

**COMPRUEBE** **Tamaño, anillo y pie.**

# Galerina marginada

*Galerina marginata*

Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.

Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...

Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

E F M A M J J A S O N D — Láminas — Con anillo — Sin volva — 0–2000 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.

! Anillo fino pardo en el pie.

! Esporada pardo herrumbre.

! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO (HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**DÓNDE** **Sobre madera.** Madera muerta de coníferas y planifolios.

**SE CONFUNDE CON**

**Pollancró** COMESTIBLE Mayor y sobre chopos. → p. 26

≈ ***Kuehneromyces mutabilis*** COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

**COMPRUEBE** **Tamaño y árbol.**

MORTAL ●●○ MEDIA

# *Inosperma erubescens*

*Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.*

Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.

Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).

E F M A **M J J** A S O N D Láminas Sin anillo Sin volva 0–1500 m de altitud



**RASGOS DE ALARMA**

- ! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
- ! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
- ! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO (GRAVE)** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión; puede ser mortal sin tratamiento.

**DÓNDE** **En prados.** Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

**SE CONFUNDE CON**

**Moixernó** COMESTIBLE El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece. → p. 21

**COMPRUEBE** **Sombrero, manchas rojas y olor.**

# Cortinari metzinós

*Cortinarius orellanus*

Sombrero naranja herrumbre, seco y fibroso.

Láminas color herrumbre, espaciadas.

Pie amarillento y fibroso, con restos de cortina.

E F M A M J J A **S O N** D — Láminas — Sin anillo — Sin volva — 100–1500 m de altitud

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
! Esporada pardo herrumbre.
! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

**OLOR** Débil a rábano.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

**SÍNDROME ORELLÁNICO (NEFROTÓXICO TARDÍO)** Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida; insuficiencia renal que puede requerir diálisis o trasplante.

**DÓNDE** Con roble pubescente, castaño y encina. Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

**SE CONFUNDE CON**

**Rossinyol** COMESTIBLE El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas.
→ p. 10

**Camagroc** COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

# Bolet de greix

*Gyromitra esculenta* · falsa colmenilla · bonete

*Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).*

E F M **A** **M** **J** J A S O N D — Liso — Sin anillo — Sin volva — 600–2200 m de altitud



**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

**GRAVEDAD ●●● Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

**SÍNDROME GIROMITRIANO (CONVULSIVO Y HEPATOTÓXICO)** Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

**DÓNDE** Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. **Sobre madera.** Coníferas de montaña.

**SE CONFUNDE CON**

**Múrgola** CONDICIONADA La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad. → p. 27

**Múrgola** CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco.

**COMPRUEBE** **Corte longitudinal.**

# Árboles y sus setas

*Muchas setas viven unidas a las raíces de un árbol: reconocerlo por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.*

HOJA

TRONCO

## Pino carrasco

pi blanc

*Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido; tronco a menudo inclinado o tortuoso.*

**BUSQUE** Rovelló y pinetell *4*, Molleric *8*, Cama de perdiu *9*, Fredolic *19*, Llenega negra *22*

**CUIDADO** Cualbra morada *31*

HOJA

TRONCO

## Pino piñonero

pi pinyer

*Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.*

**BUSQUE** Rovelló y pinetell *4*, Molleric *8*, Cama de perdiu *9*, Fredolic *19*

**CUIDADO** Pota de cavall groga *34*, Verderol *40*, Cualbra morada *31*

HOJA

TRONCO

## Pino laricio

pinassa

*Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.*

**BUSQUE** Rovelló y pinetell *4*, Peu de rata de pi *6*, Molleric *8*, Cama de perdiu *9*, Camagroc *12*, Fredolic *19*

**CUIDADO** Cualbra morada *31*

HOJA

TRONCO

## Pino silvestre

pi roig

*Copa irregular y alta; la parte superior del tronco y las ramas gruesas son de color naranja asalmonado, visible de...*

**BUSQUE** Rovelló y pinetell *4*, Peu de rata de pi *6*, Cep *7*, Molleric *8*, Cama de perdiu *9*, Rossinyol *10*

**CUIDADO** Paxil·le tòxic *48*, Bolet de greix *56*, Pixacà *36*, Reig bord *37*, Verderol *40*, Fredolic metzinós *41*

HOJA

TRONCO

## Encina

alzina

*Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate; en el interior a menudo en forma de mata.*

**BUSQUE** Llora *5*, Rossinyol *10*, Trompeta de la mort *11*, Llengua de bou *13*, Ou de reig *14*, Carlet *23*

**CUIDADO** Paxil·le tòxic *48*, Farinera borda *49*, Cogomassa *50*, Cortinari metzinós *55*, Enganyapastors de llet groga *28*, Enganyapastors *29*

# Árboles y sus setas

HOJA

TRONCO

## Abeto blanco

avet

*Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.*

**BUSQUE** Cep *7*, Rossinyol *10*, Camagroc *12*, Llengua de bou *13*

**CUIDADO** Bolet de greix *56*, Reig bord *37*, Fredolic metzinós *41*

HOJA

TRONCO

## Alcornoque

surera

*Árbol de copa amplia y verde grisácea; tronco con corcho grueso o, si se ha descorchado, de color rojo anaranjado.*

**BUSQUE** Llora *5*, Rossinyol *10*, Ou de reig *14*

**CUIDADO** Farinera borda *49*, Cogomassa *50*, Enganyapastors de llet groga *28*, Pota de cavall groga *34*

HOJA

TRONCO

## Roble pubescente

roure martinenc

*Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las hojas secas.*

**BUSQUE** Llora *5*, Trompeta de la mort *11*, Llengua de bou *13*, Ou de reig *14*, Carlet *23*

**CUIDADO** Farinera borda *49*, Cogomassa *50*, Cortinari metzinós *55*, Enganyapastors de llet groga *28*, Enganyapastors *29*, Matagent *32*

HOJA

TRONCO

## Haya

faig

*Árbol alto de corteza lisa y gris; bajo su copa densa apenas crece sotobosque.*

**BUSQUE** Llora *5*, Cep *7*, Rossinyol *10*, Trompeta de la mort *11*, Llengua de bou *13*

**CUIDADO** Farinera borda *49*, Farinera pudent *51*, Matagent *32*, Peu de rata bord *35*, Pixacà *36*, Fredolic metzinós *41*

HOJA

TRONCO

## Castaño

castanyer

*Árbol grande de copa amplia; a menudo en forma de rebrotes de cepa (castañares de leña).*

**BUSQUE** Llora *5*, Cep *7*, Rossinyol *10*, Trompeta de la mort *11*, Llengua de bou *13*, Ou de reig *14*

**CUIDADO** Paxil·le tòxic *48*, Farinera borda *49*, Cortinari metzinós *55*, Enganyapastors de llet groga *28*, Matagent *32*, Pota de cavall groga *34*

# Índice

*Nombres en catalán, castellano y científicos (en cursiva), con su página.*


*Agaricus campestris* 17
*Agaricus xanthodermus* 39
*Amanita caesarea* 14
*Amanita muscaria* 37
Amanita pantera 36
*Amanita pantherina* 36
*Amanita phalloides* 49
*Amanita verna* 50
*Amanita virosa* 51
Angula de monte 12
Apagallums 15
Babosa negra 22
Barbuda 16
Barret de bruixa 47
Bola de neu pudent 39
Bolet de greix 56
Bolet de pi 46
Bolet de tinta 16
Boleto 7
Boleto de Satanás 32
Boleto granulado 8
*Boletus edulis* 7
Cabra de beç 30
*Calocybe gambosa* 21
Cama de perdiu 9
Cama-sec 24
Camagroc 12
Camperol 17
*Cantharellus cibarius* 10
Carbonera 5
Carlet 23
Cep 7
Champiñón silvestre 17
*Chroogomphus rutilus* 9
Clitocibe blanc 42
*Clitocybe rivulosa* 42
Cogomassa 50
Colmenilla 27
*Coprinus comatus* 16
Cortinari metzinós 55
*Cortinarius orellanus* 55
*Craterellus cornucopioides* 11
*Craterellus lutescens* 12
Cualbra morada 31
*Cyclocybe cylindracea* 26
Enganyapastors 29
Enganyapastors de llet groga 28
*Entoloma sinuatum* 45
Fals carlet 45
Fals rossinyol 33
Falsa colmenilla 56
Falso níscalo 30
Falso rebozuelo 33
Farinera borda 49
Farinera pudent 51
Fredolic 19
Fredolic metzinós 41
Galerina marginada 53
*Galerina marginata* 53
Círgola d'olivera 43
Círgola de panical 25
*Gyromitra esculenta* 56
*Hydnum repandum* 13
*Hygrophoropsis aurantiaca* 33
*Hygrophorus latitabundus* 22
*Hygrophorus russula* 23
*Hypholoma fasciculare* 46
*Inocybe geophylla* 47
*Inosperma erubescens* 54
*Lactarius chrysorrheus* 28

# Índice


*Lactarius deliciosus* 4
*Lactarius sanguifluus* 4
*Lactarius torminosus* 30
*Lactarius zonarius* 29
Lengua de vaca 13
*Lepiota brunneoincarnata* 52
*Lepiota cristata* 38
Lepiota metzinosa 52
Lepiota pudent 38
*Lepista nuda* 20
Llenega negra 22
Llengua de bou 13
Llora 5
*Lycoperdon perlatum* 18
*Macrolepiota procera* 15
*Marasmius oreades* 24
Matagent 32
Matamoscas 37
Moixernó 21
Molleric 8
*Morchella esculenta* 27
Múrgola 27
*Mycena pura* 44
Negrilla 19
Níscalo 4
Níscalo de sangre 4
*Omphalotus olearius* 43
Oronja 14
Oronja verde 49
Ou de reig 14
Parasol 15
Paxil·le tòxic 48
*Paxillus involutus* 48
Paxilo 48
Pedo de lobo 18
Perrechico 21
Pet de llop 18
Peu de rata bord 35
Peu de rata de pi 6
Pie azul 20
Pimpinella morada 20
Pinetell 4
Pixacà 36
*Pleurotus eryngii* 25
Pollancró 26
Pota de cavall groga 34
*Ramaria formosa* 35
Rebozuelo 10
Reig bord 37
Rossinyol 10
Rovelló 4
*Rubroboletus satanas* 32
*Russula cyanoxantha* 5
*Russula torulosa* 31
*Scleroderma citrinum* 34
Senderuela 24
Seta coliflor 6
Seta de cardo 25
Seta de chopo 26
Seta de los caballeros 40
Seta de olivo 43
*Sparassis crispa* 6
*Suillus granulatus* 8
*Tricholoma equestre* 40
*Tricholoma pardinum* 41
*Tricholoma terreum* 19
Trompeta de la mort 11
Trompeta de los muertos 11
Verderol 40


Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura**. Uso personal o sin ánimo de lucro.