# Falso níscalo

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*Lactarius torminosus* · cabra de beç · lleterol de beç

E F M A M J J **A** **S** **O** N D

Bolet de cabra: sombrero rosado salmón con el margen peludo.

Debajo: láminas pálidas y margen lanoso. El látex es blanco.

El margen enrollado y peludo del bolet de cabra.

### CÓMO ES

- ✓ **Láminas** crema rosado
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ✓ **Látex** blanco
- ● **Esporada** crema

### DÓNDE

Abedul

500–1900 m; sobre todo por debajo de 1600 m

Abedulares y bosques con abedul.

### RASGOS DE ALARMA

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.

! Látex blanco que no cambia.

! Siempre bajo abedules.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

### SE CONFUNDE CON

≈ **Níscalo** pinetell · *Lactarius deliciosus* COMESTIBLE → p. 4

**SE PARECE** Sombrero anaranjado con zonas. **SE DISTINGUE** Margen liso, látex naranja; bajo pinos.

**Pinetell d'avet**

*Lactarius salmonicolor*

COMESTIBLE Margen liso, látex naranja; bajo abetos.

**COMPRUEBE** Margen y látex.





# Setas *esenciales*

*de Cataluña*

Las **54** que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

○ 25 COMESTIBLES ○ 20 TÓXICAS ○ 9 MORTALES

**Ante la duda, no la recolecte.**

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

# Las 12 reglas

*No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.*

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.**
2. **Saque la seta entera, con la base del pie.**
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.**
4. **No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.**
5. **Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.**
6. **Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.**
7. **No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata…).**
8. **Las apps de fotos orientan, pero no deciden.**
9. **Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.**
10. **Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.**
11. **Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.**
12. **Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.**

## CÓMO LEER LAS FICHAS

| | |
|---|---|
| COMESTIBLE · TÓXICA · MORTAL | Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen. |
| ●●○ Media | Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil. |
| E F M A M J J A **S O N** D | Meses en que sale; en claro, solo algunos años. |
| ✓ ✗ ◑ | Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte. |
| 🌲 🌳 ⛰ 🏞 | Dónde: pinos y abetos, árboles de hoja ancha, prados, madera, altitud. |
| ●●○ Grave | En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal. |
| → *p. 12* | Página de la seta con la que se confunde. |

EMPIEZAN EN LA PÁGINA ■ Comestibles *4* ■ Tóxicas *27* ■ Mortales *43* ■ Árboles *52*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.



# Enganyapastors

TÓXICAS ●○○ FÁCIL

*Lactarius zonarius* y *L. chrysorrheus* · pinetell bord, rovelló bord

*Parecen níscalos, pero su látex es blanco. Los dos son tóxicos.*

**Enganyapastors**
*Lactarius zonarius*
Zonas como el níscalo.

**De llet groga**
*Lactarius chrysorrheus*
Látex blanco que amarillea.

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex** ⛰ 0–1300 m de altitud

E F M A M J J **A S O N D**

| | Enganyapastors | De llet groga |
|---|---|---|
| LÁTEX | Blanco, no cambia; muy picante | Blanco que amarillea en segundos |
| SOMBRERO | Crema a naranja pálido, con zonas | Ocre salmón pálido, con zonas |

**RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS**

- ! Látex BLANCO al cortar (en los níscalos es rojo vino o naranja).
- ! Láminas crema que no se manchan de verde.
- ! Bajo encinas, alcornoques y robles; no bajo pinos.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, dolor abdominal y diarrea.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Níscalo** pinetell · *Lactarius deliciosus* COMESTIBLE → p. 4
**SE DISTINGUE** Látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos.

≈ **Níscalo de sangre** rovelló · *Lactarius sanguifluus* COMESTIBLE → p. 4
**SE PARECE** Sombrero anaranjado. **SE DISTINGUE** Látex rojo vino; bajo pinos.

**COMPRUEBE** Corte el pie: si el látex es blanco, descártela.

# Colmenilla

CONDICIONADA ●●○ MEDIA

*Morchella esculenta* · múrgola · rabassola

E F **M A M** J J A S O N D

*Comestible excelente SOLO bien cocinada: cruda o poco hecha es tóxica.*

### CÓMO ES

✕ **Láminas** sombrero con alvéolos, como un panal
● **Esporada** crema ocrácea

### DÓNDE

En prados
0–1600 m; sobre todo 200–1200 m
Bordes de ríos y acequias, pies de fresnos y olmos, huertos abandonados.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
✓ Córtela de arriba abajo: es HUECA, con una sola cavidad continua desde la punta del sombrero hasta la base del pie.
✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior (no cuelga como una falda).

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

≈ **Falsa colmenilla** bolet de greix · *Gyromitra esculenta* MORTAL → p. 51

**SE PARECE** Seta de primavera con sombrero arrugado pardo. **SE DISTINGUE** Sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos), y al cortarla aparecen varias cavidades irregulares, no un único hueco.

***Verpa bohemica*** TÓXICA
Sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta; pie relleno de médula algodonosa.

**Colmenilla negra**
múrgola · *Morchella elata*
CONDICIONADA Costillas oscuras, alvéolos alineados verticalmente, forma cónica.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.





ANTES DEL NOMBRE

# Cómo mirar una seta

*Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.*




**1 Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

**2 Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.

**3 Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

**4 Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?

**5 Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

**6 Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

### QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO

**Láminas**
Hojas finas, como un libro

**Tubos**
Una esponja de agujeritos

**Pliegues**
Venas gruesas, no hojas

**Aguijones**
Púas blandas

**Interior**
Una bola: córtela

### LA EDAD CUENTA




**Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE**

# Níscalos

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

*Lactarius sanguifluus* y *L. deliciosus* · rovelló, pinetell

*Casi iguales y los dos comestibles excelentes. Lo que los separa es el color del látex al cortarlos.*

**Níscalo de sangre**
rovelló · *Lactarius sanguifluus*
Naranja vinoso, con pocas zonas.

**Níscalo**
pinetell · *Lactarius deliciosus*
Láminas naranja vivo y pie hasta la base.

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

0–2100 m de altitud

E F M A M J J A **S O N D**

| | Níscalo de sangre | Níscalo |
|---|---|---|
| LÁTEX | Rojo vino desde el primer momento | Naranja zanahoria; no pasa a vino |
| LÁMINAS | Rosa vinoso o lila | Naranja vivo |
| DÓNDE | Pino carrasco y piñonero, a menudo en suelo calizo; de la costa a la montaña media | Pino silvestre y laricio: pinares más frescos y de montaña, umbrías |

### LOS DOS

✓ Láminas que se manchan de verde al tocarlas.
✓ Pie corto y hueco, con hoyuelos más oscuros.
✓ Látex de color al cortar: si es blanco, descártelo.
✓ Siempre bajo pinos.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Paxilo** paxil·le tòxic · *Paxillus involutus* MORTAL → p. 43
**SE DISTINGUE** Sin látex; se mancha de pardo (no de verde); láminas que se separan fácilmente de la carne.

✗ **Enganyapastors de llet groga** *Lactarius chrysorrheus* TÓXICA → p. 27
**SE DISTINGUE** Látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea.

**COMPRUEBE** Corte el pie y mire el color del látex en el primer momento.



# Seta de chopo

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Cyclocybe cylindracea* · pollancró

E F M **A M J** J A **S O N** D

*Comestible muy bueno (parte A del anexo del RD 30/2009, como Agrocybe aegerita).*

### CÓMO ES

✓ **Láminas** crema → pardo tabaco
✓ **Anillo** membranoso
✗ **Volva**
● **Esporada** pardo tabaco

### DÓNDE

Chopo negro y álamo blanco
En prados
Sobre madera
0–1200 m; sobre todo por debajo de 300 m
Riberas, choperas y parques.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco (esporada parda).
✓ Sombrero crema a pardo claro con el centro más oscuro, a menudo agrietado.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Galerina marginada** *Galerina marginata* MORTAL → p. 48
**SE PARECE** Seta parda sobre madera con anillo. **SE DISTINGUE** Más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre; sobre madera de coníferas o planifolios, no en chopos.

✗ **Bolet de pi** *Hypholoma fasciculare* TÓXICA → p. 41
**SE PARECE** Ramilletes sobre tocones. **SE DISTINGUE** Amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo.

**COMPRUEBE** Tamaño y árbol.



COMESTIBLES

# Seta de cardo

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Pleurotus eryngii* · gírgola de panical

E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D**

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto

Debajo: láminas blanquecinas muy decurrentes.

Sombrero y láminas: el pie a menudo es excéntrico.

**CÓMO ES**

✓ **Láminas** blanquecinas, bajan por el pie

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

En prados

0–1200 m de altitud

Alrededor de los cardos corredores secos (grises y espinosos).

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor (Eryngium campestre) muerto: siga el pie y compruébelo.

✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Clitocibe blanc** *Clitocybe rivulosa* TÓXICA → p. 39

**SE PARECE** Seta de prado de láminas decurrentes. **SE DISTINGUE** Blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo.

✕ **Fals carlet** *Entoloma sinuatum* TÓXICA → p. 40

**SE PARECE** Seta grisácea carnosa. **SE DISTINGUE** Láminas rosa salmón, en bosque.

**COMPRUEBE** Color y base.



# Carbonera

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Russula cyanoxantha* · llora · llora morada

E F M A M **J** **J** **A** **S** **O** **N** D

*Comestible apreciada (parte A del anexo del RD 30/2009).*

Pie blanco y liso hasta abajo, sin saco en la base.

Carbonera (R. cyanoxantha)

**CÓMO ES**

✓ **Láminas** blancas, flexibles y grasas

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

Haya, castaño, encina y alcornoque y otros

50–1700 m; sobre todo 300–1100 m

Hojarasca de hayedos, castañares y robledales; bordes de caminos.

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse (en casi todas las demás rúsulas se desmenuzan).

✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Oronja verde** farinera borda · *Amanita phalloides* MORTAL → p. 44

**SE PARECE** Formas verdosas, láminas blancas, mismos bosques. **SE DISTINGUE** Anillo y volva en la farinera borda; sus láminas no son grasas ni flexibles.

***Russula sardonia*** TÓXICA Láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante.

✕ **Cualbra morada** *Russula torulosa* NO COMESTIBLE → p. 29

**SE PARECE** Sombrero púrpura o vinoso. **SE DISTINGUE** Láminas crema que se desmenuzan; pie teñido de púrpura; crece bajo pinos; carne muy picante.

**COMPRUEBE** Base del pie (desentiérrela) y anillo.



COMESTIBLES

# Seta coliflor

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Sparassis crispa* · peu de rata de pi · greixa

E F M A M J J A **S** **O** **N** D

*Comestible bueno joven (SCM). Límpiela con cuidado: acumula tierra y agujas entre los lóbulos.*

Una bola como una coliflor, al pie de un pino.

De cerca: lóbulos planos y ondulados, como fideos anchos.

Pegada al tronco o al tocón de un pino.

**CÓMO ES**

✕ **Láminas** lóbulos rizados, como una coliflor
● **Esporada** blanca a crema

**DÓNDE**

Pino silvestre, laricio y rodeno
Sobre madera
100–1800 m; sobre todo 300–1500 m
Al pie de pinos grandes y de tocones de pino.

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos o una coliflor.
✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.
✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Peu de rata bord** *Ramaria formosa* TÓXICA → p. 33
**SE PARECE** Hongo ramificado en el suelo. **SE DISTINGUE** Ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas amarillas, no lóbulos aplanados; bajo planifolios.

**Coliflor rosa**
peu de rata col-i-flor · *Ramaria botrytis*
CONDICIONADA Ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco.

**COMPRUEBE** Forma de las ramas.



# Senderuela

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Marasmius oreades* · cama-sec · carrereta

E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D

En su punto: color cuero, firmes, en grupo entre la hierba.

La clave: láminas MUY espaciadas, color crema.

Pie delgado, duro y elástico: se retuerce sin romperse.

**CÓMO ES**

✓ **Láminas** crema, muy separadas
✕ **Anillo** ✕ **Volva**
● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

En prados
0–2200 m; sobre todo 200–1400 m
Corros de hierba más verde o más seca en prados.

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.
✓ En prados y pastos, en corros o hileras.

**OLOR** Débil, a almendra amarga.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Lepiota metzinosa** *Lepiota brunneoincarnata* MORTAL → p. 47
**SE PARECE** Pequeña seta de prado. **SE DISTINGUE** Sombrero con escamas vinosas y pie con bandas.

✕ **Clitocibe blanc** *Clitocybe rivulosa* TÓXICA → p. 39
**SE PARECE** Pequeña seta de prado que crece en los mismos corros. **SE DISTINGUE** Blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes, pie no correoso.

***Inocybe (especies de prado)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado y láminas que se vuelven pardas.

**COMPRUEBE** Sombrero.

COMESTIBLES ●●○ MEDIA

# Babosa negra y carlet

*Hygrophorus latitabundus* y *H. russula* · llenega negra

## Babosa negra

llenega negra · *Hygrophorus latitabundus*

Oscura, brillante y viscosa.

## Carlet

*Hygrophorus russula*

Rosa con manchas vinosas.

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva** ▲ 0–1500 m de altitud

E F M A M J J A S **O** **N** **D**

| | Babosa negra | Carlet |
|---|---|---|
| SOMBRERO | Pardo oscuro a casi negro, con mucha baba | Rosa vinoso con manchas, poco viscoso |
| LÁMINAS | Blancas, espaciadas | Blancas, se manchan de vinoso |
| PIE | Abajo, con una funda de baba gris | Robusto, con manchas vinosas |
| DÓNDE | Bajo pinos, en suelo calizo | Bajo encinas y robles |

### LOS DOS

✓ Láminas blancas, gruesas y céreas: como de cera al tocarlas.
✓ Esporada blanca.
✓ Salen tarde: de octubre a diciembre.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Fals carlet** *Entoloma sinuatum* TÓXICA → p. 40

**SE PARECE** Seta grande de encinar y robledal en otoño. **SE DISTINGUE** Sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón (esporada rosada); olor a harina rancia.

**Llenega borda**
*Cortinarius trivialis*
NO COMESTIBLE Láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre), cortina y pie con bandas; sombrero pardo anaranjado.



# Boleto

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Boletus edulis* · cep · sureny

E F M A M J J **A** **S** **O** N D

En su punto: sombrero pardo, carnoso, y pie grueso y claro.

Jóvenes, redondos como tapones de corcho: los más firmes.

Boletos recolectados en la cesta de mimbre.

### CÓMO ES

✓ **Tubos** blancos, luego amarillo verdosos
✕ **Anillo** ✕ **Volva**
● **Esporada** pardo oliva

### DÓNDE

Pino silvestre, abeto blanco y pícea
Haya, castaño y roble albar
▲ 600–2000 m; sobre todo 900–1700 m

Bordes de bosque, claros con hierba, pistas y taludes; en hayedos, alrededor de hayas grandes.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva; NUNCA rojos ni anaranjados.
✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla (no azulea).
✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte alta.

**SABOR** Suave, a avellana.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Boleto de Satanás** matagent · *Rubroboletus satanas* TÓXICA → p. 30

**SE PARECE** Boleto grande y robusto de pie bulboso. **SE DISTINGUE** Sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo rojo; la carne azulea débilmente.

**Boleto amargo**
molleric amarg · *Tylopilus felleus*
NO COMESTIBLE Poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso; sabor muy amargo.

**Pie rojo amargo**
mataparent amarg · *Caloboletus calopus*
NO COMESTIBLE Poros amarillos que azulean y pie rojo; carne amarga que azulea.

**COMPRUEBE** Poros y pie.



COMESTIBLES

# Boleto granulado

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Suillus granulatus* · molleric · molleric granellut

E F M A M J J A S O N D

En su punto

Poros amarillos con gotitas blancas

Debajo tiene poros (como una esponja), no láminas.

### CÓMO ES

✓ **Tubos** amarillos, con gotitas de jóvenes

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** pardo ocre

### DÓNDE

Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero y otros

0–1800 m; sobre todo 400–1500 m

Bordes de camino, claros y zonas con poca pinaza; a menudo en grupos grandes.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.

✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.

✓ Pie SIN anillo, con granulaciones (puntitos) en la parte alta.

✓ Bajo pinos.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Boleto picante**
molleric pebrer · *Chalciporus piperatus*
NO COMESTIBLE Poros pardo canela a rojizos; carne muy picante; base del pie amarilla.

**Molleric de bou**
*Suillus bovinus*
SIN INTERÉS Poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes; sin granulaciones.

**Molleric**
*Suillus collinitus*
COMESTIBLE Micelio rosado en la base del pie y sombrero con fibras radiales oscuras.

**COMPRUEBE** Color de los poros.



# Perrechico

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Calocybe gambosa* · moixernó · bolet de Sant Jordi

E F M A M J J A S O N D

*Comestible excelente (parte A del anexo del RD 30/2009).*

### CÓMO ES

✓ **Láminas** blancas a crema, muy juntas

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

### DÓNDE

En prados

400–2000 m; sobre todo 500–1200 m

Prados con zarzas y endrinos, bordes de bosque; los corros se marcan por hierba más verde.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sale en PRIMAVERA (abril–junio), a menudo en corros.

✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.

✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.

✓ Sin anillo ni volva; carne blanca, gruesa y firme.

**OLOR** Intenso a harina fresca.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✕ ***Inosperma erubescens*** MORTAL → p. 49
**SE PARECE** Seta blanquecina de primavera en los mismos lugares. **SE DISTINGUE** Sombrero cónico fibroso agrietado; toda la seta se mancha de rojo; láminas que pasan a pardas; olor afrutado, no a harina.

✕ **Cogomassa** *Amanita verna* MORTAL → p. 45
**SE PARECE** Seta blanca de primavera. **SE DISTINGUE** Anillo y volva en saco; láminas libres.

✕ **Fals carlet** *Entoloma sinuatum* TÓXICA → p. 40
**SE PARECE** Seta grande blanquecina con olor a harina. **SE DISTINGUE** Láminas que pasan a rosa salmón, espaciadas; crece en otoño.

**COMPRUEBE** Sombrero, manchas rojas y láminas maduras.

# Pie azul

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Lepista nuda* · pimpinella morada

E F M A M J J A S O N D

En su punto: toda violeta, carnosa y de pie grueso.

Debajo: láminas violetas y apretadas. Sin cortina.

Con la edad el sombrero pierde el violeta y se vuelve pardo...

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** violeta lila
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** rosada pálida

**DÓNDE**

En prados

0–1800 m; sobre todo 300–1000 m

Acumulaciones de pinaza u hojarasca, montones de restos vegetales, bordes de pista.

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida (NUNCA pardo herrumbre).
✓ Sin cortina ni anillo.
✓ Olor afrutado o perfumado.

**OLOR** Afrutado, perfumado.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

***Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...)*** TÓXICA
Cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes, restos fibrosos en el pie y esporada PARDO HERRUMBRE que tiñe las láminas maduras.

✕ **Barret de bruixa** *Inocybe geophylla* TÓXICA → p. 42
**SE PARECE** La forma lila de I. **SE DISTINGUE** Pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso, láminas que se vuelven pardas.

✕ ***Mycena pura*** TÓXICA → p. 42
**SE PARECE** Tonos lila. **SE DISTINGUE** Pequeña y frágil, pie hueco delgado, olor a rábano.

**COMPRUEBE** Esporada y parte alta del pie.



# Cama de perdiu

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Chroogomphus rutilus* · pota de perdiu

E F M A M J J A S O N D

En su punto

Debajo: láminas gruesas, espaciadas y muy decurrentes.

Carne y pie de color naranja salmón.

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** gruesas, ocre → púrpura negruzco
- ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** negra o gris negruzca

**DÓNDE**

Pino silvestre, carrasco, laricio y piñonero

0–1800 m; sobre todo 400–1200 m

Donde hay Suillus: claros y bordes del pinar.

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca (no parda ni herrumbre).
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.
✓ Bajo pinos.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 50
**SE PARECE** Tonos anaranjados y cobrizos, cortina en los jóvenes. **SE DISTINGUE** Esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes.

✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 31
**SE PARECE** Tonos anaranjados en pinar. **SE DISTINGUE** Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; esporada blanca.

**Cama de perdiu mucosa**
*Gomphidius glutinosus*
COMESTIBLE Sombrero gris pardo muy mucilaginoso y carne blanca.

**COMPRUEBE** Esporada y unión de las láminas al pie; árbol.

# Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Cantharellus cibarius* · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D

En su punto

Debajo

De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

### CÓMO ES

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ **Anillo** ✗ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

### DÓNDE

- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

**OLOR** Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 50
**SE PARECE** Tonos anaranjados en planifolios ácidos. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

✗ **Seta de olivo** gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius* TÓXICA → p. 31
**SE PARECE** Color anaranjado, forma de embudo, crecimiento en otoño. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas, finas y apretadas.

✗ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 31
**SE PARECE** Naranja, en embudo, en pinares. **SE DISTINGUE** Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

**COMPRUEBE** Parte inferior.



# Negrilla

COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

*Tricholoma terreum* · fredolic · negret

**E** F M A M J J A **S O N D**

En su punto: grises, pequeños y en grupo bajo los pinos.

Debajo: láminas blanquecinas o grisáceas y pie blanco.

Sombrero gris ratón, seco y afieltrado.

### CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas a gris pálido
- ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

### DÓNDE

- Pino carrasco, silvestre, laricio y piñonero
- 0–1800 m; sobre todo 300–1000 m

Zonas abiertas del pinar con pinaza fina o musgo; a menudo cientos de ejemplares en la misma mancha.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso; NUNCA con escamas oscuras gruesas sobre fondo blanco.

✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.

✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.

✓ Bajo pinos, en grupos numerosos.

**OLOR** Débil, no harinoso.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Fredolic metzinós** *Tricholoma pardinum* TÓXICA → p. 38
**SE PARECE** Tricolomas grises bajo coníferas. **SE DISTINGUE** Mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con escamas...

***Tricholoma virgatum / T. sciodes*** TÓXICA Sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo.

***Inocybe (varias especies grises)*** TÓXICA Sombrero fibroso agrietado radialmente.

**COMPRUEBE** Escamas del sombrero, grosor de la carne, olor.

# Pedo de lobo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Lycoperdon perlatum* · pet de llop

E F M A M J J A S O N D

*Comestible solo joven, con el interior blanco puro, firme y uniforme. En cuanto amarillea o se vuelve oliváceo, deséchelo.*

Joven, blanco y lleno de verrugas

Grupo de jóvenes, blancos y firmes.

Abierto por arriba: ya suelta las esporas como humo.

**CÓMO ES**

✕ **Láminas** una bola: por dentro, blanca y firme

**DÓNDE**

En prados

0–2000 m; sobre todo 400–1100 m

Bosques de todo tipo y sus bordes.

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo: el interior debe ser blanco, compacto y uniforme, sin ningún dibujo de sombrero o láminas.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden dejando un retículo.

✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Oronja verde** farinera borda · *Amanita phalloides* MORTAL → p. 44

**SE PARECE** Fase de huevo blanco de algunas amanitas. **SE DISTINGUE** Al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una seta (sombrero, láminas, pie).

✕ **Pota de cavall groga** *Scleroderma citrinum* TÓXICA → p. 32

**SE PARECE** Bola en el suelo. **SE DISTINGUE** Interior negro violáceo y piel gruesa escamosa.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.



COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

# Trompeta de los muertos

*Craterellus cornucopioides* · trompeta de la mort · trompeta

E F M A M J J A S O N D

*Comestible muy apreciado, se seca muy bien (parte A del anexo del RD 30/2009).*

En su punto: negras, firmes y en grupo.

Mire por dentro: es hueca hasta abajo, como una trompeta.

Por fuera es gris y lisa, sin láminas.

**CÓMO ES**

✕ **Láminas** por fuera lisa, gris ceniza

● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

Haya, encina, castaño y roble pubescente y otros

100–1600 m; sobre todo 200–700 m

Vaguadas, bordes de torrentes y zonas umbrías con hojarasca gruesa y húmeda.

**CÓMO RECONOCERLA**

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.

✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada (sin láminas).

✓ Carne delgada y elástica.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

**Orella de gat negra**
*Helvella lacunosa*
CONDICIONADA Sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con costillas, no una trompeta hueca.

***Craterellus cinereus***
COMESTIBLE Cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo.

**COMPRUEBE** Forma general.

# Angula de monte

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Craterellus lutescens* · camagroc · rossinyol de pi

E F M A M J J A S **O** **N** **D**

*Comestible muy apreciado (parte A del anexo del RD 30/2009 como Cantharellus lutescens).*

En su punto

Debajo no hay láminas

Pie amarillo y hueco.

**CÓMO ES**

- ✕ **Láminas** casi liso, rosado anaranjado
- ● **Esporada** blanca a crema

**DÓNDE**

Pino silvestre, laricio y abeto blanco

300–1800 m; sobre todo 600–1100 m

Musgo húmedo junto a cursos de agua, umbrías de pinar.

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
- ✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
- ✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 31

**SE PARECE** Tonos anaranjados en pinar. **SE DISTINGUE** Láminas finas y apretadas; pie macizo.

**Camagroc**

*Craterellus tubaeformis*

COMESTIBLE Venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas; pie amarillo pardusco más apagado.

**COMPRUEBE** Parte inferior y pie.



COMESTIBLE ●●○ MEDIA

# Champiñón silvestre

*Agaricus campestris* · camperol

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

En su punto: sombrero blanco y láminas rosadas.

Láminas ROSA y anillo sencillo; nunca blancas en un...

Gírelo siempre: láminas rosadas y pie blanco sin volva.

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** rosa vivo → pardo chocolate
- ✓ **Anillo** fino, se pierde pronto
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo chocolate

**DÓNDE**

En prados

0–2000 m; sobre todo 200–1000 m

Pastos con ganado, prados de siega.

**CÓMO RECONOCERLA**

- ✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después (nunca blancas).
- ✓ Sin volva en la base.
- ✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.
- ✓ Olor agradable a champiñón (no a tinta ni a fenol).

**CUIDADO: SE CONFUNDE CON**

✕ **Cogomassa** *Amanita verna* MORTAL → p. 45

**SE PARECE** Seta blanca. **SE DISTINGUE** Láminas siempre blancas y volva en saco.

✕ **Bola de neu pudent** *Agaricus xanthodermus* TÓXICA → p. 36

**SE PARECE** Champiñón blanco de láminas rosadas a pardas. **SE DISTINGUE** Amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del pie; olor a tinta o fenol.

✕ **Fals carlet** *Entoloma sinuatum* TÓXICA → p. 40

**SE PARECE** Láminas rosadas. **SE DISTINGUE** Sin anillo; láminas amarillentas que pasan a rosa salmón; olor a harina rancia; en bosques.

**COMPRUEBE** Láminas y base.

# Barbuda

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Coprinus comatus* · bolet de tinta

E F M A M J J A S O N D

*Comestible solo muy joven, con las láminas todavía blancas, y cocinado el mismo día: en pocas horas se autodigiere en tinta negra.*

Joven, blanco y cerrado como un huevo alargado

Dos ejemplares jóvenes. Láminas todavía blancas por dentro.

Uno viejo (negro) junto a uno joven (blanco)

### CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas → rosadas → negras
- ✓ **Anillo** fino, se desliza
- ✗ **Volva**
- ● **Esporada** negra

### DÓNDE

En prados

0–1500 m; sobre todo 200–1000 m

Cunetas y bordes de camino rurales, prados con ganado, céspedes de parques.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan (como una peluca).

✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.

✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

**Bolet de femer**
*Coprinopsis atramentaria*
TÓXICA Sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas; crece en ramilletes sobre madera enterrada.

**Coprí garsa**
*Coprinopsis picacea*
NO COMESTIBLE Sombrero negro con placas blancas, como una urraca; olor desagradable.

**COMPRUEBE** Color y superficie del sombrero.



# Lengua de vaca

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

*Hydnum repandum* · llengua de bou · llémena

E F M A M J J A S O N D

*Los ejemplares viejos amargan.*

En su punto: sombrero crema, carnoso e irregular.

Debajo tiene aguijones (púas blandas), no láminas.

Aguijones y pie blanco, corto y grueso.

### CÓMO ES

- ✓ **Aguijones** blandos, crema anaranjados
- ✗ **Anillo** ✗ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

### DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco

Encina, haya, castaño y roble pubescente

0–1800 m; sobre todo 400–1000 m

Hojarasca de encinares y hayedos, a menudo en corros.

### CÓMO RECONOCERLA

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles (no láminas ni poros).

✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.

✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

**SABOR** Suave; amargo en ejemplares viejos.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

***Hydnellum* / *Sarcodon***
NO COMESTIBLE Carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos, violáceos o negruzcos; muchos amargos.

**Picornell de pi**
*Hydnum rufescens*
COMESTIBLE Más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie.

**COMPRUEBE** Consistencia de la carne.



COMESTIBLES

# Oronja

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Amanita caesarea* · ou de reig · reig

E F M A M J J **A S O** N D

En su punto: sombrero naranja, pie amarillo y volva blanca.

Láminas y pie AMARILLOS; volva blanca en saco.

Joven: sale de un huevo blanco.

### CÓMO ES

- ✓ **Láminas** amarillo dorado
- ✓ **Anillo** amarillo, colgante
- ✓ **Volva** blanca, grande, en saco
- ● **Esporada** blanca

### DÓNDE

Encina, alcornoque, roble pubescente y castaño

50–1100 m; sobre todo 200–700 m

Claros y bordes soleados, laderas de solana y taludes.

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Láminas AMARILLAS (no blancas).
- ✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
- ✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.
- ✓ Sombrero naranja rojizo a naranja, normalmente sin verrugas blancas.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

× **Oronja verde** farinera borda · *Amanita phalloides* MORTAL → p. 44
**SE PARECE** Fase de huevo blanco en los mismos bosques. **SE DISTINGUE** Al cortar el huevo de arriba abajo, el sombrero en formación es verdoso...

× **Matamoscas** reig bord · *Amanita muscaria* TÓXICA → p. 34
**SE PARECE** Sombrero rojo anaranjado, volva y anillo, mismos bosques. **SE DISTINGUE** Láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden...

***Amanita crocea*** CONDICIONADA Sin anillo; láminas blancas o crema.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal del huevo.



# Parasol

COMESTIBLE ●●○ MEDIA

*Macrolepiota procera* · apagallums · cogomella

E F M A M J J **A S O N** D

Compare con la moneda: abierto mide al menos 10–15 cm.

Pie con dibujo de piel de serpiente: la marca del parasol.

Debajo: láminas blancas y anillo grueso que se desplaza.

### CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas a crema
- ✓ **Anillo** doble, se desliza
- × **Volva**
- ● **Esporada** blanca

### DÓNDE

En prados

0–1800 m; sobre todo 200–1100 m

Bordes de bosque y claros con hierba alta o helechos; visible a distancia.

### CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un mamelón central pardo liso.
- ✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas (como piel de serpiente).
- ✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.
- ✓ Sin volva; carne blanca que NO enrojece al corte.

**OLOR** Agradable, a avellana.

### CUIDADO: SE CONFUNDE CON

× **Lepiota metzinosa** *Lepiota brunneoincarnata* MORTAL → p. 47
**SE PARECE** Aspecto de pequeño parasol con escamas. **SE DISTINGUE** Sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas; anillo apenas marcado.

× **Amanita pantera** pixacà · *Amanita pantherina* TÓXICA → p. 34
**SE DISTINGUE** Volva en la base y anillo fijo; pie liso.

**Apagallums**
*Chlorophyllum rhacodes*
CONDICIONADA Pie liso sin bandas; carne que se vuelve naranja rojiza al corte; bulbo marginado.

**COMPRUEBE** Tamaño: no recolecte nunca «parasoles» de menos de 10 cm.

NOTAS

ANEXO



# Cualbra morada

NO COMESTIBLE ●●● DIFÍCIL

*Russula torulosa* · escaldabec vinós

E F M A M J J A S O N D

*No comestible por su sabor muy picante; la SCM la sitúa entre las especies «a refusar».*

Sombrero púrpura oscuro y pie teñido de púrpura, bajo pinos.

Debajo: láminas crema y pie rosa púrpura.

En grupo, entre el musgo de un pinar.

**CÓMO ES**

✓ **Láminas** crema pálido, frágiles

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** crema

**DÓNDE**

Pino carrasco, laricio, silvestre y piñonero

0–1600 m; sobre todo 300–900 m

Pinares mediterráneos y de montaña media.

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo; brillante.

! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.

! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.

! Bajo pinos, sobre todo en suelo calcáreo.

**SABOR** Muy picante (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Níscalo de sangre** rovelló · *Lactarius sanguifluus* COMESTIBLE → p. 4

**SE PARECE** Pinares calizos, tonos vinosos, época. **SE DISTINGUE** El rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que verdean y pie hueco con hoyuelos.

≈ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 5

**SE PARECE** Sombrero púrpura. **SE DISTINGUE** La carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas, sabor suave y crece bajo planifolios.

**COMPRUEBE** Corte una lámina: la rúsula no suelta ninguna gota.

TÓXICAS

# Boleto de Satanás

**TÓXICA** ●○○ FÁCIL

*Rubroboletus satanas* · matagent · mataparent de Satanàs

E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D

Sombrero blanquecino y pie hinchado rojo.

Debajo: poros ROJOS y pie rojo. Descártelo.

Al cortarla o tocarla, la carne azulea.

### CÓMO ES

✓ **Tubos** poros rojos, azulean al tocarlos

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** pardo oliva

### DÓNDE

Roble pubescente, encina, castaño y haya

100–1300 m; sobre todo 500–1100 m

Bosques claros y cálidos de planifolios.

### RASGOS DE ALARMA

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo (nunca pardo oscuro).

! Poros rojos o rojo anaranjados.

! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.

! La carne azulea débilmente al corte.

**OLOR** Desagradable, a carroña, en ejemplares viejos.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 6 horas. Vómitos repetidos, diarrea y dolor abdominal.

### SE CONFUNDE CON

**Boleto reticulado**
cep d'estiu · *Boletus reticulatus*
**COMESTIBLE** El cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la carne no azulea.

**Boleto negro**
sureny fosc · *Boletus aereus*
**COMESTIBLE** Sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable.

**COMPRUEBE** Poros y corte.





**NOTAS**

**Para montarlo:** imprime a doble cara volteando por el **borde corto**, a tamaño real; ordena las hojas por su número pequeño (un montón con las A y otro con las B), dobla cada montón por la mitad y grapa por el pliegue.

NOTAS



# Falsos rebozuelos

TÓXICAS ●○○ FÁCIL

*Hygrophoropsis aurantiaca* y *Omphalotus olearius* · fals rossinyol, gírgola d'olivera

*Naranjas como el rebozuelo, pero con láminas finas de verdad.*

## Falso rebozuelo

fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*

Pequeño y todo naranja.

## Seta de olivo

gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*

En ramillete sobre un tocón.

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** 0–1800 m de altitud

E F M A M J J A **S O N D**

| | Falso rebozuelo | Seta de olivo |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Pequeño (2–8 cm), carne delgada y blanda | Grande (5–15 cm) y carnoso |
| CÓMO SALE | Suelto, en la pinaza o sobre madera podrida de pino | En ramilletes de pies unidos, sobre tocones y raíces de olivo, encina o castaño |

**RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS**

! Láminas verdaderas: finas, apretadas y que bajan por el pie.
! Todo naranja: sombrero, láminas y pie.
! Pase el dedo por debajo: las láminas se separan; los pliegues del rebozuelo, no.

**SETA DE OLIVO** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**FALSO REBOZUELO** ●○○ **Leve.** No comestible: puede sentar mal.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal intensos.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Rebozuelo** rossinyol · *Cantharellus cibarius* COMESTIBLE → p. 10

**SE DISTINGUE** El rossinyol tiene pliegues gruesos, bajos y romos (no láminas finas).

**COMPRUEBE** Debajo del sombrero: láminas finas, falso; pliegues gruesos y romos, rebozuelo.

TÓXICAS

TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Pota de cavall groga

*Scleroderma citrinum*

E F M A M J J A S O N D

Bola de piel gruesa

Cortada

Interior oscuro con vetas claras.

**CÓMO ES**

✕ **Láminas** una bola: por dentro, negra violácea

**DÓNDE**

Pino piñonero

Alcornoque, encina y castaño

0–1200 m; sobre todo 200–1000 m

Bosques sobre suelo ácido, bordes de camino.

**RASGOS DE ALARMA**

! Corte de arriba abajo: interior negro violáceo, firme, marmoleado de blanco, desde muy joven.

! Piel gruesa (2–4 mm), dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

**GRAVEDAD ●●○ Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal; se han descrito casos con mareo y sudoración.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Pedo de lobo** pet de llop · *Lycoperdon perlatum* COMESTIBLE → p. 18

**SE PARECE** Bola sin pie claro. **SE DISTINGUE** El pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes.

**Bejín gigante**
pet de llop gegant · *Calvatia gigantea*
COMESTIBLE Interior blanco uniforme y piel fina.

**Trufa negra**
tòfona negra · *Tuber melanosporum*
COMESTIBLE La trufa es subterránea, de piel negra con verrugas piramidales y olor intenso agradable.

**COMPRUEBE** Corte longitudinal.





# Árboles y sus setas

HOJA

TRONCO

## Abeto blanco
**avet** · *Abies alba*

*Conífera alta de copa cónica regular y verde oscuro, en umbrías frescas.*

**BUSQUE** Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Angula de monte *12*, Lengua de vaca *13*

**CUIDADO** Falsa colmenilla *51*, Amanita pantera y matamoscas *34*, Fredolic metzinós *38*

HOJA

TRONCO

## Alcornoque
**surera** · *Quercus suber*

*Árbol de copa amplia y verde grisácea.*

**BUSQUE** Carbonera *5*, Rebozuelo *10*, Oronja *14*

**CUIDADO** Oronja verde *44*, Cogomassa *45*, Enganyapastors *27*, Pota de cavall groga *32*

HOJA

TRONCO

## Roble pubescente
**roure martinenc** · *Quercus pubescens*

*Roble de talla media, a menudo marcescente: conserva en invierno buena parte de las...*

**BUSQUE** Carbonera *5*, Trompeta de los muertos *11*, Lengua de vaca *13*, Oronja *14*, Babosa negra y carlet *22*

**CUIDADO** Oronja verde *44*, Cogomassa *45*, Cortinari metzinós *50*, Enganyapastors *27*, Boleto de Satanás *30*, Peu de rata bord *33*

HOJA

TRONCO

## Haya
**faig** · *Fagus sylvatica*

*Árbol alto de corteza lisa y gris.*

**BUSQUE** Carbonera *5*, Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Trompeta de los muertos *11*, Lengua de vaca *13*

**CUIDADO** Oronja verde *44*, Farinera pudent *46*, Boleto de Satanás *30*, Peu de rata bord *33*, Amanita pantera y matamoscas *34*, Fredolic metzinós *38*

HOJA

TRONCO

## Castaño
**castanyer** · *Castanea sativa*

*Árbol grande de copa amplia.*

**BUSQUE** Carbonera *5*, Boleto *7*, Rebozuelo *10*, Trompeta de los muertos *11*, Lengua de vaca *13*, Oronja *14*

**CUIDADO** Paxilo *43*, Oronja verde *44*, Cortinari metzinós *50*, Enganyapastors *27*, Boleto de Satanás *30*, Pota de cavall groga *32*

ANEXO

DÓNDE BUSCAR

# Árboles y sus setas

*Reconocer el árbol por la hoja y el tronco ayuda a saber qué buscar.*

HOJA

TRONCO

## Pino carrasco

**pi blanc** · *Pinus halepensis*

*Copa clara, irregular y de verde grisáceo pálido.*

**BUSQUE** Níscalos 4, Boleto granulado 8, Cama de perdiu 9, Negrilla 19, Babosa negra y carlet 22

**CUIDADO** Cualbra morada 29

HOJA

TRONCO

## Pino piñonero

**pi pinyer** · *Pinus pinea*

*Copa ancha en forma de parasol o sombrilla, inconfundible en árboles adultos aislados.*

**BUSQUE** Níscalos 4, Boleto granulado 8, Cama de perdiu 9, Negrilla 19

**CUIDADO** Pota de cavall groga 32, Seta de los caballeros 37, Cualbra morada 29

HOJA

TRONCO

## Pino laricio

**pinassa** · *Pinus nigra subsp. salzmannii*

*Pino de copa densa y verde muy oscuro, alto y recto en los rodales maduros.*

**BUSQUE** Níscalos 4, Seta coliflor 6, Boleto granulado 8, Cama de perdiu 9, Angula de monte 12, Negrilla 19

**CUIDADO** Cualbra morada 29

HOJA

TRONCO

## Pino silvestre

**pi roig** · *Pinus sylvestris*

*Copa irregular y alta.*

**BUSQUE** Níscalos 4, Seta coliflor 6, Boleto 7, Boleto granulado 8, Cama de perdiu 9, Rebozuelo 10

**CUIDADO** Paxilo 43, Falsa colmenilla 51, Amanita pantera y matamoscas 34, Seta de los caballeros 37, Fredolic metzinós 38, Cualbra morada 29

HOJA

TRONCO

## Encina

**alzina** · *Quercus ilex*

*Árbol perennifolio de copa densa, redondeada y verde oscuro mate.*

**BUSQUE** Carbonera 5, Rebozuelo 10, Trompeta de los muertos 11, Lengua de vaca 13, Oronja 14, Babosa negra y carlet 22

**CUIDADO** Paxilo 43, Oronja verde 44, Cogomassa 45, Cortinari metzinós 50, Enganyapastors 27, Boleto de Satanás 30

ANEXO



# Peu de rata bord

TÓXICA ●●○ MEDIA

*Ramaria formosa*

E F M A M J J A S O N D

*Tóxica (gastrointestinal, efecto laxante intenso).*

Forma de coral, ramas rosa anaranjado.

Base blanca y gruesa de la que salen las ramas.

Puntas de las ramas amarillentas.

**CÓMO ES**

✕ **Láminas** ramas, como un coral

● **Esporada** ocre

**DÓNDE**

Haya, roble pubescente y castaño

200–1600 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios.

**RASGOS DE ALARMA**

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

**SABOR** Algo amargo (no la pruebe).

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Dolor abdominal, diarrea y vómitos.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Seta coliflor** peu de rata de pi · *Sparassis crispa* COMESTIBLE → p. 6

**SE PARECE** Masa ramificada. **SE DISTINGUE** Lóbulos aplanados crema, en pinos.

**Coliflor rosa**

peu de rata col-i-flor · *Ramaria botrytis*

CONDICIONADA Puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas.

**COMPRUEBE** Forma.

TÓXICAS

TÓXICAS ●●○ MEDIA

# Amanita pantera y matamoscas

*Amanita pantherina* y *A. muscaria* · pixacà, reig bord

**Amanita pantera**
pixacà · *Amanita pantherina*
Parda con verrugas blancas.

**Matamoscas**
reig bord · *Amanita muscaria*
Rojo con verrugas blancas.

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva** 0–2200 m de altitud

E F M A M J J **A S O N** D

| | Amanita pantera | Matamoscas |
|---|---|---|
| SOMBRERO | Pardo; verrugas blanco puro, en círculos | Rojo o naranja, más grande |
| BASE | Bulbo con reborde, como un calcetín | Bulbo con anillos de volva |
| DÓNDE | Pinares, robledales, hayedos, encinares | Pinares y abedulares de montaña |

**RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS**

! Verrugas blancas en el sombrero (la lluvia puede borrarlas).
! Láminas y pie blancos; bulbo en la base.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

**SÍNDROME PANTERÍNICO (NEUROTÓXICO)** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Confusión, agitación, alucinaciones y somnolencia; vómitos.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Parasol** apagallums · *Macrolepiota procera* COMESTIBLE → p. 15
**SE PARECE** Sombrero pardo con escamas. **SE DISTINGUE** Sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado.

≈ **Oronja** ou de reig · *Amanita caesarea* COMESTIBLE → p. 14
**SE DISTINGUE** El ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco blanca.

**COMPRUEBE** Láminas blancas, anillo y volva: descártela (la oronja las tiene amarillas).





# Falsa colmenilla

MORTAL ●○○ FÁCIL

*Gyromitra esculenta* · bolet de greix · murga

E F M **A M J** J A S O N D

*Potencialmente mortal (giromitrina → monometilhidracina).*

**CÓMO ES**

✕ **Láminas** sombrero arrugado, como un cerebro

**DÓNDE**

Pino silvestre, abeto blanco y pino negro
Sobre madera
600–2200 m; sobre todo 1000–1800 m
Coníferas de montaña.

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.
! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

**SÍNDROME GIROMITRIANO** Síntomas de 6 a 12 horas. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza; en casos graves convulsiones, daño hepático y renal.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Colmenilla** múrgola · *Morchella esculenta* CONDICIONADA → p. 26
**SE PARECE** Primavera, aspecto arrugado. **SE DISTINGUE** La colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola cavidad.

**Colmenilla negra**
múrgola · *Morchella elata*
CONDICIONADA Alvéolos en hileras y un solo hueco.

**COMPRUEBE** **Corte longitudinal.**

# Cortinari metzinós

**MORTAL** ●●○ MEDIA

*Cortinarius orellanus* · bolet de mantellina

E F M A M J J A **S** **O** **N** D

Sombrero naranja herrumbre

Varios ejemplares

Pie amarillento y fibroso

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** amarillo anaranjadas → herrumbre
- ◑ **Anillo** solo una cortina en los jóvenes
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo herrumbre

**DÓNDE**

Roble pubescente, castaño y encina

100–1500 m de altitud

Bosques de planifolios sobre suelo ácido.

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.

! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.

! Esporada pardo herrumbre.

! Pie amarillento fibroso, sin bulbo ni anillo membranoso (restos de cortina).

**OLOR** Débil a rábano.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

**SÍNDROME ORELLÁNICO** Síntomas de 2 a 15 días (o más). Sed intensa, cansancio, dolor lumbar y alteraciones de la orina días después de la comida.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Rebozuelo** rossinyol · *Cantharellus cibarius* COMESTIBLE → p. 10

**SE DISTINGUE** El rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas.

**Camagroc**
*Craterellus tubaeformis*
COMESTIBLE Pie hueco y pliegues en lugar de láminas.

**COMPRUEBE** **Parte inferior.**





# Lepiota pudent

**TÓXICA** ●●○ MEDIA

*Lepiota cristata*

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D

*Tóxica (gastrointestinal). Es la lepiota pequeña más común; recuerda que cualquier lepiota pequeña puede ser mortal.*

L. cristata de cerca

Lepiota cristata

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** fino, frágil
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

En prados

0–1600 m; sobre todo 300–1000 m

Hojarasca, jardines y bordes de camino.

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña (2–5 cm) de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.

! Olor desagradable, a goma o gas.

! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos y diarrea.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Parasol** apagallums · *Macrolepiota procera* COMESTIBLE → p. 15

**SE PARECE** Parasol en miniatura. **SE DISTINGUE** Tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado.

**COMPRUEBE** Tamaño.

# Bola de neu pudent

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*Agaricus xanthodermus*

E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

Parece un champiñón blanco, pero la base amarillea.

Láminas rosa grisáceo de joven; se confunde fácilmente con...

Vieja: láminas pardo oscuro.

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** rosadas → pardas
- ✓ **Anillo** grueso
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo chocolate

**DÓNDE**

En prados

0–1500 m; sobre todo 200–500 m

Parques, jardines, bordes de camino y bosques claros.

**RASGOS DE ALARMA**

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.

! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

**OLOR** Desagradable (tinta, fenol).

**GRAVEDAD** ●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas entre 30 minutos y 3 horas. Vómitos, diarrea y dolor abdominal.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Champiñón silvestre** camperol · *Agaricus campestris* COMESTIBLE → p. 17

**SE PARECE** Champiñón blanco. **SE DISTINGUE** No amarillea y huele bien.

**Bola de nieve**

bola de neu · *Agaricus arvensis*

COMESTIBLE Olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo.

**COMPRUEBE** Base del pie.





MORTAL ●●○ MEDIA

# *Inosperma erubescens*

E F M A **M** **J** **J** A S O N D

*Potencialmente mortal por su alto contenido en muscarina.*

Setas pequeñas de sombrero cónico y fibroso.

Algunas se manchan de rojo (Inosperma erubescens).

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blanquecinas → pardas, manchas rojas
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** parda

**DÓNDE**

En prados

0–1500 m de altitud

Bosques de planifolios, parques con tilos, hayas o robles.

**RASGOS DE ALARMA**

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.

! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.

! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas (esporada parda).

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, pulso lento y caída de la tensión.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Perrechico** moixernó · *Calocybe gambosa* COMESTIBLE → p. 21

**SE PARECE** Seta blanquecina de primavera. **SE DISTINGUE** El moixernó tiene sombrero liso carnoso, láminas muy apretadas blancas, olor a harina y no enrojece.

**COMPRUEBE** **Sombrero, manchas rojas y olor.**

# Galerina marginada

MORTAL ●●○ MEDIA

*Galerina marginata* · galerina metzinosa

E F M A M J J A S O N D

Setas pardo miel en grupo sobre madera musgosa.

Pie delgado con un anillo pequeño. Sombrero liso y...

Láminas pardo herrumbre y sombrero anaranjado.

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** amarillentas → pardo herrumbre
- ✓ **Anillo** fino
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** pardo herrumbre

**DÓNDE**

- Sobre madera
- 0–2000 m; sobre todo 400–1300 m

Madera muerta de coníferas y planifolios.

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Pequeña seta parda (1,5–5 cm) sobre madera, en grupos.
- ! Anillo fino pardo en el pie.
- ! Esporada pardo herrumbre.
- ! Sombrero liso, miel a pardo, que cambia de color al secarse (higrófano).

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Seta de chopo** pollancró · *Cyclocybe cylindracea* COMESTIBLE → p. 25

**SE PARECE** Pardo con anillo sobre madera. **SE DISTINGUE** Mayor y sobre chopos.

***Kuehneromyces mutabilis***

COMESTIBLE Pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas).

**COMPRUEBE** **Tamaño y árbol.**





TÓXICA ●○○ FÁCIL

# Seta de los caballeros

*Tricholoma equestre* · verderol · groguet

E F M A M J J A S O N D

Todo amarillo verdoso: sombrero, láminas y pie.

Debajo: láminas amarillo azufre.

Sombrero amarillento con escamitas oscuras en el centro.

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** amarillo azufre
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

- Pino piñonero, silvestre y rodeno
- En prados
- 0–1700 m; sobre todo 400–1500 m

Pinares sobre suelo arenoso.

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Láminas amarillo azufre intenso.
- ! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.
- ! Pie amarillo.

**OLOR** A harina débil.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

**SÍNDROME RABDOMIOLÍTICO** Síntomas de 24 a 72 horas tras varias comidas en días seguidos. Cansancio, debilidad y dolores musculares, orina oscura.

**SE CONFUNDE CON**

**Capuchina**

fredolic gros · *Tricholoma portentosum*

COMESTIBLE Sombrero gris con fibras negras.

≈ **Oronja verde** farinera borda · *Amanita phalloides* MORTAL → p. 44

**SE PARECE** Sombrero amarillo verdoso. **SE DISTINGUE** Láminas blancas, anillo y volva.

**COMPRUEBE** Sombrero.

# Fredolic metzinós

TÓXICA ●●○ MEDIA

*Tricholoma pardinum*

E F M A M J J **A** **S** **O** N D

Sombreros grises cubiertos de escamas oscuras en círculos.

Sombrero escamoso y pie robusto y lleno

Debajo: láminas blanquecinas y pie grueso.

**CÓMO ES**

✓ **Láminas** blanquecinas, reflejo verdoso

✕ **Anillo** ✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

Abeto blanco y pino silvestre

Haya

800–2000 m de altitud

Bosques de montaña.

**RASGOS DE ALARMA**

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o pardas (dibujo de tigre).

! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.

! Olor a harina.

**OLOR** A harina.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 3 horas. Vómitos y diarrea intensos, que pueden requerir hospitalización.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Negrilla** fredolic · *Tricholoma terreum* COMESTIBLE → p. 19

**SE PARECE** Tricoloma gris. **SE DISTINGUE** El fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina.

**Capuchina**

fredolic gros · *Tricholoma portentosum*

COMESTIBLE Sombrero con fibras radiales lisas, no escamas.

**COMPRUEBE** Tamaño y escamas.





# Lepiota metzinosa

MORTAL ●●○ MEDIA

*Lepiota brunneoincarnata* · palometa

E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

Pequeña, sombrero con escamas pardo rosadas.

Pie rosado con bandas y láminas blancas.

Sombrero con escamas en círculos, más oscuro en el centro.

**CÓMO ES**

✓ **Láminas** blancas a crema

◑ **Anillo** solo una zona algodonosa

✕ **Volva**

● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

En prados

0–900 m; sobre todo por debajo de 300 m

Prados, jardines, parques, bordes de bosque y de camino; a menudo en zonas litorales.

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.

! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.

! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.

! Láminas blancas, libres.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas. Gastroenteritis intensa seguida de daño hepático grave.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Parasol** apagallums · *Macrolepiota procera* COMESTIBLE → p. 15

**SE PARECE** Aspecto de parasol con escamas. **SE DISTINGUE** El apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie atigrado.

≈ **Senderuela** cama-sec · *Marasmius oreades* COMESTIBLE → p. 23

**SE PARECE** Pequeña seta de prado en otoño. **SE DISTINGUE** El cama-sec tiene láminas espaciadas, pie correoso que no se rompe y sombrero liso sin escamas.

**COMPRUEBE** **Tamaño, anillo y pie.**

# Farinera pudent

MORTAL ●●○ MEDIA

*Amanita virosa*

E F M A M J J **A** **S** **O** N D

*Mortal (amatoxinas).*

Toda blanca, con anillo y volva.

Láminas blancas. Un champiñón abierto las tendría rosas o...

Pie blanco y fibroso con restos de anillo.

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, frágil
- ✓ **Volva** en saco
- ● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

Haya y abedul

500–1800 m de altitud

Bosques húmedos sobre suelo ácido (en Europa).

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.

! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.

! Volva blanca en saco.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas. Como la farinera borda.

**SE CONFUNDE CON**

**Bola de nieve**
bola de neu · *Agaricus arvensis*
COMESTIBLE Láminas rosadas a pardas, sin volva.

**COMPRUEBE** **Láminas y base.**





# Clitocibe blanc

TÓXICA ●●○ MEDIA

*Clitocybe rivulosa* · candeleta

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blancas a crema, bajan por el pie
- ✗ **Anillo** ✗ **Volva**
- ● **Esporada** blanca

**DÓNDE**

En prados

0–2000 m; sobre todo 300–1000 m

Prados, céspedes, claros herbosos.

**RASGOS DE ALARMA**

! Seta pequeña (2–5 cm) blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.

! Láminas blancas a crema, DECURRENTES (bajan por el pie).

! Esporada blanca (no rosada).

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración intensa, salivación, lagrimeo, visión borrosa, vómitos, diarrea, pulso lento.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Senderuela** cama-sec · *Marasmius oreades* COMESTIBLE → p. 23
**SE PARECE** Pequeña seta de prado en corros. **SE DISTINGUE** El cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes, sombrero ocre con mamelón y pie correoso.

**Molinera**
moixernó blanc de tardor · *Clitopilus prunulus*
COMESTIBLE Láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a harina.

≈ **Champiñón silvestre** camperol · *Agaricus campestris* COMESTIBLE → p. 17
**SE PARECE** Seta blanca de prado. **SE DISTINGUE** Láminas libres rosadas a pardas.

**COMPRUEBE** Láminas.

# Fals carlet

TÓXICA ●●○ MEDIA

*Entoloma sinuatum* · carlet bord

E F M A M J J A **S O N** D

Setas grandes de sombrero blanquecino y sedoso, en grupo.

Láminas rosadas: la señal para descartarlo.

Adulto

### CÓMO ES

- ✓ **Láminas** amarillentas → rosa salmón
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** rosada

### DÓNDE

Roble pubescente, haya y castaño

100–1500 m; sobre todo 200–800 m

Bosques de planifolios.

### RASGOS DE ALARMA

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.
! Seta grande gris ocrácea, carnosa, sin anillo ni volva.

**OLOR** A harina rancia.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a 4 horas. Vómitos y diarrea violentos y prolongados; puede requerir hospitalización.

### SE CONFUNDE CON

≈ **Carlet** *Hygrophorus russula* COMESTIBLE → p. 22
**SE PARECE** Seta grande y carnosa de bosque de robles en otoño. **SE DISTINGUE** El carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas, láminas céreas blancas que se manchan de vinoso y esporada blanca.

≈ **Perrechico** moixernó · *Calocybe gambosa* COMESTIBLE → p. 21
**SE PARECE** Seta blanquecina carnosa con olor a harina. **SE DISTINGUE** Láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas; sale en primavera.

**COMPRUEBE** Color del sombrero y de las láminas.



# Cogomassa

MORTAL ●●○ MEDIA

*Amanita verna*

E F M **A M J** J A S O N D

### CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

### DÓNDE

Encina, roble pubescente y alcornoque

0–900 m de altitud

Encinares y robledales mediterráneos.

### RASGOS DE ALARMA

! Seta enteramente blanca.
! Volva blanca en saco en la base.
! Anillo membranoso blanco.
! Láminas blancas, libres.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas. Igual que la farinera borda: gastroenteritis violenta, mejoría aparente y daño hepático grave.

### SE CONFUNDE CON

≈ **Perrechico** moixernó · *Calocybe gambosa* COMESTIBLE → p. 21
**SE PARECE** Seta blanca de primavera. **SE DISTINGUE** El moixernó no tiene volva ni anillo, sus láminas son muy apretadas y adherentes al pie, y huele a harina.

≈ **Champiñón silvestre** camperol · *Agaricus campestris* COMESTIBLE → p. 17
**SE PARECE** Seta blanca de prado o borde de bosque. **SE DISTINGUE** Láminas rosadas y luego pardas; sin volva.

**COMPRUEBE** Base y pie.

# Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

*Amanita phalloides* · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D

Adulta

Debajo

Láminas blancas y base con volva

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

**DÓNDE**

- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

**OLOR** Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

**GRAVEDAD** ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

**SÍNDROME FALOIDIANO** Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

**SE CONFUNDE CON**

**Gorro verde**
llora verda · *Russula virescens*
COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...

≈ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 5
**SE DISTINGUE** Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

**COMPRUEBE** **Base y pie.**





# Bolet de pi

TÓXICA ●○○ FÁCIL

*Hypholoma fasciculare*

E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

*Tóxico (gastrointestinal, a veces grave) y muy amargo.*

**CÓMO ES**

- ✓ **Láminas** amarillas → verdosas
- ✗ **Anillo** ✗ **Volva**
- ● **Esporada** pardo violácea

**DÓNDE**

- En prados
- Sobre madera
- 0–2000 m; sobre todo 400–1100 m

Tocones y madera muerta.

**RASGOS DE ALARMA**

- ! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
- ! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
- ! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

**GRAVEDAD** ●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

**SÍNDROME GASTROINTESTINAL** Síntomas de 30 minutos a varias horas. Vómitos, diarrea; se han descrito casos graves.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Seta de chopo** pollancró · *Cyclocybe cylindracea* COMESTIBLE → p. 25
**SE PARECE** Ramilletes. **SE DISTINGUE** Crema, anillo membranoso, en chopos.

**Armilaria**
alzinoi · *Armillaria mellea*
CONDICIONADA Anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras.

**COMPRUEBE** Color.

TÓXICAS ●●○ MEDIA

# Pequeñas con muscarina

*Inocybe geophylla* y *Mycena pura*

E F M A M J J **A S O N** D

*Pequeñas, blancas o lilas; las lilas se confunden con el pie azul.*

**Barret de bruixa**
*Inocybe geophylla*
Blanco, con un pico en el centro.

**Mycena pura**
Lila, borde con rayas.

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ▲ 0–2000 m de altitud

| | Barret de bruixa | Mycena pura |
|---|---|---|
| COLOR | Blanco sedoso, a veces lila | Lila o rosado; borde con rayas |
| FORMA | Cónico, con pico; fibras que se agrietan | Acampanado; pie hueco y frágil |
| OLOR | A tierra | A rábano |

**RASGOS DE ALARMA DE LOS DOS**

! Pequeñas: de 1 a 5 cm.
! En la hojarasca de pinares, hayedos y bosques mixtos.

GRAVEDAD ●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

**SÍNDROME MUSCARÍNICO** Síntomas de 15 minutos a 2 horas. Sudoración, salivación, lagrimeo, vómitos y diarrea.

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Pie azul** pimpinella morada · *Lepista nuda* COMESTIBLE → p. 20
**SE PARECE** Tonos lila. **SE DISTINGUE** Mucho mayor y carnosa.

≈ **Senderuela** cama-sec · *Marasmius oreades* COMESTIBLE → p. 23
**SE DISTINGUE** Prado, pie correoso, láminas espaciadas crema.

**COMPRUEBE** Tamaño: el pie azul es grande, carnoso y huele a fruta.



# Paxilo

MORTAL ●●○ MEDIA

*Paxillus involutus* · paxil·le tòxic · paxil enrotllat

E F M A M J J **A S O N** D

Sombreros pardos en grupo, con el margen curvado hacia...

Margen del sombrero muy enrollado.

Debajo: láminas crema que bajan por el pie.

**CÓMO ES**

✓ **Láminas** ocre, se manchan de pardo
✕ **Anillo** ✕ **Volva**
● **Esporada** pardo ocre

**DÓNDE**

Pino silvestre
Abedul, encina y castaño
▲ 0–1900 m; sobre todo 400–1400 m

**RASGOS DE ALARMA**

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.
! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan con facilidad de la carne.
! Sin látex.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

**SÍNDROME HEMOLÍTICO** Síntomas de 1 a 3 horas en personas ya sensibilizadas. Vómitos, dolor abdominal, orina oscura por destrucción de glóbulos rojos, caída de la tensión y...

**SE CONFUNDE CON**

≈ **Níscalo de sangre** rovelló · *Lactarius sanguifluus* COMESTIBLE → p. 4
**SE PARECE** Margen enrollado, tonos pardo rojizos en ejemplares viejos. **SE DISTINGUE** El rovelló tiene látex rojo vino y verdea; el paxilo no tiene látex y se mancha de pardo.

≈ **Níscalo** pinetell · *Lactarius deliciosus* COMESTIBLE → p. 4
**SE PARECE** Margen enrollado; tonos anaranjados en pinar. **SE DISTINGUE** Látex naranja y manchas verdes en el pinetell.

**COMPRUEBE** **Corte: látex o no.**