

Setas *esenciales*

de Cataluña






Las **54** que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES · **20** TÓXICAS · **9** MORTALES

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.**
2. **Saque la seta entera, con la base del pie.**
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.**
4. **No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.**
5. **Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.**
6. **Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.**
7. **No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata…).**
8. **Las apps de fotos orientan, pero no deciden.**
9. **Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.**
10. **Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.**
11. **Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.**
12. **Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.**

CÓMO LEER LAS FICHAS

COMESTIBLE · TÓXICA · MORTAL	Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen.
●●○ Media	Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil.
E F M A M J J A **S O N** D	Meses en que sale; en claro, solo algunos años.
✓ ✗ ◑	Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte.
●●○ Grave	En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal.
→ *p. 12*	Página de la seta con la que se confunde.


EMPIEZAN EN LA PÁGINA ■ **Comestibles** *4* ■ **Tóxicas** *13* ■ **Mortales** *20*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.

ANTES DEL NOMBRE

Cómo mirar una seta

Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.



1 **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

2 **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.


3 **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

4 **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?


5 **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

6 **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO




Láminas
Hojas finas, como un libro



Tubos
Una esponja de agujeritos



Pliegues
Venas gruesas, no hojas




Aguijones
Púas blandas





Interior
Una bola: córtela

LA EDAD CUENTA









Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Níscalo de sangre

rovelló · *Lactarius sanguifluus*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex**

✓ Látex rojo vino desde el primer instante, sin pasar por naranja.
✓ Láminas rosa vinoso o lila vinoso, que se manchan de verde.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y piñonero y otros.

CUIDADO
Paxilo MORTAL → *p. 20*: sin látex; se mancha de pardo (no de verde).
Enganyapastors de llet groga TÓXICA → *p. 13*: látex BLANCO que amarillea en segundos.



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Níscalo

pinetell · *Lactarius deliciosus*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex**

✓ Látex naranja zanahoria al cortar, que no se vuelve rojo vino en los...
✓ Láminas naranja vivo que se manchan de verde.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y negro y otros.

CUIDADO
Paxilo MORTAL → *p. 20*: sin látex; se mancha de pardo (no de verde).
Falso níscalo TÓXICA → *p. 13*: margen muy peludo, látex blanco y picante.



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Carbonera

llora · *Russula cyanoxantha*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto.
✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

DÓNDE Con haya, castaño y encina y otros.

CUIDADO
Oronja verde MORTAL → *p. 20*: anillo y volva en la farinera borda.
Russula sardonia TÓXICA: láminas amarillo limón, pie violáceo.



E F M A M J J A **S O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Seta coliflor

peu de rata de pi · *Sparassis crispa*

✕ **Láminas**

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados...

✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y rodeno. Sobre madera.

CUIDADO

Peu de rata bord TÓXICA → *p. 15*: ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas...

Coliflor rosa CONDICIONADA: ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco



E F M A M J J **A S O** N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Boleto

cep · *Boletus edulis*

✓ **Tubos** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva.

✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla.

DÓNDE Con haya, castaño y roble albar y otros.

CUIDADO

Boleto de Satanás TÓXICA → *p. 14*: sombrero blanquecino grisáceo.

Boleto amargo NO COMESTIBLE: poros que se vuelven rosados.



E F M A **M J J** A **S O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Boleto granulado

molleric · *Suillus granulatus*

✓ **Tubos** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.

✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los...

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre y laricio y otros.

CUIDADO

Boleto picante NO COMESTIBLE: poros pardo canela a rojizos; carne muy picante.

Molleric de bou SIN INTERÉS: poros grandes y angulosos, compuestos.



E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris...
✓ Esporada negra o gris negruzca.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco y laricio y otros.

CUIDADO
Cortinari metzinós MORTAL → *p. 22*: esporada pardo herrumbre (no negra).
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → *p. 14*: láminas finas, apretadas y bifurcadas.



E F M A M **J J A S O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Rebozuelo

rossinyol · *Cantharellus cibarius*

✓ **Pliegues** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Por debajo NO tiene láminas.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa.

DÓNDE Con encina, alcornoque y castaño y otros.

CUIDADO
Cortinari metzinós MORTAL → *p. 22*: láminas verdaderas que se vuelven pardo...
Seta de olivo TÓXICA → *p. 15*: láminas verdaderas, finas y apretadas.



E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Trompeta de los muertos

trompeta de la mort · *Craterellus cornucopioides*

✕ **Láminas**

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.
✓ Cara interna negra a pardo oscuro.

DÓNDE Con haya, encina y castaño y otros.

CUIDADO
Orella de gat negra CONDICIONADA: sombrero en forma de silla de montar y pie...
Craterellus cinereus COMESTIBLE: cara externa con pliegues bien marcados y pie...



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Angula de monte

camagroc · *Craterellus lutescens*

✕ **Láminas**

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y abeto blanco.

CUIDADO
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → *p. 14*: láminas finas y apretadas; pie macizo
Camagroc COMESTIBLE: venas bien marcadas y bifurcadas.



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Lengua de vaca


llengua de bou · *Hydnum repandum*

✓ **Aguijones** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles.
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al...

DÓNDE Con encina, haya y castaño y otros.

CUIDADO
Hydnellum / Sarcodon NO COMESTIBLE: carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos.
Picornell de pi COMESTIBLE: más pequeño y naranja rojizo.



E F M A M J J **A** **S** **O** N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Oronja

ou de reig · *Amanita caesarea*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

✓ Láminas AMARILLAS.
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

CUIDADO
Oronja verde MORTAL → *p. 20*: al cortar el huevo de arriba abajo.
Matamoscas TÓXICA → *p. 16*: láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el...



E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Parasol

apagallums · *Macrolepiota procera*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto.
✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Lepiota metzinosa MORTAL → *p. 21*: sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas.
Amanita pantera TÓXICA → *p. 16*: volva en la base y anillo fijo; pie liso



E F **M** **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Barbuda

bolet de tinta · *Coprinus comatus*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que...
✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde...

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Bolet de femer TÓXICA: sombrero gris, liso o con estrías.
Coprí garsa NO COMESTIBLE: sombrero negro con placas blancas.



E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Champiñón silvestre

camperol · *Agaricus campestris*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a...
✓ Sin volva en la base.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Cogomassa MORTAL → *p. 20*: láminas siempre blancas y volva en saco
Bola de neu pudent TÓXICA → *p. 17*: amarillea intensamente al rozarlo y en el corte...



E F M A M J J **A S O N D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Pedo de lobo

pet de llop · *Lycoperdon perlatum*

✕ **Láminas**

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que...

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Oronja verde MORTAL → *p. 20*: al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el...

Pota de cavall groga TÓXICA → *p. 15*: interior negro violáceo y piel gruesa escamosa



E F M A M J J A S **O N D**

COMESTIBLE ●●● Difícil

Negrilla

fredolic · *Tricholoma terreum*

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas.


✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre y laricio y otros.

CUIDADO

Fredolic metzinós TÓXICA → *p. 17*: mucho más robusto y carnoso.

Tricholoma virgatum* / *T. sciodes TÓXICA: sombrero liso con fibras radiales negras y...



E F M A M J J A S **O N D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Pie azul

pimpinella morada · *Lepista nuda*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la...

✓ Esporada rosada pálida.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...) TÓXICA: cortina (telaraña) entre sombrero y pie en...

Barret de bruixa TÓXICA → *p. 18*: pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso.



E F M **A** **M** **J** J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Perrechico

moixernó · *Calocybe gambosa*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sale en PRIMAVERA, a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Inosperma erubescens MORTAL → *p. 22*: sombrero cónico fibroso agrietado.
Cogomassa MORTAL → *p. 20*: anillo y volva en saco; láminas libres



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Babosa negra

llenega negra · *Hygrophorus latitabundus*

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre.

CUIDADO
Llenega borda NO COMESTIBLE: láminas que se vuelven pardo herrumbre...
Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE: láminas que se vuelven gris negruzcas y base...



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Carlet

Hygrophorus russula

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo.

CUIDADO
Fals carlet TÓXICA → *p. 19*: sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven...
Cualbra morada NO COMESTIBLE → *p. 14*: carne quebradiza como tiza, láminas no céreas.



E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Senderuela

cama-sec · *Marasmius oreades*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Lepiota metzinosa MORTAL → *p. 21*: sombrero con escamas vinosas y pie con bandas
Clitocibe blanc TÓXICA → *p. 18*: blanca escarchada, láminas apretadas y...



E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Seta de cardo

gírgola de panical · *Pleurotus eryngii*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo...
✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Clitocibe blanc TÓXICA → *p. 18*: blanca escarchada, pequeña.
Fals carlet TÓXICA → *p. 19*: láminas rosa salmón, en bosque



E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Seta de chopo

pollancró · *Cyclocybe cylindracea*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.

DÓNDE Con chopo negro y álamo blanco. En prados y sobre madera.

CUIDADO
Galerina marginada MORTAL → *p. 21*: más pequeña, sombrero liso miel.
Bolet de pi TÓXICA → *p. 19*: amarillo azufre, láminas verdosas.



E F M A M J J A S O N D

CONDICIONADA ●●○ Media

Colmenilla

múrgola · *Morchella esculenta*

✕ **Láminas**

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por...
✓ Córtela de arriba abajo.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Falsa colmenilla MORTAL → *p. 22*: sombrero en forma de cerebro con...

Verpa bohemica TÓXICA: sombrero libre como un dedal.

NOTAS

NOTAS



E F M A M J J A **S O N D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Enganyapastors de llet groga

Lactarius chrysorrheus

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex**

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.
! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

SE CONFUNDE
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 4*: el rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo...
Níscalo COMESTIBLE → *p. 4*: el pinetell tiene látex naranja y láminas...



E F M A M J J **A S O N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Enganyapastors

Lactarius zonarius

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex**

! Látex blanco que no cambia de color.
! Láminas crema, sin manchas verdes.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo.

SE CONFUNDE
Níscalo COMESTIBLE → *p. 4*: látex naranja y láminas naranja que verdean.
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 4*: látex rojo vino; bajo pinos



E F M A M J J **A S O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Falso níscalo

cabra de beç · *Lactarius torminosus*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex**

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
! Látex blanco que no cambia.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con abedul.

SE CONFUNDE
Níscalo COMESTIBLE → *p. 4*: margen liso, látex naranja; bajo pinos
Pinetell d'avet COMESTIBLE: margen liso, látex naranja; bajo abetos



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

NO COMESTIBLE ●●● Difícil

Cualbra morada

Russula torulosa

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro.

! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.

●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre y otros.

SE CONFUNDE

Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 4*: el rovelló tiene látex rojo vino.

Carbonera COMESTIBLE → *p. 4*



E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Boleto de Satanás

matagent · *Rubroboletus satanas*

✓ **Tubos** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo.

! Poros rojos o rojo anaranjados.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con roble pubescente, encina y castaño y otros.

SE CONFUNDE

Boleto reticulado COMESTIBLE: el cep de verano tiene poros blancos o amarillo...

Boleto negro COMESTIBLE: sombrero oscuro, poros blancos o amarillos.



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

NO COMESTIBLE ●○○ Fácil

Falso rebozuelo

fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Láminas verdaderas.

! Carne delgada y blanda, no compacta.

●○○ **Leve.** No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

DÓNDE Con pino silvestre y rodeno. Sobre madera.

SE CONFUNDE

Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 6*: el rossinyol tiene pliegues gruesos.

Seta de olivo TÓXICA → *p. 15*: omphalotus crece en grandes ramilletes sobre...



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Seta de olivo

gírgola d'olivera · Omphalotus olearius

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo.
! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con olivo, encina y castaño y otros. Sobre madera.

SE CONFUNDE
Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 6*: el rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y...



E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

✕ **Láminas**

! Corte de arriba abajo.
! Piel gruesa, dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con alcornoque, encina y castaño y otros.

SE CONFUNDE
Pedo de lobo COMESTIBLE → *p. 9*: el pedo de lobo es blanco y blando por dentro...
Bejín gigante COMESTIBLE: interior blanco uniforme y piel fina



E F M A M **J** J **A** **S** **O** **N** D

TÓXICA ●●○ Media

Peu de rata bord

Ramaria formosa

✕ **Láminas**

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas...
! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con haya, roble pubescente y castaño.

SE CONFUNDE
Seta coliflor COMESTIBLE → *p. 5*: lóbulos aplanados crema, en pinos
Coliflor rosa CONDICIONADA: puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Amanita pantera

pixacà · *Amanita pantherina*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en...

! Base del pie en bulbo con un reborde y 1–2 anillos por encima.

●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

DÓNDE Con pino silvestre, roble pubescente y haya y otros.

SE CONFUNDE

Parasol COMESTIBLE → *p. 8*: sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado

Vinosa CONDICIONADA



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Matamoscas

reig bord · *Amanita muscaria*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Sombrero rojo con verrugas blancas.

! Láminas y pie BLANCOS.

●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

DÓNDE Con pino silvestre, abedul y abeto blanco y otros.

SE CONFUNDE

Oronja COMESTIBLE → *p. 7*: el ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y...



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Lepiota pudent

Lepiota cristata

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

! Seta pequeña de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y...

! Olor desagradable, a goma o gas.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE

Parasol COMESTIBLE → *p. 8*: tamaño mucho mayor, anillo doble móvil.



E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al...
! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Champiñón silvestre COMESTIBLE → *p. 8*: no amarillea y huele bien
Bola de nieve COMESTIBLE: olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Seta de los caballeros

verderol · *Tricholoma equestre*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Láminas amarillo azufre intenso.
! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco.

●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

DÓNDE Con pino piñonero, silvestre y rodeno. En prados.

SE CONFUNDE
Capuchina COMESTIBLE: sombrero gris con fibras negras
Oronja verde MORTAL → *p. 20*: láminas blancas, anillo y volva



E F M A M J J **A** **S** **O** N D

TÓXICA ●●○ Media

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de...
! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con abeto blanco, haya y pino silvestre.

SE CONFUNDE
Negrilla COMESTIBLE → *p. 9*: el fredolic es pequeño, frágil.
Capuchina COMESTIBLE: sombrero con fibras radiales lisas, no escamas



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Seta pequeña blanca, con aspecto escarchado o pruinoso.
! Láminas blancas a crema, DECURRENTES.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Senderuela COMESTIBLE → *p. 11*: el cama-sec tiene láminas espaciadas no...
Molinera COMESTIBLE: láminas que se vuelven rosadas.



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Mycena pura

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Pequeña seta lila, rosada o violácea con el margen estriado.
! Olor a rábano.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SE CONFUNDE
Pie azul COMESTIBLE → *p. 9*: mucho mayor, carnosa, olor afrutado
Pimpinella morada petita SIN INTERÉS: láminas gruesas, sin olor a rábano



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Barret de bruixa

Inocybe geophylla

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Pequeña seta blanca sedosa con mamelón agudo.
! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SE CONFUNDE
Pie azul COMESTIBLE → *p. 9*: mucho mayor y carnosa
Senderuela COMESTIBLE → *p. 11*: prado, pie correoso, láminas espaciadas crema



E F M A M J J A **S** **O** **N** D

TÓXICA ●●○ Media

Fals carlet

Entoloma sinuatum

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al...

! Esporada rosada.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con roble pubescente, haya y castaño.

SE CONFUNDE

Carlet COMESTIBLE → *p. 10*: el carlet tiene sombrero rosa vinoso con...

Perrechico COMESTIBLE → *p. 10*



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.

! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados y sobre madera.

SE CONFUNDE

Seta de chopo COMESTIBLE → *p. 11*: crema, anillo membranoso, en chopos

Armilaria CONDICIONADA: anillo blanco, esporada blanca.

NOTAS



E F M A M J J **A S O N** D

MORTAL ●●○ Media

Paxilo

paxil·le tòxic · *Paxillus involutus*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo.

●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

DÓNDE Con abedul, pino silvestre y encina y otros.

SE CONFUNDE

Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 4*: el rovelló tiene látex rojo vino y verdea.

Níscalo COMESTIBLE → *p. 4*



E F M A M J J **A S O N** D

MORTAL ●●○ Media

Oronja verde

farinera borda · *Amanita phalloides*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Volva blanca membranosa en saco en la base.

! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque y otros.

SE CONFUNDE

Gorro verde COMESTIBLE: la llora verda no tiene volva ni anillo y su...

Carbonera COMESTIBLE → *p. 4*: sin volva ni anillo; láminas flexibles



E F M **A M J** J A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Cogomassa

Amanita verna

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Seta enteramente blanca.

! Volva blanca en saco en la base.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque.

SE CONFUNDE

Perrechico COMESTIBLE → *p. 10*: el moixernó no tiene volva ni anillo.

Champiñón silvestre COMESTIBLE → *p. 8*: láminas rosadas y luego pardas; sin volva



E F M A M J J **A** **S** **O** N D

MORTAL ●●○ Media

Farinera pudent

Amanita virosa

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.

! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con haya y abedul.

SE CONFUNDE

Bola de nieve COMESTIBLE: láminas rosadas a pardas, sin volva



E F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** **D**

MORTAL ●●○ Media

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.

! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.


●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE

Parasol COMESTIBLE → *p. 8*: el apagallums mide más de 10 cm.

Senderuela COMESTIBLE → *p. 11*



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

MORTAL ●●○ Media

Galerina marginada

Galerina marginata

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

! Pequeña seta parda sobre madera, en grupos.

! Anillo fino pardo en el pie.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Sobre madera.

SE CONFUNDE

Seta de chopo COMESTIBLE → *p. 11*: mayor y sobre chopos

Kuehneromyces mutabilis COMESTIBLE: pie con escamitas por debajo del anillo (no...



E F M A **M** **J** **J** A **S** **O** N D

MORTAL ●●○ Media

Inosperma erubescens

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema.

! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.

●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE

Perrechico COMESTIBLE → *p. 10*: el moixernó tiene sombrero liso carnoso.



E F M A M J J A **S** **O** **N** D

MORTAL ●●○ Media

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco.

! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven...

●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

DÓNDE Con roble pubescente, castaño y encina.

SE CONFUNDE

Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 6*: el rossinyol tiene pliegues gruesos y romos.

Camagroc COMESTIBLE: pie hueco y pliegues en lugar de láminas



E F **M** **A** **M** **J** J A S O N D

MORTAL ●○○ Fácil

Falsa colmenilla

bolet de greix · *Gyromitra esculenta*

✕ **Láminas**

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

●●● **Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

DÓNDE Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. Sobre madera.

SE CONFUNDE

Colmenilla CONDICIONADA → *p. 12*: la colmenilla tiene alvéolos de panal y está...

Colmenilla negra CONDICIONADA: alvéolos en hileras y un solo hueco

NOTAS

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

Llame ahora

112

Emergencias
Diga que han comido setas silvestres y cuándo.

91 562 04 20

Toxicología · 24 h
Información de intoxicaciones.

QUÉ HACER

- → **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.
- → **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.
- → **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.
- → **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.
- → **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).

ANÓTELO ANTES DE SALIR

ALOJAMIENTO

CENTRO DE SALUD

SOCIEDAD MICOLÓGICA

DÓNDE APARQUÉ