
Setas *esenciales*

de Cataluña







Las **54** que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES · **20** TÓXICAS · **9** MORTALES

Ante la duda, no la recolecte.

Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

No admiten excepciones. Ante la duda, no la recolecte para comer.

1. **Recolecte solo lo que conoce a fondo.**
2. **Saque la seta entera, con la base del pie.**
3. **Revise cada ejemplar, uno a uno.**
4. **No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.**
5. **Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.**
6. **Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.**
7. **No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata…).**
8. **Las apps de fotos orientan, pero no deciden.**
9. **Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.**
10. **Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.**
11. **Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.**
12. **Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.**

CÓMO LEER LAS FICHAS

COMESTIBLE · TÓXICA · MORTAL	Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen.
●●○ Media	Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil.
E F M A M J J A **S O N** D	Meses en que sale; en claro, solo algunos años.
✓ ✗ ◑	Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte.
●●○ Grave	En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal.
→ *p. 12*	Página de la seta con la que se confunde.


EMPIEZAN EN LA PÁGINA ■ **Comestibles** *4* ■ **Tóxicas** *17* ■ **Mortales** *27*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.

ANTES DEL NOMBRE

Cómo mirar una seta

Seis cosas, siempre en este orden. Si falta una, no la puede identificar.



1 **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.

2 **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.


3 **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?

4 **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?


5 **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?

6 **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

QUÉ HAY BAJO EL SOMBRERO




Láminas
Hojas finas, como un libro



Tubos
Una esponja de agujeritos



Pliegues
Venas gruesas, no hojas




Aguijones
Púas blandas





Interior
Una bola: córtela

LA EDAD CUENTA









Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Níscalo de sangre

rovelló · *Lactarius sanguifluus*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

✓ Látex rojo vino desde el primer instante, sin pasar por naranja.
✓ Láminas rosa vinoso o lila vinoso, que se manchan de verde.
✓ Pie corto, hueco, del color del sombrero, con hoyuelos más oscuros.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y piñonero y otros.

CUIDADO
Paxilo MORTAL → *p. 27*: sin látex; se mancha de pardo (no de verde).
Enganyapastors de llet groga TÓXICA → *p. 17*: látex BLANCO que amarillea en segundos; láminas crema; no verdea





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Níscalo


pinetell · *Lactarius deliciosus*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

✓ Látex naranja zanahoria al cortar, que no se vuelve rojo vino en los primeros minutos.
✓ Láminas naranja vivo que se manchan de verde.
✓ Pie hueco, naranja, con hoyuelos más oscuros.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y negro y otros.

CUIDADO
Paxilo MORTAL → *p. 27*: sin látex; se mancha de pardo (no de verde).
Falso níscalo TÓXICA → *p. 18*: margen muy peludo, látex blanco y picante; bajo abedules





E F M A M **J J A S O N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Carbonera

llora · *Russula cyanoxantha*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto: al pasar el dedo se doblan sin romperse.
✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

DÓNDE Con haya, castaño y encina y otros.

CUIDADO
Oronja verde MORTAL → *p. 27*: anillo y volva en la farinera borda.
Russula sardonia TÓXICA: láminas amarillo limón, pie violáceo, bajo pinos y muy picante





E F M A M J J A **S O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Seta coliflor

peu de rata de pi · *Sparassis crispa*

✗ **Láminas**

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados como fideos anchos...
✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.
✓ En la base de pinos o junto a tocones de pino.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y rodeno. Sobre madera.

CUIDADO
Peu de rata bord TÓXICA → *p. 21*: ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas con puntas...
Coliflor rosa CONDICIONADA: ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco





E F M A M J J **A S O** N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Boleto

cep · *Boletus edulis*

✓ **Tubos** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva.
✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla.
✓ Pie grueso, blanquecino o pardo claro, con un retículo fino y blanco al menos en la parte...

DÓNDE Con haya, castaño y roble albar y otros.

CUIDADO

Boleto de Satanás TÓXICA → *p. 19*: sombrero blanquecino grisáceo, poros rojos y pie con retículo...

Boleto amargo NO COMESTIBLE: poros que se vuelven rosados; retículo pardo oscuro y grueso.





E F M A **M J J** A **S O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Boleto granulado

molleric · *Suillus granulatus*

✓ **Tubos** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.
✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los ejemplares jóvenes.
✓ Pie SIN anillo, con granulaciones en la parte alta.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre y laricio y otros.

CUIDADO

Boleto picante NO COMESTIBLE: poros pardo canela a rojizos; carne muy picante.

Molleric de bou SIN INTERÉS: poros grandes y angulosos, compuestos, algo decurrentes.





E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris púrpura a negruzcas.
✓ Esporada negra o gris negruzca.
✓ Base del pie con carne amarillo anaranjada.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco y laricio y otros.

CUIDADO
Cortinari metzinós MORTAL → *p. 30*: esporada pardo herrumbre (no negra), láminas no decurrentes.
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → *p. 19*: láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.





E F M A M **J J A S O N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Rebozuelo


rossinyol · *Cantharellus cibarius*

✓ **Pliegues** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Por debajo NO tiene láminas.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa.
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DÓNDE Con encina, alcornoque y castaño y otros.

CUIDADO
Cortinari metzinós MORTAL → *p. 30*: láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.
Seta de olivo TÓXICA → *p. 20*: láminas verdaderas, finas y apretadas.





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Trompeta de los muertos

trompeta de la mort · *Craterellus cornucopioides*

✕ **Láminas**

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.
✓ Cara interna negra a pardo oscuro; cara externa gris ceniza, lisa o apenas arrugada.
✓ Carne delgada y elástica.

DÓNDE Con haya, encina y castaño y otros.

CUIDADO
Orella de gat negra CONDICIONADA: sombrero en forma de silla de montar y pie surcado con...
Craterellus cinereus COMESTIBLE: cara externa con pliegues bien marcados y pie macizo





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Angula de monte

camagroc · *Craterellus lutescens*

✕ **Láminas**

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas, de color rosado anaranjado a amarillo.
✓ Sombrero en embudo, pardo con tonos anaranjados.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y abeto blanco.

CUIDADO
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → *p. 19*: láminas finas y apretadas; pie macizo
Camagroc COMESTIBLE: venas bien marcadas y bifurcadas, grisáceas o amarillentas.





E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Lengua de vaca

llengua de bou · *Hydnum repandum*

✓ **Aguijones** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles.
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al rozarla.
✓ Sombrero carnoso crema anaranjado, sin tonos pardos oscuros.

DÓNDE Con encina, haya y castaño y otros.

CUIDADO

Hydnellum / Sarcodon NO COMESTIBLE: carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos.

Picornell de pi COMESTIBLE: más pequeño y naranja rojizo; aguijones que no bajan por el pie





E F M A M J **J A S O** N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Oronja

ou de reig · *Amanita caesarea*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

✓ Láminas AMARILLAS.
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.
✓ Volva blanca, grande, gruesa y en forma de saco en la base: hay que verla entera.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

CUIDADO

Oronja verde MORTAL → *p. 27*: al cortar el huevo de arriba abajo.

Matamoscas TÓXICA → *p. 22*: láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el sombrero (pueden...





E F M A M J J **A S O N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Parasol

apagallums · *Macrolepiota procera*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto, con escamas pardas sobre fondo crema y un...
✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas.
✓ Anillo doble, grueso, que se puede desplazar arriba y abajo por el pie.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Lepiota metzinosa MORTAL → *p. 29*: sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas.

Amanita pantera TÓXICA → *p. 21*: volva en la base y anillo fijo; pie liso





E F **M A M** J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Barbuda

bolet de tinta · *Coprinus comatus*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que se levantan.
✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde el borde.
✓ Pie blanco, hueco, con un anillo fino que se desliza.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Bolet de femer TÓXICA: sombrero gris, liso o con estrías, sin escamas lanosas.

Coprí garsa NO COMESTIBLE: sombrero negro con placas blancas, como una urraca.





E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ● ● ○ Media

Champiñón silvestre

camperol · *Agaricus campestris*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a negruzcas después.
✓ Sin volva en la base.
✓ La carne no amarillea al rozarla ni al cortar la base del pie.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Cogomassa MORTAL → *p. 28*: láminas siempre blancas y volva en saco
Bola de neu pudent TÓXICA → *p. 23*: amarillea intensamente al rozarlo y en el corte de la base del...





E F M A M J J **A** **S** **O** **N** **D**

COMESTIBLE ● ○ ○ Fácil

Pedo de lobo

pet de llop · *Lycoperdon perlatum*

✗ **Láminas**

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo.
✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que se desprenden...
✓ En la madurez se abre un poro en lo alto por donde salen las esporas.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Oronja verde MORTAL → *p. 27*: al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el contorno de una...
Pota de cavall groga TÓXICA → *p. 20*: interior negro violáceo y piel gruesa escamosa





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●● Difícil

Negrilla

fredolic · *Tricholoma terreum*

✓ Láminas ◑ Anillo ✕ Volva

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas, con un mamelón obtuso.
✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie, sin tonos amarillo verdosos.
✓ Carne delgada, frágil, sin olor apreciable a harina ni sabor amargo.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre y laricio y otros.

CUIDADO
Fredolic metzinós TÓXICA → *p. 24*: mucho más robusto y carnoso; sombrero blanco grisáceo con...
Tricholoma virgatum / T. sciodes TÓXICA: sombrero liso con fibras radiales negras y mamelón puntiagudo.





E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Pie azul

pimpinella morada · *Lepista nuda*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la carne del sombrero.
✓ Esporada rosada pálida.
✓ Sin cortina ni anillo.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...) TÓXICA: cortina (telaraña) entre sombrero y pie en jóvenes.
Barret de bruixa TÓXICA → *p. 25*: pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso.





E F M **A** **M** **J** J A S **O** N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Perrechico

moixernó · *Calocybe gambosa*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sale en PRIMAVERA, a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.
✓ Fuerte olor a harina fresca o a pepino.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Inosperma erubescens MORTAL → *p. 30*: sombrero cónico fibroso agrietado.

Cogomassa MORTAL → *p. 28*: anillo y volva en saco; láminas libres





E F M A M J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Babosa negra

llenega negra · *Hygrophorus latitabundus*

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro, cubierto de una capa gruesa de mucílago.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.
✓ Pie blanco arriba y envuelto por una vaina mucosa por debajo de una zona anular.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre.

CUIDADO

Llenega borda NO COMESTIBLE: láminas que se vuelven pardo herrumbre (esporada herrumbre).

Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE: láminas que se vuelven gris negruzcas y base del pie amarillo...





E F M A M J J A S **O N D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Carlet

Hygrophorus russula

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.
✓ Esporada blanca.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo.

CUIDADO

Fals carlet TÓXICA → *p. 26*: sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven rosa salmón...
Cualbra morada NO COMESTIBLE → *p. 18*: carne quebradiza como tiza, láminas no céreas, crece bajo pinos





E F M **A M J** J A **S O N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Senderuela

cama-sec · *Marasmius oreades*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso: se puede retorcer sin que se rompa.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.
✓ Sombrero ocre con un mamelón ancho, que palidece al secarse.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Lepiota metzinosa MORTAL → *p. 29*: sombrero con escamas vinosas y pie con bandas
Clitocibe blanc TÓXICA → *p. 24*: blanca escarchada, láminas apretadas y decurrentes.





E F M **A** **M** J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Seta de cardo

gírgola de panical · *Pleurotus eryngii*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo corredor muerto.
✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.
✓ Sombrero pardo grisáceo, a menudo excéntrico; sin anillo ni volva.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Clitocibe blanc TÓXICA → *p. 24*: blanca escarchada, pequeña, sin relación con raíces de cardo
Fals carlet TÓXICA → *p. 26*: láminas rosa salmón, en bosque





E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Seta de chopo

pollancró · *Cyclocybe cylindracea*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.
✓ Láminas crema que se vuelven pardo tabaco.

DÓNDE Con chopo negro y álamo blanco. En prados y sobre madera.

CUIDADO
Galerina marginada MORTAL → *p. 29*: más pequeña, sombrero liso miel, esporada herrumbre.
Bolet de pi TÓXICA → *p. 26*: amarillo azufre, láminas verdosas, sin anillo membranoso, amargo





E F M A M J J A S O N D

CONDICIONADA ●●○ Media

Colmenilla

múrgola · *Morchella esculenta*

✕ **Láminas**

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por costillas.
✓ Córtela de arriba abajo.
✓ El sombrero está unido al pie por su borde inferior.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Falsa colmenilla MORTAL → *p. 31*: sombrero en forma de cerebro con circunvoluciones (no alvéolos).
Verpa bohemica TÓXICA: sombrero libre como un dedal, unido solo por la punta.

NOTAS





E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Enganyapastors de llet groga

Lactarius chrysorrheus

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.
! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.
! No se mancha de verde.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

SE CONFUNDE
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 4*: el rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo pinos
Níscalo COMESTIBLE → *p. 4*: el pinetell tiene látex naranja y láminas naranja vivo que...





E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Enganyapastors

Lactarius zonarius


✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

! Látex blanco que no cambia de color.
! Láminas crema, sin manchas verdes.
! Bajo robles y encinas, no bajo pinos.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo.

SE CONFUNDE
Níscalo COMESTIBLE → *p. 4*: látex naranja y láminas naranja que verdean; bajo pinos
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 4*: látex rojo vino; bajo pinos





E F M A M J J **A** **S** **O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Falso níscalo

cabra de beç · *Lactarius torminosus*


✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
! Látex blanco que no cambia.
! Siempre bajo abedules.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con abedul.

SE CONFUNDE
Níscalo COMESTIBLE → *p. 4*: margen liso, látex naranja; bajo pinos
Pinetell d'avet COMESTIBLE: margen liso, látex naranja; bajo abetos





E F M A M J J A S **O** **N** **D**

NO COMESTIBLE ●●● Difícil

Cualbra morada

Russula torulosa

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro, a menudo con el centro más oscuro u oliváceo.
! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.
! Láminas crema, que se desmenuzan al pasar el dedo; sin látex.

●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre y otros.

SE CONFUNDE
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 4*: el rovelló tiene látex rojo vino, láminas rosa vinoso que...
Carbonera COMESTIBLE → *p. 5*: la carbonera tiene láminas blancas flexibles y grasas.





E F M A M J **J A S O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Boleto de Satanás

matagent · *Rubroboletus satanas*

✓ **Tubos** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo.
! Poros rojos o rojo anaranjados.
! Pie muy grueso y bulboso, rojo en la zona media con retículo rojo.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con roble pubescente, encina y castaño y otros.

SE CONFUNDE
Boleto reticulado COMESTIBLE: el cep de verano tiene poros blancos o amarillo verdosos y la...
Boleto negro COMESTIBLE: sombrero oscuro, poros blancos o amarillos, carne inmutable





E F M A M J J A **S O N D**

NO COMESTIBLE ●○○ Fácil

Falso rebozuelo

fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Láminas verdaderas: finas, apretadas, bifurcadas varias veces, naranja vivo.
! Carne delgada y blanda, no compacta.
! Sombrero aterciopelado naranja a pardo anaranjado.

●○○ **Leve.** No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

DÓNDE Con pino silvestre y rodeno. Sobre madera.

SE CONFUNDE
Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 7*: el rossinyol tiene pliegues gruesos.
Seta de olivo TÓXICA → *p. 20*: omphalotus crece en grandes ramilletes sobre madera de olivo.





E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Seta de olivo

gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo, encina.

! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.

! Toda la seta es naranja intenso, carnosa y grande.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con olivo, encina y castaño y otros. Sobre madera.

SE CONFUNDE

Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 7*: el rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y crece aislado en...





E F M A M J J **A** **S** **O** **N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

✕ **Láminas**

! Corte de arriba abajo.

! Piel gruesa, dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con alcornoque, encina y castaño y otros.

SE CONFUNDE

Pedo de lobo COMESTIBLE → *p. 11*: el pedo de lobo es blanco y blando por dentro en los jóvenes

Bejín gigante COMESTIBLE: interior blanco uniforme y piel fina





E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Peu de rata bord

Ramaria formosa

✕ **Láminas**

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas amarillas.

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con haya, roble pubescente y castaño.

SE CONFUNDE

Seta coliflor COMESTIBLE → *p. 5*: lóbulos aplanados crema, en pinos

Coliflor rosa CONDICIONADA: puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas





E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Amanita pantera

pixacà · *Amanita pantherina*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en círculos.

! Base del pie en bulbo con un reborde y 1–2 anillos por encima.

! Anillo liso, sin estrías por arriba.

●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

DÓNDE Con pino silvestre, roble pubescente y haya y otros.

SE CONFUNDE

Parasol COMESTIBLE → *p. 10*: sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado

Vinosa CONDICIONADA: en la vinosa la carne y las heridas se vuelven rojizas.





E F M A M J J **A S O N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Matamoscas

reig bord · *Amanita muscaria*


✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Sombrero rojo con verrugas blancas.
! Láminas y pie BLANCOS.
! Bulbo en la base con anillos concéntricos de restos de volva.

●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

DÓNDE Con pino silvestre, abedul y abeto blanco y otros.

SE CONFUNDE
Oronja COMESTIBLE → *p. 9*: el ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y una volva en saco...





E F M A M J J **A S O N** D

TÓXICA ●●○ Media

Lepiota pudent

Lepiota cristata

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

! Seta pequeña de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y escamas concéntricas.
! Olor desagradable, a goma o gas.
! Láminas blancas, libres; anillo frágil.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Parasol COMESTIBLE → *p. 10*: tamaño mucho mayor, anillo doble móvil, pie atigrado





E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus


✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al instante.
! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.
! Amarillea intensamente al rozar el borde del sombrero.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Champiñón silvestre COMESTIBLE → *p. 11*: no amarillea y huele bien
Bola de nieve COMESTIBLE: olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo





E F M A M J J A S **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Seta de los caballeros

verderol · *Tricholoma equestre*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Láminas amarillo azufre intenso.
! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco, con escamitas pardas en el centro.
! Pie amarillo.

●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

DÓNDE Con pino piñonero, silvestre y rodeno. En prados.

SE CONFUNDE
Capuchina COMESTIBLE: sombrero gris con fibras negras
Oronja verde MORTAL → *p. 27*: láminas blancas, anillo y volva





E F M A M J J **A S O** N D

TÓXICA ●●○ Media

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de escamas gris oscuro o...
! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos, a veces con gotas.
! Olor a harina.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con abeto blanco, haya y pino silvestre.

SE CONFUNDE
Negrilla COMESTIBLE → *p. 12*: el fredolic es pequeño, frágil, afieltrado y sin olor a harina
Capuchina COMESTIBLE: sombrero con fibras radiales lisas, no escamas





E F M A M J J A **S O N D**

TÓXICA ●●○ Media

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Seta pequeña blanca, con aspecto escarchado o pruinoso, a veces con zonas concéntricas.
! Láminas blancas a crema, DECURRENTES.
! Esporada blanca.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Senderuela COMESTIBLE → *p. 14*: el cama-sec tiene láminas espaciadas no decurrentes.
Molinera COMESTIBLE: láminas que se vuelven rosadas, esporada rosada y fuerte olor a...





E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Mycena pura

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Pequeña seta lila, rosada o violácea con el margen estriado.
! Olor a rábano.
! Pie hueco, frágil.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SE CONFUNDE
Pie azul COMESTIBLE → *p. 12*: mucho mayor, carnosa, olor afrutado
Pimpinella morada petita SIN INTERÉS: láminas gruesas, sin olor a rábano





E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Barret de bruixa

Inocybe geophylla

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Pequeña seta blanca sedosa con mamelón agudo.
! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.
! Olor terroso o espermático.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SE CONFUNDE
Pie azul COMESTIBLE → *p. 12*: mucho mayor y carnosa
Senderuela COMESTIBLE → *p. 14*: prado, pie correoso, láminas espaciadas crema





E F M A M J J A **S** **O** **N** D

TÓXICA ●●○ Media

Fals carlet

Entoloma sinuatum

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al madurar.
! Esporada rosada.
! Olor a harina rancia.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con roble pubescente, haya y castaño.

SE CONFUNDE
Carlet COMESTIBLE → *p. 14*: el carlet tiene sombrero rosa vinoso con manchas.
Perrechico COMESTIBLE → *p. 13*: láminas muy apretadas que no se vuelven rosadas.





E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare


✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.
! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.
! Láminas amarillo azufre que se vuelven verdosas y luego pardo violáceas.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados y sobre madera.

SE CONFUNDE
Seta de chopo COMESTIBLE → *p. 15*: crema, anillo membranoso, en chopos
Armilaria CONDICIONADA: anillo blanco, esporada blanca, escamitas oscuras





E F M A M J J **A S O N** D

MORTAL ●●○ **Media**

Paxilo

paxil·le tòxic · *Paxillus involutus*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.
! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo, que se manchan de pardo al tocarlas y se separan...
! Sin látex.

●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

DÓNDE Con abedul, pino silvestre y encina y otros.

SE CONFUNDE
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 4*: el rovelló tiene látex rojo vino y verdea.
Níscalo COMESTIBLE → *p. 4*: látex naranja y manchas verdes en el pinetell





E F M A M **J J A S O N** D

MORTAL ●●○ **Media**

Oronja verde

farinera borda · *Amanita phalloides*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Volva blanca membranosa en saco en la base.
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
! Láminas BLANCAS, libres.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque y otros.

SE CONFUNDE
Gorro verde COMESTIBLE: la llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está...
Carbonera COMESTIBLE → *p. 5*: sin volva ni anillo; láminas flexibles





E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** N D

MORTAL ●●○ Media

Cogomassa

Amanita verna

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Seta enteramente blanca.
! Volva blanca en saco en la base.
! Anillo membranoso blanco.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque.

SE CONFUNDE
Perrechico COMESTIBLE → *p. 13*: el moixernó no tiene volva ni anillo.
Champiñón silvestre COMESTIBLE → *p. 11*: láminas rosadas y luego pardas; sin volva





E F M A M J J **A** **S** **O** N D

MORTAL ●●○ Media

Farinera pudent

Amanita virosa

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.
! Volva blanca en saco.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con haya y abedul.

SE CONFUNDE
Bola de nieve COMESTIBLE: láminas rosadas a pardas, sin volva





E F M A M J J A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.

! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.

! Pie con bandas o escamas pardo rosadas bajo una zona anular poco marcada.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE

Parasol COMESTIBLE → *p. 10*: el apagallums mide más de 10 cm, tiene anillo doble móvil y pie...

Senderuela COMESTIBLE → *p. 14*: el cama-sec tiene láminas espaciadas.





E F M A M J J A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Galerina marginada

Galerina marginata

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

! Pequeña seta parda sobre madera, en grupos.

! Anillo fino pardo en el pie.

! Esporada pardo herrumbre.


●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Sobre madera.

SE CONFUNDE

Seta de chopo COMESTIBLE → *p. 15*: mayor y sobre chopos

Kuehneromyces mutabilis COMESTIBLE: pie con escamitas por debajo del anillo (no fibras plateadas)





E F M A **M** **J** **J** A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Inosperma erubescens

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema, fibroso y agrietado radialmente.
! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.
! Láminas blanquecinas que se vuelven pardas.

●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Perrechico COMESTIBLE → *p. 13*: el moixernó tiene sombrero liso carnoso.





E F M A M J J A **S** **O** **N** D

MORTAL ●●○ Media

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco, fibroso o finamente escamoso.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven pardo herrumbre.
! Esporada pardo herrumbre.

●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

DÓNDE Con roble pubescente, castaño y encina.

SE CONFUNDE
Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 7*: el rossinyol tiene pliegues gruesos y romos, no láminas
Camagroc COMESTIBLE: pie hueco y pliegues en lugar de láminas





E F M A M J J A S O N D

MORTAL ●○○ Fácil

Falsa colmenilla

bolet de greix · *Gyromitra esculenta*

✕ **Láminas**

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones, NO con alvéolos.

! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

●●● **Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

DÓNDE Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. Sobre madera.

SE CONFUNDE

Colmenilla CONDICIONADA → *p. 16*: la colmenilla tiene alvéolos de panal y está hueca en una sola...

Colmenilla negra CONDICIONADA: alvéolos en hileras y un solo hueco

NOTAS

SI ALGUIEN SE ENCUENTRA MAL

Llame ahora

112

Emergencias
Diga que han comido setas silvestres y cuándo.

91 562 04 20

Toxicología · 24 h
Información de intoxicaciones.

QUÉ HACER

- → **Acuda a urgencias o llame al 112 en cuanto aparezcan síntomas**, aunque parezcan leves.
- → **Avise a todas las personas que comieron las mismas setas**: deben recibir atención médica aunque no tengan síntomas.
- → **Lleve los restos**: setas crudas sobrantes, peladuras, restos de la comida e incluso el vómito.
- → **Anote** qué se comió, cuánto, a qué hora, si hubo más de una comida con setas y a qué hora empezaron los síntomas.
- → **No aplique remedios caseros** (leche, aceite, provocarse el vómito) salvo indicación sanitaria.

Señal de alarma: si los síntomas aparecen más de 6 horas después de comer, la intoxicación puede ser grave (amatoxinas de la farinera borda, lepiotas pequeñas o galerina).

ANÓTELO ANTES DE SALIR

ALOJAMIENTO

CENTRO DE SALUD

SOCIEDAD MICOLÓGICA

DÓNDE APARQUÉ