1

Rebozuelo: las seis maquetas

La misma ficha (comestibles) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

Ahora Ficha completa

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M J J A S O N D



En su punto | Debajo | De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

COMESTIBLES

CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ **Anillo** ✕ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.


OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON
- ✕ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 49
  SE PARECE Tonos anaranjados en planifolios ácidos. SE DISTINGUE Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.
- ✕ **Seta de olivo** girgola d'olivera · *Omphalotus olearius* TÓXICA → p. 30
  SE PARECE Color anaranjado, forma de embudo, crecimiento en otoño. SE DISTINGUE Láminas verdaderas, finas y apretadas.
- ✕ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 30
  SE PARECE Naranja, en embudo, en pinares. SE DISTINGUE Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

A Foto protagonista



COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

B Guía de campo

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M J J A S O N D De junio a noviembre



En su punto



Debajo



De cerca

CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ **Anillo**
- ✕ **Volva**
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. SABOR Suave o algo picante.

CUIDADO CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

C Tarjetas

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL



CÓMO ES
- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ Anillo
- ✕ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

CUÁNDO



De junio a noviembre

DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies...

COMESTIBLES 9

D Sí o no

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta



E F M A M J J A S O N D

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

ES ELLA SI...
- ☐ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ☐ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ☐ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DESCÁRTELA SI...
- ☐ Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre. → **Cortinari metzinós**
- ☐ Láminas verdaderas, finas y apretadas. → **Seta de olivo**
- ☐ Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo. → **Falso rebozuelo**

NO LA CONFUNDA



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49 | Seta de olivo TÓXICA → p. 30

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Parte inferior.

COMESTIBLES 9


E Infografía

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta





DÓNDE
- Pino silvestre y abeto blanco
- Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
- 50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

ESPORADA
- Crema rosada pálida

CÓMO RECONOCERLA
- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

COMESTIBLES 9

Ahora

Ficha completa

La que hay ahora, sin cambios

Cabecera con nombre y meses, tres fotos iguales en fila, «Cómo es / Dónde» en dos columnas y debajo, en texto seguido, cómo reconocerla y las confusiones.

A FAVOR

- Lo dice todo: es la más completa.
- Muy ordenada y regular: todas las fichas se parecen.

EN CONTRA

- Mucho texto pequeño; cuesta encontrar algo de un vistazo.
- Las fotos son pequeñas para A6.

Rebozuelo

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D



En su punto



Debajo



De cerca: los pliegues son bajos y redondeados, como venas.

COMESTIBLES

CÓMO ES

✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
✗ **Anillo** ✗ **Volva**
● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

✗ **Cortinari metzinós** *Cortinarius orellanus* MORTAL → p. 49
SE PARECE Tonos anaranjados en planifolios ácidos. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

✗ **Seta de olivo** gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius* TÓXICA → p. 30
SE PARECE Color anaranjado, forma de embudo, crecimiento en otoño. **SE DISTINGUE** Láminas verdaderas, finas y apretadas.

✗ **Falso rebozuelo** fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca* NO COMESTIBLE → p. 30
SE PARECE Naranja, en embudo, en pinares. **SE DISTINGUE** Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

COMESTIBLES 9

Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J **A S O N** D



Adulta



Debajo



Láminas blancas y base con volva

MORTALES

CÓMO ES

✓ **Láminas** blancas
✓ **Anillo** blanco, colgante
✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
! Láminas BLANCAS, libres.
! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde
llora verda · *Russula virescens*
COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está…

≈ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 4
SE DISTINGUE Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE Base y pie.

MORTALES 43

Lámina 2 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 8.

A

Foto protagonista

Como una revista

Una foto grande a sangre arriba, con el nombre encima; dos fotos pequeñas en la esquina. Una banda de color con la dificultad y los meses, y el texto debajo, más corto.

A FAVOR

- Se reconoce la seta al pasar las páginas.
- Muy atractiva; el color del grupo se ve enseguida.

EN CONTRA

- Cabe menos texto: se quitan detalles si no caben.
- Gasta más tinta (foto a sangre).



COMESTIBLE

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

●○○ FÁCIL — E F M A M **J J A S O N** D

CÓMO ES

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✕ Anillo
- ✕ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO: SE CONFUNDE CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre…

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.



MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA — E F M A M J J **A S O N** D

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE Base y pie.

Lámina 3 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 8.

B

Guía de campo

Columna de fotos

Como las guías de campo clásicas: las tres fotos en una columna a la izquierda, con su pie y dónde sale; a la derecha, todo el texto en una columna estrecha, fácil de leer.

A FAVOR

- Líneas cortas: se lee más rápido.
- Las fotos van con su explicación al lado del texto.

EN CONTRA

- Fotos más pequeñas que en A.
- La columna de texto se llena antes en las fichas largas.

Rebozuelo

COMESTIBLE

●○○ FÁCIL

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

E F M A M **J J A S O N** D De junio a noviembre



En su punto



Debajo



De cerca

CÓMO ES

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ Anillo
- ✗ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Taludes y bordes de camino con musgo, laderas con brezo; salen año tras año en los mismos lugares.

CÓMO RECONOCERLA

- ✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ✓ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

OLOR Afrutado, a albaricoque. **SABOR** Suave o algo picante.

CUIDADO CON

Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre; sombrero pardo anaranjado fibroso.

Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies unidos sobre...

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo; carne delgada y blanda.

COMPRUEBE Parte inferior.

Oronja verde

MORTAL

●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J **A S O N** D De agosto a noviembre



Adulta



Debajo



Láminas blancas y base con volva

CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA

- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

Lámina 4 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 8.

C

Tarjetas

Cada cosa en su caja

Cabecera de color y cada bloque en una tarjeta: cómo es, cuándo (rueda de meses), dónde, cómo reconocerla y las confusiones con su foto redonda.

A FAVOR

- Se encuentra cada dato enseguida, siempre en el mismo sitio.
- Las confusiones llevan foto.

EN CONTRA

- Las cajas ocupan sitio: menos texto.
- Más «de app» que de libro.

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE
●○○ FÁCIL







CÓMO ES

- ✓ **Pliegues** gruesos, del color del sombrero
- ✗ Anillo
- ✗ Volva
- ● **Esporada** crema rosada pálida

CUÁNDO



De junio a noviembre

DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas; crece en grandes ramilletes de pies…

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

MORTAL
●●○ MEDIA







CÓMO ES

- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

CUÁNDO



De agosto a noviembre

DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.



Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Lámina 5 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 8.

D

Sí o no

Lista para el monte

Pensada para usarla con la seta en la mano: casillas para marcar lo que se ve (es ella si… / descártela si…), las parecidas foto contra foto y lo que hay que comprobar antes de cogerla.

A FAVOR

- Obliga a mirar cada rasgo: la más segura.
- Las confusiones, foto contra foto.

EN CONTRA

- Menos descripción (sombrero, pie…).
- En las tóxicas cambia la columna de la derecha: «Si se come…».

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta

COMESTIBLE
●○○ FÁCIL







E F M A M **J J A S O N** D

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros

ES ELLA SI…

- ☐ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
- ☐ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).
- ☐ Crece en el suelo, aislado o en grupos, nunca en ramilletes sobre madera.

DESCÁRTELA SI…

- ☐ Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre. → **Cortinari metzinós**
- ☐ Láminas verdaderas, finas y apretadas. → **Seta de olivo**
- ☐ Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo. → **Falso rebozuelo**

NO LA CONFUNDA



≠



Cortinari metzinós MORTAL → p. 49



≠



Seta de olivo TÓXICA → p. 30

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Parte inferior.

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

MORTAL
●●○ MEDIA







E F M A M J J **A S O N** D

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

SEÑALES DE ALARMA

- ☐ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ☐ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ☐ Láminas BLANCAS, libres.
- ☐ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SI SE COME…

●●● **Mortal**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

Síndrome faloidiano. Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12).

NO LA CONFUNDA



≠



Gorro verde COMESTIBLE



≠



Carbonera COMESTIBLE → p. 4

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Base y pie.

Lámina 6 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 8.

E

Infografía

Dibujo con flechas

Un dibujo de la seta con flechas a sus partes (sombrero, debajo, anillo, pie, volva), una tira de fotos, la rueda de meses y las confusiones en tres columnas con foto.

A FAVOR

- Enseña a mirar las partes: muy didáctica.
- Anillo y volva saltan a la vista (o que no los tiene).

EN CONTRA

- El dibujo es esquemático: no sirve para las setas con formas raras (bolas, corales, colmenillas).
- Menos texto de reconocimiento.

COMESTIBLE ●○○ FÁCIL

Rebozuelo

Cantharellus cibarius · rossinyol · vaqueta





DÓNDE

Pino silvestre y abeto blanco
Encina, alcornoque, castaño y haya y otros
50–1800 m; sobre todo 400–1300 m

ESPORADA

Crema rosada pálida

CÓMO RECONOCERLA

✓ Por debajo NO tiene láminas: tiene pliegues gruesos, bajos y romos, bifurcados, que bajan por el pie.
✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa (se deshilacha como pechuga de pollo).

CUIDADO: SE CONFUNDE CON



Cortinari metzinós
MORTAL → p. 49
Láminas verdaderas que se vuelven pardo herrumbre.



Seta de olivo
TÓXICA → p. 30
Láminas verdaderas, finas y apretadas.




Falso rebozuelo
NO COMESTIBLE → p. 30
Láminas finas, apretadas y bifurcadas, naranja vivo.

MORTAL ●●○ MEDIA

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda





DÓNDE

Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

ESPORADA

Blanca

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

RASGOS DE ALARMA

! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde
COMESTIBLE



Carbonera
COMESTIBLE → p. 4



Bola de nieve
COMESTIBLE

Lámina 7 · tamaño real (A6, 105 × 148 mm). Comestible a la izquierda, mortal a la derecha; la tóxica, en la lámina 8.

8

Boleto de Satanás: las seis maquetas

La misma ficha (tóxicas) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

Ahora Ficha completa




A Foto protagonista




B Guía de campo




C Tarjetas



D Sí o no



E Infografía



9

Oronja verde: las seis maquetas

La misma ficha (mortales) en cada propuesta, al 60 %. Las láminas siguientes las muestran a tamaño real.

Ahora Ficha completa

Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J A S O N D



Adulta · Debajo · Láminas blancas y base con volva

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde llora verda · *Russula virescens* COMESTIBLE La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está…

≈ **Carbonera** llora · *Russula cyanoxantha* COMESTIBLE → p. 4
SE DISTINGUE Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE Base y pie.

MORTALES

MORTALES 43

A Foto protagonista



MORTAL

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

●●○ MEDIA

E F M A M J J A S O N D

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

COMPRUEBE Base y pie.

MORTALES 43


B Guía de campo

Oronja verde


MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda

E F M A M J J A S O N D De agosto a noviembre



Adulta



Debajo



Láminas blancas y base con volva

CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

Bosques de planifolios y mixtos; también parques con robles o castaños.

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ! Láminas BLANCAS, libres.
- ! Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

OLOR Débil de joven; dulzón desagradable de viejo.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

Bola de nieve COMESTIBLE
Láminas rosadas y luego pardo negruzcas; sin volva.

COMPRUEBE Base y pie.

MORTALES 43

C Tarjetas

Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda



CÓMO ES
- ✓ **Láminas** blancas
- ✓ **Anillo** blanco, colgante
- ✓ **Volva** blanca, en saco
- ● **Esporada** blanca

CUÁNDO



De agosto a noviembre

DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SE CONFUNDE CON

Gorro verde COMESTIBLE
La llora verda no tiene volva ni anillo y su cutícula está agrietada en mosaico.

Carbonera COMESTIBLE → p. 4
Sin volva ni anillo; láminas flexibles.

MORTALES 43

D Sí o no

Oronja verde

MORTAL ●●○ MEDIA

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda



E F M A M J J A S O N D · Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros

SEÑALES DE ALARMA
- ☐ Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ☐ Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.
- ☐ Láminas BLANCAS, libres.
- ☐ Sombrero verde oliva a verde amarillento con fibras radiales oscuras; puede ser casi blanco.

SI SE COME…

●●● **Mortal**

Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

Síndrome faloidiano. Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12).

NO LA CONFUNDA



Gorro verde COMESTIBLE · Carbonera COMESTIBLE → p. 4

☐ **Antes de cogerla, compruebe:** Base y pie.

MORTALES 43


E Infografía

MORTAL ●●○ MEDIA

Oronja verde

Amanita phalloides · farinera borda · cogoma borda





DÓNDE
- Encina, roble pubescente, alcornoque y castaño y otros
- 0–1500 m; sobre todo 300–1000 m

ESPORADA
- ○ Blanca

GRAVEDAD ●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

SÍNDROME FALOIDIANO Síntomas de 6 a 24 horas (típicamente 8–12). Vómitos y diarrea muy intensos.

RASGOS DE ALARMA
- ! Volva blanca membranosa en saco en la base (a menudo enterrada: desentierre siempre la base).
- ! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

SE CONFUNDE CON



Gorro verde COMESTIBLE · Carbonera COMESTIBLE → p. 4 · Bola de nieve COMESTIBLE

MORTALES 43