




Image

动力系统笔记

目录

第一章 预备知识	1
1.1 概率测度空间	1
1.2 单调类	6
1.3 积概率空间	9
1.4 积分与测度相关概念	10
第二章 遍历理论	13
2.1 一个问题	13
2.2 保测映射	16
2.3 遍历映射	19
2.4 Birkhoff 遍历定理	24

第一章 预备知识

1.1 概率测度空间

定义 1.1 (σ -代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 若 $\mathcal{B}$ 满足以下 3 个条件:

1. $X \in \mathcal{B}$
2. $A \in \mathcal{B} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}$
3. $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$

则称 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数



除了上述定义中满足的三个条件之外, 还可以证明 σ -代数 满足以下两个性质.

命题 1.1 (σ -代数的基本性质)

1. $\emptyset \in \mathcal{B}$
2. 设 $A_i \in \mathcal{B} (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$



证明

1. 由条件 1 可知 $X \in \mathcal{B}$, 所以 $X \setminus X \in \mathcal{B}$, 即 $\emptyset \in \mathcal{B}$.
2. 由 $A_i \in \mathcal{B}$ 知 $A_i^c = X \setminus A_i \in \mathcal{B}$. 所以 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{B} \Rightarrow X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right) = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$.

□

因此, σ -代数是包含全集合 X 和空集 $\emptyset$, 且对取余, 可数并和可数交运算均封闭的集类. 我们也把 $(X, \mathcal{B})$ 称为一个**可测空间**, 把 $(X, \mathcal{B})$ 中的元素叫做**可测集**. 下面我们引入可测空间上的测度.

定义 1.2 (概率测度)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数, 函数: $m: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$. 如果 m 满足以下 2 个条件:

1. $m(\emptyset) = 0, m(X) = 1$
2. $\forall$ 两两不交集合 $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} (A_i \in \mathcal{B})$, $m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$

则称 m 为 $(X, \mathcal{B})$ 上的一个**概率测度**, $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个**概率测度空间**.



特别地, 如果在上面的定义中去掉 $m(X) = 1$ 的限制, 则称 m 为**有限测度**, $(X, \mathcal{B}, m)$ 为**有限测度空间**.

例 (1) 取 $X = [0, 1]$, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的可测集}\}$, 由可测集的性质可知 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数.

再令 $m = m_{\text{Leb}}: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$, 其中 m_{Leb} 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度.

由 $m_{\text{Leb}}(\emptyset) = 0, m_{\text{Leb}}([0, 1]) = 1$ 以及 Lebesgue 测度的可列可加性可知 m_{Leb} 是 $(X, \mathcal{B})$ 的一个概率测度, $(X, \mathcal{B}, m_{\text{Leb}})$ 是一个概率测度空间.

如果把 X 扩展到实数域 $\mathbb{R}$, 则 m_{Leb} 就是一个有限测度, $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, m_{\text{Leb}})$ 是一个有限测度空间.

(2) 取 $X = \{1, 2, \dots, n\}$, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的所有子集}\}$, 同样可证 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数.

定义 $m: \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$
 $A \mapsto \frac{|A|}{|X|}$, 则有 $m(\emptyset) = \frac{0}{n} = 0$, $m(X) = \frac{n}{n} = 1$. 且若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 X 中两两

不交子集, 则 $m\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \frac{\left|\bigcup_{i=1}^m A_i\right|}{|X|} = \frac{\sum_{i=1}^m |A_i|}{|X|} = \sum_{i=1}^m \frac{|A_i|}{|X|} = \sum_{i=1}^m m(A_i)$.

因此 m 是 $(X, \mathcal{B})$ 上的概率测度, $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间.

如果我们把 X 看作一个样本空间, m 实际上描述的就是古典概型中概率的定义.

但很多时候, σ -代数上的测度不容易计算, 因此我们需要引入**半代数**与**代数**的概念.

定义 1.3 (半代数)


设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是由 X 的一些子集构成的集合类, 如果 $\mathcal{S}$ 满足以下 3 个条件:

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$
2. $A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{S}$
3. $A \in \mathcal{S} \Rightarrow \exists$ 有限多个两两不交集合 $E_i \in \mathcal{S} (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得 $X \setminus A = \bigcup_{i=1}^n E_i$

称 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个**半代数**.



例 (1) 取 $X = [0, 1]$, $\mathcal{S} = \{X \text{ 中所有区间}\} \cup \{\emptyset\}$. 则 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数.



(2) 取 $X = [0, 1]^n$, $\mathcal{S} = \{X \text{ 中的所有矩体}\} \cup \{\emptyset\}$, 则 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数.

定义 1.4 (代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{A}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 如果 $\mathcal{A}$ 满足以下 3 个条件:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A}$
3. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$

称 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个**代数**.



结合第一个和第二个条件, 还可以得到代数的以下性质:

命题 1.2 (代数的性质)

若 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个代数, 则若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, $\bigcup_{i=1}^n A_i, \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.



这说明代数是对取余、有限并和有限交封闭的集类, 它和 σ -代数的区别在于它不要求对可数并和可数交运算封闭.

从半代数的例子中可以看出, $[0, 1]^n$ 内的矩体和空集构成半代数, 相较于所有的可测集构成的 σ -代数 要简单许多, 因此研究清楚半代数并将这些结论延申到 σ -代数上也会比直接在 σ -代数

上做文章方便, 为此, 需要介绍**最小代数**和**延拓定理**.

定义 1.5 (最小代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 定义

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \supseteq \mathcal{S} \\ \mathcal{A} \text{ 代数}}} \mathcal{A}$$

则 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 是一个代数, 称为包含 $\mathcal{S}$ 的**最小代数**.



下面我们证明 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 是一个代数.

证明 (1) $\emptyset \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$

$$(2) A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}) \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$$

$$(3) A \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow A \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \supseteq \mathcal{S}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}(\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) \quad \square$$

注 可以发现, 在上述证明过程中并未使用到 $\mathcal{S}$ 为半代数的性质, 因此上述定义实际上并不依赖于 $\mathcal{S}$ 为半代数.

类似地, 可以定义最小 σ -代数的概念.

定义 1.6 (最小 σ -代数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 定义

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A} \\ \mathcal{B} \text{ } \sigma\text{-代数}}} \mathcal{B}$$

则 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数, 称为包含 $\mathcal{A}$ 的**最小 σ -代数**.



同样可以证明 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 为一个 σ -代数.

证明 (1) $X \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$

$$(2) A \in \mathcal{B}(\mathcal{A}) \Rightarrow A \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$$

$$(3) A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B}(\mathcal{A}) \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}(\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}) \Rightarrow$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}(\mathcal{A}) \quad \square$$

注 同样地, 上述定义也不依赖于 $\mathcal{A}$ 是一个代数.

除了上述的基本定义之外, 我们发现可以用半代数的结构描述其最小代数.

定理 1.1

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的一个半代数, 则 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 的每个子集均能表示成 $\mathcal{S}$ 中有限个互不相交元素的并, 即:

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ E = \bigcup_{i=1}^n E_i \mid E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{N} \right\}$$



证明 记 $\mathcal{F} = \mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ E = \bigcup_{i=1}^n E_i \mid E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{N} \right\}.$

(1) $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{S}.$

令 $n = 1$ 即可.

(2) $\mathcal{F}$ 是 X 的一个代数

(i) $\emptyset \in \mathcal{F}$

(ii) 若 $A, B \in \mathcal{F}$, 则 $A = E_1 \cup \cdots \cup E_m (E_i \in \mathcal{S}), B = F_1 \cup \cdots \cup F_n (F_i \in \mathcal{S})$.
所以

$$\begin{aligned} A \cap B &= (E_1 \cup \cdots \cup E_m) \cap (F_1 \cup \cdots \cup F_n) \\ &= (E_1 \cap F_1) \cup (E_2 \cap F_1) \cup \cdots \cup (E_m \cap F_1) \cup \cdots \\ &= \bigcup_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (E_i \cap F_j) \end{aligned}$$

其中 $E_i \cap F_j \in \mathcal{S}$ 且它们两两不交.

(iii) 若 $A \in \mathcal{F}$, $A = E_1 \cap E_2 \cap \cdots \cap E_m (E_i \in \mathcal{S}, \text{两两不交})$.

则 $X \setminus A = X \setminus (E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_m) = E_1^c \cup E_2^c \cup \cdots \cup E_m^c$.

由半代数的性质可知, $E_i^c = \bigcup_{j=1}^{n_i} F_{ij}$, 所以

$$\begin{aligned} X \setminus A &= E_1^c \cup E_2^c \cup \cdots \cup E_m^c \\ &= \bigcup_{j=1}^{n_1} F_{1j} \cap \bigcup_{j=1}^{n_2} F_{2j} \cap \cdots \cap \bigcup_{j=1}^{n_m} F_{mj} \\ &= (F_{11} \cap F_{21} \cap F_{31} \cap \cdots \cap F_{m1}) \cup \cdots \end{aligned}$$

上式中的每一项都在 $\mathcal{S}$ 中且两两不交.

结合以上两点可知 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{A}(\mathcal{S})$.

(3) $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{S})$

$$\forall \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{F}, E_i \in \mathcal{S}, E_i \text{ 两两不交}, n \in \mathbb{N}, E_i \subseteq \mathcal{S} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{S}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{A}(\mathcal{S}).$$

所以 $\mathcal{A}(\mathcal{S}) \supseteq \mathcal{F}$.

综上可得 $\mathcal{F} = \mathcal{A}(\mathcal{S})$. □

在建立起由半代数构造其最小代数的方法后, 就可以把半代数上的某些函数延拓到其最小代数上, **有限可加函数**是其中的一类.

定义 1.7 (有限可加 (可列可加) 函数)

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是一个半代数, $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$, 如果

1. $\tau(\emptyset) = 0$

2. $\forall \bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{S}, E_i \in \mathcal{S} (i = 1, 2, \cdots, n), E_i \text{ 互不相交}, \text{ 有 } \tau\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n \tau(E_i)$

则称 τ 是**有限可加**的.

如果 $n = \infty$, 称 τ 是**可列可加**的.



显然, 可列可加函数包含有限可加函数.

在代数 $\mathcal{A}$ 和 σ -代数 $\mathcal{B}$ 上, 也可以类似地定义有限可加函数和可列可加函数. 例如概率测度空间 $(X, \mathcal{B}, m)$ 中的测度 m 是定义在 σ -代数 $\mathcal{B}$ 上的可列可加函数.

下面介绍半代数到其最小代数的延拓定理.

定理 1.2

设 X 是一个集合, $\mathcal{S}$ 是一个半代数, $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 是一个有限可加 (可列可加) 函数, 那么 τ 可以唯一地延拓到 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 上的一个有限可加 (可列可加) 函数 τ_1 . (即 $\forall E \in \mathcal{S}, \tau(E) = \tau_1(E)$)



证明 设 $\tau: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 是一个有限可加函数, 定义

$$\begin{aligned} \tau_1: \mathcal{A}(\mathcal{S}) &\rightarrow [0, 1] \\ \bigcup_{i=1}^n E_i &\rightarrow \sum_{i=1}^n \tau(E_i) \quad (E_i \in \mathcal{S}, \text{ 两两不交}) \end{aligned}$$

- 函数 τ_1 是良定的.

若 $\bigcup_{i=1}^n E_i = \bigcup_{j=1}^m F_j \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) (E_i, F_j \in \mathcal{S})$, 则

$$\begin{aligned} \tau(E_i) &= \tau\left(E_i \cap \left(\bigcup_{j=1}^m F_j\right)\right) = \tau((E_i \cap F_1) \cup (E_i \cap F_2) \cup \cdots \cup (E_i \cap F_m)) \\ &= \tau(E_i \cap F_1) + \tau(E_i \cap F_2) + \cdots + \tau(E_i \cap F_m) = \sum_{j=1}^m \tau(E_i \cap F_j) \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n \tau(E_i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \tau(E_i \cap F_j) \end{aligned}$$

$$\text{类似地, } \sum_{j=1}^m \tau(F_j) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \tau(F_j \cap E_i).$$

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^n \tau(E_i) = \sum_{j=1}^m \tau(F_j), \quad \tau_1 \text{ 良定.}$$

- 函数 τ_1 有限可加.

$$(1) \tau_1(\emptyset) = \tau(\emptyset) = 0$$

(2) 若 $A_i \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) (i = 1, 2, \dots, n)$ 两两不交.

由代数的定义可知 $A_i = \bigcup_{j=1}^{k_i} E_{ij}, E_{ij} \in \mathcal{S}, E_{ij}$ 两两不交, $1 \leq j \leq k_i$.

所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \tau_1(A_i) &= \tau_1(A_1) + \tau_1(A_2) + \cdots + \tau_1(A_n) \\ &= \sum_{j=1}^{k_1} \tau(E_{1j}) + \sum_{j=1}^{k_2} \tau(E_{2j}) + \cdots + \sum_{j=1}^{k_n} \tau(E_{nj}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} \tau(E_{ij}) = \tau\left(\bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^{k_i} E_{ij}\right) \\ &= \tau_1\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \end{aligned}$$

- 函数唯一

如果 $\tilde{\tau}$ 也满足条件, 则 $\tilde{\tau} = \tau_1$

□

类似地有代数 $\mathcal{A}$ 到其最小 σ -代数 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 的延拓定理.

定理 1.3

设 X 是一个集合, $\mathcal{A}$ 是一个代数, $\tau: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ 是 $\mathcal{A}$ 上的一个可列可加函数, 那么 τ 可以唯一地延拓到 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 上的可列可加函数 $m: \mathcal{B}(\mathcal{A}) \rightarrow [0, 1]$. (即 $\forall A \in \mathcal{A}, m(A) = \tau(A)$)



例 设 $X = [0, 1]$, $\mathcal{S} = \{X \text{ 的所有子区间}\}$ 为一个半代数, $\mathcal{B} = \{X \text{ 中的可测集}\}$ 是一个 σ -代数.

在 $\mathcal{S}$ 上定义函数 $\tau: \begin{matrix} \mathcal{S} \rightarrow [0, 1] \\ I \rightarrow |I| \end{matrix}$, 则 τ 可延拓到 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 上的概率测度, 其中 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 和 $\mathcal{B}$ 只

相差一个零测集.

1.2 单调类

定义 1.8 (单调类)

设 X 是一个集合, $\mathcal{C}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 如果 $\mathcal{C}$ 满足以下两个条件:

1. $\forall A_i \in \mathcal{C} (i \in \mathbb{N}), A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}$
2. $\forall A_i \in \mathcal{C} (i \in \mathbb{N}), A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \cdots \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}$

则称 $\mathcal{C}$ 是 X 的一个单调类.



单调类满足下述的一个基本性质.

命题 1.3 (单调类的基本性质)

如果 $\mathcal{C}_i (i \in I)$ 是 X 的单调类, 则 $\bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_i$ 是单调类.



证明 记 $\mathcal{C} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{C}_i$. 若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$, 其中 $A_i \in \mathcal{C}$.

则 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$, 其中 $A_i \in \mathcal{C}_k, k \in I$.

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \mathcal{C}_k (k \in I) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}.$$

对单调减的条件类似可证. □

该性质不论单调类是有限个还是无限个, 是可数个还是不可数个, 它们的交集都还是单调类.

对于任意一个集合 X , 它的所有子集构成的 X 的幂集 2^X 一定是包含 X 的一个单调类, 因此任何集合都有包含它的单调类. 因此, 仿照半代数的最小代数、代数的最小 σ -代数, 我们可以定义一个集合生成的最小单调类.

定义 1.9 (最小单调类)

设 $\mathcal{S}$ 是 X 的一些子集构成的集合类, 定义

$$\mathcal{C}(\mathcal{S}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{C} \supseteq \mathcal{S} \\ \mathcal{C} \text{ 单调类}}}$$

称为包含 $\mathcal{S}$ 的最小单调类.



下面一个定理介绍了一个代数生成的最小单调类和最小 σ -代数 之间的关系.

定理 1.4

设 X 是一个集合, $\mathcal{A}$ 是 X 的一个代数, 则 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathcal{A})$.



证明 由于 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数, 所以 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 中任意子集的可数交与可数并包含于 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$, 因此 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 是一个单调类, 所以 $\mathcal{B}(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

现证 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{A})$, 由于 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{A}$, 所以只需证明 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数.

- 取补运算在 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 中封闭.

定义 $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) | X \setminus E \in \mathcal{C}(\mathcal{A})\}$, 现证 $\mathcal{F} = \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

- (i) 由定义可知 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$.
- (ii) 由代数的定义可知 $\forall A \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}), X \setminus A \in \mathcal{A} \Rightarrow A \in \mathcal{F} (\forall A \in \mathcal{A}) \Rightarrow \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$.
- (iii) $\mathcal{F}$ 是一个单调类.

设 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots (A_i \in \mathcal{F})$, 则 $A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}), X \setminus A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{单调类定义}} \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}), \bigcap_{i=1}^{\infty} (X \setminus A_i) \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \\ & \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}), X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

对单调减的情形同理可证. 因此, $\mathcal{F}$ 是单调类.

由 (ii)(iii) 可得 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$. 结合 (i) 得 $\mathcal{F} = \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

- 交运算在 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 中封闭.

设 $E \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$, 考虑 $\mathcal{F} = \{A \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) | A \cap E \in \mathcal{C}(\mathcal{A})\}$, 现证 $\mathcal{F} = \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

- (i) 由定义知 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{A}$.
- (ii) $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{A} (\forall B \in \mathcal{A}, \forall F \in \mathcal{C}(\mathcal{A}), B \cap F \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow B \in \mathcal{F} (\forall B \in \mathcal{A}) \Rightarrow \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F})$
- (iii) $\mathcal{F}$ 是一个单调类.

设 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots (A_i \in \mathcal{F})$, 则 $A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}), A_i \cap E \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

$$\xrightarrow{\text{单调类定义}} \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}), \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap E \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

对单调减的情形同理可证, 因此 $\mathcal{F}$ 是单调类.

由 (ii)(iii) 可得 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$. 结合 (i) 得 $\mathcal{F} = \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

- $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 是一个 σ -代数.

(1) $\emptyset \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$. ($\emptyset \in \mathcal{A} \Rightarrow X = \emptyset^c \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \emptyset = X^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$).

(2) $A \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow A^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

(3) $A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) (i = 1, 2, \cdots) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A})$.

$$\text{对于 } A_1, A_2, \cdots, A_n, A_i^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i = \left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c \right)^c \in \mathcal{C}(\mathcal{A}).$$

$$\left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \right\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{C}(\mathcal{A}) \text{ 单调递增, 所以 } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}(\mathcal{A}).$$

□

该定理指出要将代数 $\mathcal{A}$ 扩张至其最小 σ -代数 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$, 只需要将 $\mathcal{A}$ 中单调增集合序列的并集和单调减集合序列的交集包含进来即可.

之前在讨论最小代数和最小 σ -代数时, 已经给出了使用半代数中的元素构造其最小代数的方法. 但对于代数生成的最小 σ -代数中的元素, 我们却一般无法详细描述, 只能使用 $\mathcal{A}$ 中的元素逼近 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 中的元素. 下面我们可以借助 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathcal{A})$ 来证明这种逼近关系.

定理 1.5

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 为概率测度空间, $\mathcal{A}$ 是 X 的一个代数, $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A})$, 那么对于 $\forall B \in \mathcal{B}, \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}$ 使得 $m(A \triangle B) < \varepsilon$.



证明 设 $\mathcal{F} = \{B \in \mathcal{B} | \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}, m(A \triangle B) < \varepsilon\}$, 现证 $\mathcal{F} = \mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A})$. 由定义知 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}$, 故只需证明 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{B}$

(i) $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$

(ii) $\mathcal{F}$ 是一个单调类.

设 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots \subseteq B_n \subseteq \cdots (B_i \in \mathcal{F}, i \in \mathbb{N})$.

由 $\mathcal{F}$ 的定义可知 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_i \in \mathcal{A}$, 使得 $m(A_i \triangle B_i) < \frac{\varepsilon}{2^i}$.

由于 $m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \leq 1$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists l \in \mathbb{N}$, 使得 $m\left(\bigcup_{i=l+1}^{\infty} A_i\right) < \varepsilon$, 那么

$$\begin{aligned} m\left(\bigcup_{i=1}^l A_i \triangle \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) &= m\left(\left(\bigcup_{i=1}^l A_i \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \setminus \bigcup_{i=1}^l A_i\right)\right) \\ &= m\left(\bigcup_{i=1}^l A_i \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) + m\left(\bigcup_{i=1}^l B_i \setminus \bigcup_{i=1}^l A_i\right) + m\left(\bigcup_{i=l+1}^{\infty} B_i \setminus \bigcup_{i=1}^l A_i\right) \\ &\leq m\left(\bigcup_{i=1}^l A_i \setminus \bigcup_{i=1}^l B_i\right) + m\left(\bigcup_{i=1}^l B_i \setminus \bigcup_{i=1}^l A_i\right) + m\left(\bigcup_{i=l+1}^{\infty} B_i\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^l m(A_i \triangle B_i) + m\left(\bigcup_{i=l+1}^{\infty} B_i\right) \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{F}.$$

对于单调减的情形同理可证.

进而可知 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}) \xrightarrow{\text{定理 1.4}} \mathcal{F} \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}$. 综上得 $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathcal{A})$. □

注 上述证明过程中除了最后一步实际上并未使用单调集的性质, 因此也可以脱离单调集, 仅使用 σ -代数 相关概念证明 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{A})$.

证明 (1) $\forall B_i \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{F}$.

(2) $B \in \mathcal{F} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}$, 使得 $m(A \triangle B) = m(A \setminus B) + m(B \setminus A) = m(B \setminus A^c) + m(A \setminus B^c) = m(A^c \triangle B^c) < \varepsilon \Rightarrow B^c \in \mathcal{F}$.

结合 (1)(2) 两点知 $\mathcal{F}$ 为 σ -代数, 所以 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{B}(\mathcal{A})$ □

1.3 积概率空间

假设 $(X_i, \mathcal{B}_i, m_i)$ 为一列概率测度空间 $-\infty < i < +\infty, i \in \mathbb{Z}$, 我们定义集合

$$X = \prod_{i=-\infty}^{+\infty} X_i = \{(\cdots, x_{-1}, x_0, x_1, \cdots) | x_i \in X_i\}$$

在这个集合上可以定义其半代数.

定义 1.10 (可测矩形)

$$\mathcal{S} = \left\{ \prod_{i=1}^{m-1} X_i \times A_m \times A_{m+1} \times \cdots \times A_{n-1} \times A_n \times \prod_{i=n+1}^{+\infty} X_i : A_k \in \mathcal{B}_k, m \leq k \leq n, m, n \in \mathbb{Z} \right\},$$

称其为可测矩形, 它是 $X = \prod_{i=-\infty}^{+\infty} X_i$ 的半代数.



利用该半代数和前面提到的利用半代数生成代数、用代数生成 σ -代数的方法, 我们可以定义 X 上的 σ -代数.

定义 1.11 (积 σ -代数)

定义 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$, 称为积 σ -代数, 为 $X = \prod_{i=-\infty}^{+\infty} X_i$ 上的 σ -代数.



类似地, 我们可以通过在可测矩形上定义 τ 函数并将其延拓到 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 来得到 $(X, \mathcal{B})$ 上的概率测度.

定义 1.12 (积测度)

在 $\mathcal{S}$ 上定义

$$\tau : \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$$

$$\prod_{i=1}^{m-1} X_i \times A_m \times \cdots \times A_n \times \prod_{i=n+1}^{+\infty} X_i \mapsto m_m(A_m) \times \cdots \times m_n(A_n)$$

将 τ 唯一地延拓到 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$, 可以得到 $\mathcal{B}$ 上的概率测度, 记为 m , 叫积测度.



由此, 我们就得到了 X 上的 σ -代数和相应的测度, 它们构成了一个概率测度空间.

定义 1.13 (积概率空间)

上述的 $(X, \mathcal{B}, m)$ 称为 $(X_i, \mathcal{B}_i, m_i)$ 的积概率空间, 记作 $\prod_{i=-\infty}^{+\infty} (X_i, \mathcal{B}_i, m_i)$



类似地, 可以相应定义 $\prod_{i=0}^{\infty} X_i$ 和 $\prod_{i=-\infty}^0 X_i$.

在本课程中, 通常遇到的积概率空间是由完全相同的概率测度空间构成的, 其中每一个概率测度空间中的测度均为离散测度.

例 $X_i = 1, 2, \dots, n$ $\mathcal{B}_i = \{X_i \text{ 的所有子集} \}$

$$m_i : \mathcal{B}_i \rightarrow [0, 1]$$

$$A \mapsto \frac{|A|}{n} \Rightarrow (X_i, \mathcal{B}_i, m_i)$$

$$X = \prod_{i=-\infty}^{\infty} X_i.$$

1.4 积分与测度相关概念

定义 1.14 (Borel σ -代数)

设 $X = \mathbb{R}$, 包含所有开集的最小 σ -代数 称为 **Borel σ -代数** $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

借助 Borel σ -代数, 可以定义 $(X, \mathcal{B}, m)$ 上的可测函数, 这里给出其等价定义.

定义 1.15 (可测函数)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 概率测度空间, 对于函数 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $\forall c \in \mathbb{R}, f^{-1}((-\infty, c)) \in \mathcal{B}$, 则称 f 是一个 **可测函数**.

下面仿照实变函数中 Lebesgue 积分的定义方式定义从简单函数到一般可测函数在概率测度空间上的积分.

定义 1.16 (积分)

1. 若 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$ 为一个简单函数, $\int_X \varphi(x) dm = \sum_{i=1}^n c_i m(A_i)$.
2. 若 $f \geq 0$ 可测函数, 有简单函数逼近 $\varphi_n(x) \nearrow f(x)$, 则 $\int_X f dm = \sup_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n(x) dm$.
3. 若 f 一般可测函数, $f = f^+ + f^-$, $f^+ = \max\{f, 0\}, f^- = \max\{-f, 0\}$, 则 $\int_X f dm = \int_X f^+ dm - \int_X f^- dm$.

在概率测度空间中定义的上述积分依旧满足以下定理和引理.

定理 1.6 (Levi 定理 MCT)

设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $(X, \mathcal{B}, m)$ 上的非负可积函数列. 如果 f_n 关于 n 单调递增且 $\left\{ \int_X f_n dm \right\}$ 是有界数列, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ 存在 a.e. 且可积, 并满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n dm = \int_X f dm.$$

注 在上述定理中, 如果可知函数列极限几乎处处存在, 则不需要函数列积分有界的条件.

引理 1.1 (Fatou 引理)

设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $(X, \mathcal{B}, m)$ 上的非负可测函数列.

(i) 如果存在可积函数 g , 使 $f_n \geq g$ 对每一个 $n = 1, 2, 3, \dots$ 成立, 且

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm < \infty,$$

则 $\liminf f_n$ 是可积的, 且有

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm.$$

(ii) 如果存在可积函数 g , 使 $f_n \leq g$ 对每一个 $n = 1, 2, 3, \dots$ 成立, 且

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm > -\infty,$$

则 $\limsup f_n$ 是可积的, 且有

$$\int \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n dm \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm.$$

**定理 1.7 (Lebesgue 控制收敛定理 LDCT)**

设 $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $(X, \mathcal{B}, m)$ 上的可测函数列且被一个可积函数 $g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 控制: $|f_n| \leq g, \text{ a.e.}$, 进一步设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f, \text{ a.e.}$, 则 f 可积, 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dm = \int f dm.$$



下面的定义描述了同一空间上的两个概率测度之间的关联.

定义 1.17 (绝对连续)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 σ -代数, μ, m 是 $(X, \mathcal{B})$ 的概率测度.

如果 $\forall B \in \mathcal{B}, m(B) = 0 \Rightarrow \mu(B) = 0$, 称 μ **绝对连续** 于 m , 记为 $\mu \ll m$.

如果 $\mu \ll m$ 且 $m \ll \mu$, 称 μ 和 m **等价**.



除了上述的定义之外, 我们也可以利用下述定理使用函数刻画何时 $\mu \ll m$.

定理 1.8 (Radon-Nikodym 定理)

设 m 和 μ 为可测空间 $(X, \mathcal{B})$ 的两个概率测度, 则 $\mu \ll m$ 的充要条件是存在

$$f \in L_1(m), \quad f \geq 0, \quad \int f dm = 1,$$

使得对任意 $C \in \mathcal{B}$, 有 $\mu(C) = \int_C f dm$.

此时的函数 f 是几乎处处唯一的. (如果 g 也满足这些性质, 则 $f = g$ a.e. $x \in X$)



注 上面定理中的函数 f 叫做 μ 关于 m 的 Radon-Nikodym 导数, 记作 $f = \frac{d\mu}{dm}$

最后介绍 Lebesgue 覆盖引理和 Lebesgue 数的概念.

引理 1.2 (Lebesgue 覆盖引理)

设 (X, d) 是一个紧致度量空间, α 是 X 的一个开覆盖, 那么 $\exists \delta > 0$, 使得对于任意直径小于 δ 的集合 B , 可以找到 $U \in \alpha$, 使得 $B \subseteq U$, δ 称为此开覆盖的 Lebesgue 数.



证明 使用反证法, 若 $\forall n \in \mathbb{N}, \delta = \frac{1}{n}, \exists B_n \subset X, \text{diam } B_n < \delta_n, B_n$ 不包含在 α 的任何一个开集中.

任取 $x_n \in B_n, \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 由 (X, d) 为紧致度量空间, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}, x_{n_k} \rightarrow x_0 \in X$.
 由于 α 是 X 的一个开覆盖, 所以 $\exists U_0 \in \alpha$, 使得 $x_0 \in U_0$.

U_0 为开集 $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0, B(x_0, \varepsilon) \subseteq U_0$.

当 k 充分大时, $B_{n_k} \subseteq B(x_0, \varepsilon) \subseteq U_0$. 矛盾!

□

第二章 遍历理论

2.1 一个问题

在正式介绍遍历理论之前，首先看一个利用遍历理论解决概率论问题的例子，以此引入我们将在后续学习的概念. 问题是：

问题 2.1 考虑数列 $x_n = 2^{n-1}$, a_n 表示 x_n 的第一位数字, 则对 $\forall k \in \{1, 2, \dots, 9\}$, 计算 $P(a_n = k) = ?$

n	x_n	a_n
0	1	1
1	2	2
2	4	4
3	9	9
4	16	1
5	32	3

首先对该问题进行化简，将其解释为可以处理的数学问题.

$$x_n = 2^n, a_n = x_n \text{ 的首一数字} \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}, \text{ 使得 } a_n \cdot 10^m \leq 2^n \leq (a_n + 1) \cdot 10^m$$

$$\xLeftrightarrow{\text{取对数}} \log a_n + m \leq n \log 2 \leq \log(a_n + 1) + m$$

$$\xLeftrightarrow{\text{取小数部分}} \log a_n \leq \{n \log 2\} \leq \log(a_n + 1)$$

$$\Leftrightarrow \{n \log 2\} \in [\log a_n, \log(a_n + 1)]$$

$$\bullet P(a_n = k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{0 \leq n \leq N-1 | a_n = k\}|}{|N|} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \left(\sum_{n=0}^{N-1} \chi_{I_k}(\{n \log 2\}) \right), I_k = [\log k, \log(k+1)]$$

为了求出上述概率，我们需要引入均匀分布的概念.

定义 2.1 (均匀分布)

设 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq [0, 1]$, 如果对于任意区间 $I \subseteq [0, 1]$, $\{x_n\}$ 落入区间 I 的概率等于 $|I|$, 即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{1 \leq n \leq N | x_n \in I\}|}{N} = |I|$$

那么称 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, 1]$ 中均匀分布.



下面还有均匀分布的等价刻画.

命题 2.1 (均匀分布的等价刻画)

$$\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ 在 } [0, 1] \text{ 中均匀分布} \Leftrightarrow \forall f \in C([0, 1]), f(0) = f(1), \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx.$$



证明

$$“\Rightarrow” \text{ 由均匀分布的定义可知, } \forall I \subseteq [0, 1], \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_I(x_n) \rightarrow |I| = \int_0^1 \chi_I(x) dx.$$

$$\text{则对简单函数 } \varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}(x), \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi(x_n) \rightarrow \int_0^1 \varphi(x) dx.$$

利用简单函数逼近一般可测函数 $f(x)$,

$$\text{即 } \forall \varepsilon > 0, \exists \varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{I_i}(x), \text{ s.t. } |\varphi(x) - f(x)| < \varepsilon (\forall x \in [0, 1]).$$

$$\text{故 } \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi(x_n) \right| \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |f(x_n) - \varphi(x_n)| < \varepsilon.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi(x_n) - \varepsilon \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi(x_n) + \varepsilon.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 取上下极限, 其中下面两个不等号成立的原因是积分的绝对值不等式

$$\int_0^1 \varphi(x) dx - \varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \int_0^1 \varphi(x) dx + \varepsilon$$

$$\int_0^1 f(x) dx - 2\varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \int_0^1 f(x) dx + 2\varepsilon$$

$$\text{令 } \varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx.$$

“ $\Leftarrow$ ” $\forall I \subseteq [0, 1]$, 构造连续函数列 $\{\varphi_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 和 $\{\psi_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$, 使

$$(1) \varphi_n(x) \leq \chi_I(x) \leq \psi_n(x)$$

$$(2) \int_0^1 \varphi_n(x) dx \rightarrow \int_0^1 \chi_I(x) dx.$$

$$\int_0^1 \psi_n(x) dx \rightarrow \int_0^1 \chi_I(x) dx.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \varphi_n(x_n) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_I(x_n) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \psi_n(x_n).$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \chi_I(x_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \chi_I(x_n) \leq \int_0^1 \psi_n(x) dx.$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \chi_I(x_k) = \int_0^1 \chi_I(x) dx.$$




图 2.1: 连续函数逼近特征函数

□

- 上述定理给了我们用连续函数刻画均匀分布的方法, 如果我们把连续的条件加强为三阶连续可导, 设 $f \in C^3([0, 1])$, $f(0) = f(1)$, 由 Fourier 分析可知可以对上述函数作 Fourier 级数展开 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2\pi n x + b_n \sin 2\pi n x)$ ($\forall x \in [0, 1]$). 并且有以下定理.

定理

$$\text{若 } f \in C^1([0, 1]), \quad \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi n x + b_n \sin 2\pi n x) \Rightarrow f(x) \quad (\forall x \in [0, 1]).$$



借由 Fourier 级数, 又可以得到以下使用正余弦和刻画均匀分布的方法.

定理 2.1

$$\forall f \in C^3([0, 1]), f(0) = f(1), \quad \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \cos 2\pi k x_n \rightarrow 0, \quad \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \sin 2\pi k x_n \rightarrow 0.$$



证明

$$“\Rightarrow” \quad \text{取 } f(x) = \cos 2\pi kx \Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \cos 2\pi kx_n \rightarrow \int_0^1 \cos 2\pi kx = 0.$$

对 $\sin$ 的情形同理可证.

$$“\Leftarrow” \quad \forall f \in C^3([0, 1]), f(0) = f(1), \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi nx + b_n \sin 2\pi nx) \Rightarrow f(x) \\ \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } \left| f(x) - \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi nx + b_n \sin 2\pi nx) \right) \right| < \varepsilon, \forall x \in [0, 1].$$

$$\text{记 } \varphi_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi nx + b_n \sin 2\pi nx)$$

$$\text{则 } \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \varphi_N(x_n) - \varepsilon \leq \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L f(x_n) \leq \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \varphi_N(x_n) + \varepsilon.$$

$$\text{令 } L \rightarrow \infty, \text{ 则 } \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \varphi_N(x_n) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos 2\pi nx + b_n \sin 2\pi nx) \right) = \\ \frac{a_0}{2} = \int_0^1 f(x) dx.$$

$$\text{故上述不等式变为 } \int_0^1 f(x) dx - \varepsilon \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \leq \int_0^1 f(x) dx + \varepsilon.$$

$$\text{再令 } \varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$$

□

- 有了上述定理的准备, 下一步要说明的是 $\{\{n \log 2\}\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, 1]$ 中均匀分布.

$$\text{证明 } \forall k \in \mathbb{N}, \text{ 考虑 } \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \cos(k \cdot \{n \log 2\} 2\pi) \right|.$$

由于添加整数对于 $\cos(k \cdot \{n \log 2\} 2\pi)$ 的值没有影响, 因此

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \cos(k \cdot \{n \log 2\} 2\pi) \right| &= \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} \cos(k \cdot n \log 2 \cdot 2\pi) \right| \\ &= \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2 \cos(k \cdot n \log 2 \cdot 2\pi) \sin(\log 2 \cdot k\pi)}{2 \sin(\log 2 \cdot k\pi)} \right| \\ &\stackrel{\text{积化和差}}{=} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\sin(\log 2 \cdot (2n+1)k\pi) - \sin(\log 2 \cdot (2n-1)k\pi)}{2 \sin(\log 2 \cdot k\pi)} \right| \\ &= \left| \frac{1}{N} \frac{\sin(\log 2 \cdot (2N-1)k\pi) - \sin(\log 2 \cdot (-k\pi))}{2 \sin(\log 2 \cdot k\pi)} \right| \\ &\leq \frac{1}{N} \frac{1}{|\sin(\log 2 \cdot k\pi)|} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

对 $\sin$ 同理.

□

- $x_n = 2^n, a_n = x_n$ 的首一数字, 由于 $\{n \log 2\}$ 在 $[0, 1]$ 中均匀分布, 因此

$$P(a_n = k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N \chi_{I_k}(\{n \log 2\}) = \int_0^1 \chi_{I_k}(x) dx = \log \left(1 + \frac{1}{k}\right) I_k = [\log k, \log(k+1)].$$

- 这个结果就是大名鼎鼎的**本·福特定理**

在上面一系列的证明过程中, 最重要的部分是对 $\frac{1}{L} \sum_{n=1}^L f(x)$ 的估计, 关于这个估计, 我们先不加证明的引入以下定理:

定理 2.2 (Birkhoff 遍历定理)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T: (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是一个保测遍历映射, 那么 $\forall f \in L^1(X, \mathcal{B}, m), \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n(x)) \rightarrow \int_X f dm$ a.e. x .



该定理包含的保测映射、遍历映射等概念将在后续学习中一一提及.

2.2 保测映射

定义 2.2 (保测映射)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T: (X, \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{B})$ 是一个**可测映射** (可测集的原像是可测集).

- 如果 $\forall A \in \mathcal{B}, m(T^{-1}A) = m(A)$, 那么称 T 为**保测映射**.
- 如果 T 是 1-1 的保测映射且 T^{-1} 也是保测映射, 那么称 T 为**可逆保测映射**



特别地, 当映射 $T: (X, \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{B})$ 保持测度 m 不变时, 我们就说 m 是 T 的**不变测度**, 称 $(X, \mathcal{B}, m, T)$ 为**概率系统**.

下面一个命题使用积分形式给出了保测映射的一个等价刻画.

命题 2.2 (保测映射的等价刻画)

$T: (X, \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{B})$ 是一个保测映射 $\Leftrightarrow \int_X f \circ T dm = \int_X f dm, \forall f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$.



证明 先证明 $\chi_B \circ T = \chi_{T^{-1}B}$.

$$\chi_B \circ T(x) = 1, x \in X \Rightarrow T(x) \in B \Rightarrow x \in T^{-1}B \Rightarrow \chi_{T^{-1}B}(x) = 1.$$

$$\chi_B \circ T(x) = 0, x \in X \Rightarrow T(x) \notin B \Rightarrow x \notin T^{-1}B \Rightarrow \chi_{T^{-1}B} = 0.$$

所以 $\chi_B \circ T = \chi_{T^{-1}B}$.

“ $\Leftarrow$ ” 令 $f = \chi_B (B \in \mathcal{B})$.

$$\text{则 } \int_X \chi_B \circ T dm = \int_X \chi_B dm \Leftrightarrow \int_X \chi_{T^{-1}B} dm = \int_X \chi_B dm \Leftrightarrow m(T^{-1}B) = m(B).$$

“ $\Rightarrow$ ” 假设 T 是保测映射, $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$ 是简单函数.

$$\int_X \varphi \circ T dm = \sum_{i=1}^n c_i \int_X \chi_{A_i} \circ T dm = \sum_{i=1}^n c_i \int_X \chi_{T^{-1}A_i} dm = \sum_{i=1}^n c_i m(T^{-1}A_i).$$

$$\int_X \varphi \, dm = \sum_{i=1}^n c_i \int_X \chi_{A_i} \, dm = \sum_{i=1}^n c_i m(A_i).$$

由于 T 是保测映射, 所以 $m(T^{-1}A_i) = m(A_i)$, 故 $\int_X \varphi \circ T \, dm = \int_X \varphi \, dm$.

对于 $\forall f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$, $f \geq 0$, 可找到一列简单函数 $\varphi_n(x) \nearrow f(x)$,

$$\text{取极限得 } \int_X f \circ T \, dm = \int_X f \, dm.$$

□

除此之外, 还有下述的帮助我们验证一个可测映射是否是保测映射的方法.

定理 2.3 (保测映射的验证方法)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T: (X, \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{B})$ 是一个可测映射. $\mathcal{S}$ 是 X 的一个生成 $\mathcal{B}$ 的半代数, 即 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$, 那么

$$T \text{ 是可测映射} \iff \forall E \in \mathcal{S}, m(T^{-1}E) = m(E)$$

♡

证明

“ $\Rightarrow$ ” 由定义可得.

“ $\Leftarrow$ ” 令 $\mathcal{F} = \{A \in \mathcal{B} | m(T^{-1}A) = m(A)\}$, 下证 $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S})) = \mathcal{B}$.

(i) $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}$

(ii) $\mathcal{A}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{F}$.

$\forall E \in \mathcal{A}(\mathcal{S}), E = E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_n$ ($E_1 \in \mathcal{S}$, 两两不交).

$$\begin{aligned} m(T^{-1}E) &= m(T^{-1}E_1 \cup T^{-1}E_2 \cup \cdots \cup T^{-1}E_n) \\ &= m(T^{-1}E_1) + m(T^{-1}E_2) + \cdots + m(T^{-1}E_n) \\ &= m(E_1) + m(E_2) + \cdots + m(E_n) = m(E) \end{aligned}$$

(iii) $\mathcal{F}$ 是一个单调类. ($\Rightarrow \mathcal{F} \supseteq \mathcal{C}(\mathcal{A}(\mathcal{S})) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S})) = \mathcal{B}$)

设 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$, $A_i \in \mathcal{F}$.

由于 T 是保测映射, 所以 $m(T^{-1}A_i) = m(A_i) \Leftrightarrow \int \chi_{T^{-1}A_i} \, dm = \int \chi_{A_i} \, dm$.

$$\text{由 LDCT 得 } \int \chi_{T^{-1}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)} \, dm = \int \chi_{(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)} \, dm \Leftrightarrow m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = m\left(T^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)\right).$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

单调减的情形类似.

□

下面列举本课程中常用的保测映射.

例

(1) 最简单的, 恒同映射 $Id: X \rightarrow X$ 是一个 X 上的保测映射.

(2) 定义 $R_\alpha: [0, 1) \rightarrow [0, 1)$, 即将元素平移 α 个单位后取其小数部分.

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

取 $\mathcal{S} = \{[0, 1) \text{ 中的所有区间}\}$ 是 $\mathcal{S}$ 的一个半代数. 对 $\forall I \in \mathcal{S}$, 定义其概率测度为 Lebesgue 测

度, 即 $m(I) = m_{\text{Leb}}(I)$, 则 R_α 是 $[0, 1)$ 上的一个保测映射, 下图直观地展示了其原因.




图 2.2: R_α 保持测度

如果 I 左端点的值小于 α , 那么 $R_\alpha^{-1}(I)$ 会被分为两个部分, 但其测度不会发生变化.

(3) 定义 $T_2 : [0, 1) \rightarrow [0, 1)$

$$x \mapsto 2x \mod 1$$

其中 $\mathcal{B} = \text{Borel } \sigma\text{-代数}$, $m = m_{\text{Leb}}$ 为 Lebesgue 测度.

可以证明: $m_{\text{Leb}}(T_2^{-1}(I)) = m_{\text{Leb}}(I)$, 因此 T_2 为 $[0, 1)$ 上的一个保测映射.

右图直观地展示了为何 T_2 可以保持半代数的测度.

更一般地, 对于 $\forall k \in \mathbb{N}, T_k(x) = k \cdot x \mod 1$ 是 $[0, 1)$ 上的保测映射.




图 2.3: T_2 保持测度

(4) 下一个例子是高斯映射, 定义为:

$$T : (0, 1) \rightarrow (0, 1)$$

$$x \mapsto \frac{1}{x} \mod 1$$

$\mathcal{B}$ 为 $(0, 1)$ 上的 Borel σ -代数, 概率测度使用如下微分和积分定义:

$$dm(x) = \frac{1}{\ln 2} \frac{1}{1+x} dx \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{B}, m(A) = \frac{1}{\ln 2} \int_A \frac{1}{1+x} dx$$

下一步, 证明 T 是一个保测映射.




图 2.4: 高斯映射保持测度

高斯映射的图象如右图所示, 可以看出高斯映射由可数条曲线组成, 在自右向左第 k 根曲线上高斯映射可以写成:

$$T_2^k : \left(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right) \rightarrow (0, 1)$$

$$x \mapsto \frac{1}{x} \mod 1 = \frac{1}{x} - k$$

对于 $\forall I = (a, b) \subseteq (0, 1), (T_2^k)^{-1}(I) = \left(\frac{1}{b+k}, \frac{1}{a+k} \right) \Rightarrow T_2^{-1}(I) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{b+k}, \frac{1}{a+k} \right)$, 则

$$\begin{aligned} m(T_2^{-1}(I)) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\ln 2} \int_{\frac{1}{b+k}}^{\frac{1}{a+k}} \frac{1}{1+x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{a+N+1}{a+1} - \ln \frac{b+N+1}{b+1} \right) \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{a+N+1}{a+1} - \ln \frac{b+N+1}{b+1} \right) \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{a+N+1}{a+1} - \ln \frac{b+N+1}{b+1} \right) \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{a+N+1}{b+N+1} - \ln \frac{b+1}{a+1} \right) \right) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{b+1}{a+1} \right) = \frac{1}{\ln 2} \int_a^b \frac{1}{1+x} dx = m(I). \end{aligned}$$

(5) 最后是一个积概率空间的例子. 设 $Y = \{1, 2, \dots, n\}, \mathcal{B}_Y = \{Y \text{ 的所有子集}\}, m_Y : \mathcal{B}_Y \rightarrow [0, 1]$.

$$A \mapsto \frac{|A|}{n}$$

设 $X = \prod_{i=-\infty}^{\infty} Y = \{(\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots) | x_i \in Y\}$, 其上的 σ -代数 和 概率测度 参考定义 1.10、

定义 1.11 和 定义 1.12.

定义 Y 上的左位移映射

$$T : X \rightarrow X$$

$$(\dots, -x_2, -x_1, x_0, x_1, x_2, \dots) \mapsto (\dots, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, x_3, \dots)$$

- T 是保测映射, 称为 **Bernouli 转移**.

T 是可测映射, 这是因为 $T^{-1}\mathcal{S} = \mathcal{S} \Rightarrow T^{-1}\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{B}_x$.

- $\forall E = \dots \times Y \times A_m \times \dots \times A_n \times Y \times \dots \in \mathcal{S}$,

知 $T^{-1}E = \dots \times Y \times Y \times A_m \times \dots \times A_{n-1} \times A_n \times Y \times \dots$

由积概率测度的定义可知 $m(E) = m(T^{-1}E)$.

2.3 遍历映射

定义 2.3 (遍历映射)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 为概率测度空间, $T : X \rightarrow X$ 为保测映射, 如果 T 满足 $\forall B \in \mathcal{B}, T^{-1}B = B \Rightarrow m(B) = 0$ 或 1 , 那么称 T 是 **遍历映射**.



下面的例子利用 R_α 构造了一个遍历映射.

例 设 $R_\alpha : [0, 1) \rightarrow [0, 1)$, 其中 $\alpha = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}, m \geq 1, m, n$ 互素.

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

$\forall x \in [0, 1)$, 定义 $\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$, 其中 $A \in \mathcal{B}$, 称上述定义为支在点 x 处的 **Dirac 测度**.

可以证明 δ_x 是 $([0, 1), \mathcal{B})$ 上的一个概率测度.

令 $\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{\frac{i}{m}}$, 它实际上就是分别支在 m 个均匀分布在 $[0, 1)$ 上的点的 Dirac 测度的平均

值, 因此也可以证明 μ 是 $([0, 1), \mathcal{B})$ 上的一个概率测度.

由于 $R_\alpha(x) = x + \frac{n}{m} \pmod{1}$, 因此 R_α 作用在 $\text{supp}(\mu) = \left\{0, \frac{1}{m}, \dots, \frac{m-1}{m}\right\}$ 上为支集中点

的轮换, 因此有 $\frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{R_\alpha(\frac{i}{m})}(A) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{\frac{i}{m}}(A)$.

又因为 $\delta_{R_\alpha(\frac{i}{m})}(A) = \delta_{\frac{i}{m}}(R_\alpha^{-1}(A))$, 得

$$\mu(R_\alpha^{-1}(A)) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{\frac{i}{m}}(R_\alpha^{-1}(A)) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{R_\alpha(\frac{i}{m})}(A) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \delta_{\frac{i}{m}}(A) = \mu(A)$$

这说明 $R_\alpha : ([0, 1], \mathcal{B}, \mu) \rightarrow ([0, 1], \mathcal{B}, \mu)$ 是保测映射.

下面证明 R_α 是遍历映射.

对 $\forall A \in \mathcal{B}, R_\alpha^{-1}(A) = A$, 可分两种情况:

1. 若 $A \cap \text{supp}(\mu) = \emptyset$, 则有 $\mu(A) = 0$.
2. 若 $A \cap \text{supp}(\mu) \neq \emptyset$, 由于 R_α 保持 $\text{supp}(\mu)$, 所以 $R_\alpha(A) = A$.

设 $x_0 \in A \cap \text{supp}(\mu), x_0 = \frac{j}{m}$, 则 $R_\alpha^k(x_0) = \frac{j}{m} + \frac{n}{m} \cdot k \pmod{1}$.

因为 m, n 互素 $\Rightarrow A \supseteq \left\{ R_\alpha^k(x_0) | k \in \mathbb{Z} \right\} = \text{supp}(\mu)$.

$\Rightarrow \mu(A) = 1$

遍历映射的另一个意义是, 如果一个映射是保测映射但并非遍历映射, 那么就可以把测度空间分解为两个不交的子集, 在每个子集定义保测映射. 对于遍历映射, 我们就不能这么做.

设 $T : (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是保测映射, 如果 $\exists B \in \mathcal{B}$, 使得 $0 < m(B) < 1, T^{-1}B = B$, 那么就可以在 B 和 $X \setminus B$ 上定义新的保测映射, 也就是:

$$\begin{array}{ll} T|_B : B \rightarrow B & T|_{X \setminus B} : X \setminus B \rightarrow X \setminus B \\ \text{关于 } m_B(A) = \frac{m(A)}{m(B)} & \text{关于 } m_{X \setminus B}(A) = \frac{m(A)}{m(X \setminus B)} \\ \text{是保测映射 } (\forall A \in B) & \text{是保测映射 } (\forall A \in X \setminus B) \end{array}$$

遍历性有若干形式的等价条件, 下面两个定理分别从集合和函数的角度给出了两组描述方式.

定理 2.4 (遍历映射的等价条件)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T : (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是保测映射, 则以下结论等价:

- (1) T 是一个保测遍历映射
- (2) $\forall B \in \mathcal{B}, m(T^{-1}B \triangle B) = 0 \Rightarrow m(B) = 0$ 或 1
- (3) $\forall A \in \mathcal{B}, m(A) > 0 \Rightarrow m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} T^{-i}A\right) = 1$
- (4) $\forall A, B \in \mathcal{B}, m(A) > 0, m(B) > 0, \exists n \in \mathbb{N}$, 使得 $m(T^{-n}A \cap B) > 0$



证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 令 $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=n}^{\infty} T^{-i}B \right)$.

• $T^{-1}E = E$.

令 $A_n = \bigcup_{i=n}^{\infty} T^{-i}B$, 则 $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq A_{n+1} \supseteq \cdots$, 且 $T^{-1}A_n = A_{n+1}$.

$$T^{-1}(E) = T^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} T^{-1}A_n = \bigcap_{n=2}^{\infty} T^{-1}A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E.$$

由遍历映射的定义可得 $m(E) = 0$ 或 1 .

• 由 T 为保测映射, 所以 $m(T^{-1}B \triangle B) = 0 \Rightarrow m(T^{-2}B \triangle T^{-1}B) = m(T^{-1}(T^{-1}B \triangle B)) = 0$.

依此类推可得 $m(T^{-(k+1)}B \triangle T^{-k}B) = 0, \forall k \in \mathbb{N}$.

这表明 $B, T^{-1}B, T^{-2}B, \dots, T^{-k}B, \dots$ 中任意两个集合之间只相差 1 个零测集.

因此 $\forall A_n, m(A_n \triangle B) = 0 \Rightarrow m(E \triangle B) = 0 \Rightarrow m(B) = m(E) = 0$ 或 1 .

$$(2) \Rightarrow (3): \forall A \in \mathcal{B}, m(A) > 0, \text{ 令 } E = \bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-n}A.$$

$$T^{-1}E = \bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-(n+1)}A = \bigcup_{n=2}^{\infty} T^{-n}A \subseteq E.$$

又由于 $m(E) = m(T^{-1}E) \Rightarrow m(T^{-1}E \triangle E) = 0 \xrightarrow{\text{条件(2)}} m(E) = 0 \text{ 或 } 1.$

$$\text{而 } m(E) = m\left(T^{-1}\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} T^{-n}A\right)\right) = m\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} T^{-n}A\right) \geq m(A) > 0.$$

$$\text{因此 } m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} T^{-i}A\right) = 1.$$

$$(3) \Rightarrow (4): \forall A, B \in \mathcal{B}, m(A) > 0, m(B) > 0, \text{ 由 (3) 可知 } m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-n}A\right) = 1.$$

$$\text{所以 } m\left(B \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} T^{-i}A\right) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (B \cap T^{-n}A)\right) \xrightarrow{\text{可列可加性}} \sum_{n=1}^{\infty} m(B \cap T^{-n}A) > 0.$$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}, m(T^{-n}A \cap B) > 0.$$

(4) $\Rightarrow$ (1): 设 $B \in \mathcal{B}, T^{-1}B = B$, 如果 $m(B) \in (0, 1)$, 那么令 $A = X \setminus B$, 有 $m(A) > 0$.

$$T^{-1}A = T^{-1}(X \setminus B) = T^{-1}X \setminus T^{-1}B = X \setminus B = A \Rightarrow T^{-n}A = A,$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, m(T^{-n}A \cap B) = m(A \cap B) = m((X \setminus B) \cap B) = 0. \text{ 与 (4) 矛盾!}$$

□

从直观上理解, 遍历映射的定义和结论 2 是说在该映射下几乎保持不变的集合要么几乎是全集, 要么几乎是空集. 结论 3 和结论 4 是在说任意一个正测度的集合在映射的作用下会遍历几乎整个空间. 只不过结论 3 只从集合本身出发, 而结论 4 利用两个正测度的集合的关系来描述遍历性.

定理 2.5 (遍历映射的等价函数刻画)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T: (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 是保测映射, 则以下结论等价:

(1) T 是一个保测遍历映射

(2) $\forall f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 是可测函数, 若 $f \circ T = f$ a.e., 那么 $f = \text{const}$ a.e.

(3) $\forall f \in L^2(X, \mathcal{B}, m)$, 如果 $f \circ T = f$ a.e., 那么 $f = \text{const}$ a.e.



证明 (2) $\Rightarrow$ (3): 由平方可积函数定义可得.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $B \in \mathcal{B}, T^{-1}B = B$, 考虑 $f = \chi_B \in L^2(X, \mathcal{B}, m)$.

$$\Rightarrow \chi_{T^{-1}B} = \chi_B \Rightarrow \chi_B \circ T = \chi_B \Rightarrow \chi_B = c \text{ a.e.}$$

因为 χ_B 是特征函数, 故 $c = 0$ 或 $1 \Rightarrow m(B) = \int \chi_B dm = 0$ 或 1 .

(1) $\Rightarrow$ (2): 设 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $f \circ T = f$ a.e..

设存在 $S \subseteq X, m(S) = 0$ 使得 $f(Tx) = f(x), \forall x \in X \setminus S$.

令 $E_c = \{x \in X | f(x) \geq c\} (\forall c \in \mathbb{R})$.

$$\forall y \in T^{-1}E_c \setminus S, f(y) = f(Ty) \geq c \Rightarrow y \in E_c.$$

因此 $T^{-1}E_c \setminus S \subseteq E_c$, 由保测映射 $m(T^{-1}E_c) = m(E_c) \Rightarrow m(T^{-1}E_c \triangle E_c) = 0$.

由定理 2.4(2) 可得 $m(E_c) = 0$ 或 1 .

取 $c_0 = \inf\{c | m(E_c) = 0\}$, 则 $f = c_0$ a.e..

□

下面看几个常见的遍历映射的例子.

例 考虑旋转映射 $X = [0, 1), X \rightarrow X$, 我们的问题是在 $(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 上 R_α 是否是一个遍历映射.

我们有两种方法对这一问题进行解答, 第一种方法为直接使用遍历映射的定义.

从定义来看, 如果 R_α 是一个遍历映射, 那么对于任意满足 $R_\alpha^{-1}(B) = B$ 的可测集 B 是零测集或是全测集.

这一方法的核心思路是把 $[0, 1)$ 表示成一个圆周 S^1 . 这样这个映射作用在 S^1 上是一个旋转变换, 因此可以通过分析点的旋转来判断是否是遍历映射.




图 2.5: $[0, 1)$ 表为圆周

(1) 当 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 时, $\alpha = \frac{n}{m} (m \in \mathbb{N}^+, n \in \mathbb{Z}, (m, n) = 1)$.

此时 R_α 是一个周期映射, 周期为 n , 故 $\forall n \in X, R_\alpha^n(n) = n$.

则 $\left\{0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, \frac{(m-1)}{m}\right\}$ 是 X 的一个周期轨道.

下面在该周期轨道中的每一个附近选取一个测度相等的小邻域, $B = (-\varepsilon, \varepsilon) \cup \left(\frac{1}{m} - \varepsilon, \frac{1}{m} + \varepsilon\right) \cup \dots \cup \left(\frac{m-1}{m} - \varepsilon, \frac{m-1}{m} + \varepsilon\right)$.

由 R_α 的周期性可知 $R_\alpha^{-1}B = B$, 但由于邻域选取的较小, 故 $0 < m(B) < 1$, 则 R_α 不是遍历映射.

(2) 当 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 时, 一个重要的性质是此时所有轨道 $\{\{n\alpha\}_{n \in \mathbb{Z}}\}$ 在 $X = [0, 1) \cong S^1$ 中是稠密的, 这个性质可以使用抽屉原理加以证明.

下面证明当 α 为无理数时, R_α 是一个遍历映射.

设 $B \in X$ 是一个可测集, 且满足 $R_\alpha^{-1}B = B$.

如果 B 是零测集, 证毕.

如果 B 不是零测集, 即 $m(B) > 0$

那么在 B 中存在 Lebesgue 点 x_0 , 使得 $\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{m((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap B)}{2\delta} = 1$.

则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t.}, \forall r < \delta, 2r(1 - \varepsilon) \leq m((x_0 - r, x_0 + r) \cap B) \leq 2r(1 + \varepsilon)$.

取 $k \in \mathbb{Z}, \text{s.t.} \{k\alpha\} < \delta$.

现令 $2r = \{k\alpha\}$, 则 $r \in (0, \delta)$.

由 R_α 为可测映射, 所以 $R_\alpha^{-1}B = B \Rightarrow R_{k\alpha}^{-1}(B) = B$.

且 $(x_0 - r, x_0 + r) \cap B \xrightarrow{R_{k\alpha}} (x_0 - r + \{k\alpha\}, x_0 + r + \{k\alpha\}) \cap B$,

其中 $x_0 - r + \{k\alpha\} = x_0 + r, x_0 + r + \{k\alpha\} = x_0 + 3r$.

以此类推, 得到区间 $I_0 = (x_0 - r, x_0 + r), I_1 = (x_0 + r, x_0 + 3r), \dots$,

使得 $I_i \cap I_j = \emptyset, m(I_i) = m(I_j) (\forall i, j)$, 那么 $m\left(X \setminus \bigcup_i I_i\right) < 2r$.

所以 $m(B) \geq \sum_i m(I_i)(1 - \varepsilon) \geq (1 - 2r)(1 - \varepsilon)$.

令 $\varepsilon \rightarrow 0, r \rightarrow 0$ 可得 $m(B) = 1$.

因此 B 要么是零测集, 要么是全测集, R_α 是遍历映射.




图 2.6: $R_{k\alpha}$ 作用在区间上

第二个方法是利用函数来判断 R_α 是否为遍历映射.

设 $L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 是 X 上所有平方可积函数构成的空间, 则它是一个完备内积空间, 即 Hilbert 空间, 其中的内积定义为 $\langle f, g \rangle = \int_X \bar{f}g \, dm$.

$L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 中有一组标准正交基 $\{e_n = e^{2\pi i n x} | n \in \mathbb{Z}\}$, $\|e_n\| = \left(\int_0^1 |e^{2\pi i n x}|^2 \, dx \right)^{1/2} = 1$.

$\forall f \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}}), \exists c_n \in \mathbb{C}, \text{s.t. } f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \cdot e_n \Leftrightarrow \left\| f(x) - \sum_{n=-N}^N c_n e_n \right\|_{L^2} \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty)$.

其中 $f \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}}) (f: X \rightarrow \mathbb{C})$, 系数 $c_n = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} \, dx$.

(1) $\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha = \frac{n}{m} (m \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{Z}, (m, n) = 1)$.

则 $\exists f(x) = e_m = e^{2\pi i m x}, f \circ R_\alpha(x) = e^{2\pi i m(x+\alpha)} = e^{2\pi i m x} = f$.

由于 $f \neq \text{const}$, 所以 $R_\alpha: X \rightarrow X$ 不是遍历映射.

(2) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 设 $f \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 满足 $f \circ R_\alpha = f$ a.e..

则 $f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \cdot e_n$, 其中 c_n 是 f 是关于基 $\{e_m\}_{m \in \mathbb{Z}}$ 的坐标.

$f \circ R_\alpha(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{2\pi i n(x+\alpha)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (c_n e^{2\pi i n \alpha}) \cdot e^{2\pi i n x}$, 且 $f \circ R_\alpha(x) \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$.

因为 $f \circ R_\alpha = f$ a.e. $\Rightarrow f \circ R_\alpha$ 和 f 代表 $L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$ 中的同一元素, 因此二者坐标相同, 即 $c_n = c_n \cdot e^{2\pi i n \alpha}$.

由于 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, e^{2\pi i n \alpha} \neq 1 \Rightarrow c_n = 0 (n \neq 0)$.

因此 $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e_n = c_0 e_0 = c_0 \in L^2(X, \mathcal{B}_X, m_{\text{Leb}})$. 故 R_α 为遍历映射.

例 设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $\prod_{n=1}^{\infty} X_n = Y$ 是对应的乘积测度空间, $T: Y \rightarrow Y$ 为 Bernoulli

转移, $Y \xrightarrow{T} Y \quad (\cdots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \cdots) \rightarrow (\cdots, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, x_3, \cdots)$ 是遍历映射.

证明 设 $B \in \mathbb{Y}$ 满足 $T^{-1}B = B$.

$\mathcal{S} = \{\cdots \times X \times A_m \times \cdots \times A_n \times X \times \cdots | A_i \in \mathcal{B}\}$ 是一个半代数, 由它生成的 σ -代数 $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{S}))$ 是乘积 Y 上的 σ -代数.

$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}(\mathcal{S}), \text{s.t. } m(A \Delta B) < \varepsilon$, 由半代数生成代数上元素的结构可知 $A = E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_n (E_i \in \mathcal{S} \text{ 两两不交})$, 再设 $E_i = \cdots \times X \times A_{l_1}^i \times \cdots \times A_{l_2}^i \times X \times \cdots$.

则 $A = \cdots \times X \times E \times X \times X \times \cdots, E \subseteq X_{l_1} \times \cdots \times X_{l_2}$.

当 L 充分大时,

$$\begin{aligned} m(T^{-L}A \cap A) &= m(T^{-L}(E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_k) \cap (E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_k)) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq k} m(T^{-L}E_i \cap E_j) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq k} m\left(\cdots \times X \times A_{l_1}^i \times \cdots \times A_{l_2}^i \times X \times \cdots \times A_{l_1}^j \times \cdots \times A_{l_2}^j \times X \times \cdots\right) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq k} m(E_i)m(E_j) = m(A) \cdot m(A) = m(A)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{又因为 } m(A \triangle B) < \varepsilon, \quad m(T^{-L}B \cap B) &\leq m(T^{-L}B \cap A) + \varepsilon \\
&\leq m((T^{-L}A \cup T^{-L}(B \setminus A)) \cap A) + \varepsilon \\
&\leq m(T^{-L}A \cap A) + m(T^{-L}(B \setminus A)) + \varepsilon \\
&\leq m(T^{-L}A \cap A) + 2\varepsilon \\
&= m(A)^2 + 2\varepsilon \\
&\leq (m(B) + \varepsilon)^2 + 2\varepsilon
\end{aligned}$$

由假设 $m(B) = m(T^{-L}B \cap B) \leq (m(B) + \varepsilon)^2 + 2\varepsilon$.

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得 $m(B) \leq m(B)^2 \Rightarrow m(B) = 0$ 或 1 . □

2.4 Birkhoff 遍历定理

下面我们要正式介绍之前提到的 Birkhoff 遍历定理.

定理 2.6 (Birkhoff 遍历定理)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 是一个概率测度空间, $T: X \rightarrow X$ 是保测映射, 则对于 $\forall f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$, 有

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(T^k(x)) \rightarrow f^*(\text{a.e. } x \in X), \text{ 其中 } f^* \in L^1(X, \mathcal{B}, m), f^* \circ T = f^* \text{ a.e. } x \in X \text{ 且}$$

$$\int_X f^* dm = \int_X f dm$$

如果 T 是遍历映射, 那么 $f^* = \int_X f dm$ a.e.. ♡

如果定理在保测映射的情形下成立, 想要证明它在遍历映射下的情形成立是较为简单的. 若 $f^* \circ T = f^*$ a.e., 由遍历映射的等价刻画可知 $f^* = c(\text{a.e.})$, 进而 $f^* = c = \int_X f^* dm = \int_X f dm$ a.e..

为了证明这个定理, 我们需要引入一些工具, 首先介绍下面的引理.

引理 2.1

设 $f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$, 记 $f_0 = 0, f_1 = f, f_2 = f + f \circ T, \dots, f_n = f + f \circ T + \dots + f \circ T^{n-1}$.

定义 $F_N = \max_{0 \leq n \leq N} f_n$, 那么 $\int_{\{F_N > 0\}} f dm \geq 0$. ♡

证明 $f_k = f + f \circ T + \dots + f \circ T^{k-1}, f_k \circ T = f \circ T + \dots + f \circ T^k = f_{k+1} - f$, 所以 $f = f_{k+1} - f_k \circ T$.

$$\text{则 } F_N \circ T = \max_{0 \leq n \leq N} \{f_n \circ T\} = \max_{0 \leq n \leq N} \{f_{n+1} - f\} = \max_{0 \leq n \leq N} f_{n+1} - f.$$

$$\text{因此 } f = \max_{0 \leq n \leq N} f_{n+1} - F_N \circ T \geq \max_{1 \leq n \leq N} f_n - F_N \circ T.$$

在 $\{F_N > 0\}$ 上, 由于 $f_0 = 0$, 所以 $\max_{1 \leq n \leq N} f_n = \max_{0 \leq n \leq N} f_n = F_N \Rightarrow f \geq F_N - F_N \circ T$.

$$\text{积分得 } \int_{\{F_N > 0\}} f dm \geq \int_{\{F_N > 0\}} F_N dm - \int_{\{F_N > 0\}} F_N \circ T dm. \quad \square$$

$$\begin{aligned}
&\underline{\underline{F_N, F_N \circ T \geq 0}} \int_X F_N dm - \int_X F_N \circ T dm \\
&\underline{\underline{T \text{ 保测}}} 0
\end{aligned}$$

使用该引理，我们可以证明如下的极大遍历定理。

定理 2.7 (极大遍历定理)

设 $(X, \mathcal{B}, m)$ 为概率测度空间， $T: X \rightarrow X$ 为保测映射， $g \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$ ， $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ ，定义

$$E_\alpha = \left\{ x \in X \left| \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(T^k x) > \alpha \right. \right\}$$

则 $\int_{E_\alpha} g \, dm \geq \alpha m(E_\alpha)$ 。

如果 $T^{-1}A = A$ ($A \subseteq X$)，那么 $\int_{E_\alpha \cap A} g \, dm \geq \alpha m(E_\alpha \cap A)$ ，其中的保测映射为 $T|_A: A \rightarrow A$ 。



证明 设 $f = g - \alpha$ ，令 $f_0 = 0, f_1 = f, f_2 = f + f \circ T, \dots, F_N = \max_{0 \leq n \leq N} f_n$ ，则由引理 2.1 可知

$$\int_{\{F_N > 0\}} f \, dm \geq 0 \quad (\forall N \in \mathbb{N}).$$

$$\begin{aligned} \text{则 } E_\alpha &= \left\{ x \in X \left| \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i x) > 0 \right. \right\} = \left\{ x \in X \left| \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} f_n > 0 \right. \right\} \\ &= \left\{ x \in X \left| \sup_{n \geq 1} f_n > 0 \right. \right\} \\ &= \bigcup_{N=1}^{\infty} \{F_N > 0\}, \text{ 其中 } F_{N+1} \geq F_N \Rightarrow \{F_N > 0\} \subseteq \{F_{N+1} > 0\}. \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ ，由单调收敛定理可知 $\int \chi_{\{F_N > 0\}}(x) f \, dm \rightarrow \int \chi_{\bigcup_{N=1}^{\infty} \{F_N > 0\}}(x) f \, dm \geq 0$ 。

即 $\int_{\bigcup_{N=1}^{\infty} \{F_N > 0\}} f \, dm \geq 0$ 。

$$\Leftrightarrow \int_{E_\alpha} (g - \alpha) \, dm \geq 0 \Leftrightarrow \int_{E_\alpha} g \, dm \geq \alpha m(E_\alpha).$$

如果 $T^{-1}A = A$ ，那么考虑映射 $T|_A: A \rightarrow A$ ，则 $T|_A$ 是 $(A, \mathcal{B}|_A, m|_A)$ 上的保测映射，其中 $m|_A(E) = \frac{m(E \cap A)}{m(A)}, E \subseteq A$ 。

因此 $\int_{E_\alpha \cap A} g \, dm \geq \alpha m(E_\alpha \cap A)$ 。

□

有了以上两个工具，下面我们要正式开始证明 Birkhoff 遍历定理，证明这个定理的步骤为：

1. 利用上下极限几乎处处相等证明 $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(T^k(x))$ 几乎处处收敛于其极限函数 f^* ，过程中会

证明 f^* 是 T -不变的。

2. 利用 Fatou 引理证明 $f^* \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$ 。

3. 证明反向的不等式成立，从而积分相等。

证明 设 $f \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$ 。

- $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i(x))$ 几乎处处收敛。

记 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i(x)) = f^*(x)$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(T^i(x)) = f_*(x)$, 现证 $f^* = f_*$ (a.e. $x \in X$).

$\forall \alpha > \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{Q}$, 记 $E_{\alpha, \beta} = \{x \in X \mid f^*(x) > \alpha > \beta > f_*(x)\}$.

那么 $\{x \mid f^*(x) \neq f_*(x)\} = \bigcup_{\substack{\alpha > \beta \\ \alpha, \beta \in \mathbb{Q}}} E_{\alpha, \beta}$, 只需证 $\forall \alpha > \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, m(E_{\alpha, \beta}) = 0$.

$$E_{\alpha, \beta} = \{x \in X \mid f^*(x) > \alpha, f_*(x) < \beta\} = \left\{x \in X \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} f(T^i(x)) \right) > \alpha, f_*(x) < \beta \right\}.$$

因此 $E_{\alpha, \beta} \subseteq E_\alpha$.

下面证明 $E_{\alpha, \beta}$ 是 T -不变集 ($T^{-1}E_{\alpha, \beta} = E_{\alpha, \beta}$).

由 $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f(T^k x) = \frac{n}{n+1} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k(Tx)) \right) + \frac{1}{n+1} f(x)$, 取上极限得 $f^*(x) = f^*(Tx)$.

对 $f_*(x) = f_*(Tx)$ 同理.

$\forall x \in T^{-1}E_{\alpha, \beta}, f^*(x) = f^*(Tx) > \alpha, f_*(x) = f_*(Tx) < \beta$.

所以 $x \in E_{\alpha, \beta} \Rightarrow T^{-1}E_{\alpha, \beta} \subseteq E_{\alpha, \beta}$.

反过来, $\forall x \in E_{\alpha, \beta}, f^*(Tx) = f^*(x) > \alpha, f_*(Tx) = f_*(x) < \beta$.

所以 $Tx \in E_{\alpha, \beta} \Rightarrow x \in T^{-1}E_{\alpha, \beta} \Rightarrow E_{\alpha, \beta} \subseteq T^{-1}E_{\alpha, \beta}$.

因此 $T^{-1}E_{\alpha, \beta} = E_{\alpha, \beta}$.

由极大遍历定理可知 $\int_{E_{\alpha, \beta} \cap E_\alpha} f \, dm \geq \alpha m(E_{\alpha, \beta} \cap E_\alpha) \xrightarrow{E_{\alpha, \beta} \subseteq E_\alpha} \int_{E_{\alpha, \beta}} f \, dm \geq \alpha m(E_{\alpha, \beta})$.

又 $E_{\alpha, \beta} = \{x \in X \mid f^*(x) > \alpha, f_*(x) < \beta\} = \{x \in X \mid (-f)_*(x) < -\alpha < -\beta < (-f)^*(x)\}$.

类似地, 就有 $\int_{E_{\alpha, \beta}} -f \, dm \leq -\beta m(E_{\alpha, \beta}) \Rightarrow \int_{E_{\alpha, \beta}} f \, dm \geq \beta m(E_{\alpha, \beta})$.

因此 $\beta m(E_{\alpha, \beta}) \geq \int_{E_{\alpha, \beta}} f \, dm \geq \alpha m(E_{\alpha, \beta}) \xrightarrow{\alpha > \beta} m(E_{\alpha, \beta}) = 0$.

• 极限 f^* 是 T -不变的, $f^* \circ T = f^*$.

• $f^* \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$.

不妨设 $f \geq 0$ (一般地, $f = f_+ - f_-$, $f^* = (f_+)^* - (f_-)^*$).

由 Fatou 引理可知 $\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k(x)) \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k(x)) \, dm$.

$\Rightarrow \int_X f^* \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k(x)) \, dm \xrightarrow{T \text{ 保测}} \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \, dm = \int_X f \, dm < \infty$

$\Rightarrow f^* \in L^1(X, \mathcal{B}, m)$.

• $\int_X f \, dm \leq \int_X f^* \, dm$.

由于 $f \geq 0$, 存在单调增的简单函数列 $\{\varphi_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 逼近 f , 即 $0 \leq \varphi_k(x) \leq \varphi_{k+1}(x) \leq f(x)$

且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$.

由 LDCT 可知 $\int_X \varphi_k(x) \, dm \rightarrow \int_X f \, dm$, 因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N}, \text{s.t. } \int_X f \, dm \leq \int_X \varphi_k \, dm + \varepsilon$.

又存在 $\varphi_k^* \leq f^* (\forall k \in \mathbb{N})$, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi_k(T^n(x)) \rightarrow \varphi_k^*(x) (\text{a.e. } x \in X)$.

由于 $\varphi_k(x)$ 是有界函数, 由 LDCT 得 $\int_X \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \varphi_k(T^n(x)) dm \rightarrow \int_X \varphi_k^* dm$.

$$\xrightarrow{T\text{保测}} \int_X \varphi_k(x) dm = \int_X \varphi_k^*(x) dm.$$

$$\Rightarrow \int_X f dm \leq \int_X \varphi_k dm + \varepsilon = \int_X \varphi_k^* dm + \varepsilon \leq \int_X f^* dm + \varepsilon.$$

$$\text{令 } \varepsilon \rightarrow 0, \int_X f dm \leq \int_X f^* dm.$$

□

下面看几个与 Birkhoff 遍历定理相关的例子.

例 设 $X = [0, 1)$, $(X, \mathcal{B}, m) = ([0, 1), \mathcal{B}_{[0,1)}, m_{\text{Leb}})$, $T: X \rightarrow X$

$$x \mapsto 10 \cdot x \pmod{1}$$

可以证明 $\text{a.e. } x \in [0, 1), \forall k \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, k 出现在 x 十进制中概率为 $\frac{1}{10}$.

- 设 $k \in \{0, 1, \dots, 9\}$, $x = 0.x_1x_2x_3\cdots = \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \frac{x_3}{10^3} + \cdots$.

$$\text{则 } k = x_i \Leftrightarrow x = \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \cdots + \frac{x_i}{10^i} + \cdots = \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \cdots + \frac{x_i}{10^i} + \cdots$$

$$\Leftrightarrow 10^{i-1}x \pmod{1} = \frac{k}{10^{i-1}} + \frac{x_{i+1}}{10^i} + \cdots$$

$$\Leftrightarrow 10^{i-1}x \pmod{1} \in I_k = \left[\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10} \right)$$

$$\Leftrightarrow \chi_{I_k}(10^{i-1}x \pmod{1}) = 1$$

- $\mathbb{P}(x_i = k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{1 \leq n \leq N | x_n = k\}|}{N}$.

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{I_k}(10^{n-1}x \pmod{1})$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \chi_{I_k}(T^n x)$$

$$(\text{若 } T \text{ 遍历}) = \int_0^1 \chi_{I_k}(x) dm = \frac{1}{10}$$

下面证明 T 是遍历映射, 设 $f \in L^2(X, \mathcal{B}, m)$ 满足 $f \circ T = f$ a.e..

$$f = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n e_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n \cdot e^{2\pi i n x}.$$

$$\text{则 } f \circ T(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n e^{2\pi i n(10x)} = \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n e^{2\pi i (10n)x}.$$

由于 f 与 $f \circ T$ 代表 $L^2(X, \mathcal{B}, m)$ 同一元素 $\Rightarrow$ 坐标相同 $\Rightarrow c_k = c_{10k} (\forall k \in \mathbb{Z})$.

由 Parseval 等式 $\|f\|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 < \infty$.

如果 $k \neq 0$, $c_k = c_{10k} = c_{10^2k} = \cdots = 0$, 否则与坐标平方和有限矛盾.

故 $f = c_0 e_0 = c_0$ 为常数.

下面是更为有趣、更有意义的例子.

例 对 $x \in (0, 1)$, 考虑 x 的连分数展开, $x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$ ($a_0 = 0, a_i \in \mathbb{N}^+$).

对 $\forall k \in \mathbb{N}^+$, 计算 $\mathbb{P}(a_n = k)$.

$$\bullet \mathbb{P}(a_n = k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{1 \leq n \leq N \mid a_n = k\}|}{N}.$$

$\bullet (x > 0)$, 设 $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ 是一个自然数序列 ($a_0 \geq 0, a_i \geq 1 (i \geq 1)$), 考虑 $a_0, a_0 + \frac{1}{a_1}, a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}}, a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3}}}, \dots$.

其中第 n 个分式为 $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_n}}} = \frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$.

如果 $\left\{\frac{p_n}{q_n}\right\}$ 收敛到 $x \in \mathbb{R}_{>0}$, 那么称 $x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}} = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ 为 x 的连分式.

下面寻找连分数逼近中分子分母的规律, $\frac{p_0}{q_0} = a_0 = \frac{a_0}{1}, p_0 = a_0, q_0 = 1, \frac{p_1}{q_1} = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}, p_1 = a_0 a_1 + 1, q_1 = a_1$.

实际上, p_i, q_i 满足以下关系 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-1} & p_n \\ q_{n-1} & q_n \end{pmatrix} \forall n \in \mathbb{N}$
 $q_{-1} = 0, q_{-1} = 1$