

ACHIOTE



ACHIOTE

NOMBRE CIENTÍFICO.

Bixa orellana L.

SINÓNIMOS.

Bixa acuminata Bojer, *Bixa americana* Poiret in Lam.,
Bixa odorata Ruiz & Pav. ex G.

Don, *Bixa platycarpa* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Bixa*
tinctoria Salisb., *Bixa upatensis*

Ram. Goyena, *Bixa urucurana* Willd., *Orellana*
americana Kuntze, *Orellana Orellana*

(L.) Kuntze (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Bija, achiote, achote, bicha, onoto,
anato, urucú.



ACHIOTE

NOMBRES COMUNES: Bija, achiote, achote, bicha, onoto, anato, urucú.

Parte utilizada: Semillas

USOS TRADICIONALES.

Las hojas se emplean en casos de gonorrea, afecciones de la garganta y como antiemético. Las semillas se usan como tónico gastrointestinal, antidiarreico, purgante, estomáquico, antiprurítico, antiinflamatorio, antidiabético, febrífugo y en caso de tumores bucales y estados gripales.

La masa obtenida de las semillas se emplea por vía tópica en caso de quemaduras y otras afecciones cutáneas, especialmente para evitar la formación de ampollas



ACHIOTE

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las semillas de esta planta son ricas en un pigmento rojizo, el cual es una mezcla de carotenoides como bixina, norbixina, fitoeno y caroteno. Contienen además saponinas, compuestos fenólicos, aceites fijos, terpenoides, tocotrienoles y flavonoides, incluyendo luteolina y apigenina



ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Se evidenció actividad antiofídica del extracto etanólico de hojas y tallos (Otero R. ycol., 2000). El extracto metanólico de las hojas de achiote presentó actividad captadora de radicales libres. Igualmente, mostró actividad analgésica y antidiarreica,

ACHIOTE

INDICACIONES.

Uso externo: Antiinflamatorio, cicatrizante.

Posología.

Modo de empleo: Tópico.

Aplicar la preparación una o más veces al día

Contraindicaciones y precauciones.

Uso externo únicamente.

TOXICIDAD.

La DL50 de semillas en ratones, por vía intraperitoneal, es de 700mg/Kg (Germosén- Robineau L., 1995). En ensayos de toxicidad aguda en ratones, el extracto metanólico de hojas en dosis hasta de 4000mg/Kg, no produjo efectos tóxicos dentro del tiempo de evaluación (Shilpi J. y col., 2006).

FORMAS FARMACÉUTICAS.

Gel con extracto de semillas de achiote.



AJENJO
ARTEMISA



AJENJO

NOMBRE CIENTÍFICO

Artemisia absinthium L.

Sinónimos

Artemisia absinthium var. *insipida* Stechmann (Missouri Botanical Garden, 2007)

NOMBRES COMUNES: Ajenjo, artemisia amarga, hierba santa, absinthium.

PARTE UTILIZADA: Sumidad florida.

USOS TRADICIONALES.

Esta especie se emplea como tónico estomacal, antiespasmódico, antiácido, antihelmíntico, febrífugo, estimulante del apetito y en el tratamiento de afecciones de la vesícula biliar, obstrucciones intestinales, oxiuriasis y dermatomicosis.

Externamente se emplea como antiséptico, en tratamiento de golpes y picaduras de insectos y ulceraciones dérmicas.



AJENJO

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Aceite de color verde-azuloso que contiene flavonoides, monoterpenos como tuyona, acetato de bornilo, acetato de sabinilo, tuyol, cineol, linalol y lactonas terpénicas como absintina (principio amargo) y artabsina.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto metanólico de la planta mostró actividad hepatoprotectora en ratones (Gilani A. y col., 1995). El aceite esencial y extractos en cloroformo y acetato de etilo mostraron actividad antibacteriana, *in vitro*. El aceite esencial presentó actividad Fungicida.

Los extractos de las hojas en metanol, acetato de etilo y hexano, tienen actividad repelente contra *Loxides ricinos*.



AJENJO

INDICACIONES.

Uso interno: Estimulante del apetito, coadyuvante en el tratamiento de dispepsias, hiposecretoras, colerética.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral 2-3 g de droga diarios.

Infusión: 1-1.5g de droga en 150mL de agua, hasta tres veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Epilepsia y embarazo. Evitar su uso prolongado. Por sobredosis o uso prolongado pueden aparecer síntomas de toxicidad debidos a la tuyaona.



AJENJO

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Puede reducir la eficacia de fármacos que inhiben producción de ácido: neutralizantes, sucralfato, antagonistas H1 e inhibidores de la bomba de protones. Al administrarse con otras drogas que contengan tuyaona se incrementa el efecto tóxico de este compuesto. Los efectos del etanol pueden alterarse por acción de la tuyaona

TOXICIDAD.

La DL50 en ratones, utilizando el extracto fluido de las hojas, es de 2499mg/Kg. (Lagarto A. y col., 1995). En ratas de ambos sexos, la administración oral del extracto etanólico durante 13 semanas no ocasionó cambios apreciables que indicaran intoxicación, según los resultados de exámenes hematológicos, bioquímicos del suero y estudios histopatológicos.

FORMAS FARMACÉUTICAS.

Tabletas y cápsulas con polvo de hojas y flores de ajeno. Jarabe con extracto hidroalcohólico de hojas frescas de ajeno.





AJENJO - ARTEMISA



Universidad del
Rosario

<https://www.youtube.com/watch?v=3MFOm5NgbHw&t=23s>

ARTEMISA ¿PARA QUE SIRVE? Plantas medicinales 2019, Artemisia. Plantas alucinógenas. ajenjo

AJI



AJI

NOMBRES CIENTÍFICOS

Capsicum annuum var. *minimum*, *Capsicum frutescens* L., *Capsicum baccatum* L.

NOMBRES COMUNES:

Capsicum annuum: Ají, ají pimienta, cayena.

Capsicum frutescens: Ají de plaza, ají picante, ají común, ají pajarito.

Capsicum baccatum: Ají chivato, ají pajarito, pimienta, ají dulce, ají pimienta, pimentón, pimienta marrón.

PARTE UTILIZADA: FRUTOS.

USOS TRADICIONALES.

Los frutos son usados externamente como revulsivos y en forma de ungüento o emplasto para el tratamiento de lumbagos y neuralgias. Las preparaciones de *Capsicum* han sido usadas como rubefacientes.



AJI

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Contiene flavonoides (apiosido, luteína), aceite esencial, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2 y amidas denominadas capsaicinoides como capsaicina, dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina y homocapsaicina. La capsaicina es el principio picante e irritante que se encuentra especialmente en las paredes divisorias del fruto. El fruto contiene además carotenoides y saponinas (García Barriga H., 1975; Font Quer P., 1985; Patiño D., 1988; Blair S. y col., 1989; Vanaclocha B. y Cañigüeral S. 2003; Del Río P., 2005).

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Estudios realizados en pacientes mostraron actividad analgésica de preparaciones de Capsicum.

La capsaicina en aplicaciones tópicas presentó efectos antinociceptivos). El extracto etanólico de los frutos y la capsaicina mostraron actividad inmunomodulador.



AJI

INDICACIONES.

Uso externo: rubefaciente, analgésico, coadyuvante en el tratamiento de espasmos musculares dolorosos.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Tópico.

Administrar las preparaciones en forma líquida o semisólida por no más de dos días.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Uso externo únicamente.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

La administración concomitante con inhibidores de la MAO, puede producir intoxicación (crisis hipertensiva) debido a una liberación de catecolaminas (Fetrow C, 2000).



AJI

TOXICIDAD.

No se conocen reportes sobre estudios realizados. La sobredosificación puede causar irritación de piel y mucosas, llegando a ser vesicante; el uso prolongado sobre una misma área, puede causar daños en las células nerviosas. En contacto con la membrana ocular puede ocasionar irritación.



FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Solución hidroalcohólica de ají. Crema de capsaicina.

AJO



AJO

Nombre científico

Allium sativum L.

Sinónimos

Allium pekinense Prokhaynov

Nombres comunes : Ajo, chilote, ajo elefante

Parte utilizada: Bulbos

Usos tradicionales.

Se ha empleado como antihelmíntico, hipotensor, hipoglicemiante, antiespasmódico, hipolipemiante y para desórdenes intestinales.

Principales constituyentes.

El ajo contiene aproximadamente un 1% de aliina, un sulfóxido de la cisteína que por acción de la enzima aliinasa se convierte en alicina. Existen otros compuestos importantes, entre ellos el ajoeno, flavonoides (apigenina, quercetina y miricetina), saponinas y aminoácidos.



AJO

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

En estudios realizados en ratas a las cuales se les administraron extractos de ajo, se observó disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en plasma total.

Homogenizados de ajo mostraron actividad antiagregante plaquetaria

Diferentes estudios clínicos han mostrado la disminución de los niveles de colesterol por la administración de extractos de ajo

Extractos de ajo mostraron actividad antibacteriana y antimicótica.

La administración de cápsulas de aceite de ajo a pacientes con enfermedad arterial coronaria redujo significativamente los niveles de colesterol total y de triglicéridos.

Extractos de ajo causaron un efecto antihipertensivo en ratas.

INDICACIONES.

Uso interno: Hipotensor, coadyuvante en el tratamiento de hiperlipidemias y en la profilaxis de la aterosclerosis.



AJO

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Ajo fresco: 2-5g diarios.

Polvo deshidratado de ajo: 0.3-1.2g diarios. Aceite de ajo: 2-5mg diarios.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipersensibilidad a los componentes de la droga. Puede producir cefaleas, gastritis y diarrea por sobredosis. Puede causar dermatitis de contacto.

Interacción con otros medicamentos.

Debe considerarse el riesgo de aumento de sangrado en pacientes con terapia Anticoagulante.

TOXICIDAD.

Estudios toxicológicos y clínicos del ajo no han mostrado efectos adversos considerables.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Ajo deshidratado en polvo. Tabletas, cápsulas y grageas con ajo deshidratado. Cápsulas blandas con aceite de ajo



6 de noviembre 2024

ALBAHACA



ALBAHACA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Ocimum basilicum L.

SINÓNIMOS: *Ocimum basilicum* var *basilicum*, *Ocimum basilicum* var *citriodorum*, *Ocimum basilicum* var *crispum*, *Ocimum basilicum* var *glabratum* Benth. (Missouri Botanical Garden, 2007).

NOMBRES COMUNES: Albahaca, alhábeda, alfébeda, basílica, alfébeda, alfabeta, alfabeguera, alfalfa, albaraka.

PARTE UTILIZADA: Planta completa.

USOS TRADICIONALES.

El cocimiento y la infusión de esta planta, administrados oralmente, tienen diversos usos en el tratamiento de afecciones gastrointestinales. Las semillas son empleadas como carminativas, espasmolíticas y estomáquicas



ALBAHACA

Actividad farmacológica.

El aceite esencial presentó actividad antimicrobiana y antifúngica en ensayos con una gama variada de microorganismos (hongos y bacterias) y actividad antiagregante plaquetaria comparable a la del ácido acetilsalicílico

Estudios realizados con el aceite de *O. basilicum* permitieron determinar actividad en inflamación plantar inducida en ratas.

Indicaciones.

Uso interno: Antiflatulento, coadyuvante en el tratamiento de la distensión abdominal y dolores abdominales.

Posología.

Modo de empleo: Oral

Aceite esencial: 2 a 3 gotas, 3 veces al día, después de las comidas.

Infusión (aproximadamente 5 gramos de planta en una taza de agua): una taza después de las comidas principales.



ALBAHACA

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

El aceite esencial está contraindicado en casos de embarazo, lactancia y en niños. No deben sobrepasarse las dosis recomendadas para el aceite y la planta, en general. Se ha reportado el desarrollo de brotes de ciclosporiasis relacionados con el consumo de albahaca fresca, sin haberse logrado establecer la fuente de contaminación.

TOXICIDAD.

No se presentó respuesta genotóxica en ratones, empleando dosis del extracto de 500, 1000 y 2000mg/Kg de peso corporal (García A. y col., 2000). Se determinó la DL50 en ratones para el extracto etanólico de las hojas, dando como resultado 956.50 mg/Kg de peso (Largarto A. y col., 2001).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES:

Solución oral de extracto de albahaca. Tabletas de albahaca. Aceite esencial.



ALCACHOFA



ALCACHOFA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Cynara scolymus L.

SINÓNIMOS: *Cynara cardunculus* L. (Missouri Botanical Garden, 2007)

NOMBRES COMUNES: Alcachofa, alcachofra, alcaulera, alcaucil, alcaucique, alcancil, alcacil, morrillera, cardón.

PARTE UTILIZADA: Hojas

USOS TRADICIONALES.

La planta tiene efectos beneficiosos sobre el tracto gastrointestinal en dispepsias. Las hojas secas en decocción, tinturas, vino medicinal o extracto son empleadas para activar la vesícula, proteger el hígado, disminuir el colesterol en la sangre y facilitar la digestión



ALCACHOFA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

En la planta se encuentran flavonoides, ácidos cafeolínicos, proteínas, ácidos glutámico y aspártico, calcio, fósforo, potasio, sodio, ácido fólico y vitaminas C y del complejo B. Se encuentran además carotenoides, compuestos fenólicos, sesquiterpenos, fitosteroles, taninos, azúcares, almidón, inulina y antocianinas, las cuales son responsables de la coloración de las cabezas de la alcachofa. En las hojas y las flores se encuentran sesquiterpenlactonas y algunos pigmentos. La planta contiene un aceite esencial con alto contenido de sesquiterpenos.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Un extracto acuoso demostró inhibir la biosíntesis del colesterol en ratas. Se evaluaron extractos alcohólicos y acuosos de alcachofa sobre el estrés oxidativo intracelular y se comprobó que la planta tiene un marcado efecto protector. El liofilizado de la infusión de las hojas presentó actividad scavenger contra los radicales superóxido, hidroxilo y el ácido hipocloroso.



ALCACHOFA

Se comprobó un efecto hepatoprotector de extractos de hojas de alcachofa, en ratas se comprobó, igualmente, un efecto antihiperlipidémico del extracto metanólico de las hojas.

En un estudio clínico se determinó un descenso de los niveles de colesterol total y LDL.

INDICACIONES.

Uso interno: Colerético, colagogo, coadyuvante en el tratamiento de dispepsias.

POSOLOGÍA

Modo de empleo: Oral

1 a 4 gramos tres veces al día, de hojas, tallos o raíces.

Infusión: Una taza 4 veces al día después de las comidas.

Tintura (4:1): 3-4 mL, dos veces al día.



ALCACHOFA

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Lactancia. Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Niños menores de 12 años.

Las tabletas de alcachofa en combinación con boldo se contraindican en casos de embarazo, estenosis u obstrucción del tracto digestivo, oclusión intestinal posible o existente, síntomas de apendicitis y demás estados dolorosos e inflamatorios del aparato digestivo. El contacto frecuente con la planta puede generar reacciones alérgicas en individuos sensibles.

TOXICIDAD.

Estudios realizados en pacientes no reportaron efectos adversos luego de la administración de extracto seco de alcachofa

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Extracto y tintura de hojas de alcachofa. Tabletas de hojas de alcachofa. Polvo para infusión.





<https://www.youtube.com/watch?v=OcBDBC869kE>

Alcachofa propiedades beneficios contraindicaciones y precauciones en dieta.

ALGARROBO



ALGARROBO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Hymenaea courbaril L.

SINÓNIMOS: *Hymenaea animifera* Stokes, *Hymenaea candolleana* Kunth, *Hymenaea*

multiflora Kleinhoonte, *Hymenaea resinifera* Salisb., *Hymenaea retusa* Wild. ex Hayne, *Hymenaea stilbocarpa* Hayne, *Inga megacarpa* M.E. **Nombres comunes:** Algarrobo, algarroba, algarrobillo, copa, copal, guapinol, nazareno, jatuba, curbaril.

PARTE UTILIZADA: Corteza.

USOS TRADICIONALES.

El té preparado con la corteza es usado para el control de parásitos intestinales y tratamiento de indigestión e infecciones urinarias. La infusión se emplea para el estreñimiento y gases intestinales. La corteza se utiliza en casos de tos, bronquitis, micosis superficiales, heridas infectadas, cistitis, prostatitis, diarrea, fiebre, dispepsia, reumatismo, diabetes.



ALGARROBO

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

La planta contiene taninos, flavonoides, esteroides, catequina, resina aromática, diterpenos y sesquiterpenos como β -bisabolenol, cadinol y cariofilol.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

La decocción de la corteza mostró un efecto diurético.

La fracción acuosa produjo descenso de la glicemia en ratones.

Extractos etanólicos de la corteza y la resina mostraron actividad antimicrobiana.

El extracto etanólico del pericarpio inhibió el edema plantar inducido por carragenina. La resina y extractos en etanol y acetona de la corteza presentaron actividad insecticida.

INDICACIONES.

Uso interno: antiséptico.



ALGARROBO **POSOLOGÍA.**

Modo de empleo. Oral

Decocción: una taza 1-3 veces al día

Tintura (4:1): 1-3mL dos veces al día

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Usar bajo supervisión médica en personas diabéticas.

TOXICIDAD.

De acuerdo con la ausencia de mortalidad durante los ensayos, se concluye que la DL50 aguda del extracto etanólico de la planta, por vía oral, es superior a 2000mg/Kg.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS **PREPARACIONES**

Tintura 4:1. Infusión. Decocción



AMANSATOROS



AMANSATOROS

NOMBRE CIENTÍFICO.

Justicia pectoralis Jacq.

SINÓNIMOS: *Dianthera pectoralis*

Dianthera pectoralis

Murria, *Ecbolium pectoralis*

Psacadocalymma pectoralis

NOMBRES COMUNES:

Amansatoros, curíbano, anador, chamba, amansaguapos, carpintero, yakayú, tilo criollo, tilo, te criollo, carpintero, hierba de San Antonio.

Parte utilizada: Partes aéreas

USOS TRADICIONALES.

La planta es empleada en forma de infusión y tintura para el tratamiento de cefaleas, dolores musculares, resfriados, problemas de la próstata, dolores menstruales, tos, bronquitis, fiebre, cólicos abdominales, heridas, úlceras, enfermedades nerviosas, insomnio y como expectorante



AMANSATOROS

PRINCIPALES CONSTITUYENTES

Cumarinas (dihidrocumarina y umbeliferona), flavonoides, saponinas, taninos, antraquinonas, aminoácidos, β -sitosterol y flavonas glucosidadas

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto hidroalcohólico y la umbeliferona aislada de esta planta, reducen la inflamación inducida por carragenina. El extracto hidroalcohólico de las hojas mostró actividad antinociceptiva en ratones.

El extracto etanólico de las hojas mostró actividad broncodilatadora en cobayos

El polvo de la planta presentó actividad antioxidante *in vitro*.

La decocción acuosa y el extracto etanólico producen depresión del SNC

INDICACIONES.

Uso interno: Sedante.



AMANSATOROS

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

20-60mg de droga al día.

Decocción o infusión: 240mL al día, repartidos en dos tomas.

Contraindicaciones y precauciones.

Embarazo y lactancia. No exceder el uso por más de 30 días.

Interacción con otros medicamentos.

No administrar conjuntamente con anticoagulantes o en pacientes con trastornos de la coagulación.

TOXICIDAD.

El uso de la decocción de las partes aéreas por vía oral, en un ensayo clínico, no indujo signos o síntomas de toxicidad ni intolerancia clínicamente evidenciables, durante un período de 20 días de tratamiento consecutivo.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Infusión. Decocción.



ANAMU



ANAMU

NOMBRE CIENTÍFICO.

Petiveria alliacea L.

SINÓNIMOS: *Petiveria foetida* Salisb (Missouri Botanical Garden, 2007)

NOMBRES COMUNES: Anamú, apacin, mapurito, ajillo, zorrillo, hierba hedionda,

jazmillo, mazote, chanviro, mucurá, tipi, raíz de pipí, anamo, urgat.

PARTE UTILIZADA: Planta completa, especialmente hojas.

USOS TRADICIONALES.

La planta se emplea en el tratamiento de estados gripales, dismenorrea, inflamaciones e infecciones bacterianas. La hojas se usan como antiespasmódico, analgésico, hipoglicemiante, abortivo, sudorífico, diurético, sedante, antihelmíntico, emenagogo, anticancerígeno, antitusivo, cicatrizante, antimalárico, antipirético, antirreumático, insecticida y en tratamiento de enfermedades venéreas, desórdenes uterinos y gastrointestinales y afecciones de la piel.



ANAMU

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

La planta contiene trisulfuros, aceite esencial, triterpenos, esteroides, alcaloides, flavonoides, taninos, cumarinas, alantoína y ácidos oleico, linolénico, palmítico, esteárico y lignocérico.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Extractos etanólico y en hexano mostraron escasa actividad contra *Trypanosoma cruzi* (Berger I. y col., 1998).

El extracto fluido presentó significativa actividad dosis dependiente, frente a *Giardia lamblia* (Echevarría A. y col., 2001).

El extracto etanólico de la planta mostró efecto inmunomodulador, *in vitro*. Se evidenció efecto inhibidor sobre proliferación tumoral, particularmente sobre líneas celulares leucémicas, pero no sobre células de carcinoma hepatocelular humano.

Extracto de las raíces en diclorometano indujo toxicidad sobre células de cáncer de próstata y leucemia mieloblástica, mientras que el extracto acuoso sólo indujo citotoxicidad sobre las últimas.

El extracto butanólico de las hojas mostró actividad antioxidante *in vitro*, dependiente de la dosis (Pérez R. y col., 2006).



ANAMU

INDICACIONES.

Uso interno: Coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios.

Uso externo: Antiinflamatorio local de la mucosa bucal.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

1 g de polvo de droga diarios.

Modo de empleo: Tópico

Enjuague bucal con extracto de hojas de anamú: administrar una o varias veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo, lactancia.

Extracto de hojas de anamú en polvo. Tabletas de anamú en polvo (planta completa).

Solución para enjuague bucal con extracto de hojas de anamú.



ANAMU

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

El uso concomitante de hipoglicemiantes orales o insulina con formulaciones de la planta puede ser perjudicial por sospecha de una eventual potenciación del efecto hipoglicemiante.

TOXICIDAD.

La DL50 es de 1.7g/kg en ratones, por vía intraperitoneal. Se reporta que la planta es tóxica para el ganado.

Se observó leve toxicidad en ratones por administración del extracto acuoso de hojas de anamú.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Extracto de hojas de anamú en polvo. Tabletas de anamú en polvo (planta completa).

Solución para enjuague bucal con extracto de hojas de anamú.



ANIS



ANIS

NOMBRE CIENTÍFICO.

Pimpinella anisum L.

Sinónimos: *Corum anisum* , *Selinum anisum* , *Sison anisum* Spreng,
Tragium anisum, *Anisum vulgare* Gaertn, *Apium anisum*

NOMBRES COMUNES: Anís.

Parte utilizada: Frutos y semillas.

USOS TRADICIONALES.

El aceite tiene propiedades antisépticas y es repelente de insectos. Las hojas se utilizan para aliviar la tos y el dolor de cabeza y en el tratamiento de trastornos intestinales, flatulencia y dispepsia.



ANIS

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

El aceite esencial está constituido en su mayor parte por anetol, metilchavicol, furanocumarinas (umbeliferona), trazas de hidrocarburos terpénicos y cetonas, estigmasterol, flavonoides, colina, limoneno, paracimeno y anisaldehído

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El aceite esencial, el extracto acuoso y el extracto etanólico mostraron actividad broncodilatadora (Boskabady M. y col., 2001). El extracto hidroalcohólico reduce las contracciones inducidas por acetilcolina, en músculo liso de rata (Tirapelli C. y col., 2007).

INDICACIONES.

Uso interno: Antiflatulento. Tratamiento de trastornos dispépticos.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Aceite esencial : 0.3g/día o dosis equivalentes de preparados.

Infusión : 1-5g de frutos triturados en 150mL de agua, varias veces al día.



ANIS

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipersensibilidad a sus componentes. Evitar su uso prolongado, puede producir fotosensibilización. El aceite esencial, a dosis elevadas o prolongadas, puede producir efectos convulsivantes, provocar paresias musculares, congestión cerebral. Puede originar reacciones de hipersensibilidad cutánea (dermatitis vesicular), respiratoria y gastrointestinal (Vanaclocha B. Cañigual S., 2003).

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

No debe administrarse concomitantemente con estrógenos o progestágenos.

TOXICIDAD.

No se conocen reportes sobre estudios realizados.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Cápsulas con semillas pulverizadas de anís. Infusión de frutos pulverizados. Aceite esencial.



APIO



APIO

Nombre científico

Apium graveolens L.

Sinónimos : *Apium integrilobum* Hayata, *Apium vulgare* Bubani, *Carum graveolens*

(L.) Koso-Pol, *Celeri graveolens* (L.) Britton, *Selinum graveolens* Krause, *Seseli*

graveolens Scop, *Sium apium* Roth, *Sium graveolens*

Nombres comunes : Apio

Parte utilizada : Partes aéreas.

Usos tradicionales

La planta fresca o seca se emplea como aperitivo, eupéptico, carminativo y relajante en el insomnio. También es empleada como antiinflamatorio y antiflatulento



APIO

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las hojas, frutos y tallos son ricos en aceite esencial compuesto por limoneno, apiol, otros terpenos como p-cimeno, β -pineno, β -terpineol, β -cariofileno, α -santalol, ácidos linoleico, oleico y palmítico y selineno. Se ha detectado la presencia de alcaloides, cumarinas C-preniladas y furanocumarinas. Las hojas contienen alcaloides, flavonoides, taninos, esteroides, triterpenoides y lactonas; en las semillas se encuentran alcaloides, saponinas, estereoides, triterpenoides, lactonas y terpenos

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Compuestos aislados de la fracción en hexano del extracto metanólico de las semillas de la planta mostraron actividad inhibidora de la ciclo-oxigenasa, de las topoisomerasas I y II y actividad antioxidante.

El extracto metanólico de las semillas mostró tener un amplio potencial anticancerígeno y antiproliferativo.



APIO

INDICACIONES.

Uso interno: Antiinflamatorio.

Posología.

Modo de empleo: Oral

Tintura (1:10): 50 a 100 gotas, una a tres veces al día.

Extracto fluido (1:1): 15 a 30 gotas, dos veces al día.

Infusión: Una taza, tres veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo. Puede producir fotosensibilización. Puede ocasionar reacciones alérgicas relativamente graves en personas sensibles.

TOXICIDAD.

No se han reportado estudios sobre el particular.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Tintura 1:10. Extracto fluído 1:1. Infusión.



ARNICA



ARNICA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Arnica montana L.

Sinónimos: No se conocen (Missouri Botanical Garden, 2007)

Nombres comunes: Arnica de las montañas, estornudadera, tabaco de montaña, quina de los pobres.

Parte utilizada: Flores

USOS TRADICIONALES.

La planta se emplea como antiequimótica, cicatrizante, antiinflamatoria, analgésica y antineurálgica. Por vía tópica se usa en forma de infusión o tintura aplicada en compresas en caso de contusiones, inflamación por flebitis, hematomas y neuralgias.

La infusión de las hojas frescas o de las flores frescas o secas se emplea para aliviar el dolor reumático, contusiones y esguinces. A la arnicina que se encuentra en las flores y el rizoma, se le atribuye propiedad rubefaciente.



ARNICA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Los principales constituyentes de la planta son las sesquiterpenlactonas helenalina y $11\alpha,13$ -dihidrohelenalina. Las flores contienen además, flavonoides (isoquercitrina y astragalina), derivados del ácido quínico y arnicina. El aceite esencial que puede ser obtenido de las raíces, de los rizomas o de las flores, está constituido especialmente por timol y sus derivados, otros terpenos y sesquiterpenos y ácidos grasos como palmítico, linoleico, mirístico y linolénico.

Las preparaciones de las flores de árnica presentan actividad analgésica e Inmunomoduladora. Estas preparaciones han mostrado actividad en el tratamiento de enfermedades inflamatorias postraumáticas, siendo las lactonas sesquiterpénicas los compuestos que median la actividad antiinflamatoria.

INDICACIONES.

Uso externo: Antiinflamatorio y analgésico, tratamiento de golpes, esquinces, contusiones, inflamaciones causadas por picaduras de insectos, dolores musculares.



ARNICA

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Tópico

Aplicar la preparación una o más veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipersensibilidad a los componentes de la planta, heridas abiertas. El uso prolongado puede causar dermatitis edematosa con formación de vesículas.

TOXICIDAD.

Estudios en animales han demostrado que la administración del extracto de árnica por vía interna tiene efectos sobre el sistema circulatorio y el corazón y causa un gran incremento de la presión sanguínea (Tyler V., 1993). Las sesquiterpenlactonas de esta especie son cardiotoxinas en animales de experimentación (DerMardesorian A. y col., 2002).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Extracto blando de Arnica. Solución tópica. Tintura. Linimentos. Ungüentos. Geles.



AVENA



AVENA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Avena sativa L.

SINÓNIMOS: *Avena anglica* Hort, *Avena byzantina* K.Koch

Avena ponderosa L ex B.D. Jacks, *Avena unilateralis* Brouss,

Nombres comunes: Avena.

Parte utilizada: Sumidad florida, hojas y semillas

USOS TRADICIONALES.

La harina de las semillas está considerada como una fuente rica en salvado y fibra, cuya ingesta reduce los niveles séricos de colesterol. Preparaciones para uso tópico se utilizan en el tratamiento de irritaciones leves de la piel como exantemas, psoriasis, quemaduras y eczema.



AVENA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

En las hojas se encuentra óxido de silicio, ésteres del ácido silícico con polifenoles,

oligosacáridos, saponinas estereoidales, betaína y glicina. En las flores se encuentran

flavonas. Las semillas contienen fenoles, vainillina y ácidos p-hidroxibenzoico, vainílico, caféico, p-cumárico y ferúlico, además de los alcaloides trigonelina y avenina.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Actividad antioxidante.

Ensayos clínicos han demostrado que la administración de avena disminuye los niveles plasmáticos de colesterol de los pacientes.

Estudios *in vitro* permitieron demostrar actividad de la avena en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel.

INDICACIONES.

Uso interno: Aporte de fibra para favorecer la digestión.



AVENA

POSOLOGÍA

Modo de empleo: Oral

50-100g de avena diarios.

Tintura 1:5 en alcohol: 1-7 mL, tres veces al día.



CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Utilizar con cautela en pacientes con obstrucción intestinal u otros síntomas de disminución de la motilidad intestinal. Puede producir dermatitis de contacto, distensión abdominal, flatulencia, irritación perineal

En casos esporádicos se ha presentado hipersensibilidad al gluten de la avena

TOXICIDAD.

No se encuentran reportes sobre estudios realizados.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Tabletas de avena. Polvo para reconstituir. Tintura 1:5.

AZUCENA



AZUCENA

NOMBRE CIENTÍFICO

Lilium candidum L.

SINÓNIMOS: No se reportan (Missouri Botanical Garden, 2007)

NOMBRES COMUNES: Azucena, lirio blanco, flor de la virgen.

PARTE UTILIZADA: Flores

USOS TRADICIONALES.

El aceite de la planta se emplea como emoliente, para curar quemaduras, úlceras, manchas cutáneas, pecas, eczemas y otras imperfecciones de la piel; el té de las flores sirve como sudorífico y la tisana, como diurético. El polen es estimulante y antiespasmódico.

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Los bulbos y las flores contienen ácidos orgánicos, flavonoides, esteroides, glicósidos y compuestos nitrogenados. Del polen se han aislado aminoácidos y ácidos ribonucleicos.

De los pistilos y estambres se aislaron ácidos itacónico, succínico, metilsuccínico y fumárico; de los pétalos, saponinas y lilalina



ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Compuestos aislados del extracto etanólico de las flores y el bulbo presentaron actividad inhibidora de la lipooxigenasa

INDICACIONES.

Uso externo: Despigmentador de la piel

POSOLOGÍA

Modo de empleo: Tópico

Ungüento y loción: aplicar varias veces al día

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Sólo para uso externo.

TOXICIDAD.

No se conocen reportes sobre estudios realizados.

FORMAS FARMACÉUTICAS.

Loción . Ungüento con extracto de las flores.



BALSAMINA



BALSAMINA



NOMBRE CIENTÍFICO.

Momordica charantia L.

Sinónimos: *Cucumis argüi* H. Lav., *Momordica chilensis* Spreng, *Momordica elegans*

Salisb, *Momordica indica* L., *Momordica operculata* Vell, *Momordica sinensis* Spreng.(Missouri Botanical Garden, 2007).

NOMBRES COMUNES: Balsamina, bejuco de coje, subicogen, pepinillo, pepino cimarrón.

PARTE UTILIZADA: Toda la planta

BALSAMINA

USOS TRADICIONALES.

La planta se emplea como **antidiabético**, antiparasitario, emenagogo, antihelmíntico, antimicótico, antirreumático, antihipertensivo, antimalárico, carminativo, colerético, antipirético y antiflatulento. También se emplea en casos de litiasis, ictericia, leucorrea y neumonía. La infusión de la planta entera se usa en el tratamiento de escabiosis y prurito. El fruto tiene como uso tradicional laxante, emenagogo, antihelmíntico y se emplea para el tratamiento de la anorexia, asma, bronquitis, diabetes, dismenorrea y reumatismo. En forma de jalea o jarabe se usa contra la fiebre y el paludismo. El cocimiento de los frutos se utiliza como emético. Los frutos maduros se emplean en el tratamiento de úlcera péptica y externamente en la cicatrización de heridas, aplicados en forma de cataplasma



BALSAMINA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las hojas contienen alcaloides, esteroides, terpenoides, flavonoides, saponinas, compuestos fenólicos, taninos y triterpenos. El fruto contiene triterpenos pentacíclicos,

(momordicina, momordicinina, momordicilina), esteroides, aminoácidos, alcaloides, ácido ascórbico, citrulina y niacina .

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Estudios *in vitro* e *in vivo* mostraron actividad antiinflamatoria de los extractos de los tallos, hojas y frutos verdes y maduros de la planta

Numerosos estudios en animales y en humanos determinaron actividad hipoglicemiante de la planta.

La actividad inhibidora de la xantina oxidasa por parte del extracto de la planta puede disminuir la generación de ácido úrico y superóxido.



BALSAMINA

INDICACIONES.

Uso interno: Coadyuvante en el tratamiento dependiente

POSOLÓGÍA.

Modo de empleo: Oral

Polvo del fruto: 1-1.5g/día.

Infusión 2-4g: 2-3 veces al día.

Tintura 1:10 en etanol : 2-4 mL

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Hipoglicemia, cetoacidosis diabética, embarazo, lactancia, niños, daño renal y hepático.



BALSAMINA

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

La planta puede potenciar el efecto de los hipoglicemiantes (Bash E. y col., 2003).

Puede producir efectos teratogénicos. Las semillas y la cáscara contienen lecitinas tóxicas que inhiben la síntesis de proteínas de la pared intestinal. Individuos con insuficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa tienen el riesgo de desarrollar favismo. La administración oral del extracto puede producir cambios histopatológicos en el hígado.

Se ha reportado cefalea después de la ingestión de semillas. Se debe evitar el consumo por parte de pacientes con antecedentes de alergia a la planta o a las plantas de la familia Cucurbitaceae



BALSAMINA

TOXICIDAD.

La DL 50 de la decocción, por vía oral, es de 3g/Kg. La DL50 del extracto etanólico, por vía intraperitoneal en ratón, es de 681mg/Kg (Cáceres A., 1986). Se reportó efecto teratogénico de las momorcharinas en cultivos de embriones de ratón (Grover K. y Yadav S., 2004).



FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Cápsulas con extracto 1:1 de hojas de balsamina en etanol. Tintura 1:10. Infusión.

BELLADONA



BELLADONA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Atropa belladonna L.

Sinónimos: No se encuentran reportados (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Belladona, botón negro.

Parte utilizada: Hojas.

USOS TRADICIONALES.

Se usa principalmente por vía oral como sedante y para inhibir secreciones.

La planta tiene propiedades midriáticas, antiespasmódicas, sedantes y narcóticas; disminuye algunas secreciones por lo que se emplea en el tratamiento de sudores nocturnos y secreción excesiva de ácido clorhídrico en el estómago. Algunas preparaciones de la planta son empleadas para el asma, bronquitis, úlceras gástricas, cálculos renales, neuralgias y reumatismo (Duke J., 1985; Font Quer P., 1985).



BELLADONA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las hojas contienen taninos y alcaloides: atropina, hiosciamina, escopolamina (hioscina) y apoatropina. Contienen además ácido succínico, asparagina, colina, metilcanferol y fitosterol

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

La belladona y sus preparados tienen actividad parasimpaticolítica bloqueando el efecto de la acetilcolina; actúan sobre el corazón produciendo taquicardia y sobre la musculatura lisa produciendo relajación, parálisis de los uréteres e inhibición de las contracciones uterinas. Ocasionan además midriasis y reducción de las secreciones glandulares (saliva, lágrimas, sudor). La escopolamina posee actividad sedante e hipnótica y potencia la acción de los neurolépticos y antiparkinsonianos (Vanaclocha B. y col., 2003).

BELLADONA

POSOLOGÍA.

Modo de empleo : Oral

Tintura de belladona: 30-120 gotas/día.

Extracto de belladona: 0.015-0.03g/día.

Infusión de la planta seca: 30-100mg.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Glaucoma, obstrucción intestinal, hipertrofia prostática y cardiopatías. Embarazo y lactancia. La sobredosificación puede producir debilidad muscular, taquicardia, midriasis, sequedad de las mucosas, hipertermia debida a la inhibición de la sudoración, alucinaciones, delirios, incoordinación motora, convulsiones, somnolencia y coma. El consumo con alcohol puede producir retardo de la función cerebral.



BELLADONA

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

La belladona disminuye la velocidad de absorción de algunos fármacos y alimentos.

Debido a que contiene atropina pueden presentarse interacciones con antidepresivos tricíclicos. El efecto de la Cisaprida puede quedar bloqueado. Puede potenciar el efecto de medicamentos inotrópicos, especialmente procainamida.

TOXICIDAD

No se conocen reportes sobre estudios realizados.

FORMAS FARMACÉUTICAS

Tintura de belladona. Extracto seco. Extracto fluido.

BOLDO



BOLDO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Peumus boldus Molina

Sinónimos: No se encuentran reportados (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Boldo.

Parte utilizada : Hojas.

USOS TRADICIONALES.

Las hojas y el té son usados especialmente para afecciones hepáticas como ictericia y para la dispepsia. También hay referencias de su uso como colerético y hepatotónico. La infusión se emplea para tratar problemas estomacales y hepáticos



BOLDO

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las hojas y la corteza contienen al menos 17 alcaloides derivados de la aporfina y la noraporfina, entre ellos boldina, laurotetanina, coclaurina e isocordina. Se encuentran además flavonoides, glicósidos (boldoglucina), taninos y un aceite esencial, el cual contiene α y β pineno, canfeno, sabineno, limoneno, p-cimeno, linalol, alcanfor y ascaridol, entre otros compuestos

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto alcohólico de la planta mostró hepatoprotección significativa en ratas.

La boldina mostró efecto antiinflamatorio, dosis dependiente, en edema inducido por carragenina, en ratas y cobayos las hojas, la boldina y el aceite esencial mostraron actividad colerética y diurética.



BOLDO

INDICACIONES.

Uso interno: Laxante. Colerético. Coadyuvante en el tratamiento de dispepsias y disfunciones hepatobiliares menores.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo : Oral.

La dosis diaria promedio es de 3.0 g de la hoja seca.

Extracto fluido: 1-3 mL diarios.

Tintura: 0.5 – 1.0 mL diarios.

Se prepara la infusión adicionando 1-2 g a agua hirviendo, como colerético se toma una taza dos o tres veces al día (Wichtl M., 2004).



BOLDO

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Estados inflamatorios u obstructivos del tracto digestivo. Apendicitis. Obstrucción biliar.

Embarazo y lactancia. El extracto alcohólico de la hoja y la boldina producen cambios en los niveles plasmáticos de colesterol, bilirrubina, glucosa, alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa.

TOXICIDAD.

No se observó toxicidad aguda en ratas después de la administración por vía oral del extracto alcohólico de boldo, a dosis de hasta 3g/Kg. El aceite esencial de las hojas es tóxico por vía oral, para roedores. La boldina no posee actividad genotóxica (Vanaclocha B. y Cañigüeral S., 2003).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Cápsulas blandas y tabletas con extracto de boldo. Elixir con extracto fluido de boldo..



BOTON NEGRO



BOTON NEGRO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Hyptis capitata Jacq.

SINÓNIMOS: *Pycnanthemum decurrens*, *Thymus virginicus*. (Missouri Botanical Garden, 2007)

Nombres comunes: Botón negro, cuchilla de Perdomo, cabezona.

Parte utilizada: Planta completa.

USOS TRADICIONALES.

Se usa como antiséptico y cicatrizante en úlceras varicosas, eczema y afecciones cutáneas de tipo inflamatorio y alérgico. La decocción de las hojas se emplea para limpiar heridas (García-Barriga H., 1975; Falcão D., 2003b).

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

La planta contiene triterpenos y monoterpenos, especialmente en el aceite esencial, sesquiterpenos como el β -cariofileno, flavonoides, derivados del ácido cafeico y lignanos.



BOTON NEGRO

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto etanólico de las hojas mostró neutralización moderada del efecto hemorrágico del veneno de *Bothrops atrox*, en ratones (Otero R. y col., 2000). El ácido oleanólico, obtenido del extracto metanólico de la planta, inhibe la replicación de HIV-1 en células H9 con infección aguda; el ácido pomólico mostró actividad anti-HIV y el ácido ursólico mostró actividad citotóxica en células de leucemia linfocítica y en células humanas de carcinoma de pulmón (Deborah Q., 2003; Kashiwada Y. y col., 1998).

INDICACIONES.

Uso externo: Coadyuvante en el tratamiento de inflamaciones cutáneas, dermatitis alérgica y psoriasis.



BOTON NEGRO

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Tópico.

Aplicar la preparación 2 a 3 veces al día.

Contraindicaciones y precauciones.

Hipersensibilidad a los componentes de la planta. Embarazo.

TOXICIDAD.

No existen reportes de estudios que sustenten la seguridad del uso de esta planta.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Solución de uso tópico. Ungüento.



BRUSCA



BRUSCA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Cassia occidentalis L.

Sinónimos: *Senna occidentalis* (L) Link, *Cassia caroliniana* Walter, *Cassia ciliata*

Raf., *Cassia falcata* L., *Cassia foetida* Pers., *Cassia frutescens* Mill., *Cassia geminiflora*

Schrank, *Cassia linearis* Michx, *Cassia longisiliqua* L.F., *Cassia obliquifolia* Schrank, *Cassia planisiliqua* L., *Cassia sopera* L., *Ditremexa occidentalis* (L.) Britton & Rose ex

Britton & P. Wilson, *Senna occidentalis* (L.) Roxb (Missouri Botanical Garden, 2006).

NOMBRES COMUNES: Bicho de café, brusca, busaca, café de brusca, cafecillo, cimarrón, moquillo, yerba de murciélago.

PARTE UTILIZADA: Hojas. Semillas tostadas.

BRUSCA

USOS TRADICIONALES.

Las semillas tostadas poseen actividad febrífuga, emenagoga y estomáquica; se emplean además como diurético y en el tratamiento de indigestión, dispepsia y enfermedades prostáticas.

Las semillas sin tostar son empleadas como purgante y en forma de cataplasma en el tratamiento de edemas y enfermedades de la piel.

La infusión es administrada para el tratamiento del asma y como febrífugo.

Las semillas se usan externamente para el tratamiento de la escabiosis en la cabeza y en caso de golpes o contusiones (Bernal H. y col., 1990; Girón L. y col., 1991; Girach R. y col., 1994).

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

En las semillas se encuentran lípidos, carotenoides, tocoferoles, aminoácidos, carbohidratos, alcaloides, saponinas, taninos, mucílago y aceites fijos. Contienen además reína, aloe-emodina, crisofanol, galactomananos, y toxoalbúmina, xantona (casiolina), β -sitosterol, derivados de 1,4,5-trihidroxiantraquinona.

BRUSCA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Se han hecho numerosos estudios sobre la actividad antimicrobiana (antibacteriana y antifúngica) de extractos de diversas partes de la planta obteniéndose diferentes resultados (Vaijayanthimala J. y col., 2000; Perumal R. y col., 2000; Evans E. y col., 2002; Kiuchi K. y col., 2002; Chukwujekwu J. y col., 2006).

Los extractos de las semillas en acetato de etilo, hexano y metanol, poseen actividad antioxidante. La fracción proteica con actividad tóxica, aislada de las semillas, presenta actividad inmunomoduladora en ratones, suprimiendo la respuesta inmune humoral de los animales a los antígenos T dependientes (Franca S. y col., 2005).

INDICACIONES.

Uso interno.

Hojas: Coadyuvante en cuadros de hepatotoxicidad.

Hojas y semillas tostadas: Antiséptico.

BRUSCA

Posología.

Modo de empleo: Oral.

Infusión: 1 taza dos veces al día.

Tintura (1:10): 3-4 mL dos veces al día.

Contraindicaciones y precauciones.

El extracto de las hojas de *Cassia occidentalis* está contraindicado durante el embarazo

y en personas con baja tensión arterial. La ingestión por tiempo prolongado de pequeñas

cantidades de las semillas sin tostar causa reacciones tóxicas incluyendo degeneración

muscular y muerte (Tropical Plant Database, 2006).

Formas farmacéuticas y otras preparaciones.

Polvo de las semillas tostadas. Tintura 1:10 en etanol de las semillas tostadas. Infusión.



Universidad del
Rosario

BRUSCA



TOXICIDAD

El endospermo administrado por vía oral a conejos causa la muerte, produciendo degeneración mitocondrial, acumulación lipídica, degeneración miofibrilar y Miocitolisis.

Las semillas secas administradas a caballos por vía oral en dosis variables, presentaron letalidad.

Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia se realizó el estudio de toxicidad aguda oral del extracto etanólico de las semillas tostadas y no se observaron hallazgos clínicos significativos que puedan estar relacionados con la administración del extracto, dosificado a 2000mg/Kg.



Universidad del
Rosario



<https://www.youtube.com/watch?v=niAC5Ozizkw>

**Muchas plantas medicinales, hipérico, artemisa, sauce,
vincapervinca, hepática, ailanto, gordolobo**

CADILLO



CADILLO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Bidens pilosa L.

Sinónimos: *Bidens adhaerescens* Vell., *Bidens alausensis* Kunt., *Bidens alba* (L.) DC., *Bidens chilensis* DC., *Bidens hirsuta* Nutt., *Bidens leucantha*., *Bidens montaubani*. Phil., *Bidens odorata* Cav., *Bidens reflexa* Link., *Bidens scandicina* Kunth, *Bidens sundaica*, *Coreopsis leucantha* L., *Kerneria pilosa* (L.) (Missouri Botanical Garden, 2007).

NOMBRES COMUNES: Cadillo, romerillo, romerillo blanco, picacho, carapico, chipaca, cadillo de huerta, papunga, pecunia, cadillo de perro, papunca, pega-pega (Correa J. y col., 1990; Gupta M., 1995).

PARTE UTILIZADA: Partes aéreas



CADILLO

USOS TRADICIONALES.

La infusión de las hojas se emplea para el tratamiento de disentería, diarrea, estados gripales, dolor de estómago, aftas bucales, angina, tos, fiebre, diabetes, edemas, hepatitis, hipertensión y úlceras gastroduodenales.

Se emplea también como antiinflamatorio y diurético. Por vía tópica la infusión de las hojas se emplea como antimicótico, vulnerario, antiséptico y en caso de dolores osteoarticulares.



PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

La planta contiene glicósidos, chalconas, terpenos, aceites esenciales, poliacetilenos, flavonoides, sesquiterpenos, esteroides y taninos.

CADILLO

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Se evidenció actividad relajante muscular, dependiente de la dosis, del extracto acuoso de las hojas de la planta (Dimo y col., 1998).

El extracto acuoso de las partes aéreas presentó actividad antiinflamatoria y antialérgica (Yoshida N. y col., 2006; Horiuchi M. y col., 2006).

INDICACIONES.

Uso interno: Coadyuvante en el tratamiento de la gastritis.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Jarabe: adultos una cucharada tres veces al día; niños una cucharada pequeña tres veces al día.

Cápsulas: tomar una cápsula después de cada comida

Infusión: un vaso pequeño tres veces al día.



CADILLO

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo y lactancia, hipersensibilidad a los componentes de la planta, insuficiencia renal.

TOXICIDAD.

No se encuentran reportes sobre el particular.

FORMAS FARMACÉUTICAS.

Cápsulas con polvo de la planta. Jarabe con extracto fluido. Infusión.



CAFÉ



CAFÉ

NOMBRE CIENTÍFICO.

Coffea arabica L.

Sinónimos: Existen variedades de *Coffea arabica*.

NOMBRES COMUNES: Café, cafeto enano, cafeto San Lorenzo, cafeto San Ramón.

Parte utilizada: Semillas

USOS TRADICIONALES.

En general, la planta es usada como tónico, estimulante, diurético, hemostático, broncodilatador y para el dolor de cabeza (Duke J., 1985; Weniger B. y col., 1989;

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las semillas contienen alcaloides, entre ellos: cafeína, teobromina, teofilina y trigonelina, compuestos fenólicos, ácidos orgánicos, esteroides, taninos y sales minerales.



CAFÉ

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

En diferentes estudios se ha podido comprobar la actividad estimulante sobre el SNC de las semillas de café y de la cafeína, así como su actividad vasodilatadora periférica, vasoconstrictora a nivel craneal y estimulante de la musculatura lisa y esquelética, sobre los sistemas cardiovascular y urinario.

INDICACIONES.

Uso interno: Estimulante del sistema nervioso central, vasodilatador.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Infusión: 15g/día

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Cardiopatía. Úlcera péptica. A dosis elevadas puede producir taquicardia, insomnio, irritabilidad, reflujo gastroesofágico y úlcera péptica.



CAFÉ

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

No se debe asociar a tranquilizantes ni a otros estimulantes; el etinilestradiol y el mestranol pueden potenciar el efecto de la cafeína; la cimetidina potencia el efecto y la toxicidad de la cafeína. (Vanaclocha B. y col., 2003; Del Río P., 2005).

TOXICIDAD.

No se conocen reportes sobre toxicidad aguda y a dosis repetida.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Infusión.





Universidad del
Rosario



Caléndula ¿para qué sirve - Propiedades medicinales

<https://www.youtube.com/watch?v=qIUWgwU4HZk>

CALENDULA



CALENDULA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Calendula officinalis L.

Sinónimos: No reportados. (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Caléndula, maravilla del crisol, flor de todos los meses.

Parte utilizada: Flores.

USOS TRADICIONALES.

Las flores se usan por sus propiedades antiflogística, antiséptica, antiespasmódica, astringente, diaforética, antibacteriana, cicatrizante, antiinflamatoria, emenagoga e inmunomoduladora. Se emplean en caso de acné, contusiones, golpes, torceduras, eczemas, quemaduras, picaduras de insectos, irritaciones cutáneas, amenorrea, dismenorrea y vulvovaginitis



CALENDULA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Aceite esencial que contiene carvona, cariofileno, mentona, isomentona, terpineno, cadineno, pedunculatina, cariofilencetona, α y β -ionona, α -muroleno, geranilcetona y los sesquiterpenos epicubebol y aloaromadentrol.

Esta especie contiene además carotenoides (β -caroteno, violaxantina, rubixantina, citroxantina, flavoxantina, luteína, licopeno, auroxantina y microxantina), flavonoides (rutenósido, isoharmentina, quercetina, calendoflósido, calendoflavonósido, isoquercitina y kamferol), triterpenos, saponinas, ácidos fenólicos (cumárico, gentísico, cafeico, sirínico, vainillínico, ferúlico, p-hidroxibenzoico, salicílico y clorogénico), cumarinas (escopoletina, umbeliferona y esculetina), alcoholes triterpénicos, taninos, triterpenoides pentacíclicos y esteroides libres, esterificados y glucosilados



CALENDULA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto hidroalcohólico exhibió actividad antibacteriana, antimicótica y antiviral.

Se determinó actividad inmunomoduladora del extracto etanólico de las hojas.

Los extractos acuoso y metanólico de las flores mostraron actividad antioxidante, *in vitro*.

INDICACIONES.

Uso interno: Antiinflamatorio. Tratamiento de alteraciones inflamatorias bucofaríngeas.

Uso externo: Antiinflamatorio, cicatrizante. Tratamiento tópico de inflamaciones de piel y mucosas.



CALENDULA

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Por uso interno: embarazo y lactancia. Por uso externo: puede producir irritación e hipersensibilidad.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Debido a la presencia de mucílagos puede existir el riesgo de retrasar o disminuir la absorción oral de algunos principios activos. La caléndula puede potenciar el efecto de fármacos sedantes, hipoglicemiantes e hipocolesterolemiantes (Geocities, 2007; Emory Healthcare, 2007).





POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Extracto fluido (1:1): 20-30 gotas cada 8-12 horas

Tintura (1:10): 40-60 gotas cada 8 horas

Infusión: 2g/taza, 2-3 veces al día

Polvo de flores de caléndula: 300-500mg, 1-3 veces al día.

Modo de empleo: Tópico

Aplicar en forma de tintura o ungüento varias veces al día



CALENDULA

TOXICIDAD.

No se conocen reportes de toxicidad aguda ni toxicidad a dosis repetida.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Para uso tópico: Tintura de caléndula, aceite de caléndula, shampoo con extracto de flores de caléndula.

Para uso interno: Tabletas y cápsulas con flores de caléndula, extracto de flores de caléndula, solución oral con extracto seco de flores de caléndula, jarabe con extracto de flores de caléndula, infusión.



CANELA



CANELA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Cinnamomum zeylanicum Nees.

Sinónimos: No se encuentran (Missouri Botanical Garden, 2007)

Nombres comunes: Canelo de Ceilán, canelo.

Parte utilizada: Corteza.

USOS TRADICIONALES.

Estimulante de las funciones digestivas, carminativo y antiespasmódico.

Se emplea en caso de dispepsias flatulentas, cólicos, diarrea y como eupéptico y aperitivo.

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Aceite esencial constituido principalmente por aldehído cinámico, eugenol, α - felandreno, β -linalool, acetato de linalilo, benzaldehído, β -cariofileno, ácido benzoico y cinamato de bencilo. La corteza contiene además taninos, cumarinas, azúcares y resina.



CANELA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto etanólico de la corteza, administrado por vía oral a ratones, presentó efecto antinociceptivo (Atta A. y col., 1998).

El extracto de la planta en dosis de 80mg/día mostró ser inefectivo en la erradicación de *H. pylori* (Nir Y. y col., 2000). En estudios clínicos se comprobó que la canela reduce los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol total en suero en personas con diabetes tipo 2.

El aceite esencial y extractos de la planta mostraron buena actividad antimicrobiana en diferentes estudios realizados.

INDICACIONES.

Uso interno: Antiespasmódico. Antiflatulento. Coadyuvante en el tratamiento de dispepsia y espasmos gastrointestinales.



CANELA

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Aceite esencial: 0.05-0.2g al día

Infusión de la corteza: 0.5-1.0g diarios

Tintura: 2-4 mL.



CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipersensibilidad a los componentes de la planta. La canela puede producir reacciones alérgicas en algunas personas. La sobredosis del aceite puede producir náuseas, vómito y posible lesión renal. No se recomienda a niños menores de dos años ni en mujeres embarazadas o lactantes (Krapp K., y col., 2005).

TOXICIDAD.

No se conocen reportes sobre estudios realizados.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Solución oral con extracto de corteza pulverizada. Tintura. Aceite esencial. Infusión.

CANELO DE MONTE.



CANELO DE MONTE.

NOMBRE CIENTÍFICO.

Drimys winteri J.R. y G. Forster

Sinónimos: *Drimys chilensis* DC., *Drimys granatensis* L.f., *Drimys mexicana* Moc. & Sessé, *Drimys montana* Mier., *Winterana aromatica* Sol. ex Foth., *Winterana romántica* Sol (Missouri Botanical Garden, 2007).

NOMBRES COMUNES: Canelo, canela amarga, casca de anta, cataya, capororoca picante, malamba, melambo, palo de ají.

Parte utilizada: Corteza y hojas.



USOS TRADICIONALES.

La planta se emplea como astringente, balsámico, carminativo, estomáquico, diurético, antiinflamatorio, antiespasmódico y tónico.

Se emplea además en el tratamiento de gastritis, úlceras, afecciones del tracto respiratorio, dolor de dientes, dermatitis, reumatismo e infecciones por hongos, levaduras y bacterias.

La corteza se utiliza en enfermedades inflamatorias, como cicatrizante, para el tratamiento del cáncer y en casos de indigestión, dermatitis y escorbuto.



CANELO DE MONTE.



PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

De la planta completa se han aislado flavonoides como el kamferol, sesquiterpenos (germacreno-D, drimenol), terpenos y lactonas. La corteza contiene aceite esencial, taninos, cineol, α y β -pineno, manitol, eugenol, poligodial, linalool, β -cariofileno, α -humuleno, farnesol, los flavonoides taxifolina y astilbina y vitamina C.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Extractos hidroalcohólicos de tallos y hojas mostraron actividad contra leucemia

(Bhakuni D. y col., 1976). El extracto hidroalcohólico de la corteza inhibe la formación de edema plantar en ratas y ratones.

El extracto de la corteza y algunos de los compuestos aislados de la misma demostraron poseer actividad antinociceptiva, procesos alérgicos.



CANELO DE MONTE.

INDICACIONES.

Uso interno:

Corteza: Analgésico, antiinflamatorio. Hojas: Coadyuvante en el tratamiento de procesos alérgicos

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Infusión: Agregar agua caliente a hojas o corteza de canelo, beber varias veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No se conocen reportes sobre contraindicaciones para el consumo de la planta.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Infusión de hojas y corteza.



CANELO DE MONTE.

TOXICIDAD.

En estudios de toxicidad aguda realizados en el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional el extracto etanólico administrado por vía oral a dosis de 2000mg/Kg presentó comportamiento acelerado y aumento de la actividad motora de los animales. No se percibieron alteraciones patológicas.

Se concluye que la DL50 aguda, vía oral, del extracto etanólico es superior a 2000mg/Kg y la categoría toxicológica para el extracto bajo el Sistema GHS es de 5.

Se concluye que la administración diaria, por 28 días, del extracto etanólico de la planta, dosificado a 1000mg/Kg no ocasiona mortalidad, pero sí irritación en mucosa respiratoria e intestinal y aumento en el peso relativo del hígado, particularmente en ratas macho.



CARDAMOMO



CARDAMOMO



NOMBRE CIENTÍFICO.

Elettaria cardamomun L.

Sinónimos: No se reportan sinónimos (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Cardamomo, cardamomi, cardamomo menor.

Parte utilizada: Semillas

USOS TRADICIONALES.

La decocción de las semillas se usa para tratar halitosis y flatulencia. La tintura de cardamomo se usa contra la flatulencia y en la industria farmacéutica como saborizante

y aromatizante. El cardamomo se utiliza como estimulante del apetito y para tratar desórdenes gastrointestinales y dispepsia, como digestivo y carminativo (Cáceres A., 1996; Al-zuhair H. y col., 1996; Fetrow C. y col., 2000; Jamal y col., 2006).



CARDAMOMO

PRINCIPALES CONSTITUYENTES:

El fruto contiene 1,8-cineol, α -felandreno, α y β -pineno, α -terpineno, α -terpenil-acetato, borneol, camfeno, alcanfor, carbohidratos, citronelol, limoneno, linalool, almidón, pentosano, ácidos grasos: caprílico, caproico, palmítico, oleico y linoleico, resinas y minerales. Las semillas contienen aceite esencial el cual contiene citronelol, 1,8- cineol, linalil acetato, linalool, sabineno, nerolidol, α -terpineol, geraniol, neral, acetato de geranilo y limoneno

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Estudios realizados demostraron que la semilla y el aceite esencial poseen actividad estimulante del apetito, digestiva, carminativa, bacteriostática y antifúngica (Cáceres A.). El aceite esencial posee actividad antifúngica

contra *Aspergillus flavus* (Rahnman A. y col., 1999). El extracto de las semillas mostró actividad antimicrobiana contra *S. aureus*, *P. aureginosa*, *Listeria monocytogenes* y *Proteus vulgaris*



CARDAMOMO

INDICACIONES.

Uso interno: Antiflatulento. Estimulante del apetito. Tratamiento de la halitosis y dispepsia.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

1.5 g/día de la droga o preparaciones equivalentes.

Tintura: 1-2g/día.

Infusión: 3-5g tres veces al día.

Contraindicaciones y precauciones.

Evitar su uso en personas gestantes o lactantes. No administrar ni aplicar tópicamente a niños menores de seis años ni a personas con alergias respiratorias o con hipersensibilidad conocida a este u otros aceites esenciales.

TOXICIDAD.

En estudios realizados en ratones el cardamomo indujo toxicidad a dosis de 300mg/Kg.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Cápsulas de cardamomo en polvo. Extracto de cardamomo. Tintura. Infusión.



CARDO MARIANO



CARDO MARIANO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Silybum marianum L.

Sinónimos: *Cardus mariae* Crantz., *Cardus marianus* L., *Carthamus maculatum* Lam., *Mariana láctea*, *Mariana mariana* (L.), *Silybum maculatum*.

NOMBRES COMUNES: Cardo mariano, cardo de burro, cardo lechero, cardo blanco, cardo de María.

PARTE UTILIZADA: Frutos.

USOS TRADICIONALES.

Hepatoprotector, se ha utilizado en el tratamiento de insuficiencia hepatobiliar, hepatitis aguda y crónica, cirrosis, disquinecias hepatobiliares, inapetencia, digestión lenta, trastornos de la vesícula biliar, intoxicación por setas, psoriasis. Se ha empleado también como antioxidante



CARDO MARIANO

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA:

La silimarina y la silibina son efectivas en el tratamiento del envenenamiento con *Amanita phalloides*. En hepatitis viral. Se observó notable mejoría en grupos de pacientes con cirrosis hepática por la administración de silimarina (OMS, 2002).
Extractos del fruto mostraron actividad antioxidante.

INDICACIONES.

Uso interno: Coadyuvante en el tratamiento de cuadros de hepatotoxicidad e insuficiencia hepatobiliar.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral, Infusión: 3-5g/taza de infusión tres veces al día. Extracto fluido (1:1): 20-50 gotas, cada 8-24 horas.

Polvo de los frutos: 300 mg-1g al día.



CARDO MARIANO



CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Colestasis e hipersensibilidad a los componentes de la planta.

TOXICIDAD.

En estudios clínicos, la administración prolongada de silimarina no mostró efectos adversos. En ratas a las que se les administró silimarina en dosis de 50, 500 y 2500mg/Kg no se evidenció toxicidad en los estudios post-mortem (DerMarderosian A. y col., 2002).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Cápsulas con polvo de los frutos de cardo mariano, extracto fluido, infusión.



CASCARA SAGRADA



CASCARA SAGRADA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Rhamnus purshiana DC.

SINÓNIMOS: No se encuentran reportados (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres Comunes: Cáscara sagrada, cáscara santa, corteza persa, corteza amarga .

PARTE UTILIZADA: Corteza.

USOS TRADICIONALES.

La corteza ha sido empleada tradicionalmente como laxante; envejecida y seca se emplea como tratamiento suave y efectivo de la constipación intestinal crónica y como **purgante** (Fetrow C. y col., 2000; García-Barriga H., 1974).



CASCARA SAGRADA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

En la corteza se encuentra una mezcla compleja de derivados hidroxiantracénicos,

Entre el 10 y el 20% de la

droga se encuentra constituida por O-glucósidos de aloemodina y de frangulaemodina y

los aglicones aloemodina, crisofanol, frangulaemodina y fisción

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Presenta actividad laxante la cual se atribuye a los heterósidos hidroxiantracénicos.

Ensayos clínicos realizados con el extracto fluido de cáscara sagrada indicaron que la

curva dosis dependiente en pacientes que sufrían de constipación, mostraba gran sensibilidad a los cambios en la dosificación, por encima de 0.5g/día

INDICACIONES.

Uso interno: Laxante. Tratamiento del estreñimiento y afecciones en las cuales sea necesario una fácil evacuación intestinal, con heces blandas



CASULLORÍA SAGRADA

Modo de empleo: Oral

Extracto seco de corteza de cáscara sagrada: 400 mg en una sola toma. Es recomendable ajustar la dosis individualmente.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Estados inflamatorios u obstructivos del tracto digestivo. Apendicitis. Obstrucción biliar. Enfermedades del colon, ictericia grave. Embarazo, lactancia. Niños menores de 7 años. Por utilización frecuente o prolongada se puede presentar aumento de la pérdida de agua y sales, particularmente de potasio, desequilibrio electrolítico, dolor abdominal, pigmentación de la orina y vómito.

En pacientes ancianos debilidad, falta de coordinación e hipotensión ortostática. Se han presentado pocos casos de alergias (rinitis y asma, especialmente) causados por la corteza de la planta.



CASCARA SAGRADA

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

El consumo de preparaciones con cáscara sagrada potencia la actividad de heterósidos cardiotónicos como los digitálicos. (Cañigüeral S. y col., 1998; Del Río P., 2005; TresJ., 2006). Puede presentarse interacción con diuréticos y antiácidos como cimetidina, famotidina y ranitidina. Puede presentarse disminución de la absorción de fármacos (Fugh A., 2000).

TOXICIDAD.

No se conocen estudios sobre toxicidad aguda o a dosis repetidas de la cáscara sagrada.

FORMAS FARMACÉUTICAS.

Cápsulas con extracto seco de corteza de cáscara sagrada.



CASCO DE VACA



CASCO DE VACA

NOMBRE CIENTÍFICO. *Bauhinia variegata* L.

SINÓNIMOS: *Bauhinia chinensis* , *Bauhinia decora*

Nombres comunes: Casco de vaca, pata de buey, patebuey, patevaca.

PARTE UTILIZADA: Partes aéreas.

USOS TRADICIONALES.

La corteza como astringente, tónico y enfermedades de la piel, úlceras, diarreas, disentería y parasitismo intestinal. Se reporta el uso de la infusión de las hojas de diferentes especies de *Bauhinia* para el tratamiento de diabetes e hipertensión y como agente diurético y antihelmíntico. La planta también se emplea como hipocolesterolemia, vermífugo y en el tratamiento de dolores estomacales.



CASCO DE VACA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

El estudio preliminar del extracto etanólico de los tallos mostró la presencia de flavonoides, glicósidos cardiotónicos, antraquinonas y saponinas, flavonas, lupeol y β -sitosterol. En las hojas se encuentran flavonoides como quercetina, rutina, quercitrina y apigenina, naftoquinonas, antraquinonas, taninos, saponinas, lactonas terpénicas, esteroides, triterpenos y un aceite esencial, constituido exclusivamente por sesquiterpenos.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Se ha reportado actividad antiinflamatoria *in vivo* del extracto de la planta, administrado por vía oral en dosis variable.

El extracto etanólico de la planta a una concentración de 20 $\mu\text{g/mL}$ presentó actividad secretagoga de insulina. El extracto etanólico de las partes aéreas de la planta presentó buena actividad captadora de radicales libres.



CASCO DE VACA

INDICACIONES.

Uso interno.

Hojas: Hipoglicemiante. Partes aéreas: Antidiarréico.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Se emplea en forma de decocción e infusión, tomando una taza, una o más veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No se han reportado efectos adversos en humanos y/o animales asociados al consumo de la infusión o la decocción de la planta.

TOXICIDAD.

una dosis de 1000 mg/Kg no se presenta mortalidad, pero sí algunas alteraciones que pueden sugerir una leve respuesta tóxica.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Infusión y decocción con las hojas o las partes aéreas.





CASTAÑO DE INDIAS

CASTAÑO DE INDIAS

NOMBRE CIENTÍFICO.

Aesculus hippocastanum L.

Sinónimos: No se encuentran (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Castaño de Indias.

Parte utilizada: Semillas.

USOS TRADICIONALES.

Se emplea en forma interna y externa para el tratamiento de venas varicosas, flebitis, hemorroides, afecciones cutáneas, úlceras y llagas varicosas y como antiinflamatorio.

(Krapp K., 2005).



CASTAÑO DE INDIAS


PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

En la corteza se encuentran heterósidos hidroxycumarínicos, flavonoides, alcanfor, quercetina, taninos catéquicos, saponósidos triterpénicos, oligosacáridos y fitoesteroles.

En las hojas se encuentran heterósidos hidroxycumarínicos y derivados de quercetol, ramnetol y alcanfor.

En las semillas se han identificado flavonoides, saponósidos triterpénicos, taninos catéquicos, hidroxycumarinas, pectina, mucílago, adenina, adenosina, esculetina, alantoina, arginina, astragalina, colina, leucocianidina, fitosterol, rutina y escopoletina.

El compuesto que se considera como principio activo de la planta es la escina.



CASTAÑO DE INDIAS

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Estudios clínicos con pacientes con insuficiencia venosa crónica grados I a III, mostraron actividad favorable del extracto de semillas de la planta.

Estudios realizados con la línea celular HT-29 de células cancerígenas de colon humano mostraron que la β -escina causa apoptosis celular de forma dosis dependiente.

INDICACIONES.

Uso interno: Coadyuvante en el tratamiento de venas varicosas, de insuficiencia venosa crónica de las extremidades inferiores y de hemorroides.

Uso externo: Antiinflamatorio

POSOLOGÍA

Modo de empleo: Oral. Extracto estandarizado: 250-312mg, (equivalentes a 100mg de escina), dos veces al día.

Modo de empleo: Tópico. Aplicar las preparaciones una o más veces al día.



CASTAÑO DE INDIAS




CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No se recomienda su uso en niños ni en mujeres embarazadas o lactantes. Se han presentado casos de irritación gastrointestinal, náuseas y vómito por sobredosis del extracto de las semillas.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

La capacidad del castaño de Indias para reducir la coagulación sanguínea indica que no debe administrarse concomitantemente con fármacos anticoagulantes como warfarina o ácido acetilsalicílico (Krapp K., 2005). Se recomienda tener precaución si el paciente está tomando suplementos, medicamentos o plantas que disminuyen los niveles de glucosa en sangre.



CASTAÑO DE INDIAS

TOXICIDAD


La FDA ha clasificado esta planta como insegura; el envenenamiento se caracteriza por tics musculares, debilidad, falta de coordinación, dilatación de las pupilas, vómito, diarrea, depresión, parálisis y estupor, siendo el fruto la parte más tóxica de la planta (DerMardesorian A., 2002).

Estudios de toxicidad crónica oral del extracto de las semillas y de la escina mostraron ausencia de efectos tóxicos y daño orgánico.

Las semillas, las hojas, la corteza y las flores contienen esculina la cual se ha asociado con una considerable toxicidad. La cáscara externa del fruto es venenosa, se han registrado casos de intoxicación por comer castañas de indias crudas (Krapp K., 2005).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Gel con extracto o tintura de Castaño de Indias. Ungüento. Extracto fluido de Castaño de Indias.



CENTELLA ASIATICA



CENTELLA ASIÁTICA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Centella asiatica (L.) Urban

Sinónimos: *Centella biflora*, *Centella coriacea* Nannf, *Centella dusenii* Nannf, *Centella erecta* Fernald, *Centella floridana* Naanf, *Centella hirtella* Nannf, *Centella repanda* Small, *Centella triflora*, *Gyiceria repanda* Nutt, *Hydrocotyle asiática* *Hydrocotyle biflora* P. Vell

NOMBRES COMUNES: Gotu Kola, hidrocotile, hidrocotile asiática.

PARTE UTILIZADA: Partes aéreas

USOS TRADICIONALES.

Se ha empleado en el tratamiento de heridas escleróticas, procesos inflamatorios y gastritis. La decocción de las raíces jóvenes se administra para tratar heridas infectadas.



CENTELLA ASIATICA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

La planta contiene saponinas triterpénicas pentacíclicas siendo las principales el asiaticósido y el madecasósido. Contiene, además, otras saponinas minoritarias, abundantes taninos, aceite esencial con β -cariofileno, germacreno

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA

actividad sobre la insuficiencia venosa y afecciones varicosas y se comprobó mejoría notable de los síntomas (pesadez en extremidades inferiores, edema) y distensibilidad venosa en los pacientes que recibieron el extracto, en forma dosis-dependiente

INDICACIONES

Uso interno: Coadyuvante en el tratamiento sintomático de várices de miembros inferiores y de úlceras estomacales y duodenales.



CENTELLA ASIATICA

POSOLOGÍA

Modo de empleo : Oral

1-2g diarios de droga, repartidos en tres tomas, como tal o en forma de infusión.

Extracto fluido (1:1) : 10-30 gotas cada 8 horas

Tintura (1:10): 50 gotas cada 8 horas

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la planta.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

El consumo de preparaciones de *Centella asiatica* en dosis elevadas puede alterar la acción de hipoglicemiantes e hipocolesterolémiantes, razón por la cual se recomienda evitar su uso concomitante. (Fetrow y col, 2000).

TOXICIDAD

No se conocen estudios sobre pruebas de toxicidad de esta especie vegetal.

FORMAS FARMACÉUTICAS

Cápsulas y tabletas con polvo de la planta. Tintura 1:10. Extracto fluido 1:1



CHAPARRO



CHAPARRO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Curatella americana L.

Sinónimos: *Curatella americana* var. *Pentagyna* Donn.Sm., *Curatella cambiaba* A. St-Hil, *Curatella grisebachiana* Eichler (Missouri Botanical Garden, 2006).

Nombres comunes: Chaparro, guayabillo, carne de fiambre, chaparro de agua, manteco yuco, paralejo macho.

PARTE UTILIZADA: Corteza y hojas.

USOS TRADICIONALES.

Popularmente propiedades medicinales en el tratamiento de la diabetes, inflamación, heridas, hipertensión arterial, como astringente, siendo la diabetes la enfermedad en la que más es empleada. La infusión que se obtiene de las hojas se utiliza en algunas regiones para lavar heridas y contra erupciones de la piel flavonoides, terpenos, fenoles, saponinas y esteroides. Se han aislado triterpenoides (β -amirina, lupeol), fitosteroles, taninos, ácidos grasos y ácido gálico. De la corteza se aislaron triterpenos pentacíclicos, acetato del ácido ursólico, ácido betulínico, acetato de lupeol, acetato del ácido betulínico y taninos condensados



CHAPARRO

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.



El extracto etanólico de la corteza presentó actividad molusquicida sobre *Biomphalaria straminea*. y *Biomphalaria glabrata* (Pinheiro M. y col., 1974).

Fracciones del extracto clorofórmico de la corteza mostraron efecto antihiperglicemiante en animales normoglicémicos.

Una solución hidroalcohólica preparada a partir del extracto etanólico de la corteza presentó actividad diurética similar a la producida por la hidroclorotiazida y la Furosemida.

El extracto etanólico total y las fracciones nbutanólica y metanólica presentaron acentuada actividad inhibidora de la vía clásica del complemento, moderada actividad sobre la vía terminal y mínima actividad sobre la vía Alterna.



CHAPARRO

INDICACIONES.

Uso interno: Antiinflamatorio

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Infusión: tomar media taza dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No se encuentran reportes para esta especie.

En un estudio de toxicidad subcrónica no se presentaron cambios histológicos severos en los animales a los que se les administró el extracto a una dosis de 100mg/Kg/día.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Polvo de la planta deshidratada para reconstituir. Infusión.





CHILCA

CHILCA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Baccharis latifolia (R.& P.) Pers.

Sinónimos: *Molina latifolia* Ruiz & Pav.; *Baccharis poliantha* Kunth; *B. fl oribunda* Kunth; *B. riparia* Kunth; *Pluchea glabra* Griseb

Nombres comunes: Chilca, algodoncillo, chilca blanca, chilca negra, chilco, chilco blanco, chilco negro, chirca, chirco, gurrubo, chilca rucia.

PARTE UTILIZADA: Partes aéreas

USOS TRADICIONALES.

La infusión de las hojas se utiliza como antidiarreico, vulnerario, resolutivo, antiflatulento, tónico amargo, antidiabético y en el tratamiento de inflamaciones, dolor de estómago e insomnio. La decocción se emplea para el tratamiento de reumatismo, desórdenes hepáticos, tos, bronquitis, úlceras y en caso de parásitos intestinales.

Externamente, la planta se emplea en forma de cataplasma para casos de luxaciones, heridas, dolores reumáticos y hematomas.



CHILCA

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las hojas contienen galotaninos, aceite esencial, leucoantocianidinas, compuestos fenólicos, alcaloides, cumarinas, esteroides y triterpenos como la friedelina, lactonas, sesquiterpénicas y flavonoides como quercetina, rutina y quercitrina.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto metanólico inhibió la producción de especies reactivas de oxígeno.

Extractos en hexano y diclorometano y en menor proporción extractos etanólico y acuoso de las partes aéreas, presentaron actividad antiinflamatoria *in vitro*

INDICACIONES.

Uso interno: Antiinflamatorio.

Uso externo: Antiinflamatorio.



CHILCA

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral.

Infusión: diez hojas por una taza de agua, tomar una taza una o dos veces al día.

Modo de empleo: Tópico. Aplicar la preparación una o más veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No se han reportado contraindicaciones para el uso de la planta.

Se realizó también el estudio de toxicidad subaguda oral en ratas, del cual se concluyó que la administración diaria por 28 días del extracto etanólico, dosificado a 1000mg/kg no ocasiona mortalidad, pero sí alteraciones en el peso relativo de órganos como el bazo y los riñones, así como lesiones en tejido renal que pueden sugerir una leve respuesta tóxica.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Infusión. Cataplasma.



13 nov 2024



CHISACA

CHISACA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Cansen.

Sinónimos: *Acmella mutisii* (Kunth) Cass., *Acmella occidentalis* (Willd.) Rich., *Anthemis americana* L.f., *Anthemis occidentalis* Willd., *Anthemis oppositifolia* Lam., *Caratocephalus americanus* Kuntze, *Spilanthes americana*.

NOMBRES COMUNES: Botón de oro, botoncillo, chisacá, guaca, guasca, risacá, quemadera, yuyo, yuyo quemado.

PARTE UTILIZADA: Partes aéreas.

USOS TRADICIONALES.

La decocción de la planta se emplea en el tratamiento de enfermedades hepáticas y biliares, aftas bucales y como hipoglicemiante. Externamente se usa en caso de afecciones cutáneas.

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

La planta contiene espilantol, taraxasterol y otras isobultamidas acetilénicas y alquilamidas insaturadas.



CHISACA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

En estudios histopatológicos en piel de conejo con una isobutilamida aislada de la planta se evidenció actividad cicatrizante y disminución de la incidencia de fenómenos inflamatorios. En estudios clínicos se determinó efecto positivo en el tratamiento de aftas y *Herpes simplex* al administrar el extracto de la planta.

INDICACIONES.

Uso externo: Coadyuvante en el tratamiento de aftas bucales.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo:

Tópico: Aplicar en forma de gel o loción, varias veces al día.



CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No se conocen reportes sobre contraindicaciones por el uso tópico de la planta en humanos.

TOXICIDAD.

Se observaron síntomas generales como inquietud, irritabilidad, temblor, convulsiones tónico-clónicas y finalmente una fuerte convulsión tónica en extensión, precedente a la muerte del animal.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Ungüento, gel y loción con extracto de la planta.



CHUCHUHUAZA



CHUCHUHUAZA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Maytenus laevis Reissek

Sinónimos: *Maytenus jauaensis* Steyerl (Missouri Botanical Garden, 2006)

Chuchuhuasha, chuchuasó, chuchuguasi.

Parte utilizada: Corteza

USOS TRADICIONALES.

Los indios Siona de Putumayo preparan una decocción de la corteza de la cual toman dos tazas al día durante una semana para tratar el reumatismo y la artritis.

En la hoya del Amazonas general para el tratamiento del reumatismo

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

saponinas, taninos, ácidos orgánicos, fenoles, esteroides insaturados y flavonoides.



CHUCHUHUAZA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto metanólico de la corteza y de las hojas presentó actividad inmunoestimulante al administrarse a ratones hembras en una dosis de 50mg/Kg

Mediante el método del edema plantar en rata inducido con dextrano, al administrar el extracto en dosis de 1.5 g/Kg o la fracción colorante en dosis de 60-300 mg/Kg se observó efecto antiinflamatorio mayor de la fracción colorante que el de la indometacina y el de la fenilbutazona.

INDICACIONES.

Uso interno: Antiinflamatorio.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Se toman dos tazas diarias de la decocción, durante 10 días.



CHUCHUHAZA

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No se han reportado contraindicaciones para el uso de la planta. Sin embargo, a dosis altas se han presentado convulsiones ligeras y depresión acompañada de somnolencia.

TOXICIDAD.

Universidad Nacional de Colombia se realizó el estudio de toxicidad aguda oral del extracto etanólico de la corteza de la planta y no se observaron hallazgos clínicos significativos que puedan estar relacionados con la administración del extracto dosificado a 2000mg/kg.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Infusión y decocción con la corteza.



CIDRON

CIDRON

NOMBRE CIENTÍFICO.

Lippia citriodora

Sinónimos: *Aloysia citriodora*, *Aloysia tripylla*, *Lippia tripylla*, *Zapania citriodor*.

NOMBRES COMUNES: Cidrón, cedrón, hierbaluisa, verbena olorosa.

Parte utilizada: Hojas

USOS TRADICIONALES.

La infusión o decocción de las hojas se emplea como estomáquica, digestiva, tónica, carminativa, eupéptica, en el tratamiento de dispepsias, indigestión, náuseas y vómito. La planta completa en tisana se usa como estomáquico, antiespasmódico y para la indigestión y la flatulencia.

CIDRON

Principales constituyentes.

Las hojas contienen citral, limoneno, geraniol, citronal, verbenol, linalol, terpineol, terpenos, sesquiterpenos, flavonoides, alcaloides, flavonas y ácidos fenólicos. El aceite esencial contiene principalmente geranial, neral y limoneno

Actividad farmacológica.

Se comprobó que la infusión tiene actividad sobre el radical superóxido y sobre el ácido ipocloroso

Se comprobó actividad sedante e incremento en los episodios de sueño por uso del extracto acuoso de la planta, en ratas

Indicaciones.

Uso interno: Antiflatulento, sedante, coadyuvante en el tratamiento de dispepsias y espasmos gastrointestinales.

CIDRON



Posología.

Modo de empleo : Oral

Infusión 25-30 g por litro de agua, una cucharada tres veces al día.

Contraindicaciones y precauciones.

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la planta.

Toxicidad.

No hay información sobre el particular.

Forma farmacéutica y otras preparaciones.

Infusión.



CIMICIFUGA

CIMICIFUGA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.

SINÓNIMOS: *Actaea racemosa* L.

NOMBRES COMUNES: Hierba de San Cristóbal, raíces de cohosh negro, raíz de culebra negra, cimicifuga, hierba rica, raíz de cascabel, raíz de serpiente de cascabel, hierba de cascabel.

Parte utilizada: Rizomas

USOS TRADICIONALES.

La planta ha sido usada en el tratamiento de síntomas propios de la menopausia, así como en caso de irregularidades menstruales, síndrome premenstrual y flujo vaginal.

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Alcaloides quinolizidínicos, glucósidos triterpénicos derivados del cicloartano como la acteína, taninos, resina, principios amargos, compuestos estrogénicos y ácidos orgánicos: acético, butírico, fórmico, gálico, oleico, palmítico y salicílico. Los efectos terapéuticos se le atribuyen a la formocetina, una isoflavona presente en la planta.



CIMICIFUGA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Se evidenció actividad antiestrogénica en extractos de la planta.

El extracto isopropanólico mostró actividad antiosteoporosis en

INDICACIONES.

Uso interno: Tratamiento de alteraciones del climaterio y síndrome premenstrual.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Extracto fluido: 1-3g cada 8 horas

Tintura (1:10): 2-4mL AL día

Extracto seco: 20-40 mg dos veces al día.



CIMICIFUGA

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipersensibilidad a los componentes, embarazo, lactancia. No usar por más de seis meses consecutivos. La sobredosis puede causar vómito, náuseas, mareo, alteraciones visuales y del sistema nervioso, reducción en el pulso cardíaco e incremento en la perspiración (DerMarderosian A. y col., 2002).

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Debe administrarse con precaución en pacientes que sigan terapias de reemplazo hormonal o que consuman antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios, salicilatos, hipoglicemiantes e insulina (NCCAM 2005; Etcheverry S. 2005; Del Río Pérez 2005)

TOXICIDAD.

No se reportan estudios sobre toxicidad.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Comprimidos con extracto seco de rizoma. Extracto fluido. Tintura.



COL



COL

NOMBRE CIENTÍFICO.

Brassica oleracea L. DC.

Sinónimos: No se encuentran reportados (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Col, repollo.

Parte utilizada: Hojas

USOS TRADICIONALES.

Se emplea como diurético, antidiarreico y en el tratamiento de úlceras gástricas o duodenales, hipertiroidismo, escorbuto y colitis ulcerosa. Externamente se usa como cicatrizante, antiulceroso, demulcente y para tratar dolores reumáticos, contusiones y heridas.



COL

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las hojas contienen compuestos azufrados, ácidos aconítico, cítrico, málico, quínico y fumárico, vitamina C, β -caroteno, vitamina E, compuestos fenólicos, inositol, proteínas, calcio y hierro.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA

Extractos de la planta mostraron actividad contra *H. pylori* y algunos hongos filamentosos, actividad antioxidante.

INDICACIONES.

Uso interno: Coadyuvante en el tratamiento de úlcera gastroduodenal.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Polvo deshidratado de hojas: 400-500 mg tres veces al día.



COL

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipotiroidismo, tratamiento con anticoagulantes tipo warfarina.

TOXICIDAD.

No se encuentran reportes sobre estudios realizados.

FORMAS FARMACÉUTICAS.

Cápsulas con polvo deshidratado.



COLA DE CABALLO



COLA DE CABALLO



NOMBRE CIENTÍFICO.

Equisetum giganteum L.

Sinónimos: *Equisetum maitie* Milde, *Equisetum ramosissimum* Kunth, *Equisetum xylochaetum* Mett. (Missouri Botanical Garden, 2006).

Nombres comunes: Cola de caballo, tembladera, cola grande de caballo, tembladera grande.

PARTE UTILIZADA: Partes aéreas.

USOS TRADICIONALES.

La planta se emplea como diurético y antiinflamatorio. A la raíz se le atribuyen propiedades astringentes, diuréticas, emolientes, estomáquicas y hemostáticas.

Externamente se usan infusiones y decocciones para el lavado de heridas y llagas. La decocción del tallo y las hojas frescas o el polvo macerado en vino se usa por vía oral para tratar afecciones gastrointestinales y genitourinarias.



COLA DE CABALLO

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Se ha reportado la presencia de alcaloides piridínicos, nicotina y palustrina

(equisetina), flavonoides glicosilados, esteroides, triterpenos, saponinas, ácido

silícico, compuestos fenólicos, taninos y leucoantocianinas

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto clorofórmico de la planta entera mostró actividad diurética a dosis de 50mg/Kg en ratón y 1.0g/Kg en rata.

INDICACIONES.

Uso interno: Diurético.

Uso externo: Antiséptico.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Polvo de la planta deshidratada para reconstituir. Infusión.

Decocción. Tintura 1:8.



COLA DE CABALLO

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral 750 mg de la droga al día.

Tintura (1:8): 15-60 gotas al día

Decocción: media taza pequeña, dos veces al día.

Modo de empleo: Tópico.

Aplicar la preparación una o más veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No se conocen reportes para esta especie.

TOXICIDAD.

La planta se considera tóxica para el ganado vacuno (Gupta M., 1995; Lorenzi H y col., 2002). Se demostró que la administración en dosis de 1-5g/Kg por vía oral no tiene ningún efecto tóxico (Cáceres A., 1996).





COLA DE CABALLO



Universidad del
Rosario

Usos y propiedades medicinales de la Cola de caballo, Equisetum arvense, Planta medicinal diurética

<https://www.youtube.com/watch?v=cXjKO1sjaAU>

CULANTRO

CULANTRO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Eryngium foetidum L.

Sinónimos: *Eryngium antihystericum*, *Eryngium foetidum*

Nombres comunes: Culantro, cilantro, coriander, chicoria, culantro de coyote, culantrón, culantro de sabana, culantro hediondo, cimarrón, pericón, cilantrón, acopate.

Parte utilizada: Partes aéreas.

USOS TRADICIONALES.

La planta es empleada como febrífugo, emenagogo, aperitivo, antiescorbútico, antirreumático, antiséptico, antiemético, carminativo y en el tratamiento de la gripe, dolor de cabeza, hemorragias, dolor de estómago, convulsiones, diarrea, malaria, tos, espasmos e impotencia sexual

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

flavonoides, saponinas, triterpenos, taninos, caroteno, riboflavina, estigmasterol, campesterol, beta-sitosterol y aceite esencial constituido principalmente por alfa-pineno.



CULANTRO

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

El extracto acuoso presentó efecto anticonvulsivante, en ratas y ratones

La decocción de las hojas, administrada por vía oral, presentó actividad antiinflamatoria en ratas.

El extracto metanólico presentó actividad antioxidante *in vitro*. El extracto acuoso de la planta demostró actividad antipirética.

INDICACIONES.

Uso interno: Antiinflamatorio

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral.

Infusión preparada con 20-30g de hojas en un litro de agua: una taza tres veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No usar durante el embarazo, lactancia, ni en niños menores de 3 años.



CULANTRO

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No usar durante el embarazo, lactancia, ni en niños menores de 3 años.

TOXICIDAD.

En el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional se realizó la determinación de la toxicidad aguda de la planta, con los siguientes resultados: no se observaron hallazgos clínicos significativos que puedan estar relacionados con la administración de extracto etanólico de la planta, a dosis de 2000mg/Kg.

De acuerdo a la ausencia de mortalidad o presencia de animales moribundos durante los dos ensayos realizados conforme a la guía OECD 423, se concluye que la DL50 aguda, vía oral, del extracto etanólico de la planta es superior a 2000mg/Kg.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Infusión.



DIENTE DE LEON



DIENTE DE LEON

NOMBRE CIENTÍFICO.

Taraxacum officinale Weber

SINÓNIMOS: *Leontodon taraxacum* L., *Taraxacum dens-leonis*, *Taraxacum officinale*.

NOMBRES COMUNES: Diente de león, dandelion, lechuguilla, mírame pero no me toques, Achicoria.

PARTE UTILIZADA: Hojas y raíz

USOS TRADICIONALES

Tónico, diurético, contra enfermedades del hígado y de la piel, para disminuir niveles de ácido úrico en la sangre en pacientes con gota, para tratar afecciones gástricas, erradicar verrugas y para tratar el paludismo.



DIENTE DE LEÓN

PRINCIPALES CONSTITUYENTES

La raíz contiene lactonas sesquiterpénicas (germacranólidos, taraxacina o eudesmanólido), triterpenos pentacíclicos (taraxasterol, pseudotaraxasterol y sus derivados hidroxilados), fitosteroles: sitosterol, estigmasterol, β -sitosterol, sales potásicas, resina, flavonoides, taninos, carotenoides, vitaminas, mucílago, inulina

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Extracto fluido a ratas y ratones mostró actividad diurética

La decocción de las hojas produjo aumento en el volumen de bilis excretada,

INDICACIONES.

Uso interno : Diurético. Coadyuvante en el tratamiento de alteraciones de la secreción biliar.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral 400mg-1g de droga al día

Extracto (1:1 en alcohol): 4-10mL al día, Tintura (1:10): 50-100 gotas cada 8 horas

Decocción o infusión: Una taza tres veces al día.



DIENTE DE LEON

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo, lactancia, pacientes con desequilibrios hidroelectrolíticos, obstrucción de las vías biliares. La planta puede ocasionar dermatitis de contacto en personas sensibles.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Pueden disminuir la absorción de ciprofloxacina. Debe consumirse con precaución en pacientes que requieran insulina, litio, digoxina o corticosteroides como prednisolona.

Requiere supervisión médica en pacientes con terapia con anticoagulantes, antiplaquetarios o antiinflamatorios no esteroideos, pues puede aumentar el riesgo de hemorragia. Puede disminuir la efectividad de los medicamentos indicados para el tratamiento de la úlcera péptica.

TOXICIDAD.

No se conocen reportes sobre estudios realizados.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Cápsulas con polvo de las hojas de la planta. Solución oral con extracto de la planta.

Tintura 1: 10. Extracto 1:1. Decocción e infusión.



DIENTE DE LEON propiedades / beneficios y como cultivar.

<https://www.youtube.com/watch?v=cnJAb9r2CnU>

ENELDO



ENELDO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Anethum graveolens L.

Sinónimos: *Pucedanum graveolens* Beth., *Anethum sowa*

Nombres comunes: Eneldo, anega, aneto.

PARTE UTILIZADA: Semillas

USOS TRADICIONALES.

La planta se usa tradicionalmente en infusiones que se toman como estimulantes y galactogogas. Se le atribuye actividad antiflatulenta, diaforética, calmante, antiséptica y colerética. Se ha empleado en caso de espasmos gastrointestinales, meteorismo y ulceraciones dérmicas.

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

flavonoides (kanferol, quercetina e iso-ramnetina), cumarinas (escopoletina, esculetina, bergapteno y umbeliferona), ácidos fenólicos (caféico y clorogénico), aceites fijos, proteínas, beta-sitosterol, triterpenos



ENELDO

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Péptidos aislados de las semillas de eneldo presentaron actividad inhibitoria frente a (*Verticillium dahliae*). Las partes aéreas de la planta y el aceite esencial mostraron actividad hipolipemiante en ratas

INDICACIONES.

Uso interno: Antiflatulento. Coadyuvante en el tratamiento de dispepsias.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral 1-4g de droga, tres veces al día

Aceite esencial: 0.5-2mL, tres veces al día. Infusión: una taza, dos a tres veces al día



ENELDO

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

El aceite esencial induce aberraciones en los cromosomas de linfocitos humanos e inhibe parcialmente la actividad mitótica (Lazutka J. y col., 2001). Puede producir fotosensibilización. Contraindicado en pacientes que requieren dieta baja en sodio. (Fetrow C. y col., 2000; Invima, 2007).

TOXICIDAD.

No se conocen reportes sobre estudios realizados.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Infusión. Aceite esencial.



EQUINACEA





USO MEDICINAL DE LA EQUINACEA

EQUINACEA

NOMBRE CIENTIFICO

Echinacea purpurea L.

SINÓNIMOS: *Echinacea pupurea* Moench. (Missouri Botanical Garden, 2007)

Nombres comunes: Equinacea, echinacea, purple cone flower.

Parte utilizada: Raíz

USOS TRADICIONALES.

La planta se ha utilizado para curar heridas, abscesos, quemaduras, eczema y úlceras, para tratar el resfriado común y como carminativo, antiinflamatorio, antibacteriano, antifúngico, antiviral e inmunoestimulante.

PRINCIPALES CONSTITUYENTES

En la planta se encuentran alquilamidas, isobutilamidas, fenilpropanoides o derivados del ácido caféico, polisacáridos, lectinas, flavonoides, aceite esencial, poliacetilenos, ácidos clorogénico y caftárico, trazas de alcaloides y glicoproteínas.



EQUINACEA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Extractos y compuestos aislados de la planta mostraron actividad inmunomoduladora *in vitro* e *in vivo*.

Estudios realizados en pacientes, con extractos de la planta y compuestos aislados de la misma, mostraron resultados contradictorios en el tratamiento del resfriado común y afecciones respiratorias. Extractos etanólico y metanólico de la planta presentaron actividad antioxidante.

INDICACIONES.

Uso interno: Coadyuvante en el tratamiento del resfriado común.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

500-1000mg de droga, tres veces al día

Extracto de la planta: 6-9mL diariamente

Tintura (1:5): 0.75-1.5mL, 2 a 5 veces al día.



EQUINACEA

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No utilizar en pacientes con enfermedades autoinmunes o de tipo alérgico, asma bronquial, esclerosis múltiple, tuberculosis y VIH, ni en pacientes con historia de atopía o alergia a esta planta o similares. No se recomienda su uso en embarazo y lactancia. No usar por más de una semana.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Debido a que aumenta la función del sistema inmune, la equinacea puede interferir con los efectos de medicamentos inmunosupresores, corticosteroides y anticuerpos monoclonales.

Puede además presentar interacciones con fexofenadina, itaconazol y ketoconazol, etopósido, paclitaxel, vinblastina, vincristina, lovastatina, midazolam y anticonceptivos orales (Drug Digest 2007; Werneke y col., 2004).



EQUINACEA

TOXICIDAD.

La administración de dosis orales del extracto de la planta no mostró efectos tóxicos en ratas ni ratones. Después de cuatro semanas de administración oral, las pruebas efectuadas y la necropsia no evidenciaron toxicidad. (Mengs U. y col., 1991).


FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Cápsulas con polvo o extracto estandarizado de la planta. Tintura de la raíz 1:5.





EUCALIPTO



EUCALIPTO

Nombre científico.

Eucalyptus globulus Labill.

Sinónimos: No se reportan (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Eucalipto, ocalito ucal, eucaliptus.

Parte utilizada: Hojas

Usos tradicionales.

A la planta se le atribuyen propiedades expectorantes, febrífugas, hipoglicemiantes, mucolíticas y antihelmínticas. El aceite esencial es antitusivo, expectorante y antiséptico

Principales constituyentes.

El aceite esencial contiene cineol (eucaliptol), terpineol, pineno, canfeno, eudesmol, aldehídos y alcohol etílico, amílico e isoamílico. La planta contiene además ácidos fenólicos (gálico, gentísico, cafeico y ferúlico), flavonoides (rutina, quercitrina, isoquercitrina, eucaliptina), terpenos, sesquiterpenos y taninos



EUCALIPTO

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

El aceite esencial contiene cineol (eucaliptol), terpineol, pineno, canfeno, eudesmol, aldehídos y alcohol etílico, amílico e isoamílico. La planta contiene además ácidos fenólicos (gálico, gentísico, cafeico y ferúlico), flavonoides (rutina, quercitrina, isoquercitrina, eucaliptina), terpenos, sesquiterpenos y taninos (González D., 1988; Blair S. y col., 1989; Vanaclocha B. y col., 2003).

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

En estudios con el extracto etanólico y el extracto en hexano se evidenció inhibición de la liberación de histamina. Aceite esencial extraído de tres especies de Eucaliptus mostró efecto analgésico y antiinflamatorio, en ratas y ratones (Silva J. y col., 2003). El extracto metanólico y el aceite esencial presentaron actividad antibacteriana, *in vitro* (Salari M. y col., 2006; Ponce A., y col., 2003).



EUCALIPTO

INDICACIONES.

Uso interno: Expectorante.

Posología. Modo de empleo: Oral

Extracto fluido (1:1): 20-30 gotas cada 8-12 horas

Decocción 3g de hojas: una taza cada 8 horas

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo y lactancia. Inflamaciones del tracto gastrointestinal o de las vías biliares. Insuficiencia hepática.



EUCALIPTO

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Evitar consumir concomitantemente con ansiolíticos. (Del Río P., 2005)

TOXICIDAD.

El eucaliptol es neurotóxico y epileptógeno. La ingestión de 30mL de aceite esencial es letal en adultos y dosis menores (4-5mL) han presentado efectos fatales en algunas personas. El extracto acuoso de las hojas, por administración oral, tiene una DL50 de 4.5g/Kg. (Jouad H., 2004). No se conocen otros reportes sobre estudios de toxicidad.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Extracto de las hojas de eucalipto. Extracto fluido. Decocción



GENCIANA



GENCIANA



- **NOMBRE CIENTÍFICO.** *Gentiana lutea* L.
- **SINÓNIMOS:** Ninguno (Missouri Botanical Garden, 2007).
- **NOMBRES COMUNES:** Genciana, genciana mayor, genciana amarilla, xensá, errosta, gengiba, junciana, xaranzana.
- **PARTE UTILIZADA:** Raíces y rizomas
- **USOS TRADICIONALES.**
 - La planta es empleada en problemas gastrointestinales como dolor de estómago, gastritis, pirosis, diarrea, vómito, distensión abdominal, meteorismo intestinal y síndrome de colon irritable. Es utilizada como ingrediente de aperitivos
- **PRINCIPALES CONSTITUYENTES.**
 - Secoiridoides (Swertiamarina, genciopicrosido, amarogencina, swerósido), xantonas (gentisina, isogentisina), xantonas glicosiladas (genciósidos), fitosteroles, pectinas.

GENCIANA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Se considera que los principios activos son las sustancias amargas que contiene la planta. Compuestos con núcleo flavonoides y cumarina aislados de las raíces **mostraron inhibición de la MAO** (Haraguchi H. y col., 2004). Extractos en etanol y éter de petróleo presentaron actividad antiinflamatoria en ratas y ratones en tres modelos de inflamación; ambos extractos aceleran los procesos de cicatrización (Mathew A. y col, 2004).

El extracto metanólico de raíces y algunas fracciones aisladas de las mismas mostraron actividad gastroprotectora, en ratas. (Niiho Y. y col., 2006).

INDICACIONES.

Uso interno: Estimulante del apetito. Coadyuvante en el tratamiento de dispepsias.



GENCIANA

POSOLOGÍA. Modo de empleo: Oral

Extracto seco (5:1): 0.3-1.0g al día.

Tintura (1:5) en alcohol : 1-4mL tres veces al día

Polvo de la raíz: 25mg tres veces al día.

Infusión preparada añadiendo una cucharada de rizoma en polvo a 750 mL de agua: tomar una cucharada, media o una hora antes de comer.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo, hipertensión. En individuos sensibles puede ocasionar cefalea e irritación estomacal. La sobredosis de genciana puede ocasionar náuseas y vómito.

TOXICIDAD.

La LD50 de la planta en ratones es de 480mg/kg, vía oral; 350mg/kg, vía intraperitoneal (Chang K., 2003).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Cápsulas con polvo de raíz de genciana. Extracto seco deshidratado. Polvo para infusión. Extracto fluido. Tintura 1:5.



GERANIO



GERANIO

NOMBRE CIENTÍFICO.

Pelargonium sidoides DC.

SINÓNIMOS: No se encuentran (Missouri Botanical Garden, 2007).

NOMBRE COMÚN: Geranio

PARTE UTILIZADA: Raíz

USOS TRADICIONALES.

Se emplea en el tratamiento de enfermedades infecciosas especialmente del tracto respiratorio, en casos de tos, diarrea, tuberculosis, bronquitis, disentería y como cicatrizante.

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

La planta contiene cumarinas, fenoles, ácido gálico, proantocianidinas, epigallocatequina y galocatequina, 7-hidroxi-cumarinas (umckalina), taninos, aminoácidos, ácidos caféico.



GERANIO

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Extractos y compuestos aislados de la planta mostraron actividad inmunomoduladora (Kolodziej H. y col., 2003).

En estudios clínicos realizados con pacientes con fiebre, resfriado común, bronquitis y disnea, se observó reducción significativa de los síntomas por la administración de extractos u otras preparaciones de las raíces.

Se determinó actividad antibacteriana y antifúngica de extractos etanólico, metanólico y en acetona de los brotes y las raíces de geranio

INDICACIONES.

Uso interno: Inmunomodulador. Coadyuvante en el tratamiento de las infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias.



GERANIO

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Extracto de las raíces: Adultos, 20-30 gotas, 3 veces al día antes de los alimentos.

Niños 6-12 años : 20 gotas

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipersensibilidad a los componentes de la planta, tendencia hemorrágica aumentada, enfermedades graves hepáticas o renales, embarazo y lactancia. Pueden presentarse efectos adversos: desórdenes gastrointestinales y del sistema nervioso, molestias respiratorias, desórdenes del oído, diarrea, exantema, urticaria, cefalea, erupciones, petequias, malestar y náuseas (Mathys H. y col., 2007; Martins K. y col., 2007)



GERANIO

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Por su contenido de cumarinas puede incrementarse el riesgo de sangrado al administrarse concomitante con derivados cumarínicos o luego de una terapia con anticoagulantes. (Koch E. y col., 2007).

TOXICIDAD.

No existen reportes sobre estudios de toxicidad aguda o a dosis repetidas.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Solución oral con extracto (1:10) de raíces en etanol..

GINKGO BILOBA



GINKGO BILOBA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Ginkgo biloba L.

SINÓNIMOS: *Salisburia adiantifolia* Sm., *Salisburia biloba* Hoffmanns (Missouri Botanical Garden, 2007).

NOMBRE COMÚN: Ginkgo.

PARTE UTILIZADA: Hojas.

USOS TRADICIONALES.

Históricamente las hojas de esta planta han sido empleadas en el tratamiento de palpitaciones y disnea debida a congestión y opresión del pecho. Hoy para **mejorar la circulación y la agudeza mental**, en la prevención y tratamiento de la **enfermedad de Alzheimer**, tratamiento de neuropatía periférica, disfunción sexual y desórdenes relacionados con falta de atención, prevención de infartos y como agente antioxidante. También se emplea en casos de nefropatías ocasionadas por diabetes, vértigo, tinnitus, alergias y asma (Upton R., 2003).



GINKGO BILOBA



PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Flavonoides glicosilados y las lactonas terpénicas. Las hojas contienen además ácidos orgánicos, derivados poliacetilénicos y carbohidratos. Las lactonas terpénicas más importantes son los ginkgólidos A,B,C, J y la bilobalida.

Flavonas (luteolina, apigenina y glicósidos de las mismas) y flavonoles, entre ellos quercetina, kamferol, isoramnetina y miricetina.

Dentro de los derivados poliacetilénicos se encuentran: ácido ginkgólico y ácido resorcílico, 3-alquilfenoles conocidos como ginkgoles y 5-alquilresorcinoles, conocidos como biloboles. Adicionalmente se encuentran ácidos ascórbico, butírico, p-hidrobenczoico y protocatéquico (van Beek T., 2002; Upton R., 2003).

GINKGO BILOBA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.



Se ha demostrado que el extracto puede mejorar algunas afecciones de la función visual ocasionadas por desórdenes circulatorios. Se ha determinado actividad del extracto de las hojas en el tratamiento de tinnitus y vértigo.

El uso del extracto de hojas en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cerebrovascular o demencia.

Estudios clínicos han demostrado efectos positivos sobre enfermedad arterial periférica oclusiva y efecto protector contra el daño cardíaco y cerebral inducido por hipoxia.

Se conocen efectos vasorreguladores, incluyendo vasorrelajación, vasoconstricción y aumento de la resistencia capilar (Upton R., 2003; Nishida S. y col., 2003; Satoh H. y col., 2004).

Existe evidencia **del efecto antioxidante del extracto de hojas** (Upton R., 2003; Erdogan H. y col., 2006; Liu C. y col., 2006; Gulec M. y col., 2006; Sener G. y col., 2007; Liu X. y col., 2007). **Se ha reportado actividad antiinflamatoria, antinociceptiva y antiulcerosa del extracto de hojas** (Abdel-Salam O. y col., 2004).

GINKGO BILOBA

INDICACIONES.

Uso interno: Vasodilatador periférico.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

120-240mg de extracto seco, 2-3 veces al día, durante 8 semanas.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

No utilizar extractos de la planta cuando las arterias presentan alto grado de

arteriosclerosis y hayan perdido su capacidad de respuesta.

Hipersensibilidad a los componentes.



GINKGO BILOBA

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Puede aumentarse el riesgo de sangrado al ser administrado concomitantemente con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios.

La bilobalida y el ginkgósido A, pueden incrementar la actividad de algunas enzimas hepáticas, por lo que pueden interferir en el metabolismo hepático y niveles plasmáticos de fármacos como propranolol, haloperidol y teofilina.

Algunos reportes señalan que la administración del extracto de hojas de ginkgo potencia la acción de las benzodiazepinas.



GINKGO BILOBA

TOXICIDAD.

Ha sido clasificada como una planta que puede ser **consumida de manera segura**, cuando es empleada de manera correcta. El valor de la DL50 del extracto de las hojas, por vía peritoneal en ratones y ratas, es respectivamente de 1900 y 2100mg/Kg.

Por vía oral este valor es mayor de 7000mg/Kg (Upton R., 2003). Estudios efectuados en ratones y perros a los cuales se les administró el extracto de Ginkgo por seis meses, en diferentes dosis, han sugerido la seguridad del extracto al no evidenciarse cambios significativos en parámetros bioquímicos, hematológicos e histopatológicos.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES

Cápsulas y tabletas con extracto seco de *Ginkgo biloba*. Solución oral con extracto seco de la planta.





GINSENG



GINSENG

NOMBRE CIENTÍFICO.

Panax ginseng C.C. Mey.

SINÓNIMOS: *Aralia quinquefolia* var. *Ginseng*, C.A. Meyer, *Panax chin-seng* Nees.
(Missouri Botanical Garden, 2007).

NOMBRES COMUNES: Ginseng, mandrágora.

PARTE UTILIZADA: Raíz.

USOS TRADICIONALES.

El Ginseng ha tenido diferentes usos, muchos de los cuales no tienen sustentación científica; entre estos usos se encuentra el tratamiento de anemia, asma, diabetes, dispepsia, tos, debilidad, impotencia, poliuria, neurastenia, hiperglicemia, fiebre, caquexia, malaria, náuseas, aterosclerosis y úlceras. También se ha empleado como cardiotónico, afrodisíaco, tranquilizante, expectorante, sialogogo, demulcente, hipolipemiente, aperitivo y para incrementar la energía física y mental, fortalecer la memoria y en caso de situaciones que involucren estrés físico y emocional.



GINSENG

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Se han realizado numerosos estudios sobre diferentes actividades farmacológicas del ginseng: **actividad sobre el SNC** (Wagner H. y col., 1988), **efectos cardiovasculares** (Gillis C., 1997), actividad adaptogénica (Naval M. y col., 2002), **hipoglicemiante** (Xie J. y col ., 2002; Jung C. y col ., 2005; Vuksan V. y col ., 2008), **hipolipemiante** (Kim S. y Park K., 2003), **anticarcinogénica** (Yun T., 2003), **sobre la función cognitiva** (Kiefer D. y Pantuso T., 2003), cerebro protectora (Shah Z y col., 2005), **antiinflamatoria** (Xia Z. y col., 2005), antimutagénica (Ivanova T. y col., 2006), **efectos sobre la enfermedad de Alzheimer** (Chen F. y col., 2006), **actividad antioxidante** (Masteikova R. y col., 2007) y hepatoprotectora (Gum S. y col ., 2007).

INDICACIONES.

Uso interno: Estimulante del sistema nervioso central. Coadyuvante en el tratamiento de estados de agotamiento físico, agotamiento mental y astenia.



GINSENG

POSOLOGÍA. Modo de empleo: Oral 1-2g de droga o su equivalente en preparaciones, diariamente.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo, lactancia, hipertensión y ansiedad.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS.

Debe evitarse su uso concomitante con warfarina, hipoglicemiantes orales, insulina, fenelzina y cafeína, medicamentos hormonales, inhibidores de la MAO y alimentos sazonados con especias (Fetrow C. y Ávila J., 2000; Kiefer D. y Pantuso T., 2003).


TOXICIDAD.

Se ha determinado una DL50 para la raíz, por vía oral en ratas.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Cápsulas con extracto estandarizado de ginseng. Suspensión oral con extracto seco estandarizado de ginseng. Elixir.

Cápsulas y tabletas con polvo de raíz de ginseng.





GUABA

GUABA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Phytolacca bogotensis Kunth.

Sinónimos: *Phytolacca australis* Phil (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes : Guaba, cargamanta, papa cimarrona.

Parte utilizada: Raíz.

USOS TRADICIONALES.

La raíz desecada se emplea, en dosis menores, como antiinflamatorio y antirreumático (González D., 1998).

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Saponinas, fitolacina o ácido fitoláctico, ácido fórmico, glucósidos, triterpenos, oxalato de calcio y materias pépticas.

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

La principal actividad es como antiinflamatorio local, para uso externo.

INDICACIONES.

Uso externo: Antiinflamatorio local.



GUABA

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Tópico

Aplicar la preparación una o más veces al día.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Hipersensibilidad a los componentes de la planta.

TOXICIDAD.

La dosis mínima letal en cobayos, de la planta seca, es de alrededor 4g/Kg por vía subcutánea o intraperitoneal. En conejos se han observado síntomas de intoxicación 48 horas después de la administración subcutánea de 2.5-3.0g de planta seca o de 3mL/Kg de jugo de la planta fresca (García-Barriga H., 1974).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Crema y solución tópica con extracto (1:1) en etanol.





GUALANDAY

GUABA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Jacaranda caucana Pittier.

Sinónimos: *Jacaranda caucana* subs. *sandwithiana*, *Jacaranda filicifolia* D. Don ex Seem. (Missouri Botanical Garden, 2007).

Nombres comunes: Gualanday, acacia, aceituno, caballito, caro, cornique, guayacán, palo de boba, piñón de oreja.

Parte utilizada: Hojas.

USOS TRADICIONALES.

La planta se emplea en el tratamiento de enfermedades venéreas, várices, eczemas, forúnculos, otras afecciones de la piel y leishmaniasis (Correa J. y col., 1989; Gupta M., 1995; Weniger B. y col., 2001).

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Jacarona, ácido jacarándico, β -sitosterol, ácido ursólico, ácido jacoumárico, ácido betulínico, ácido 2-O-hidroxiursólico y triterpenos (Correa J. y col., 1989; Gupta M., 1995).



GUABA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Estudios realizados con *P. falciparum*, *Leishmania amazonensis*, *L. braziliensis*, *L. infantum* y *T. cruzi* no permitieron determinar actividad antiparasitaria del extracto metanólico de las hojas (Weniger B. y col., 2001).

INDICACIONES.

Uso externo: Antiséptico, cicatrizante.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Tópico

Aplicar las preparaciones una o más veces al día

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Solo para uso externo.

TOXICIDAD.

No existen estudios sobre el particular.

FORMAS FARMACÉUTICAS.

Loción y crema con extracto de la planta.





GUARANA

GUARANA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Paullinia cupana H.B.K.

SINÓNIMOS: *Paullinia sorbilis* (L.) Mart. (Missouri Botanical Garden, 2007)

NOMBRES COMUNES: Guaraná, cupana, paulinia, guaranazeiro, guanazeiro, guará.

Parte utilizada: Semillas

USOS TRADICIONALES.

Se emplea como febrífugo, antineurálgico, antidiarreico, estimulante físico y del sistema nervioso central, analgésico, antigripal, vasodilatador, diurético, astringente, antibacteriano y afrodisíaco (Gupta M., 1995; Plantamed, 2007; Lleras E., 2007)

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Contiene alcaloides (cafeína, teobromina, teofilina), taninos, pectina, saponinas y aceite esencial con sesquiterpenos, monoterpenos, anetol y estragol.



GUARANA



ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

No se comprobaron mejoras en la salud cognitiva de ancianos por administración de guaraná (DerMarderosian A. y col., 2002). El extracto etanólico presentó actividad antibacteriana y actividad antioxidante (Basile A. y col., 2005).

INDICACIONES.

Uso interno: Estimulante del sistema nervioso central.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Decocción e infusión: una taza tres veces al día

Semillas pulverizadas: 1g tres veces al día



GUARANA



CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo y lactancia, personas con patologías cardiovasculares o sensibles a la cafeína, ansiedad, colon irritable, arritmias.

TOXICIDAD.

No se ha observado mortalidad ni alteraciones histopatológicas al administrar hasta 2g/Kg, vía oral o intraperitoneal, a animales de laboratorio. Se han observado efectos genotóxicos y mutagénicos moderados en procariotes (Vanaclocha B. y col., 2003).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Cápsulas con polvo de las semillas. Decocción. Infusión.





GUAYUSA

GUAYUSA

NOMBRE CIENTÍFICO.

Ilex guayusa Loes.

SINÓNIMOS: No se conocen (Missouri Botanical Garden, 2006).

NOMBRE COMÚN: Guayusa

PARTE UTILIZADA: Hojas.

USOS TRADICIONALES.

La decocción de las hojas se emplea como estimulante, narcótico, hipnótico, tónico, diaforético, diurético y en el tratamiento de dolores de cabeza, afecciones catarrales y estados gripales (Lewis W. y col., 1991; Lee R. y col, 2006).

PRINCIPALES CONSTITUYENTES.

Las hojas contienen cafeína en cantidades variables, superiores a las del café y el té; contiene además teobromina y cantidades menores de teofilina y otras xantinas, esteroides, terpenoides y lactonas terpénicas (Bernal H. y col, 1990; Gupta M., 1995; Pinzón R. y col., 2003).



GUAYUSA

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA.

Por el alto contenido de cafeína, el extracto etanólico de las hojas presenta estimulación marcada sobre el sistema nervioso central y simpático.

Debido a la cantidad de cafeína que contiene la planta, su consumo ocasiona además estimulación cardíaca y de la musculatura esquelética, aumenta el estado de vigilia e incrementa la capacidad de realizar esfuerzo físico.

INDICACIONES.

Uso interno: Estimulante del sistema nervioso central.

POSOLOGÍA.

Modo de empleo: Oral

Infusión preparada hirviendo una cucharada de las hojas en 1 a 2 tazas de agua: 2 a 3 tazas por día



GUAYUSA

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.

Embarazo. Deben tenerse en cuenta las contraindicaciones reportadas para el consumo de cafeína. El consumo en exceso puede producir vómito y alteraciones del sistema nervioso central.

INTERACCIÓN CON FÁRMACOS.

Pueden presentarse las interacciones propias de la cafeína y, en general, de los derivados de las xantinas.

TOXICIDAD.

La administración de la infusión o la decocción no presenta signos de toxicidad aguda a dosis altas.


FORMAS FARMACÉUTICAS Y OTRAS PREPARACIONES.

Infusión.



PARTE II.

HAMAMELIS



GRACIAS.