

Lista de Exercícios - Unidade 2  
Convergência Estocástica e Resultados Limite  
50 Questões Completas

Curso de Inferência Estatística  
Outubro 2025 - Versão Atualizada

## Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Lei Fraca dos Grandes Números</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Convergência via Momentos (Resultado 2P)</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Teorema de Slutsky</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Teorema Central do Limite</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Método Delta / Teorema de Mann-Wald</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Convergência em Distribuição</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Gabarito e Dicas</b>	<b>8</b>
8.1	Dicas Gerais de Resolução . . . . .	8
8.2	Respostas Seleccionadas . . . . .	9

# 1 Introdução

Esta lista contém 50 questões organizadas por teorema, com 5 questões para cada um dos principais resultados da Unidade 2. Cada questão indica explicitamente qual teorema está sendo testado e utiliza diversas distribuições estudadas no curso.

**Distribuições utilizadas:** Normal, Poisson, Uniforme, Exponencial, Chi-quadrado, Bernoulli, Cauchy, Gamma e Beta.

**Teoremas cobertos:**

1. Lei Fraca dos Grandes Números
2. Convergência via Momentos
3. Teorema de Slutsky
4. Teorema Central do Limite
5. Método Delta / Teorema de Mann-Wald
6. Convergência em Distribuição
7. TCL para Variância Amostral
8. Teorema da Função Contínua (Convergência em Distribuição)
9. Estimadores Consistentes
10. Propriedades Assintóticas dos EMVs

## 2 Lei Fraca dos Grandes Números

### [Questão 1] Lei Fraca dos Grandes Números

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$  onde  $\mu = 5$  e  $\sigma^2 = 4$ .

- (a) Mostre que  $\bar{X}_n \xrightarrow{P} 5$ .
- (b) Calcule  $P(|\bar{X}_n - 5| \geq 0.5)$  usando a desigualdade de Chebyshev para  $n = 64$ .
- (c) Compare o resultado do item (b) com o valor exato obtido usando que  $\bar{X}_n \sim N(5, 4/n)$ .

### [Questão 2] Lei Fraca dos Grandes Números

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$  onde  $\lambda = 3$ .

- (a) Verifique que  $E[X_i]$  e  $\text{Var}(X_i)$  são finitos.
- (b) Mostre que  $\bar{X}_n \xrightarrow{P} 3$ .
- (c) Encontre  $n$  tal que  $P(|\bar{X}_n - 3| \geq 0.3) \leq 0.05$  usando a desigualdade de Chebyshev.

### [Questão 3] Lei Fraca dos Grandes Números

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, \theta)$  onde  $\theta = 10$ .

- (a) Calcule  $E[X_i]$  e  $\text{Var}(X_i)$ .
- (b) Mostre que  $\bar{X}_n \xrightarrow{P} 5$ .
- (c) Use a LFGN para justificar que  $\bar{X}_n$  é um estimador consistente para  $\theta/2$ .

### [Questão 4] Lei Fraca dos Grandes Números

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\beta)$  onde  $\beta = 2$  (taxa).

- (a) Calcule  $E[X_i]$  e  $\text{Var}(X_i)$ .
- (b) Mostre que  $\bar{X}_n \xrightarrow{P} 1/2$ .
- (c) Se quisermos estimar  $\beta$  usando  $T_n = 1/\bar{X}_n$ , mostre que  $T_n$  é consistente para  $\beta$  usando o teorema da função contínua.

### [Questão 5] Lei Fraca dos Grandes Números

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Cauchy}(0, 1)$  (distribuição de Cauchy padrão).

- (a) Explique por que a LFGN **não pode** ser aplicada diretamente neste caso.
- (b) Mostre que  $E[|X_i|] = \infty$ .
- (c) Discuta o comportamento de  $\bar{X}_n$  neste caso. Ele converge?

## 3 Convergência via Momentos (Resultado 2P)

### [Questão 6] Convergência via Momentos

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \chi_k^2$  (qui-quadrado com  $k$  graus de liberdade).

- (a) Mostre que  $E[X_i] = k$  e  $\text{Var}(X_i) = 2k$ .
- (b) Use o Resultado 2P com  $r = 2$  para mostrar que  $\bar{X}_n \xrightarrow{P} k$ .
- (c) Calcule explicitamente  $E[(\bar{X}_n - k)^2]$  e mostre que converge para zero.

### [Questão 7] Convergência via Momentos

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$  onde  $p = 0.6$ .

- (a) Defina  $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ .
- (b) Mostre que  $E[S_n^2] = p(1-p) = 0.24$ .
- (c) Use o Resultado 2P para mostrar que  $S_n^2 \xrightarrow{P} 0.24$ .

### [Questão 8] Convergência via Momentos

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(a, b)$ .

- (a) Seja  $T_n = X_{(n)}$  (o máximo da amostra). Calcule  $E[T_n]$  e mostre que  $E[T_n] \rightarrow b$ .
- (b) Calcule  $E[(T_n - b)^2]$  e mostre que converge para zero.
- (c) Conclua que  $T_n \xrightarrow{P} b$  pelo Resultado 2P.

### [Questão 9] Convergência via Momentos

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

- (a) Seja  $T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ . Calcule  $E[T_n]$ .
- (b) Mostre que  $E[(T_n - (\mu^2 + \sigma^2))^2] \rightarrow 0$ .
- (c) Conclua que  $T_n \xrightarrow{P} \mu^2 + \sigma^2$ .

### [Questão 10] Convergência via Momentos

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  (taxa  $\lambda$ ).

- (a) Defina  $T_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i}$ . Este é o estimador de máxima verossimilhança para  $\lambda$ .
- (b) Mostre que  $E[1/T_n] = 1/\lambda$  (dica:  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$ ).
- (c) Argumente que  $T_n \xrightarrow{P} \lambda$  usando a LFGN e o teorema da função contínua.

## 4 Teorema de Slutsky

### [Questão 11] Teorema de Slutsky

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

- (a) Mostre que  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{D} N(0, 1)$  pelo TCL.
- (b) Mostre que  $S_n \xrightarrow{P} \sigma$ .
- (c) Use o Teorema de Slutsky para mostrar que  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \xrightarrow{D} N(0, 1)$ .

### [Questão 12] Teorema de Slutsky

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  onde  $\lambda = 2$ .

- (a) Pelo TCL,  $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1/2) \xrightarrow{D} N(0, 1/4)$ .
- (b) Defina  $U_n = \sqrt{n}(\bar{X}_n - 1/2)$  e  $V_n = \bar{X}_n$ . Mostre que  $U_n \xrightarrow{D} N(0, 1/4)$  e  $V_n \xrightarrow{P} 1/2$ .
- (c) Use Slutsky para encontrar a distribuição limite de  $W_n = U_n \cdot V_n = \sqrt{n}\bar{X}_n(\bar{X}_n - 1/2)$ .

### [Questão 13] Teorema de Slutsky

Sejam  $\{X_n, n \geq 1\}$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, \theta)$  onde  $\theta > 0$  é desconhecido.

- (a) Sabe-se que  $U_n = \frac{n}{\theta}(\theta - T_n) \xrightarrow{D} \text{Exp}(1)$  onde  $T_n = X_{(n)}$ .
- (b) Mostre que  $T_n \xrightarrow{P} \theta$ .
- (c) Defina  $Q_n = \frac{n(\theta - T_n)}{T_n}$ . Use Slutsky para encontrar a distribuição limite de  $Q_n$ .

### [Questão 14] Teorema de Slutsky

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$ .

- (a) Pelo TCL,  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$ .
- (b) Mostre que  $\sqrt{\bar{X}_n} \xrightarrow{P} \sqrt{\lambda}$ .
- (c) Use Slutsky para mostrar que  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \lambda)}{\sqrt{\bar{X}_n}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$ .

### [Questão 15] Teorema de Slutsky

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Cauchy}(\theta, 1)$  (localização  $\theta$ , escala 1).

- (a) Explique por que o TCL não pode ser aplicado diretamente para  $\bar{X}_n$ .
- (b) Suponha que, por outro método, sabemos que  $a_n(M_n - \theta) \xrightarrow{D} \text{Cauchy}(0, 1)$  onde  $M_n$  é a mediana amostral e  $a_n$  é alguma constante.
- (c) Discuta se seria possível usar Slutsky neste contexto se tivéssemos  $V_n \xrightarrow{P} c$ .

## 5 Teorema Central do Limite

### [Questão 16] Teorema Central do Limite

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$  onde  $p = 0.3$ .

- (a) Calcule  $E[X_i]$  e  $\text{Var}(X_i)$ .
- (b) Use o TCL para aproximar  $P(\bar{X}_n \leq 0.35)$  para  $n = 100$ .
- (c) Compare com a aproximação normal para a binomial:  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$ .

### [Questão 17] Teorema Central do Limite

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  onde  $\lambda = 1$ .

- (a) Verifique que  $E[X_i] = 1$  e  $\text{Var}(X_i) = 1$ .
- (b) Use o TCL para aproximar  $P(0.9 \leq \bar{X}_n \leq 1.1)$  para  $n = 50$ .
- (c) Calcule a distribuição exata de  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$  e compare.

### [Questão 18] Teorema Central do Limite

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, 1)$ .

- (a) Calcule  $E[X_i] = 1/2$  e  $\text{Var}(X_i) = 1/12$ .
- (b) Use o TCL para encontrar  $P(|\bar{X}_n - \frac{1}{2}| \leq 0.05)$  para  $n = 100$ .
- (c) Encontre  $n$  tal que  $P(|\bar{X}_n - \frac{1}{2}| \leq 0.01) \geq 0.95$ .

### [Questão 19] Teorema Central do Limite

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$  onde  $\lambda = 5$ .

- (a) Lembre que para Poisson,  $E[X_i] = \text{Var}(X_i) = \lambda = 5$ .
- (b) Use o TCL para aproximar  $P(\bar{X}_n \geq 5.5)$  para  $n = 100$ .
- (c) Use o TCL para aproximar  $P(S_n \geq 550)$  onde  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$  e compare com o item anterior.

### [Questão 20] Teorema Central do Limite

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Cauchy}(0, 1)$ .

- (a) Mostre que  $E[X_i]$  não existe (integral diverge).
- (b) Explique por que o TCL não se aplica.
- (c) Pesquise: qual é a distribuição de  $\bar{X}_n$  neste caso? (Dica: A soma de Cauchys independentes é Cauchy)

## 6 Método Delta / Teorema de Mann-Wald

### [Questão 21] Método Delta

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$  onde  $\mu > 0$ .

- (a) Pelo TCL,  $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$ .
- (b) Use o Método Delta com  $g(x) = \sqrt{x}$  para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}(\sqrt{\bar{X}_n} - \sqrt{\mu})$ .
- (c) Calcule  $g'(\mu)$  e escreva explicitamente a variância assintótica.

### [Questão 22] Método Delta

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$ .

- (a) Sabe-se que  $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \lambda) \xrightarrow{D} N(0, \lambda)$ .
- (b) Use o Método Delta com  $g(x) = x^3$  para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}(\bar{X}_n^3 - \lambda^3)$ .
- (c) Verifique que a variância assintótica é  $9\lambda^5$ .

### [Questão 23] Método Delta

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  (taxa  $\lambda$ ).

- (a) Pelo TCL,  $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1/\lambda) \xrightarrow{D} N(0, 1/\lambda^2)$ .
- (b) Use o Método Delta com  $g(x) = \log(x)$  para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}(\log(\bar{X}_n) - \log(1/\lambda))$ .
- (c) Simplifique a variância assintótica.

### [Questão 24] Método Delta

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, 1)$ .

- (a) Sabemos que  $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1/2) \xrightarrow{D} N(0, 1/12)$ .
- (b) Use o Método Delta com  $g(x) = \frac{1}{x}$  para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}\left(\frac{1}{\bar{X}_n} - 2\right)$ .
- (c) Calcule explicitamente  $g'(1/2)$  e a variância assintótica.

### [Questão 25] Método Delta

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$  onde  $0 < p < 1$ .

- (a) Pelo TCL,  $\sqrt{n}(\bar{X}_n - p) \xrightarrow{D} N(0, p(1-p))$ .
- (b) Use o Método Delta com  $g(x) = \log\left(\frac{x}{1-x}\right)$  (transformação logit) para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}\left[\log\left(\frac{\bar{X}_n}{1-\bar{X}_n}\right) - \log\left(\frac{p}{1-p}\right)\right]$ .
- (c) Calcule  $g'(p)$  e verifique que a variância assintótica é  $\frac{1}{p(1-p)}$ .

## 7 Convergência em Distribuição

### [Questão 26] Convergência em Distribuição

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, \theta)$ .

- (a) Seja  $T_n = X_{(n)}$  o máximo amostral. Encontre a f.d.a. de  $T_n$ .
- (b) Defina  $U_n = \frac{n}{\theta}(\theta - T_n)$ . Encontre a f.d.a. de  $U_n$ .
- (c) Mostre que  $U_n \xrightarrow{D} \text{Exp}(1)$  quando  $n \rightarrow \infty$ .

### [Questão 27] Convergência em Distribuição

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(1)$ .

- (a) Seja  $Y_n = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ . Encontre a distribuição de  $Y_n$ .
- (b) Considere  $Z_n = n \cdot Y_n$ . Encontre a distribuição de  $Z_n$ .
- (c) O que acontece com a distribuição de  $Z_n$  quando  $n \rightarrow \infty$ ?

### [Questão 28] Convergência em Distribuição

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(0, 1)$ .

- (a) Defina  $T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ . Qual é a distribuição de  $n \cdot T_n$ ?
- (b) Mostre que  $T_n \xrightarrow{P} 1$ .
- (c) Use o TCL para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}(T_n - 1)$ .

### [Questão 29] Convergência em Distribuição

Sejam  $Y_n \sim \text{Gamma}(n, n)$  (forma  $\alpha = n$ , taxa  $\beta = n$ ).

- (a) Calcule  $E[Y_n]$  e  $\text{Var}(Y_n)$ .
- (b) Mostre que  $Y_n \xrightarrow{P} 1$ .
- (c) Use o TCL para a distribuição Gamma para mostrar que  $\sqrt{n}(Y_n - 1) \xrightarrow{D} N(0, 1)$ .

### [Questão 30] Convergência em Distribuição

Sejam  $X_n \sim \text{Beta}(n, 1)$  para  $n \geq 1$ .

- (a) Encontre a f.d.p. de  $X_n$  e mostre que  $E[X_n] = \frac{n}{n+1}$ .
- (b) Mostre que  $X_n \xrightarrow{P} 1$ .
- (c) Defina  $Y_n = n(1 - X_n)$ . Encontre a distribuição limite de  $Y_n$  quando  $n \rightarrow \infty$ .

## 8 Gabarito e Dicas

### 8.1 Dicas Gerais de Resolução

1. **Identifique o teorema aplicável:** Leia atentamente qual teorema está sendo testado no cabeçalho da questão.
2. **Verifique as condições:** Antes de aplicar um teorema, verifique que todas as condições são satisfeitas (i.i.d., momentos finitos, etc.).
3. **LFGN:** Use quando precisar mostrar  $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ . Verifique  $E[X_i] < \infty$  e (para versão simples)  $\text{Var}(X_i) < \infty$ .
4. **TCL:** Use quando precisar da *distribuição* de  $\bar{X}_n$  padronizada. Sempre resulta em  $N(0, 1)$  assintoticamente.
5. **Slutsky:** Use quando precisar substituir parâmetros desconhecidos ou combinar convergências de tipos diferentes.
6. **Método Delta:** Use quando tiver uma transformação não-linear  $g(\bar{X}_n)$  e quiser sua distribuição assintótica.



7. **Distribuição Cauchy:** Lembre-se que é o contraexemplo padrão - não tem momentos finitos!
8. **Cálculos de variância:** Para  $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$ . Para soma:  $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2$ .
9. **Padronização:** Sempre padronize corretamente:  $(T_n - E[T_n])/\sqrt{\text{Var}(T_n)}$ .
10. **Derivadas no Método Delta:** Não esqueça de calcular  $g'(\theta)$  e elevar ao quadrado para a variância.

## 8.2 Respostas Seleccionadas

**Questão 5(c):**  $\bar{X}_n$  tem a mesma distribuição que  $X_1$  (distribuição Cauchy) para todo  $n$ . Não há convergência!

**Questão 11(c):** Este é o resultado fundamental que permite usar estatística  $t$  quando  $\sigma$  é desconhecido.

**Questão 16(b):**  $P(\bar{X}_n \leq 0.35) \approx P\left(Z \leq \frac{0.35-0.3}{\sqrt{0.21/100}}\right) = P(Z \leq 1.09) \approx 0.862$ .

**Questão 21(b):** Variância assintótica:  $\sigma^2/(4\mu)$ .

**Questão 26(c):** Use que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{u}{n}\right)^n = e^{-u}$ .

**Questão 30(c):**  $Y_n \xrightarrow{D} \text{Exp}(1)$  (use transformação de variáveis).

## 9 TCL para Variância Amostral

### [Questão 31] TCL para Variância Amostral

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$  onde  $\mu = 0$  e  $\sigma^2 = 1$ .

- (a) Calcule  $\mu_4 = E[(X_i - \mu)^4]$  para a distribuição normal padrão.
- (b) Use o TCL para variância amostral para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}(S_n^2 - 1)$ .
- (c) Construa um intervalo de confiança assintótico de 95% para  $\sigma^2$  quando  $n = 100$  e  $S_n^2 = 1.2$ .

### [Questão 32] TCL para Variância Amostral

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  onde  $\lambda = 2$ .

- (a) Calcule  $E[X_i] = 1/2$ ,  $\text{Var}(X_i) = 1/4$ , e  $\mu_4 = E[(X_i - 1/2)^4]$ .
- (b) Dica: Para exponencial,  $\mu_4 = 9/\lambda^4$ . Verifique este valor.
- (c) Use o TCL para  $S_n^2$  para encontrar  $P(S_n^2 > 0.3)$  aproximadamente quando  $n = 50$ .

### [Questão 33] TCL para Variância Amostral

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, 1)$ .

- (a) Calcule  $E[X_i] = 1/2$ ,  $\text{Var}(X_i) = 1/12$ , e o quarto momento central.
- (b) Mostre que  $\mu_4 = E[(X_i - 1/2)^4] = 1/80$ .
- (c) Use o TCL para  $S_n^2$  para aproximar  $P(|S_n^2 - 1/12| \leq 0.01)$  quando  $n = 100$ .

### [Questão 34] TCL para Variância Amostral

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$  onde  $\lambda = 5$ .

- (a) Para Poisson, mostre que  $\mu_4 = \lambda + 3\lambda^2 + \lambda^3 = 5 + 75 + 125 = 205$ .
- (b) Use o TCL para variância amostral:  $\sqrt{n}(S_n^2 - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \mu_4 - \lambda^2)$ .
- (c) Calcule a variância assintótica e use-a para aproximar  $P(S_n^2 > 6)$  quando  $n = 80$ .

### [Questão 35] TCL para Variância Amostral

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$  onde  $p = 0.4$ .

- (a) Calcule  $\text{Var}(X_i) = p(1-p) = 0.24$  e  $\mu_4 = p(1-p)[(1-p)^2 + p^2]$ .
- (b) Simplifique:  $\mu_4 = p(1-p)(1-2p(1-p))$  e calcule para  $p = 0.4$ .
- (c) Use o TCL para  $S_n^2$  para testar  $H_0 : \sigma^2 = 0.24$  vs  $H_1 : \sigma^2 \neq 0.24$  ao nível 5% quando  $n = 100$  e  $S_n^2 = 0.28$ .

## 10 Teorema da Função Contínua para Convergência em Distribuição

### [Questão 36] Teorema da Função Contínua (Distribuição)

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

- (a) Pelo TCL,  $Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ .
- (b) Use o teorema da função contínua com  $g(x) = x^2$  para mostrar que  $Z_n^2 \xrightarrow{d} \chi_1^2$ .
- (c) Conclua que  $n \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right)^2 \xrightarrow{d} \chi_1^2$ .

### [Questão 37] Teorema da Função Contínua (Distribuição)

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ .

- (a) Pelo TCL,  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1/\lambda)}{\sqrt{1/\lambda^2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ .
- (b) Defina  $Z_n = \lambda\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1/\lambda)$ . Use o teorema da função contínua com  $g(x) = |x|$  para encontrar a distribuição de  $|Z_n|$ .
- (c) Mostre que  $Z_n^2 \xrightarrow{d} \chi_1^2$ .

### [Questão 38] Teorema da Função Contínua (Distribuição)

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, 1)$ .

- (a) Sabemos que  $\sqrt{12n}(\bar{X}_n - 1/2) \xrightarrow{d} N(0, 1)$ .
- (b) Use o teorema da função contínua com  $g(x) = e^x$  para encontrar a distribuição limite de  $\exp(\sqrt{12n}(\bar{X}_n - 1/2))$ .
- (c) Esta é uma distribuição log-normal. Identifique seus parâmetros.

### [Questão 39] Teorema da Função Contínua (Distribuição)

Sejam  $U_n \xrightarrow{d} U \sim N(0, 1)$  e  $V_n \xrightarrow{d} V \sim N(0, 1)$  independentes.

- (a) Mostre que  $(U_n, V_n) \xrightarrow{d} (U, V)$  (convergência conjunta).
- (b) Use o teorema da função contínua com  $g(u, v) = u^2 + v^2$  para mostrar que  $U_n^2 + V_n^2 \xrightarrow{d} \chi_2^2$ .
- (c) Generalize para  $p$  variáveis independentes.

### [Questão 40] Teorema da Função Contínua (Distribuição)

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$  onde  $\lambda = 10$ .

- (a) Pelo TCL,  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - 10)}{\sqrt{10}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ .
- (b) Defina  $Y_n = \sqrt{\bar{X}_n}$ . Use o método delta combinado com o teorema da função contínua para analisar a distribuição de  $\sqrt{n}(Y_n - \sqrt{10})$ .
- (c) Compare com a transformação estabilizadora de variância para Poisson.

## 11 Estimadores Consistentes

### [Questão 41] Estimadores Consistentes

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, \theta)$  onde  $\theta > 0$ .

- (a) Seja  $T_n = X_{(n)}$  o máximo amostral. Encontre  $E[T_n]$  e  $\text{Var}(T_n)$ .
- (b) Mostre que  $EQM[T_n] = E[(T_n - \theta)^2] \rightarrow 0$  quando  $n \rightarrow \infty$ .
- (c) Conclua que  $T_n$  é consistente para  $\theta$ .
- (d) Compare com  $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}_n$ . Qual é mais eficiente assintoticamente?

### [Questão 42] Estimadores Consistentes

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ .

(a) Considere três estimadores para  $\lambda$ :

- $T_n^{(1)} = 1/\bar{X}_n$  (método dos momentos)
- $T_n^{(2)} = n/\sum_{i=1}^n X_i$  (EMV)
- $T_n^{(3)} = 1/X_{(1)}$  (inverso do mínimo)

(b) Mostre que  $T_n^{(1)}$  é consistente usando LFGN e teorema da função contínua.

(c) Mostre que  $T_n^{(2)}$  é consistente.

(d)  $T_n^{(3)}$  é consistente? Justifique.

### [Questão 43] Estimadores Consistentes

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

(a) Mostre que  $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$  é consistente para  $\sigma^2$ .

(b) Mostre que  $\tilde{S}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$  também é consistente para  $\sigma^2$ .

(c) Calcule o viés de cada estimador para  $n$  finito. Qual você prefere e por quê?

### [Questão 44] Estimadores Consistentes

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ .

(a) Dado  $\varepsilon = 0.05$  e  $\delta = 0.01$ , encontre o tamanho amostral mínimo  $n_0$  tal que

$$P(|\bar{X}_n - p| < \varepsilon) \geq 1 - \delta$$

usando a desigualdade de Chebyshev. Assuma  $p = 0.5$  (pior caso).

(b) Refaça usando a aproximação normal (TCL).

(c) Compare os dois valores de  $n_0$ .

### [Questão 45] Estimadores Consistentes

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com distribuição desconhecida mas com  $E[X_i] = \mu < \infty$  e  $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$ .

(a) Defina o estimador "trimmed mean":  $\bar{X}_n^{(k)} = \frac{1}{n-2k} \sum_{i=k+1}^{n-k} X_{(i)}$  onde  $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$  são as estatísticas de ordem, e  $k$  é fixo.

(b) Argumente que  $\bar{X}_n^{(k)} \xrightarrow{P} \mu$  quando  $n \rightarrow \infty$  com  $k$  fixo.

(c) Discuta a robustez deste estimador comparado a  $\bar{X}_n$  na presença de outliers.

## 12 Propriedades Assintóticas dos EMVs

### [Questão 46] Propriedades Assintóticas dos EMVs

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$  onde  $\sigma^2$  é conhecido.

- (a) Mostre que o EMV de  $\mu$  é  $\hat{\mu}_n = \bar{X}_n$ .
- (b) Calcule a informação de Fisher  $I_X(\mu) = E \left[ \left( \frac{\partial \log f(X; \mu)}{\partial \mu} \right)^2 \right]$ .
- (c) Use o TCL para EMVs para escrever a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}(\hat{\mu}_n - \mu)$ .
- (d) Construa um IC assintótico de 95% para  $\mu$ .

### [Questão 47] Propriedades Assintóticas dos EMVs

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$ .

- (a) Mostre que o EMV de  $\lambda$  é  $\hat{\lambda}_n = \bar{X}_n$ .
- (b) Calcule a informação de Fisher  $I_X(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$ .
- (c) Verifique que  $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda)$ , confirmando  $I_X^{-1}(\lambda) = \lambda$ .
- (d) Compare com o resultado do TCL clássico.

### [Questão 48] Propriedades Assintóticas dos EMVs

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  (taxa  $\lambda$ ).

- (a) Mostre que o EMV de  $\lambda$  é  $\hat{\lambda}_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{\bar{X}_n}$ .
- (b) Calcule a informação de Fisher  $I_X(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$ .
- (c) Use o TCL para EMVs para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda)$ .
- (d) Compare este resultado com o obtido usando o método delta aplicado a  $1/\bar{X}_n$ .

### [Questão 49] Propriedades Assintóticas dos EMVs e Eficiência

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim U(0, \theta)$ .

- (a) O EMV de  $\theta$  é  $\hat{\theta}_n^{MLE} = X_{(n)}$ . O estimador de momentos é  $\hat{\theta}_n^{MM} = 2\bar{X}_n$ .
- (b) Mostre que ambos são consistentes.
- (c) Calcule as variâncias assintóticas de  $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n^{MLE} - \theta)$  e  $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n^{MM} - \theta)$ .
- (d) Qual é mais eficiente? Calcule a eficiência relativa assintótica.
- (e) Nota: Este é um caso onde as condições de regularidade falham! O EMV não tem distribuição normal assintótica.

## [Questão 50] Propriedades Assintóticas dos EMVs

Sejam  $X_1, X_2, \dots, X_n$  v.a.'s i.i.d. com  $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ .

- (a) Mostre que o EMV de  $p$  é  $\hat{p}_n = \bar{X}_n$ .
- (b) Calcule a informação de Fisher  $I_X(p) = \frac{1}{p(1-p)}$ .
- (c) Use o TCL para EMVs para mostrar que  $\sqrt{n}(\hat{p}_n - p) \xrightarrow{d} N(0, p(1-p))$ .
- (d) Queremos estimar  $\psi = \log\left(\frac{p}{1-p}\right)$  (log-odds). Use o método delta para encontrar a distribuição assintótica de  $\sqrt{n}(\log(\frac{\hat{p}_n}{1-\hat{p}_n}) - \psi)$ .
- (e) Verifique que a variância assintótica é  $\frac{1}{p(1-p)}$ , que é exatamente  $I_X^{-1}(p)$  (invariância do EMV sob reparametrização).

## 13 Gabarito e Dicas - Parte 2

### 13.1 Dicas para as Novas Questões

**TCL para Variância Amostral (Questões 31-35):**

- Lembre que  $\sqrt{n}(S_n^2 - \sigma^2) \xrightarrow{d} N(0, \mu_4 - \sigma^4)$
- Para Normal:  $\mu_4 = 3\sigma^4$ , logo variância assintótica =  $2\sigma^4$
- Para Exponencial( $\lambda$ ):  $\mu_4 = 9/\lambda^4$ ,  $\sigma^2 = 1/\lambda^2$
- Para Uniforme(0,1):  $\mu_4 = 1/80$ ,  $\sigma^2 = 1/12$

**Teorema da Função Contínua - Distribuição (Questões 36-40):**

- Use quando tiver  $U_n \xrightarrow{d} U$  e quiser  $g(U_n) \xrightarrow{d} g(U)$
- Exemplo clássico:  $Z \sim N(0, 1) \Rightarrow Z^2 \sim \chi_1^2$
- Combine com método delta quando necessário

**Consistência (Questões 41-45):**

- Mostre  $T_n \xrightarrow{P} \theta$  via: (1) LFGN, (2) EQM  $\rightarrow 0$ , ou (3) convergência da f.d.a.
- Para  $X_{(n)}$  em  $U(0, \theta)$ :  $E[X_{(n)}] = \frac{n\theta}{n+1}$ ,  $\text{Var}(X_{(n)}) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$
- Tamanho amostral via Chebyshev:  $n \geq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\delta}$

**EMVs (Questões 46-50):**

- Informação de Fisher:  $I_X(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial \log f(X; \theta)}{\partial \theta}\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2 \log f(X; \theta)}{\partial \theta^2}\right]$
- TCL para EMVs:  $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, I_X^{-1}(\theta))$

- Para Normal( $\mu, \sigma^2$ ):  $I_X(\mu) = 1/\sigma^2$
- Para Poisson( $\lambda$ ):  $I_X(\lambda) = 1/\lambda$
- Para Exponencial( $\lambda$ ):  $I_X(\lambda) = 1/\lambda^2$
- Para Bernoulli( $p$ ):  $I_X(p) = 1/(p(1-p))$

## 13.2 Respostas Seleccionadas - Parte 2

**Questão 31(a):** Para  $N(0, 1)$ :  $\mu_4 = E[X^4] = 3$  (use momentos da normal).

**Questão 36(c):** Este resultado é fundamental para qui-quadrado com 1 grau de liberdade.

**Questão 41(a):**  $E[X_{(n)}] = \frac{n\theta}{n+1}$ ,  $\text{Var}(X_{(n)}) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$ , ambos  $\rightarrow 0$  quando normalizados.

**Questão 44(a):** Usando Chebyshev com  $p = 0.5$ :  $n_0 \geq \frac{0.25}{(0.05)^2(0.01)} = 10000$ .

**Questão 44(b):** Usando TCL:  $n_0 = \left\lceil \left( \frac{z_{0.005}\sqrt{0.25}}{0.05} \right)^2 \right\rceil = \lceil (51.5)^2 \rceil = 2653$ .

**Questão 49(e):** Caso especial onde condições de regularidade falham. O EMV converge mais rápido ( $n$  ao invés de  $\sqrt{n}$ ).

**Questão 50(e):** Demonstração da invariância da informação de Fisher sob transformações.