


1z1j.H.pdb, model 1



78.3% (476/608) of all residues were in favored (98%) regions.

66.2% (97.5-min) of all residents in

A. 43.18% (.82%), 28.6%

A. 190 LVE (147.6, 149.7)
A. 190 THB (148.6, 120.6)

A. 240 THB (56.6, 170.7)

b. 277 ASW (43.8, 110.6)

A. 100 TON (45.3, 110.3)

A. 2000 10.0 (2000 5.0 - 10.0)
 B. 2000 10.0 (2000 5.0 - 10.0)
 C. 2000 10.0 (2000 5.0 - 10.0)

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 345–352

© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 245–253

© 1979 McGraw-Hill (ISBN 0-07-071441-4)

© 2009 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 265: 373–381

© 2006 VAK, c.d.a., 068 Ty

© 1994 TVE (39.5, 102.0)

B 1200 TWR (S.A., 40 W)

■ 1216 GLE (63.7, 82.6)

 Δ 1209 PHE (-174.6, -10.9)

B 1222 ABE (-0.6, 1.6)
 B 1223 PBE (-0.6, 0.5)

B 1204 THH (-43.1, 96.6)
B 1205 PHO (-32.6, 176.1)

B 1207 TMR (172.3, 73.6)
 B 1277 AEW (110, 94.6)

B 1305 VAL-5 (25.4, 100.0)

11 •

h'//kɪ

9.77 KHz
