Caderno de investigação matemática

Reconstruindo a Combinatória

Dos produtos cartesianos às funções geradoras

Perguntas, experiências, conjecturas e demonstrações

Uma tabela, uma condição, uma contagem

$$\Longrightarrow F(x) = \sum_{k \geq 0} c_k x^k$$

O mesmo problema em álgebra

Uma reconstrução orgânica: os resultados aparecem quando uma pergunta os exige.

Novembro de 2026

Nota ao leitor

Este texto nasceu de uma dúvida: quando se ensina o princípio multiplicativo, aparecem normalmente dois conjuntos distintos; mas quando surgem permutações, arranjos e combinações, parece que estamos sempre a trabalhar no mesmo conjunto. A dúvida conduziu a outras: *quando precisamos de somar? Por que podemos dividir? O que exatamente contamos: objetos ou representações?*

Em vez de começar pelas fórmulas usuais, resolvemos estudar o objeto mais simples à nossa disposição — o produto cartesiano — e modificá-lo pouco a pouco. Desenhámos tabelas, encontrámos simetrias, acrescentámos camadas, criámos restrições, mudámos de representação e chegámos aos polinómios. A exposição reorganiza algumas experiências para fazer crescer a dificuldade de forma natural: primeiro conjuntos diferentes, depois conjuntos iguais; primeiro pares, depois triplos e finalmente sequências de comprimento arbitrário.

As perguntas e observações do investigador foram preservadas sempre que trouxeram uma ideia nova. Pequenas contas erradas, corrigidas durante a conversa, não são repetidas em série: o importante é mostrar a razão da correção e o desenvolvimento do pensamento. As definições e proposições surgem *depois* dos exemplos que as tornaram necessárias. Os últimos capítulos incluem aplicações adicionais, feitas com as mesmas ferramentas, e distinguem resultados já observados de prolongamentos novos.

As figuras e tabelas impressas não são interativas, mas têm sido concebidas para ser reconstruídas num blog: cada uma pode tornar-se um laboratório em que o leitor altera o conjunto, a condição ou a camada.

Índice

Nota ao leitor **i**

I Aprender a contar a partir de um objeto **1**

1 Dois conjuntos e a primeira dificuldade **2**

1.1 Uma tabela antes de qualquer fórmula 2

1.2 Introduzir uma condição sem mudar os conjuntos 3

2 A diagonal, a ordem e as representações **20**

2.1 Dois fatores iguais 20

2.2 Uma nova pergunta: o que significa "a mesma escolha"? 20

2.3 Dois conjuntos diferentes, mas com interseção 21

2.4 Uma soma surge do desenho da tabela 21

3 Acrescentar uma dimensão: as camadas **23**

3.1 Três conjuntos distintos primeiro 23

3.2 Restrições que alteram o tamanho das camadas 23

3.3 Somente agora, três cópias do mesmo conjunto 24

3.4 Generalizar a r posições 31

4 O vazio, os zeros e uns e o triângulo de Pascal **33**

4.1 Uma primeira tentativa de contar subconjuntos 33

4.2 Contar somente os subconjuntos de tamanho r 34

4.3 O triângulo surgiu da tabela 37

II Traduzir a contagem para a álgebra **67**

5 Uma potência que guarda escolhas **68**

5.1 A soma das coordenadas em vez da quantidade de escolhas 76

5.2 Elementos diferentes, mas com o mesmo peso . . . 76
5.3 O polinómio determina de onde veio? . . . 77
5.4 Problemas que escondem polinómios . . . 77
5.4.1 Problemas sem repetição . . . 77
5.4.2 Problemas com repetição . . . 83
5.4.3 O que estes problemas nos ensinaram? . . . 87

6 A diagonal reaparece como substituição polinomial 90
6.1 Uma restrição que às vezes não modifica a resposta . . . 90
6.2 Retirar a ordem sem destruir a diagonal . . . 90
6.3 Uma pequena verificação . . . 91

7 Triplos: quando a divisão uniforme deixa de funcionar 92
7.1 Três padrões de repetição . . . 92
7.2 Duas interpretações polinomiais para a mesma tabela . . . 92
7.3 Conservar todas as coordenadas antes de as esquecer . . . 93

8 Uma linguagem comum — e o que ela não resolve sozinha 94
8.1 O que sabemos codificar até aqui . . . 95

III As fórmulas clássicas vistas de novo 96

9 Arranjos, combinações e permutações como polinómios 97
9.1 Escolhas ordenadas com repetição . . . 97
9.2 Escolher sem repetição . . . 97
9.3 Permitir multiplicidades . . . 98
9.4 Permutar um multiconjunto . . . 98

IV Questões em que se aprende a construir a representação 100

10 Palíndromos: eliminar a restrição antes de contar 101
10.1 A palavra ANNA . . . 101
10.2 Questão aplicada: cinco letras e quantidades exatas . . . 102

11 Matrículas: separar os casos antes de multiplicar 103
11.1 Primeira experiência: contar as duas posições finais . . . 103
11.2 Dois casos principais . . . 103

11.3 E se o primeiro algarismo não puder ser zero? 104
11.4 Como seria a tradução polinomial? 104

12 Palitos e separadores: uma equação torna-se uma sequência 105
12.1 A equação que recordámos do livro 105
12.2 A bijeção fornece a fórmula 105
12.3 O mesmo problema pelo polinómio 106

13 Um último exemplo: mudar de representação para evitar proibições 107

V Uma fronteira aberta e um primeiro prolongamento 108

14 Três igualdades que se sobrepõem 109

Síntese 110

A Perguntas de investigação para continuar 111

B Convenções e vocabulário que surgiu no percurso 112

Parte I

Aprender a contar a partir de um objeto

Capítulo 1

Dois conjuntos e a primeira dificuldade

1.1 Uma tabela antes de qualquer fórmula

Escolhemos dois conjuntos distintos:

$$A = \{a, b, c\}, \qquad B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Se escolhermos primeiro um elemento de A e depois um elemento de B, formamos um par ordenado (x, y). Podemos visualizar todas essas escolhas sem nenhuma fórmula pronta:

$A \backslash B$	1	2	3	4
a	$(a,1)$	$(a,2)$	$(a,3)$	$(a,4)$
b	$(b,1)$	$(b,2)$	$(b,3)$	$(b,4)$
c	$(c,1)$	$(c,2)$	$(c,3)$	$(c,4)$

A tabela possui três linhas e quatro colunas. Cada célula representa um par e nenhum par aparece em duas células. Portanto, há $3 \cdot 4 = 12$ pares.

Pergunta da investigação. Por que as escolhas podem ser multiplicadas? E se os dois conjuntos forem iguais?

Resposta do investigador. *O princípio não exclui que os dois conjuntos sejam iguais. Continuamos a escolher uma primeira e uma segunda entrada.*

É a independência das duas posições, e não a diferença entre os conjuntos, que explica a multiplicação.

Primeiro resultado: princípio multiplicativo

Para conjuntos finitos A e B,

$$|A \times B| = |A|\,|B|.$$

Justificação. Para cada um dos $|A|$ elementos da primeira coordenada, a segunda percorre exatamente os $|B|$ elementos de B. As linhas são disjuntas e todas têm o mesmo comprimento. □

1.2 Introduzir uma condição sem mudar os conjuntos

Até aqui, aprendemos que, para dois conjuntos finitos A e B,

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Esta igualdade vale independentemente de A e B serem iguais ou diferentes.

O Princípio Multiplicativo funciona porque cada elemento de A pode ser combinado com todos os elementos de B.

Mas o que acontece quando uma restrição proíbe determinados pares?

Uma primeira experiência

Consideremos

$$A = \{a, b, c\}, \qquad B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Vamos aceitar um par (x, y) somente quando

$$\begin{cases} y \in \{2, 4\}, & x = a \text{ ou } x = b, \\ y \in \{2, 3, 4\}, & x = c. \end{cases}$$

Na tabela, destacamos os pares permitidos:

$A \backslash B$	1	2	3	4	Total
a	$(a,1)$	$(a,2)$	$(a,3)$	$(a,4)$	2
b	$(b,1)$	$(b,2)$	$(b,3)$	$(b,4)$	2
c	$(c,1)$	$(c,2)$	$(c,3)$	$(c,4)$	3

A restrição seleciona um subconjunto do produto cartesiano:

$$R = \{(x, y) \in A \times B : \text{a condição é satisfeita}\}.$$

É importante observar que R não é um par, mas um conjunto de pares.

Pergunta da investigação. Por que não podemos contar todos os pares multiplicando $3 \cdot 4$?

Porque nem todos os elementos da primeira coordenada admitem as mesmas escolhas para a segunda.

Mas observemos cuidadosamente a tabela.

Quando escolhemos a, podemos escolher 2 ou 4.

Quando escolhemos b, também podemos escolher 2 ou 4.

Quando escolhemos c, podemos escolher 2, 3 ou 4.

Pergunta da investigação. Apesar de termos três linhas, precisamos realmente de construir três conjuntos?

Não necessariamente.

As linhas correspondentes a a e b admitem exatamente as mesmas escolhas para a segunda coordenada.

Por isso, podemos reuni-las:

$$R_1 = \{a, b\} \times \{2, 4\}.$$

A linha correspondente a c produz outra região:

$$R_2 = \{c\} \times \{2, 3, 4\}.$$

Logo,

$$R = R_1 \dot{\cup} R_2.$$

Aplicando o Princípio Multiplicativo a cada região,

$$|R_1| = 2 \cdot 2 = 4,$$

$$|R_2| = 1 \cdot 3 = 3.$$

Como as regiões não possuem pares comuns,

$$\boxed{|R| = 4 + 3 = 7}.$$

Também poderíamos contar todos os 12 pares e retirar os cinco proibidos:

$$12 - 5 = 7.$$

O que determinou a quantidade de regiões?

Observámos três elementos em A, mas apenas dois conjuntos distintos de escolhas permitidas em B.

Podemos organizar a informação:

x	Escolhas permitidas para y
a	$\{2, 4\}$
b	$\{2, 4\}$
c	$\{2, 3, 4\}$

Pergunta da investigação. Será que o número de regiões depende da quantidade de condições escritas no problema?

A experiência sugere que não.

O que determinou as duas regiões foi o facto de existirem apenas dois conjuntos diferentes de escolhas para a segunda coordenada.

Vamos testar esta observação.

Experiência com uma região: $k = 1$

Continuemos com

$$A = \{a, b, c\}, \qquad B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Agora exigimos simplesmente

$$y \in \{2, 4\}.$$

Para qualquer escolha de x, as possibilidades de y são as mesmas:

x	Escolhas de y
a	$\{2, 4\}$
b	$\{2, 4\}$
c	$\{2, 4\}$

Portanto, podemos reunir todos os elementos de A.

O conjunto permitido é

$$R = A \times \{2, 4\}.$$

Logo,

$$\boxed{|R| = 3 \cdot 2 = 6}.$$

Temos uma restrição, mas continuamos a precisar de apenas um produto cartesiano.

Experiência com duas regiões: $k = 2$

Regressemos à primeira condição.

Os conjuntos de possibilidades são

$$B_a = B_b = \{2, 4\}$$

e

$$B_c = \{2, 3, 4\}.$$

Como existem dois conjuntos distintos de possibilidades, agrupamos a e b, mantendo c separado. Assim,

$$R = (\{a, b\} \times \{2, 4\}) \dot{\cup} (\{c\} \times \{2, 3, 4\}).$$

Portanto,

$$\boxed{|R| = 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 7}.$$

Experiência com três regiões: $k = 3$

Vamos modificar novamente a condição:

$$\begin{cases} y \in \{2, 4\}, & x = a, \\ y \in \{1, 3\}, & x = b, \\ y \in \{2, 3, 4\}, & x = c. \end{cases}$$

Agora temos

x	Escolhas de y
a	$\{2, 4\}$
b	$\{1, 3\}$
c	$\{2, 3, 4\}$

Pergunta da investigação. Podemos reunir duas linhas numa única região cartesiana?

Não utilizando diretamente os conjuntos de escolhas apresentados.

Embora a e b admitam duas escolhas cada, essas escolhas não são iguais.

Se tentássemos construir

$$\{a, b\} \times \{1, 2, 3, 4\},$$

introduziríamos vários pares proibidos.

Portanto, devemos manter as três regiões separadas:

$$R_1 = \{a\} \times \{2, 4\},$$

$$R_2 = \{b\} \times \{1, 3\},$$

$$R_3 = \{c\} \times \{2, 3, 4\}.$$

Logo,

$$|R| = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3.$$

Assim,

$$\boxed{|R| = 7}.$$

Ter o mesmo número de escolhas não é suficiente

Os conjuntos $\{2, 4\}$ e $\{1, 3\}$ possuem a mesma cardinalidade, mas são diferentes.
Para reunir duas linhas num único produto cartesiano que contenha exatamente todos os seus pares permitidos, precisamos que as possibilidades sejam iguais, e não apenas que tenham a mesma quantidade de elementos.

Experiência com cinco regiões: $k = 5$

Para investigar um número maior de regiões, precisamos de mais elementos na primeira coordenada.

Consideremos

$$A = \{a, b, c, d, e, f\}$$

e

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Vamos impor as seguintes condições:

x	Escolhas permitidas de y
a	$\{1, 2\}$
b	$\{1, 2\}$
c	$\{2, 3\}$
d	$\{1, 3, 5\}$
e	$\{4\}$
f	$\{3, 4, 6\}$

Pergunta da investigação. Quantos conjuntos distintos de possibilidades encontramos?

As linhas de a e b possuem exatamente as mesmas escolhas.

As restantes quatro linhas possuem conjuntos de escolhas diferentes entre si.

Portanto, encontramos cinco grupos de linhas:

$$\{a, b\}, \quad \{c\}, \quad \{d\}, \quad \{e\}, \quad \{f\}.$$

A região permitida pode ser escrita como

$$R = R_1 \,\dot\cup\, R_2 \,\dot\cup\, R_3 \,\dot\cup\, R_4 \,\dot\cup\, R_5,$$

onde

$$\begin{aligned} R_1 &= \{a, b\} \times \{1, 2\}, \\ R_2 &= \{c\} \times \{2, 3\}, \\ R_3 &= \{d\} \times \{1, 3, 5\}, \\ R_4 &= \{e\} \times \{4\}, \\ R_5 &= \{f\} \times \{3, 4, 6\}. \end{aligned}$$

Aplicando o Princípio Multiplicativo dentro de cada região,

$$\begin{aligned} |R| &= 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \\ &\quad + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \\ &= 4 + 2 + 3 + 1 + 3. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{|R| = 13}.$$

A experiência confirma a nossa ideia.

Não precisámos de construir uma região para cada um dos seis elementos de A.

Construímos uma região para cada conjunto diferente de possibilidades na segunda coordenada.

Uma definição que surge das experiências

Até aqui, estudámos as escolhas permitidas de y depois de fixarmos um elemento x de A.

Vamos dar um nome a esse conjunto.

Para cada $x \in A$, definimos

$$\boxed{B_x = \{y \in B : (x, y) \in R\}}.$$

Chamaremos B_x ao conjunto de escolhas permitidas para a segunda coordenada depois de fixarmos x.

Assim, a condição que define R determina uma família de subconjuntos de B:

$$(B_x)_{x \in A}.$$

Pergunta da investigação. Como decidir quais elementos de A podem ser reunidos num mesmo grupo?

A nossa observação sugere a seguinte regra:

$$\boxed{x \sim x' \iff B_x = B_{x'}}.$$

Ou seja, dois elementos da primeira coordenada pertencem ao mesmo grupo quando admitem exatamente as mesmas escolhas na segunda coordenada.

Esta relação agrupa os elementos de A em classes.

Construindo as regiões a partir dos grupos

Suponhamos que encontramos k conjuntos distintos e não vazios de escolhas permitidas:

$$D_1, D_2, \ldots, D_k.$$

Para cada conjunto D_i, reunimos os elementos de A que possuem exatamente esse conjunto de possibilidades:

$$C_i = \{x \in A : B_x = D_i\}.$$

Assim, podemos construir uma região cartesiana:

$$R_i = C_i \times D_i.$$

Pergunta da investigação. As regiões construídas desta maneira possuem algum par em comum?

Não.

Se duas regiões possuíssem um par (x, y) em comum, o elemento x teria de pertencer simultaneamente a dois grupos distintos.

Mas cada elemento x possui um único conjunto B_x.

Logo, pertence a apenas um dos grupos C_i.

Consequentemente, as regiões são disjuntas.

Além disso, todo par admissível pertence a uma dessas regiões.

Portanto,

$$R = \bigsqcup_{i=1}^{k} (C_i \times D_i).$$

Critério de agrupamento por escolhas permitidas

Sejam A e B conjuntos finitos e seja $R \subseteq A \times B$.
Para cada $x \in A$, definimos

$$B_x = \{y \in B : (x, y) \in R\}.$$

Sejam $D_1, \ldots, D_k$ todos os valores distintos e não vazios assumidos pelos conjuntos B_x.
Definindo

$$C_i = \{x \in A : B_x = D_i\},$$

temos

$$\boxed{R = \bigsqcup_{i=1}^{k} (C_i \times D_i)}.$$

Consequentemente,

$$\boxed{|R| = \sum_{i=1}^{k} |C_i||D_i|}.$$

Justificação. Se $(x, y) \in R$, então $y \in B_x$.
Como B_x é não vazio, existe exatamente um índice i para o qual $B_x = D_i$.
Assim, $x \in C_i$ e $y \in D_i$, pelo que $(x, y) \in C_i \times D_i$.
Reciprocamente, se (x, y) pertence a $C_i \times D_i$, então $B_x = D_i$ e $y \in B_x$.
Logo, $(x, y) \in R$.
Finalmente, os conjuntos C_i são disjuntos, pois cada x possui um único conjunto B_x.
Portanto, as regiões cartesianas também são disjuntas.
Aplicando os Princípios Multiplicativo e Aditivo, obtemos a igualdade. □

E quando aparece a diagonal?

Recordemos outra experiência, na qual os conjuntos iniciais eram iguais:

$$A = B = \{1, 2, 3\}.$$

Se exigirmos que as duas coordenadas sejam iguais, obtemos a diagonal:

$$D = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}.$$

Também podemos descrever esse conjunto através das escolhas permitidas:

$$B_1 = \{1\}, \qquad B_2 = \{2\}, \qquad B_3 = \{3\}.$$

Existem três conjuntos distintos de possibilidades.

Por isso, a nossa construção produz três regiões:

$$D = (\{1\} \times \{1\}) \,\dot\cup\, (\{2\} \times \{2\}) \,\dot\cup\, (\{3\} \times \{3\}).$$

Logo,

$$|D| = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Pergunta da investigação. Mas não tínhamos apenas uma condição, $x = y$?

Sim.

A condição definiu um único conjunto, chamado D.

Contudo, esse conjunto precisou de três regiões cartesianas na decomposição por linhas.

Portanto, devemos distinguir três quantidades:

1. A quantidade de condições escritas no problema.
2. A quantidade de conjuntos que decidimos estudar, como o conjunto permitido R ou a diagonal D.
3. A quantidade de regiões cartesianas necessárias para decompor esses conjuntos.

Estas quantidades não precisam de ser iguais.

Se chamarmos R ao conjunto dos pares com coordenadas diferentes, então

$$R = (A \times A) \setminus D.$$

Neste caso,

$$A \times A = R \dot{\cup} D.$$

Temos dois conjuntos disjuntos: os pares com coordenadas iguais e os pares com coordenadas diferentes.

Como a diagonal possui três pares,

$$|R| = 3^2 - 3 = 6.$$

A decomposição em R e D é útil para aplicar o Princípio Aditivo ou a subtração.

Já a decomposição em regiões cartesianas permite aplicar o Princípio Multiplicativo dentro de cada região.

São duas formas diferentes de organizar a mesma contagem.

O que esta investigação nos ensinou?

Começámos por observar que uma restrição pode selecionar apenas alguns pares de $A \times B$.

Depois percebemos que não precisamos necessariamente de separar todas as linhas da tabela.

Podemos reunir as linhas que admitem exatamente as mesmas escolhas para a segunda coordenada.

Assim, obtivemos uma regra para construir as regiões de maneira sistemática.

A regra encontrada

Para contar um conjunto $R \subseteq A \times B$, podemos proceder assim:

1. Fixar um elemento $x \in A$ e determinar o conjunto B_x das escolhas permitidas de y.
2. Reunir os elementos de A cujos conjuntos B_x sejam exatamente iguais.
3. Para cada grupo C_i, formar o produto cartesiano $C_i \times D_i$.
4. Aplicar o Princípio Multiplicativo em cada região.
5. Somar as cardinalidades das regiões disjuntas.

O número de regiões obtido por este procedimento é o número de conjuntos distintos e não vazios entre os B_x.
Ele não é necessariamente o número de condições escritas no problema.

Uma pergunta para continuarmos

Encontrámos uma decomposição natural de R agrupando os elementos da primeira coordenada.

Mas podíamos ter começado pela segunda coordenada e agrupado as colunas da tabela.

Pergunta da investigação. As duas maneiras de agrupar produzem sempre o mesmo número de regiões cartesianas?

E, se produzirem quantidades diferentes, qual das duas será mais económica?

Esta pergunta sugere que a forma de decompor um conjunto pode influenciar a dificuldade da sua contagem, mesmo quando o resultado final é o mesmo.

Construir números a partir de conjuntos de posições

Na investigação anterior, contámos os números de seis algarismos que possuem exatamente dois cincos.

Começámos com o conjunto

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Todos os números possíveis correspondem a elementos de A^6.

Mas queremos contar apenas os elementos que possuem exatamente duas coordenadas iguais a 5.

Chamemos R ao conjunto pretendido:

$$R = \{(a_1, \ldots, a_6) \in A^6 : \text{exatamente dois } a_i = 5\}.$$

Pergunta da investigação. Podemos construir os elementos de R utilizando o Princípio Multiplicativo, sem enumerar todos os números?

A nossa ideia foi começar pelas posições que devem conter o algarismo 5.

Definimos

$$D = \{S \subseteq \{1, \ldots, 6\} : |S| = 2\}.$$

Cada elemento de D determina uma configuração parcial do número.

Por exemplo,

$$S = \{2, 5\}$$

determina

$$(_, 5, _, _, 5, _).$$

Sabemos que

$$|D| = T(6,2) = 15.$$

Depois de escolhermos as duas posições dos cincos, restam quatro posições.

Nelas podemos utilizar qualquer elemento de

$$B = A \setminus \{5\}.$$

Como $|B| = 8$, existem

$$8^4$$

maneiras de preencher essas posições.

Portanto,

$$\boxed{|R| = T(6,2) \cdot 8^4 = 61440}.$$

O que aconteceu nesta construção?

Não escolhemos inicialmente os seis algarismos de uma só vez.

Primeiro construímos um padrão de posições e depois completámos as posições restantes.

Cada número de R determina exatamente um elemento de D: o conjunto das posições nas quais aparece o algarismo 5.

Depois de conhecermos essas posições, os outros quatro algarismos também ficam determinados pelo número.

Consequentemente, a construção não conta nenhum número duas vezes.

Pergunta da investigação. Será que podemos aplicar a mesma estratégia quando introduzimos outras restrições?

Vamos experimentar.

Experiência com uma categoria

Suponhamos que queremos simplesmente formar números de seis algarismos utilizando os algarismos de 1 a 9.

Não existe nenhuma restrição sobre a quantidade de ocorrências de cada algarismo.

Todas as posições admitem o mesmo conjunto A.

Portanto, temos uma única categoria de preenchimento:

$$\underbrace{A \times A \times A \times A \times A \times A}_{\text{6 posições}}.$$

Pelo Princípio Multiplicativo,

$$\boxed{N = 9^6}.$$

Não foi necessário construir conjuntos especiais de posições.

Experiência com duas categorias

Agora exigimos exatamente dois algarismos iguais a 5.

As posições dividem-se em duas categorias:

$$C_1 = \{5\},$$

$$C_2 = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}.$$

Precisamos de duas posições da primeira categoria e quatro da segunda.

Escolhemos primeiro as posições da categoria C_1:

$$T(6, 2).$$

As restantes posições pertencem automaticamente à categoria C_2.

Assim,

$$N = T(6, 2) \cdot 1^2 \cdot 8^4.$$

Portanto,

$$\boxed{N = 61440}.$$

Pergunta da investigação. Por que não precisamos de escolher novamente as posições da segunda categoria?

Porque elas são exatamente as posições que sobraram.

Depois de escolhermos as duas posições dos cincos, as outras quatro já estão determinadas.

Experiência com três categorias

Vamos acrescentar uma nova condição.

Queremos números de seis algarismos com exatamente dois cincos e exatamente três algarismos pares.

Agora precisamos de distinguir:

$$C_1 = \{5\},$$

$$C_2 = \{2, 4, 6, 8\},$$

$$C_3 = \{1, 3, 7, 9\}.$$

As quantidades de posições serão

$$n_1 = 2, \qquad n_2 = 3, \qquad n_3 = 1.$$

Pergunta da investigação. Como construir um número que satisfaça simultaneamente as duas condições?

Primeiro escolhemos as duas posições dos cincos:

$$T(6, 2).$$

Restam quatro posições.

Dessas quatro, escolhemos três para os algarismos pares:

$$T(4, 3).$$

A última posição fica automaticamente destinada a um algarismo ímpar diferente de 5.

Agora podemos preencher as posições:

$$1^2 \cdot 4^3 \cdot 4^1.$$

Logo,

$$\begin{aligned} N &= T(6, 2)T(4, 3)\, 1^2\, 4^3\, 4 \\ &= 15 \cdot 4 \cdot 64 \cdot 4 \\ &= \boxed{15360}. \end{aligned}$$

Pergunta da investigação. Por que agora precisamos de duas escolhas de posições, mas não de três?

Porque depois de escolhermos as posições dos cincos e dos algarismos pares, as posições dos outros ímpares já ficam determinadas.

Experiência com cinco categorias

Vamos criar uma restrição mais detalhada.

Queremos números de seis algarismos que contenham:

- Exatamente dois cincos;
- Exatamente um algarismo de $\{2, 4\}$;
- Exatamente um algarismo de $\{6, 8\}$;
- Exatamente um algarismo de $\{1, 3\}$;

- Exatamente um algarismo de $\{7, 9\}$.

Estas cinco categorias são disjuntas:

$$C_1 = \{5\},$$
$$C_2 = \{2, 4\},$$
$$C_3 = \{6, 8\},$$
$$C_4 = \{1, 3\},$$
$$C_5 = \{7, 9\}.$$

Precisamos de distribuir as seis posições entre as categorias, com quantidades

$$(2, 1, 1, 1, 1).$$

Pergunta da investigação. Podemos continuar a escolher as posições sucessivamente?

Sim.

Primeiro escolhemos as duas posições dos cincos:

$$T(6, 2).$$

Restam quatro posições.

Escolhemos uma para a categoria C_2:

$$T(4, 1).$$

Depois uma para C_3:

$$T(3, 1).$$

Depois uma para C_4:

$$T(2, 1).$$

A última posição pertence automaticamente à categoria C_5.

Portanto, o número de padrões de posições é

$$T(6, 2)T(4, 1)T(3, 1)T(2, 1).$$

Calculando,

$$15 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 360.$$

Agora precisamos de preencher cada categoria.

A primeira possui apenas um algarismo disponível.

Cada uma das outras quatro possui dois algarismos disponíveis.

Logo,

$$N = 360 \cdot 1^2 \cdot 2^4.$$

Assim,

$$\boxed{N = 5760}.$$

Reparemos que utilizámos cinco categorias de algarismos, mas só precisámos de escolher explicitamente as posições de quatro delas.

A última ficou determinada pelas posições restantes.

Que regra aparece nas experiências?

Nos quatro exemplos, classificámos as posições segundo os conjuntos de algarismos que poderiam receber.

Quando existia uma categoria, todas as posições admitiam o mesmo conjunto.

Quando existiam duas categorias, escolhemos as posições da primeira, ficando a segunda determinada.

Quando existiam três categorias, escolhemos as posições das duas primeiras e deixámos a última determinada.

O mesmo aconteceu com cinco categorias.

Pergunta da investigação. Podemos generalizar esta construção?

Suponhamos que queremos formar sequências de comprimento n.

Dividimos os símbolos disponíveis em k conjuntos disjuntos:

$$A = C_1 \,\dot\cup\, C_2 \,\dot\cup \cdots \dot\cup\, C_k.$$

Exigimos que exatamente n_i posições recebam símbolos da categoria C_i.

Naturalmente,

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n.$$

Primeiro escolhemos n_1 posições entre as n disponíveis:

$$T(n, n_1).$$

Depois escolhemos n_2 posições entre as $n - n_1$ restantes:

$$T(n - n_1, n_2).$$

Continuamos sucessivamente.

As posições da última categoria ficam determinadas.

Assim, o número de padrões de distribuição é

$$D = T(n, n_1)\, T(n - n_1, n_2) \\ \cdots T(n - n_1 - \cdots - n_{k-2}, n_{k-1}).$$

Agora, se $|C_i| = m_i$, cada posição da categoria C_i admite m_i possibilidades.

Logo, o preenchimento produz

$$m_1^{n_1} m_2^{n_2} \cdots m_k^{n_k}$$

sequências para cada padrão de distribuição.

Portanto,

$$\boxed{N = D \prod_{i=1}^{k} m_i^{n_i}}.$$

Contagem por categorias de posições

Sejam $C_1, \ldots, C_k$ conjuntos finitos, não vazios e dois a dois disjuntos.
Seja $n \geq 0$ e sejam $n_1, \ldots, n_k$ inteiros não negativos tais que

$$n_1 + \cdots + n_k = n.$$

O número de sequências de comprimento n que utilizam exatamente n_i símbolos da categoria C_i é

$$\boxed{\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!} \prod_{i=1}^{k} |C_i|^{n_i}}.$$

Justificação. Primeiro distribuímos as n posições entre as k categorias, respeitando as quantidades n_i.
Escolhendo sucessivamente as posições das categorias, obtemos

$$D = \binom{n}{n_1} \binom{n - n_1}{n_2} \cdots \\ \binom{n - n_1 - \cdots - n_{k-2}}{n_{k-1}}.$$

Ao desenvolver os coeficientes binomiais, os fatoriais intermédios cancelam-se, dando

$$D = \frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}.$$

Para cada distribuição fixa de posições, existem $|C_i|^{n_i}$ maneiras de preencher as posições da categoria C_i.
Pelo Princípio Multiplicativo, obtemos o produto indicado.
A construção é única: cada sequência determina as posições ocupadas por cada categoria e os símbolos escolhidos para elas.
Logo, nenhuma sequência é contada mais de uma vez. □

Uma distinção importante

O número de categorias não é necessariamente igual ao número de condições escritas no enunciado.

Uma condição pode exigir várias categorias, e várias condições podem ser verificadas utilizando as mesmas categorias.

O que devemos investigar é se os conjuntos de símbolos precisam de ser separados para representar corretamente as restrições.

Também não precisamos necessariamente de criar um novo conjunto quando acrescentamos uma condição.

Se a condição puder ser resolvida utilizando a distribuição de posições já construída, podemos conservar os mesmos conjuntos.

A construção que procurávamos

Para contar sequências com restrições sobre a quantidade de símbolos, podemos:

1. Identificar categorias disjuntas de símbolos.
2. Determinar quantas posições devem pertencer a cada categoria.
3. Escolher sucessivamente os subconjuntos de posições correspondentes às categorias.
4. Deixar a última categoria determinada pelas posições restantes.
5. Preencher as posições com os elementos permitidos de cada categoria.
6. Aplicar o Princípio Multiplicativo.

Assim, a construção de subconjuntos de posições permite transformar um problema com repetição numa sucessão de escolhas sem repetição, seguidas de preenchimentos independentes.

Uma nova pergunta

Nos exemplos anteriores, conhecíamos exatamente quantas posições pertenciam a cada categoria.

Mas e se o problema exigir apenas que uma determinada categoria apareça pelo menos duas vezes?

Nesse caso, a quantidade de posições dessa categoria pode variar.

Pergunta da investigação. Poderemos construir uma região para cada quantidade possível e depois somar as contagens obtidas?

Esta pergunta permite-nos regressar ao Princípio Aditivo e investigar como o método se comporta quando as quantidades não estão completamente determinadas.

Capítulo 2

A diagonal, a ordem e as representações

2.1 Dois fatores iguais

Tomemos agora $A = B = \{1, 2, 3\}$. A tabela ainda tem nove células. Mas, se exigirmos coordenadas diferentes, a diagonal fica proibida:

$A \backslash A$	1	2	3
1	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$
2	$(2,1)$	$(2,2)$	$(2,3)$
3	$(3,1)$	$(3,2)$	$(3,3)$

Duas contagens aparecem naturalmente: contar tudo e subtrair a diagonal, $9 - 3 = 6$; ou escolher primeiro um de três elementos e depois um dos dois restantes, $3 \cdot 2 = 6$.

2.2 Uma nova pergunta: o que significa “a mesma escolha”?

Os pares $(1, 2)$ e $(2, 1)$ são distintos no produto cartesiano. Mas, se queremos simplesmente escolher os elementos 1 e 2, sem atender à ordem, ambos representam o mesmo objeto.

Pergunta da investigação. Quando a ordem não importa, basta dividir por dois?

Resposta do investigador. *Neste caso, sim. Os pares aparecem nas duas orientações.*

Os seis pares fora da diagonal distribuem-se em três classes:

$$\{(1,2),(2,1)\}, \quad \{(1,3),(3,1)\}, \quad \{(2,3),(3,2)\}.$$

Cada classe contém exatamente dois pares. Por isso, há $6/2 = 3$ escolhas de dois elementos distintos sem ordem.

Duas operações que não devemos confundir

Restringir significa retirar objetos que não satisfazem uma condição: por exemplo, excluir $(2, 2)$ por ter entradas iguais. **Identificar** significa declarar que objetos diferentes da tabela são representações de uma mesma escolha: por exemplo, $(1, 2)$ e $(2, 1)$. Dividir por 2 só é

legítimo aqui porque *todas* as classes têm tamanho 2.

2.3 Dois conjuntos diferentes, mas com interseção

Para testar a regra, consideremos

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{2, 3, 4\}.$$

Agora $(2, 3)$ e $(3, 2)$ aparecem na tabela; porém, $(1, 2)$ aparece e $(2, 1)$ não aparece. Além disso, $(2, 2)$ não tem uma segunda representação invertida: ele é o seu próprio inverso.

$A\backslash B$	2	3	4
1	$(1, 2)$	$(1, 3)$	$(1, 4)$
2	$(2, 2)$	$(2, 3)$	$(2, 4)$
3	$(3, 2)$	$(3, 3)$	$(3, 4)$

A região simétrica é determinada pela interseção dos conjuntos, não pela tabela inteira.

Pergunta da investigação. Se A e B partilham k elementos, quantos pares têm um inverso diferente dentro do mesmo produto?

Resposta do investigador. *Na região comum, há $k(k-1)$ pares fora da diagonal. Cada escolha sem ordem aparece duas vezes; as representações excedentes são $k(k-1)/2$.*

A resposta nasce do produto cartesiano $S \times S$, onde $S = A \cap B$. Nele há k^2 pares, k diagonais e $k(k-1)$ pares fora da diagonal. Estes últimos agrupam-se em pares espelhados.

Contagem por simetria parcial

Se $|A| = n$, $|B| = m$ e $|A \cap B| = k$, o número de escolhas de dois elementos *sem ordem*, representáveis por pares de $A \times B$, é

$$U = nm - \frac{k(k-1)}{2}.$$

Se também exigirmos que os elementos escolhidos sejam distintos, então

$$U_{\neq} = nm - k - \frac{k(k-1)}{2}.$$

Justificação. Começamos com nm representações ordenadas. Uma representação possui inversa distinta na tabela se, e somente se, os seus dois valores são distintos e pertencem a $A \cap B$. Assim, somente $k(k-1)$ representações entram em classes de tamanho dois: há $k(k-1)/2$ duplicações excedentes. Se os pares (a, a) forem proibidos, retiramos ainda as k células diagonais. □

2.4 Uma soma surge do desenho da tabela

Se fizermos $A = B$ e $|A| = n$, então $m = k = n$. Substituindo na expressão anterior,

$$U_{\neq} = n^2 - n - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}, \qquad U = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Observemos, porém, a mesma contagem por linhas: na parte triangular que contém a diagonal, as linhas têm $n, n-1, \ldots, 1$ células. Logo,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Uma identidade aparece sem ser o objetivo inicial

A soma dos primeiros naturais foi encontrada por *duas maneiras de contar o mesmo conjunto*: pelas linhas e pela simetria da tabela quadrada. A identidade surge como consequência, não como fórmula anunciada à partida.

Capítulo 3


Acrescentar uma dimensão: as camadas

3.1 Três conjuntos distintos primeiro

Agora tomemos três conjuntos diferentes:

$$A = \{a, b\}, \quad B = \{1, 2, 3\}, \quad C = \{u, v, w\}.$$

Um triplo (x, y, z) possui três coordenadas. Podemos fixar z e obter uma tabela 2×3 em cada camada. Existem três camadas, todas com seis triplos.



Pergunta da investigação. Podemos contar uma única camada e multiplicar pelo número de camadas?

Resposta do investigador. *Sim, se todas tiverem a mesma quantidade. Isso permite evitar desenhar todo o sólido.*

Deste modo, encontramos $|A \times B \times C| = 6 \cdot 3 = 18$.

3.2 Restrições que alteram o tamanho das camadas

Não devemos pressupor que todas as camadas continuem iguais após introduzir uma condição. Escolhemos

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{1, 2, 3\}, \quad C = \{1, 3\},$$

e exigimos que as três coordenadas sejam distintas.

$z = 1$

$x\backslash y$	1	2	3
1	–	–	–
2	–	–	$(2,3,1)$

$z = 3$

$x\backslash y$	1	2	3
1	–	$(1,2,3)$	–
2	$(2,1,3)$	–	–

A primeira camada possui um triplo válido e a segunda, dois. A multiplicação por número de camadas falharia; a soma não falha. **Resposta do investigador.** *Não são iguais. Temos de somar as quantidades das camadas.*

Contagem por camadas (ou fibras)

Se $R \subseteq A \times B \times C$ e

$$R_z = \{(x, y) \in A \times B : (x, y, z) \in R\},$$

então

$$\boxed{|R| = \sum_{z \in C} |R_z|}.$$

Justificação. Cada triplo de R pertence a uma e apenas uma camada, determinada pela terceira coordenada z. As camadas são disjuntas e a sua união é R. Aplica-se o princípio aditivo. □

Quando $|R_z| = t$ para todo z, a expressão reduz-se a $|C|\,t$: recuperamos o princípio multiplicativo como caso particular.

3.3 Somente agora, três cópias do mesmo conjunto

Até aqui, estudámos produtos cartesianos de conjuntos distintos e descobrimos que podemos organizar os seus elementos em camadas. Cada camada é uma tabela de pares ordenados, obtida ao fixarmos uma das coordenadas do triplo.

Vimos também que, quando impomos restrições, nem todas as camadas precisam de ter a mesma quantidade de elementos permitidos. Nesse caso, somos obrigados a contar cada camada separadamente e, depois, somar os resultados.

Mas surge uma nova pergunta: o que acontece quando os três conjuntos são iguais?

Tomemos

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

Queremos estudar o produto cartesiano

$$A^3 = A \times A \times A.$$

Cada elemento de A^3 é um triplo ordenado (x, y, z), em que cada coordenada pertence a A.

Pelo Princípio Multiplicativo, o conjunto completo possui

$$|A^3| = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$$

elementos.

Geometricamente, podemos imaginar um cubo formado por 27 posições. Cada posição corresponde a uma escolha de x, uma escolha de y e uma escolha de z.

Pergunta da investigação. E se quisermos apenas os triplos em que os três elementos são diferentes?

Vamos impor as condições

$$x \neq y, \qquad x \neq z, \qquad y \neq z.$$

Em vez de procurar imediatamente uma fórmula, voltaremos à nossa representação por camadas.

Primeira experiência: fixar a terceira coordenada

Comecemos pela camada $z = 1$.

Nessa camada, podemos variar livremente x e y entre os três elementos de A, formando inicialmente nove pares.

A tabela seguinte representa os triplos $(x, y, 1)$. Os triplos dentro de caixas satisfazem as três condições.

$x\backslash y$	1	2	3
1	$(1,1,1)$	$(1,2,1)$	$(1,3,1)$
2	$(2,1,1)$	$(2,2,1)$	$\boxed{(2,3,1)}$
3	$(3,1,1)$	$\boxed{(3,2,1)}$	$(3,3,1)$

Observemos o que aconteceu.

Como fixámos $z = 1$, não podemos escolher $x = 1$ nem $y = 1$. Isso elimina a primeira linha e a primeira coluna da tabela.

Restam quatro pares possíveis para as primeiras duas coordenadas:

$$(2,2), \quad (2,3), \quad (3,2), \quad (3,3).$$

Mas ainda precisamos de impor $x \neq y$.

Assim, os pares $(2,2)$ e $(3,3)$ também são proibidos. Restam apenas

$$(2,3,1), \qquad (3,2,1).$$

Pergunta da investigação. Conseguimos contar os triplos desta camada sem precisar de enumerá-los?

Resposta do investigador. *Sim. Depois de fixar $z = 1$, restam dois valores possíveis para x. Escolhido x, existe apenas um valor disponível para y.*

Portanto, pelo Princípio Multiplicativo, a camada possui

$$2 \cdot 1 = 2$$

triplos permitidos.

Segunda experiência: mudar de camada

Fixemos agora $z = 2$.

Construímos novamente uma tabela com três linhas e três colunas:

$x\backslash y$	1	2	3
1	$(1,1,2)$	$(1,2,2)$	$\boxed{(1,3,2)}$
2	$(2,1,2)$	$(2,2,2)$	$(2,3,2)$
3	$\boxed{(3,1,2)}$	$(3,2,2)$	$(3,3,2)$

Desta vez, a restrição $x \neq z$ elimina a segunda linha, enquanto $y \neq z$ elimina a segunda coluna.

A condição $x \neq y$ elimina ainda os pares com primeiras coordenadas iguais.

Restam

$$(1,3,2), \qquad (3,1,2).$$

Novamente, temos dois triplos permitidos.

Pergunta da investigação. A segunda camada tem a mesma quantidade de triplos que a primeira por coincidência, ou existe alguma razão para isso?

Antes de responder, examinemos a última camada.

Terceira experiência: a última camada

Fixemos $z = 3$.

$x\backslash y$	1	2	3
1	$(1,1,3)$	$\boxed{(1,2,3)}$	$(1,3,3)$
2	$\boxed{(2,1,3)}$	$(2,2,3)$	$(2,3,3)$
3	$(3,1,3)$	$(3,2,3)$	$(3,3,3)$

Encontramos os triplos

$$(1,2,3), \qquad (2,1,3).$$

Também nesta camada existem dois triplos permitidos.

Podemos agora reunir as descobertas numa única tabela:

Camada	Triplos permitidos	Quantidade
$z = 1$	$(2,3,1), (3,2,1)$	2
$z = 2$	$(1,3,2), (3,1,2)$	2
$z = 3$	$(1,2,3), (2,1,3)$	2

As posições permitidas são diferentes em cada camada, mas todas possuem a mesma quantidade de elementos.

O que a regularidade nos permite concluir?

Como as camadas correspondem a valores diferentes de z, nenhum triplo pode pertencer simultaneamente a duas delas.

Podemos, portanto, aplicar o Princípio Aditivo:

$$N = 2 + 2 + 2 = 6.$$

Mas observemos que estamos a somar três vezes a mesma quantidade.

Podemos escrever

$$N = 3 \cdot 2 = 6.$$

Acabámos de recuperar o Princípio Multiplicativo a partir da decomposição em camadas!

Pergunta da investigação. Mas então já não estamos a fazer linha × coluna × profundidade?

Resposta do investigador. *Estamos, sim. A terceira coordenada determina a camada, e as duas primeiras determinam uma posição dentro dela. A diferença é que as restrições impedem que todas as posições sejam permitidas.*

No cubo completo, tínhamos

$$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27.$$

No conjunto restringido, temos três camadas, cada uma com dois elementos permitidos:

$$3 \cdot (2 \cdot 1) = 6.$$

Por que todas as camadas têm a mesma quantidade?

A tabela sugere uma regularidade, mas precisamos de justificá-la sem depender da enumeração dos casos.

Ao fixarmos qualquer valor $z \in A$, existem exatamente dois elementos de A diferentes de z.

Para construir um triplo permitido, as coordenadas x e y precisam de utilizar esses dois elementos, sem repetição.

Há duas escolhas para x e, depois de escolher x, resta uma única escolha para y.

Logo, independentemente do valor fixado de z, cada camada possui

$$2 \cdot 1 = 2$$

elementos.

A regularidade observada nas tabelas não é, portanto, uma coincidência: resulta da igualdade entre os conjuntos disponíveis e da simetria da restrição.

Uma segunda maneira de construir os triplos

Na nossa primeira abordagem, escolhemos a terceira coordenada e depois contamos os pares permitidos na camada correspondente.

Mas poderíamos construir os mesmos triplos noutra ordem.

Primeiro escolhemos x.

Como A possui três elementos, temos três possibilidades.

Depois de escolher x, a coordenada y não pode receber o mesmo valor. Restam duas possibilidades.

Por fim, a coordenada z deve ser diferente das duas anteriores. Resta apenas uma possibilidade.

Portanto,

$$\boxed{N = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6}.$$

Esta expressão coincide com a obtida por camadas:

$$\underbrace{3 \cdot (2 \cdot 1)}_{\text{contagem por camadas}} = \underbrace{3 \cdot 2 \cdot 1}_{\text{escolhas sucessivas}}.$$

Estamos a contar exatamente os mesmos objetos, mas organizámos as escolhas de duas maneiras.

Esta igualdade também mostra que, embora o número de escolhas posteriores dependa dos valores anteriormente escolhidos, a quantidade de opções disponíveis em cada etapa permanece constante.

Uma conjectura para conjuntos maiores

Pergunta da investigação. Será que podemos repetir este raciocínio quando o conjunto possui n elementos?

Suponhamos que

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\},$$

com $n \geq 3$.

Queremos contar os triplos de A^3 cujas coordenadas são duas a duas diferentes.

Podemos imaginar n camadas, uma para cada possível valor da terceira coordenada.

Ao fixarmos uma camada, sobram $n - 1$ valores disponíveis para a primeira coordenada e, depois de a escolhermos, $n - 2$ para a segunda.

Assim, cada camada possui

$$(n - 1)(n - 2)$$

elementos permitidos.

Como existem n camadas, a nossa conjectura é

$$\boxed{N = n(n-1)(n-2)}.$$

Justificação da conjectura

Fixemos qualquer $z \in A$.

Os pares (x, y) válidos são aqueles em que $x, y \in A \setminus \{z\}$ e $x \neq y$.

Como o conjunto $A \setminus \{z\}$ possui $n-1$ elementos, existem $n-1$ possibilidades para x e $n-2$ possibilidades para y.

Logo, todas as camadas possuem $(n-1)(n-2)$ triplos.

As n camadas são disjuntas e cobrem todos os triplos permitidos.

Pelo Princípio Aditivo, seguido do Multiplicativo,

$$N = \underbrace{(n-1)(n-2) + \cdots + (n-1)(n-2)}_{n \text{ parcelas}} = n(n-1)(n-2).$$

A conjectura está demonstrada.

Resultado obtido. Se A possui $n \geq 3$ elementos, o número de triplos ordenados de A^3 com coordenadas duas a duas diferentes é

$$\boxed{n(n-1)(n-2)}.$$

Mas esta descoberta sugere outra pergunta.

Pergunta da investigação. E se, em vez de triplos, quisermos construir sequências de quatro, cinco ou r elementos distintos?

Uma interpretação geométrica: caminhar entre as escolhas

Ao observar novamente o produto cartesiano, surgiu outra maneira de imaginar o Princípio Multiplicativo.

Em vez de pensar apenas numa multiplicação, podemos imaginar que estamos a caminhar por três direções: x, y e z.

Começamos com o conjunto

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

Na primeira direção, escolhemos a coordenada x. Temos três possibilidades.

Suponhamos que escolhemos

$$x = 2.$$

Agora avançamos na direção y.

Mas já utilizámos o valor 2 e não podemos passar por esse ponto novamente. Como pretendemos coordenadas distintas, não podemos voltar a escolhê-lo.

Portanto,

$$y \in \{1, 3\}.$$

Temos apenas duas possibilidades.

Suponhamos agora que escolhemos $y = 1$.

Ao avançarmos na terceira direção, z, já não podemos utilizar os valores 2 e 1.

Resta somente

$$z = 3.$$

Construímos assim o triplo

$$(2, 1, 3).$$

O nosso percurso pode ser representado por

$$\underbrace{3}_{\text{direção } x} \longrightarrow \underbrace{2}_{\text{direção } y} \longrightarrow \underbrace{1}_{\text{direção } z}.$$

Pergunta da investigação. Será que podemos interpretar a diminuição das possibilidades como uma consequência geométrica do caminho que estamos a percorrer?

Resposta do investigador. *Sim, desde que distingamos as direções das restrições sobre os valores escolhidos.*

No produto cartesiano completo, as três coordenadas podem assumir independentemente qualquer valor de A. Por isso, cada direção possui três opções.

Mas, quando exigimos coordenadas distintas, cada nova escolha precisa de evitar os valores já utilizados nas direções anteriores.

Geometricamente, podemos pensar nos 27 triplos de A^3 como pontos de uma grelha tridimensional.

A condição $x = y$ identifica os pontos situados num plano diagonal dessa grelha. Analogamente, as condições $x = z$ e $y = z$ identificam outros dois planos diagonais.

Ao exigirmos

$$x \neq y, \qquad x \neq z, \qquad y \neq z,$$

estamos a selecionar apenas os pontos que não pertencem a nenhum desses três planos.

Contudo, não precisamos de eliminar esses pontos um a um.

Podemos construir diretamente um caminho permitido, escolhendo sucessivamente valores que ainda não tenham sido utilizados.

Assim, para um conjunto com n elementos,

$$\underbrace{n}_{x} \longrightarrow \underbrace{n-1}_{y} \longrightarrow \underbrace{n-2}_{z}.$$

E o número total de caminhos possíveis é

$$N = n(n-1)(n-2).$$

Esta interpretação oferece duas maneiras de olhar para a mesma construção:

- O produto cartesiano completo representa todas as posições disponíveis no espaço das escolhas.
- As restrições determinam quais os caminhos de escolhas que conduzem a posições permitidas.

A tabela por camadas permite observar os pontos permitidos. O raciocínio por escolhas sucessivas permite contá-los sem construir toda a tabela.

Surge então uma pergunta natural:

Pergunta da investigação. Se acrescentarmos uma quarta, quinta ou sexta direção, será que continuaremos a perder uma possibilidade em cada nova escolha?

A representação geométrica já não será tão simples de desenhar, mas talvez o percurso continue a obedecer à mesma regularidade.

A nossa representação geométrica tornar-se-ia progressivamente mais difícil de desenhar. No entanto, o raciocínio de escolher uma coordenada de cada vez continua possível.

Talvez consigamos generalizar a contagem sem precisar de construir tabelas de dimensão cada vez maior.

3.4 Generalizar a r posições

Se um conjunto contém n elementos e desejamos formar uma sequência ordenada de comprimento r, sem repetir elementos, o mesmo raciocínio fornece

$$N = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1), \qquad 0 \le r \le n.$$

Pergunta da investigação. Como escrever esse produto em forma compacta?

Em $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, para conservar apenas os três primeiros fatores, dividimos por $2!$. Para n e r, o produto final que não queremos é $(n-r)!$.

Arranjos e permutações, descobertos pelo produto decrescente

O número de sequências ordenadas de r elementos distintos retirados de um conjunto de n elementos é

$$A(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

No caso $r = n$, todas as posições são ocupadas: há $n!$ permutações. **Justificação.** A sequência pode ser construída em r escolhas sucessivas: $n, n-1, \ldots, n-r+1$ possibilidades.

A notação fatorial abrevia esse produto. □

O que ocorre se não distinguirmos a ordem? Para uma escolha fixa de r elementos diferentes, existem exatamente $r!$ sequências ordenadas que a representam.

$$(1,2,3) \quad (1,3,2) \quad (2,1,3)$$
$$(2,3,1) \quad (3,1,2) \quad (3,2,1)$$

Todas correspondem à escolha $\{1,2,3\}$.

Combinações: retirar multiplicidades iguais

O número de escolhas de r elementos distintos, sem ordem, é

$$\boxed{\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}}.$$

Justificação. Existem $n!/(n-r)!$ sequências ordenadas sem repetição. Cada escolha sem ordem possui exatamente $r!$ representações ordenadas e as classes de representações são disjuntas. Dividimos o total por $r!$. □

Uma advertência que veio das tentativas

A divisão não "apaga elementos iguais" de um conjunto. Ela conta classes de representações. Se algumas classes tiverem seis elementos, outras três e outras um, dividir tudo por seis não funciona. Encontraremos exatamente esse obstáculo quando passarmos a triplos com repetições.

Capítulo 4

O vazio, os zeros e uns e o triângulo de Pascal

4.1 Uma primeira tentativa de contar subconjuntos

Voltemos ao conjunto $A = \{a, b, c\}$. Quantos subconjuntos possui? A nossa primeira ideia foi usar triplos de A^3 e ignorar a ordem e a repetição de valores. Por exemplo,

$$(a, b, a),\ (b, a, a) \longmapsto \{a, b\}.$$

Na camada cuja terceira coordenada é a, aparecem quatro subconjuntos distintos: $\{a\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ e $\{a, b, c\}$. Outras camadas têm a mesma quantidade interna, mas também trazem subconjuntos que a primeira não contém. A contagem de *novos* subconjuntos é $4 + 2 + 1 = 7$; acrescentando $\varnothing$, chegamos a oito.

Pergunta da investigação. Não haverá uma representação que inclua o vazio e não repita subconjuntos?

Resposta do investigador. *Talvez possamos usar zeros e uns. Cada elemento poderia estar presente ou ausente.*

Esta mudança de representação simplifica radicalmente o problema. Atribuímos uma posição a cada elemento de A: primeira para a, segunda para b, terceira para c. Cada coordenada vale 1 se o elemento entra no subconjunto e 0 se não entra.

Vetor	Subconjunto	Vetor	Subconjunto
000	$\varnothing$	100	$\{a\}$
001	$\{c\}$	101	$\{a, c\}$
010	$\{b\}$	110	$\{a, b\}$
011	$\{b, c\}$	111	$\{a, b, c\}$

Ao contrário da primeira tentativa, cada subconjunto corresponde a um único vetor.

A bijeção entre subconjuntos e vetores binários

Se $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$, a função


$$S \subseteq A \longmapsto (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n), \qquad \varepsilon_i = \begin{cases} 1, & a_i \in S, \\ 0, & a_i \notin S, \end{cases}$$

é uma bijeção entre os subconjuntos de A e $\{0,1\}^n$. Em particular, A possui 2^n subconjuntos. **Justificação.** Cada subconjunto determina exatamente um vetor. Reciprocamente, cada vetor determina exatamente o subconjunto formado pelos elementos cujas coordenadas são 1. As duas construções são inversas. Há duas escolhas independentes para cada uma das n coordenadas, logo 2^n vetores. □

4.2 Contar somente os subconjuntos de tamanho r

Se quisermos exatamente r elementos, devemos selecionar os vetores binários com exatamente r algarismos 1. Chamemos $T(n,r)$ ao seu número.

Para $n = 3$ e $r = 1$, há três vetores: $100, 010, 001$. Para $n = 4$ e $r = 2$, podemos organizar os dezasseis vetores binários por duas camadas: a primeira coordenada é 0 ou 1.



Camada $x_1 = 0$	**Camada** $x_1 = 1$
0000	1000
0001	1001
0010	1010
0011	1011
0100	1100
0101	1101
0110	1110
0111	1111
3 **vetores válidos**	3 **vetores válidos**

Os vetores destacados possuem exatamente dois algarismos iguais a 1.

Na primeira camada, precisamos de dois algarismos 1 nas três posições restantes.

Na segunda camada, como o primeiro algarismo já é 1, precisamos de apenas mais um.

Portanto,

$$T(4,2) = T(3,2) + T(3,1) = 3 + 3 = 6.$$

Pergunta da investigação. O que acontece quando fixamos a primeira coordenada?

Se ela for 0, ainda precisamos de r uns nas $n-1$ posições restantes. Se for 1, precisamos de $r-1$ uns nas restantes. Os casos não se intersectam.

Recorrência descoberta por camadas

Para $0 \leq r \leq n$,

$$\boxed{T(n,r) = T(n-1,r) + T(n-1,r-1)}.$$

Adotamos $T(0,0) = 1$, $T(n,0) = T(n,n) = 1$ e $T(n,r) = 0$ para $r < 0$ ou $r > n$. **Justificação.** Particionamos todos os vetores de comprimento n com r uns segundo o primeiro algarismo, que só pode ser 0 ou 1. Cada classe está em bijeção com os vetores menores indicados na fórmula. □

Pergunta da investigação. Sem saber nenhuma fórmula especial, quanto vale $T(4,1)$?

Resposta do investigador. *Não vejo logo na tabela. Mas, pela recorrência,* $T(4,1) = T(3,1) + T(3,0) = 3 + 1 = 4$.

Prosseguindo, $T(5,2) = T(4,2) + T(4,1) = 6 + 4 = 10$.

r	**Vetores binários**	$T(4,r)$
0	0000	1
1	0001, 0010, 0100, 1000	4
2	0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100	6
3	0111, 1011, 1101, 1110	4
4	1111	1

Ao organizarmos as contagens segundo a quantidade de algarismos 1, encontramos

$$\boxed{1, \quad 4, \quad 6, \quad 4, \quad 1}.$$

Pergunta da investigação. Por que os valores aparecem simetricamente?

Por exemplo, por que razão

$$T(4,1) = T(4,3)$$

e

$$T(4,0) = T(4,4)?$$

Uma simetria descoberta nos vetores binários

Ao observarmos os valores de $T(4,r)$, encontramos

$$1, \quad 4, \quad 6, \quad 4, \quad 1.$$

Os números são simétricos. Por exemplo,

$$T(4,1) = T(4,3).$$

Pergunta da investigação. Conseguimos explicar esta simetria sem utilizar uma fórmula de combinações?

Resposta do investigador. *Podemos somar a cada vetor o vetor formado apenas por uns, utilizando a soma coordenada a coordenada módulo* 2.

Nesta operação,

$$0+1 \equiv 1 \pmod 2, \qquad 1+1 \equiv 0 \pmod 2.$$

Por exemplo,

$$(1,0,0,0)+(1,1,1,1) = (0,1,1,1) \pmod 2.$$

Obtemos as correspondências

$$\begin{array}{ccc} 1000 & \longleftrightarrow & 0111 \\ 0100 & \longleftrightarrow & 1011 \\ 0010 & \longleftrightarrow & 1101 \\ 0001 & \longleftrightarrow & 1110 \end{array}$$

A transformação troca todos os zeros por uns e todos os uns por zeros.

Mais ainda, se aplicarmos a operação duas vezes, recuperamos o vetor inicial.

Pergunta da investigação. Será que esta correspondência funciona para vetores de qualquer comprimento?

Consideremos um vetor binário de comprimento n com exatamente r coordenadas iguais a 1.

Como possui $n-r$ coordenadas iguais a 0, a transformação produz um vetor com exatamente $n-r$ coordenadas iguais a 1.

A operação é reversível e estabelece uma bijeção entre os dois conjuntos de vetores.

Simetria das contagens binárias

Para $0 \leq r \leq n$,

$$\boxed{T(n,r) = T(n,n-r)}.$$

Justificação. A transformação que troca cada coordenada 0 por 1 e cada coordenada 1 por 0 leva os vetores com r uns aos vetores com $n-r$ uns.
Como aplicar a transformação duas vezes recupera o vetor inicial, ela é uma bijeção. Logo, os conjuntos possuem a mesma cardinalidade. □

4.3 Os conjuntos escondidos nos traços

Quando começamos a estudar Combinatória, é frequente representar as escolhas através de espaços vazios.

Por exemplo, para construir um número de seis algarismos, escrevemos

$$\underbrace{_\ _\ _\ _\ _\ _}_{\text{6 posições}}.$$

Depois colocamos a quantidade de possibilidades em cada posição e multiplicamos.

Este procedimento é útil, mas levanta uma questão que merece ser investigada.

Pergunta da investigação. Que conjuntos estamos realmente a multiplicar quando colocamos números de possibilidades debaixo dos traços?

Vamos começar por uma situação simples.

Quando todas as escolhas são livres

Queremos formar números de seis algarismos utilizando os elementos do conjunto

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Admitimos repetições.

Cada posição pode receber qualquer um dos nove elementos de A.

Portanto, o conjunto de todos os números possíveis é representado por

$$A^6 = A \times A \times A \times A \times A \times A.$$

Pelo Princípio Multiplicativo,

$$|A^6| = 9^6.$$

Neste caso, os seis traços representam seis escolhas independentes, todas realizadas no mesmo conjunto.

Pergunta da investigação. E se acrescentarmos uma restrição?

Exigir exatamente dois cincos

Consideremos agora o problema:

> Quantos números de seis algarismos podemos formar com os algarismos de 1 a 9, admitindo repetições, de modo que apareçam exatamente dois algarismos iguais a 5?

O conjunto de todos os números continua a ser A^6.

Mas queremos contar apenas um subconjunto desse produto.

Definimos

$$R = \{(a_1, \ldots, a_6) \in A^6 : \text{exatamente duas coordenadas são } 5\}.$$

Pergunta da investigação. Podemos continuar a colocar nove possibilidades em cada traço?

Não, porque contaríamos também números com zero, um, três ou mais cincos.

Pergunta da investigação. E se colocarmos dois cincos e oito possibilidades nos quatro espaços restantes?

Por exemplo,

$$5 \quad _ \quad _ \quad _ \quad _ \quad 5.$$

Para esta configuração, obtemos

$$1 \cdot 8^4 \cdot 1 = 8^4.$$

Mas esta contagem considera apenas os números cujos cincos ocupam a primeira e a última posições.

Os cincos poderiam ocupar outras posições.

Portanto, o problema não está no Princípio Multiplicativo.

Precisamos de reorganizar a maneira como construímos os objetos pretendidos.

Uma construção diferente dos números

Em vez de começar por escolher os seis algarismos, vamos começar por escolher as posições dos cincos.

Consideremos o conjunto de posições

$$I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Queremos escolher exatamente duas dessas posições.

Definimos

$$D = \{S \subseteq I : |S| = 2\}.$$

Cada elemento de D corresponde a uma configuração parcial do número.

Por exemplo,

$$S = \{2, 5\}$$

determina

$$_ \quad 5 \quad _ \quad _ \quad 5 \quad _.$$

Pergunta da investigação. Quantas configurações diferentes podemos construir?

Como já descobrimos a função $T(n, r)$, sabemos que

$$|D| = T(6, 2) = 15.$$

Agora precisamos de preencher as quatro posições restantes.

Como não podemos introduzir outro algarismo igual a 5, definimos

$$B = A \setminus \{5\}.$$

Portanto,

$$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}.$$

Temos

$$|B| = 8.$$

Para cada configuração de D, as quatro posições livres podem receber qualquer elemento de B.

Logo, existem

$$|B^4| = 8^4$$

preenchimentos possíveis.

Que conjuntos estamos a multiplicar?

Encontrámos duas escolhas:

1. Escolher uma configuração de posições para os dois cincos: um elemento de D.
2. Escolher os quatro algarismos restantes: um elemento de B^4.

Assim, podemos considerar o produto cartesiano

$$D \times B^4.$$

Cada elemento deste produto consiste num par (S, b), onde S indica as posições dos cincos e b fornece os quatro algarismos que preencherão as posições livres, por ordem crescente.

Por exemplo,

$$S = \{2, 5\}, \qquad b = (1, 3, 7, 9)$$

produz

$$(1, 5, 3, 7, 5, 9).$$

Pergunta da investigação. Será que duas escolhas diferentes em $D \times B^4$ podem produzir o mesmo número?

Não.

Dado um número com exatamente dois cincos, podemos recuperar de maneira única:

1. As duas posições nas quais aparece o algarismo 5.
2. A sequência dos quatro algarismos que ocupam as posições restantes.

Assim, cada elemento de $D \times B^4$ produz exatamente um elemento de R, e cada elemento de R corresponde a exatamente um elemento de $D \times B^4$.

Existe, portanto, uma bijeção

$$\boxed{D \times B^4 \longleftrightarrow R}.$$

Consequentemente,

$$|R| = |D \times B^4|.$$

Aplicando o Princípio Multiplicativo,

$$\begin{aligned} |R| &= |D| \cdot |B^4| \\ &= T(6, 2) \cdot 8^4 \\ &= 15 \cdot 4096 \\ &= \boxed{61440}. \end{aligned}$$

Os traços não determinam a construção

Quando representávamos um número por seis espaços vazios, estávamos a pensar nas seis posições como escolhas sucessivas.
Mas, ao introduzir a restrição, descobrimos uma construção diferente:

$$D \times B^4.$$

O conjunto D escolhe as posições dos elementos obrigatórios.
O conjunto B^4 escolhe os elementos que preenchem as posições restantes.
O Princípio Multiplicativo funciona porque esta construção representa cada número admissível exatamente uma vez.

Quando podemos multiplicar diretamente?

Na experiência anterior, cada elemento de D admitia exatamente a mesma quantidade de preenchimentos:

$$8^4.$$

Por isso, pudemos multiplicar

$$|D| \cdot 8^4.$$

Mas surge uma nova pergunta.

Pergunta da investigação. E se configurações diferentes admitirem quantidades diferentes de preenchimentos?

Vamos acrescentar uma restrição ao mesmo problema.

Agora queremos números de seis algarismos com exatamente dois cincos, mas exigimos também que o primeiro algarismo seja par.

Continuamos a escolher as posições dos cincos através de D.

Contudo, há duas situações possíveis.

Primeiro caso: a primeira posição contém um cinco. Nesse caso, não existe preenchimento que satisfaça a nova condição, pois o algarismo 5 não é par.

Portanto, cada configuração desse tipo admite zero preenchimentos válidos.

Segundo caso: a primeira posição não contém um cinco. Nesse caso, a primeira posição pode receber um dos algarismos

$$\{2, 4, 6, 8\}.$$

Existem quatro escolhas.

As outras três posições livres admitem oito escolhas cada.

Assim, cada configuração deste tipo possui

$$4 \cdot 8^3$$

preenchimentos válidos.

Pergunta da investigação. Podemos multiplicar diretamente $|D|$ por esse valor?

Não.

O conjunto D também possui configurações que colocam um cinco na primeira posição.

Precisamos de separar as configurações admissíveis.

Se a primeira posição não pode conter um cinco, devemos escolher as duas posições dos cincos entre as cinco posições restantes.

Existem

$$T(5, 2) = 10$$

configurações desse tipo.

Logo,

$$\begin{aligned} N &= T(5,2) \cdot 4 \cdot 8^3 \\ &= 10 \cdot 4 \cdot 512 \\ &= \boxed{20480}. \end{aligned}$$

Conseguimos novamente aplicar o Princípio Multiplicativo, mas primeiro tivemos de escolher o conjunto adequado de configurações.

Uma regra mais geral

As duas experiências permitem-nos formular uma observação.

Suponhamos que queremos construir os elementos de um conjunto finito R.

Começamos por escolher uma configuração d de um conjunto finito D.

Depois, para cada configuração d, existe um conjunto $F(d)$ de preenchimentos admissíveis.

Não precisamos de supor que todos esses conjuntos sejam iguais.

Apenas precisamos de garantir que cada objeto de R corresponde a uma única configuração d e a um único preenchimento dessa configuração.

Nesse caso,

$$\boxed{|R| = \sum_{d \in D} |F(d)|}.$$

Pergunta da investigação. O que acontece se todos os conjuntos de preenchimentos possuírem a mesma cardinalidade?

Suponhamos que existe um número m tal que

$$|F(d)| = m$$

para todo $d \in D$.

Então,

$$\begin{aligned} |R| &= \sum_{d \in D} m \\ &= |D| \cdot m. \end{aligned}$$

Recuperámos o Princípio Multiplicativo.

Contagem por configurações e preenchimentos

Seja D um conjunto finito de configurações iniciais.
Para cada $d \in D$, seja $F(d)$ um conjunto finito de preenchimentos.
Suponhamos que os pares (d, f), com $f \in F(d)$, correspondem bijetivamente aos objetos de um conjunto R.

Então

$$\boxed{|R| = \sum_{d \in D} |F(d)|}.$$

Se todos os conjuntos $F(d)$ possuírem a mesma cardinalidade m, então

$$\boxed{|R| = |D| \cdot m}.$$

Justificação. Para cada configuração d, existem $|F(d)|$ preenchimentos.
Como cada objeto corresponde a um único par (d, f), os conjuntos de objetos obtidos a partir de configurações diferentes são disjuntos.
O Princípio Aditivo fornece

$$|R| = \sum_{d \in D} |F(d)|.$$

Se todas as cardinalidades forem iguais a m, a soma possui $|D|$ parcelas iguais, e obtemos

$$|R| = |D| \cdot m.$$

□

O que aprendemos sobre o Princípio Multiplicativo?

Quando um problema é simples, podemos colocar diretamente as possibilidades nos traços.

Mas, quando aparecem restrições, esse procedimento pode esconder decisões importantes.

A investigação sugere uma pergunta anterior à multiplicação:

Pergunta da investigação. Como podemos construir cada objeto admissível através de escolhas que o determinem de maneira única?

Podemos então procurar:

1. Um conjunto D de configurações iniciais;
2. Os conjuntos $F(d)$ de preenchimentos admissíveis;
3. Uma correspondência que garanta que cada objeto é construído exatamente uma vez.

Se todas as configurações possuírem a mesma quantidade de preenchimentos, multiplicamos.

Se as quantidades variarem, podemos dividir as configurações em casos disjuntos e somar.

Em ambos os casos, os Princípios Multiplicativo e Aditivo continuam a ser as ferramentas fundamentais.

Uma mudança na maneira de pensar

O objetivo não deve ser apenas descobrir quantas possibilidades colocar debaixo de cada traço.
O objetivo é descobrir quais são os conjuntos de escolhas que permitem construir todos os objetos pretendidos, sem omissões e sem repetições.
Uma boa construção pode transformar um problema aparentemente complicado num

produto cartesiano simples.

Preparando a próxima investigação

No problema dos dois cincos, utilizámos $T(6,2)$ para escolher as posições especiais.

Mas muitos problemas permitem que os símbolos se repitam e impõem condições sobre quantos símbolos distintos aparecem.

Pergunta da investigação. Podemos utilizar o conjunto das partes para organizar também essas repetições?

Esta pergunta conduzir-nos-á a uma nova maneira de construir sequências com repetição a partir das escolhas binárias.

4.4 O triângulo surgiu da tabela

Organizemos os valores de $T(n,r)$ em linhas, com $r = 0, \ldots, n$.

			1			
		1		1		
	1		2		1	
1		3		3		1
	1		4		1	
1		5		10		5		1
	1		6		15		20		15		6		1

Resposta do investigador. *Fazendo a tabela, percebo que aparece o triângulo de Pascal; aqui ele surge naturalmente da decomposição do produto cartesiano.*

Duas propriedades, não duas fórmulas a decorar

O triângulo de Pascal é a tabela da recorrência que acabámos de demonstrar. Além disso, como cada vetor binário tem um número único de uns, as classes com $0, 1, \ldots, n$ uns dividem $\{0,1\}^n$; portanto,

$$\boxed{\sum_{r=0}^{n} T(n,r) = 2^n}.$$

Pela bijeção anterior, $T(n,r) = \binom{n}{r}$. Obtivemos os coeficientes binomiais por um segundo caminho, independente da contagem inicial das permutações ordenadas.

Das escolhas binárias às sequências com repetição

Até aqui, utilizámos os vetores binários para representar subconjuntos de um conjunto A.

Se A possui n elementos, cada subconjunto corresponde a um vetor de $\{0,1\}^n$, no qual o algarismo 1 indica que o elemento foi escolhido.

Descobrimos também que $T(n,r)$ representa o número de vetores binários de comprimento n com exatamente r algarismos iguais a 1.

Assim, $T(n,r)$ conta os subconjuntos de A com exatamente r elementos.

Mas surge uma pergunta.

Pergunta da investigação. Será que podemos utilizar esta mesma representação para contar sequências nas quais os elementos podem repetir-se?

Anteriormente, para construir sequências ordenadas sem repetição, podíamos escolher um subconjunto de tamanho r e multiplicar por $r!$.

Contudo, quando permitimos repetições, essa multiplicação deixa de funcionar diretamente.

Por exemplo, as escolhas

$$(a,a), \qquad (a,b)$$

não possuem a mesma quantidade de ordenações distintas.

A primeira possui apenas uma, enquanto a segunda possui duas.

Uma nova ideia: conservar o conjunto original

Em vez de criar cópias dos elementos de A, podemos continuar a trabalhar com o seu conjunto das partes.

Tomemos

$$A = \{a,b,c\}.$$

Queremos construir todas as sequências de comprimento 3, permitindo repetições.

Pelo Princípio Multiplicativo, sabemos que existem

$$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$$

sequências.

Mas queremos reconstruir esta contagem de outra maneira, utilizando os subconjuntos de A.

Pergunta da investigação. Podemos começar por escolher quais os elementos distintos que aparecerão na sequência e, depois, contar quantas sequências podemos formar utilizando exatamente esses elementos?

Vamos experimentar.

Primeira experiência: subconjuntos de um elemento

Os subconjuntos de A com um elemento são

$$\{a\}, \qquad \{b\}, \qquad \{c\}.$$

Se escolhermos $\{a\}$, existe uma única sequência de comprimento 3 que utiliza exatamente esse elemento:

$$aaa.$$

Analogamente, os outros subconjuntos produzem

$$bbb, \qquad ccc.$$

Portanto, cada subconjunto de tamanho 1 produz exatamente uma sequência.

Como existem $T(3,1) = 3$ subconjuntos desse tamanho, obtemos

$$T(3,1) \cdot 1 = 3.$$

Segunda experiência: subconjuntos de dois elementos

Consideremos agora o subconjunto

$$\{a, b\}.$$

Queremos formar sequências de comprimento 3 nas quais apareçam obrigatoriamente os dois elementos.

Podemos utilizar a representação binária:

$$a \longleftrightarrow 1, \qquad b \longleftrightarrow 0.$$

Assim, cada sequência corresponde a um vetor de $\{0,1\}^3$.

Mas não podemos utilizar os vetores 000 e 111, porque representam sequências com apenas um elemento distinto.

Restam os seguintes vetores:

Vetor binário	Sequência
001	bba
010	bab
100	abb
011	baa
101	aba
110	aab

Temos, portanto, seis sequências que utilizam exatamente os elementos de $\{a, b\}$.

Observemos a contagem através da nossa função T.

Os vetores permitidos podem possuir um ou dois algarismos iguais a 1.

Assim,

$$T(3,1) + T(3,2) = 3 + 3 = 6.$$

Pergunta da investigação. E se utilizarmos os outros subconjuntos de tamanho 2?

Os subconjuntos são

$$\{a,b\}, \qquad \{a,c\}, \qquad \{b,c\}.$$

A substituição das letras não altera a quantidade de sequências que podemos formar.

Portanto, cada subconjunto de tamanho 2 produz seis sequências.

Como existem $T(3,2) = 3$ desses subconjuntos, temos

$$T(3,2) \cdot 6 = 3 \cdot 6 = 18.$$

Terceira experiência: subconjuntos de três elementos

Resta o subconjunto

$$\{a,b,c\}.$$

Queremos construir sequências de comprimento 3 utilizando obrigatoriamente os três elementos.

Como temos três posições e os três elementos devem aparecer, nenhum pode repetir-se.

Voltamos ao Princípio Multiplicativo:

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6.$$

Como existe apenas um subconjunto de tamanho 3,

$$T(3,3) \cdot 6 = 1 \cdot 6 = 6.$$

Reunindo as três experiências

Podemos organizar as contagens numa tabela:

k	$T(3,k)$	Sequências por subconjunto	Total
1	3	1	3
2	3	6	18
3	1	6	6
		Total	**27**

Pelo Princípio Aditivo,

$$N = 3 + 18 + 6 = 27.$$

E verificamos que

$$3 \cdot 1 + 3 \cdot 6 + 1 \cdot 6 = 3^3.$$

Recuperámos a mesma quantidade que obteríamos pelo Princípio Multiplicativo aplicado diretamente a A^3.

Mas agora a contagem surgiu a partir do conjunto das partes de A!

Por que podemos somar estas quantidades?

Cada sequência possui um único conjunto de elementos distintos.

Por exemplo,

$$aba \longmapsto \{a, b\},$$

enquanto

$$acb \longmapsto \{a, b, c\}.$$

Uma sequência não pode ter simultaneamente dois conjuntos diferentes de elementos distintos.

Portanto, ao agruparmos as sequências segundo o subconjunto dos elementos que aparecem nelas, obtemos classes disjuntas.

Além disso, todas as sequências pertencem a alguma dessas classes.

Assim, a soma não omite sequências e não conta nenhuma mais de uma vez.

Esta observação justifica a utilização do Princípio Aditivo.

Uma nova quantidade surge da experiência

Nas experiências anteriores, utilizámos repetidamente a seguinte contagem:

Dado um subconjunto fixo com k elementos, quantas sequências de comprimento r podemos formar utilizando obrigatoriamente todos esses k elementos?

Chamemos a essa quantidade $M(r, k)$.

Definição da quantidade $M(r, k)$

Para $r \geq 1$ e $1 \leq k \leq r$, definimos $M(r, k)$ como o número de sequências ordenadas de comprimento r formadas com k símbolos distintos previamente fixados, nas quais cada símbolo aparece pelo menos uma vez.
Por convenção, $M(r, k) = 0$ quando $k > r$.

Pelas experiências realizadas, encontrámos

$$M(3,1) = 1,$$
$$M(3,2) = 6,$$
$$M(3,3) = 6.$$

Reparemos que esta quantidade não depende dos nomes dos elementos escolhidos.

Depende apenas de quantos elementos estão disponíveis e do comprimento da sequência.

Regressando à representação binária

Pergunta da investigação. Podemos calcular $M(r,2)$ diretamente a partir dos vetores binários, sem enumerar todas as sequências?

Consideremos um subconjunto fixo

$$B = \{a, b\}.$$

Como anteriormente, representamos a por 1 e b por 0.

Toda a sequência de comprimento r corresponde a um vetor de

$$\{0,1\}^r.$$

Mas queremos utilizar obrigatoriamente os dois elementos.

Portanto, precisamos de pelo menos um 0 e pelo menos um 1.

Isto significa que a quantidade de uns pode variar entre 1 e $r-1$.

Logo, pelo Princípio Aditivo,

$$M(r,2) = T(r,1) + T(r,2) + \cdots + T(r,r-1).$$

Ou, de forma abreviada,

$$\boxed{M(r,2) = \sum_{j=1}^{r-1} T(r,j)}.$$

Uma experiência com quatro posições

Tomemos agora $r = 4$.

Queremos contar as sequências de quatro posições utilizando obrigatoriamente os elementos a e b.

As sequências binárias podem possuir um, dois ou três algarismos iguais a 1.

Organizemos os casos:

j	**Vetores binários**	$T(4,j)$
1	0001, 0010, 0100, 1000	4
2	0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100	6
3	0111, 1011, 1101, 1110	4
	Total	**14**

Assim,

$$M(4,2) = T(4,1) + T(4,2) + T(4,3).$$

Substituindo os valores,

$$M(4,2) = 4 + 6 + 4 = 14.$$

Pergunta da investigação. Será que precisamos realmente de somar todos esses casos?

Observemos novamente o conjunto completo

$$\{0,1\}^4.$$

Pelo Princípio Multiplicativo, possui

$$2^4 = 16$$

elementos.

Mas apenas dois vetores não utilizam simultaneamente os símbolos 0 e 1:

$$0000, \qquad 1111.$$

Portanto, podemos contar todos os vetores e retirar os dois proibidos:

$$M(4,2) = 2^4 - 2 = 14.$$

Esta segunda contagem é mais económica.

Generalizando a descoberta

O mesmo raciocínio funciona para qualquer comprimento $r \geq 1$.

O conjunto $\{0,1\}^r$ possui 2^r sequências binárias.

Dessas sequências, exatamente duas não utilizam ambos os símbolos:

$$(0,0,\ldots,0) \quad \text{e} \quad (1,1,\ldots,1).$$

Logo,

$$\boxed{M(r,2) = 2^r - 2}.$$

Encontrámos, portanto, duas expressões para a mesma quantidade:

$$\boxed{\sum_{j=1}^{r-1} T(r,j) = 2^r - 2}.$$

Uma expressão surgiu da divisão em casos, utilizando o Princípio Aditivo.

A outra surgiu da contagem de todos os vetores e da subtração dos casos proibidos.

Sequências que utilizam dois símbolos

Para $r \geq 1$, o número de sequências de comprimento r que utilizam obrigatoriamente dois símbolos distintos previamente fixados é

$$\boxed{M(r,2) = 2^r - 2}.$$

Justificação. Cada posição admite duas escolhas, produzindo 2^r sequências pelo Princípio Multiplicativo.
Apenas duas sequências utilizam um único símbolo: a formada exclusivamente pelo primeiro símbolo e a formada exclusivamente pelo segundo.
Retirando-as, obtemos $2^r - 2$ sequências que utilizam ambos os símbolos. □

Uma relação geral entre T e M

A experiência inicial com $A = \{a, b, c\}$ sugere agora uma generalização.

Suponhamos que A possui n elementos e queremos formar sequências ordenadas de comprimento r, permitindo repetições.

Podemos classificar as sequências segundo o número k de elementos distintos que aparecem.

Primeiro escolhemos quais serão esses k elementos.

Existem

$$T(n,k)$$

possibilidades para essa escolha.

Depois construímos uma sequência de comprimento r utilizando obrigatoriamente todos os k elementos escolhidos.

Existem

$$M(r,k)$$

maneiras de fazer isso.

Pelo Princípio Multiplicativo, a quantidade de sequências que utilizam exatamente k elementos distintos é

$$T(n,k)M(r,k).$$

Como uma sequência de comprimento r não pode utilizar mais de r elementos distintos, e também não pode utilizar mais elementos do que os n disponíveis, temos

$$1 \leq k \leq \min(n,r).$$

Somando todos os casos disjuntos,

$$\boxed{n^r = \sum_{k=1}^{\min(n,r)} T(n,k)M(r,k)}.$$

Decomposição das sequências por elementos distintos

Se A possui $n \geq 1$ elementos e $r \geq 1$, então

$$\boxed{|A^r| = \sum_{k=1}^{\min(n,r)} T(n,k)M(r,k)}.$$

Justificação. A cada sequência de A^r associamos o subconjunto dos elementos distintos que nela aparecem.
Cada sequência determina um único subconjunto não vazio.
Para um subconjunto fixo de tamanho k, existem $M(r,k)$ sequências cujo conjunto de elementos distintos é exatamente esse.
Como existem $T(n,k)$ subconjuntos de tamanho k, o Princípio Multiplicativo fornece $T(n,k)M(r,k)$ sequências para cada valor de k.
As classes correspondentes a subconjuntos diferentes são disjuntas e cobrem A^r.
Pelo Princípio Aditivo, obtemos a igualdade. □

O que esta descoberta nos permite fazer?

Partimos de um problema com repetição, que inicialmente parecia exigir uma contagem diferente daquela que utilizávamos para os subconjuntos.

Mas conseguimos reconstruí-lo em duas etapas:

1. Escolher os elementos distintos que aparecerão na sequência, utilizando $T(n,k)$.
2. Contar as sequências que utilizam exatamente esses elementos, utilizando $M(r,k)$.

Assim, a contagem com repetição foi relacionada com a contagem sem repetição através do conjunto das partes.

A representação binária continua presente: ela determina os subconjuntos escolhidos e, quando temos dois símbolos, também permite contar diretamente as sequências que os utilizam.

Para três ou mais símbolos, a representação precisará de ser adaptada, mas a decomposição em classes permanece válida.

Pergunta da investigação. Será que também podemos descobrir relações entre os valores de $M(r,k)$, tal como descobrimos uma recorrência para $T(n,r)$?

Esta pergunta fica para uma investigação posterior.

Por enquanto, observámos que muitos problemas de contagem podem ser abordados escolhendo primeiro um subconjunto e estudando depois as diferentes maneiras de utilizar os seus elementos.

Essa ligação nasceu da representação por zeros e uns e dos Princípios Multiplicativo e Aditivo.

Experimentando o método em problemas práticos

Até aqui, reconstruímos duas contagens diferentes a partir dos subconjuntos de um conjunto A.

Quando não permitimos repetições, podemos escolher r elementos distintos e depois ordená-los:

$$N = T(n,r)\, r!.$$

Quando permitimos repetições, podemos agrupar as sequências segundo o número de elementos distintos que nelas aparecem:

$$N = \sum_{k=1}^{\min(n,r)} T(n,k)M(r,k).$$

Mas uma expressão só ganha significado quando compreendemos os problemas que permite resolver.

Vamos experimentar diferentes situações, comparando o nosso método com as contagens que normalmente utilizaríamos.

Problemas sem repetição

Problema 1. Formar uma equipa Numa turma existem sete estudantes disponíveis para participar numa atividade.

De quantas maneiras podemos escolher uma equipa de três estudantes, sabendo que a ordem não importa?

Pelo nosso método.

Representamos cada estudante por uma coordenada de um vetor binário de comprimento 7.

Escolher três estudantes significa procurar vetores com exatamente três algarismos iguais a 1.

Portanto,

$$N = T(7,3) = 35.$$

Não multiplicamos por 3!, porque a equipa $\{a,b,c\}$ é a mesma que $\{b,c,a\}$.

Pelo método habitual.

Se escolhermos sucessivamente três estudantes, teremos

$$7 \cdot 6 \cdot 5$$

sequências ordenadas.

Como cada equipa aparece em 3! ordens, dividimos por essa quantidade:

$$N = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = 35.$$

Os dois métodos contam os mesmos objetos.

Problema 2. Distribuir medalhas Cinco atletas participam numa competição.

De quantas maneiras diferentes podem ser atribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze, sem que um atleta receba duas medalhas?

Pelo nosso método.

Primeiro escolhemos os três atletas que receberão medalhas.

Existem

$$T(5, 3) = 10$$

subconjuntos de três atletas.

Depois precisamos de atribuir as três medalhas distintas aos atletas escolhidos.

Cada subconjunto admite

$$3! = 6$$

distribuições.

Logo,

$$N = T(5, 3) \cdot 3! = 10 \cdot 6 = 60.$$

Pelo método habitual.

Escolhemos sucessivamente o vencedor de cada medalha:

$$N = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60.$$

A diferença entre os métodos está na ordem em que organizamos a contagem.

No primeiro, escolhemos o subconjunto e depois atribuímos as posições.

No segundo, escolhemos diretamente os ocupantes de cada posição.

Problema 3. Um livro obrigatório Uma estante contém sete livros distintos.

Queremos escolher três livros e colocá-los em fila, sabendo que um determinado livro tem obrigatoriamente de estar presente.

De quantas maneiras podemos fazê-lo?

Pelo nosso método.

Como um livro já é obrigatório, precisamos de escolher mais dois entre os seis restantes.

Existem

$$T(6,2) = 15$$

possibilidades.

Depois podemos ordenar os três livros escolhidos de

$$3! = 6$$

maneiras.

Assim,

$$N = T(6,2) \cdot 3! = 15 \cdot 6 = 90.$$

Pelo método habitual.

O livro obrigatório pode ocupar qualquer uma das três posições.

Depois escolhemos os outros dois livros, respetivamente entre seis e cinco possibilidades.

Portanto,

$$N = 3 \cdot 6 \cdot 5 = 90.$$

Pergunta da investigação. Por que não utilizámos $T(7,3)$ na primeira solução?

Porque a restrição já determina um dos elementos escolhidos.

A representação binária permite fixar a coordenada correspondente a esse livro em 1, deixando apenas seis coordenadas livres, das quais duas devem ser iguais a 1.

Problema 4. Formar números de três algarismos Utilizando os algarismos

$$A = \{0,1,2,3,4,5\},$$

quantos números de três algarismos distintos podemos formar?

Recordemos que um número de três algarismos não pode começar por zero.

Pelo nosso método.

Inicialmente ignoramos a restrição sobre o primeiro algarismo.

Escolhemos três dos seis algarismos e ordenamo-los:

$$T(6,3) \cdot 3! = 20 \cdot 6 = 120.$$

Agora precisamos de retirar as sequências que começam por zero.

Se a primeira posição contém zero, precisamos de escolher dois dos cinco algarismos restantes e ordená-los nas duas posições livres.

Existem

$$T(5,2) \cdot 2! = 10 \cdot 2 = 20$$

sequências proibidas.

Logo,

$$N = 120 - 20 = \boxed{100}.$$

Pelo método habitual.

O primeiro algarismo possui cinco possibilidades, pois não pode ser zero.

O segundo possui cinco possibilidades, porque um algarismo já foi utilizado.

O terceiro possui quatro possibilidades.

Portanto,

$$N = 5 \cdot 5 \cdot 4 = \boxed{100}.$$

Esta experiência mostra que podemos combinar a escolha de subconjuntos com a subtração dos casos proibidos.

Problemas com repetição

Agora queremos permitir que um mesmo elemento apareça mais de uma vez numa sequência.

Em vez de abandonar os subconjuntos, vamos classificá-los segundo os elementos distintos que aparecem.

Problema 5. Códigos com três símbolos Um código possui quatro posições.

Em cada posição podemos utilizar um dos símbolos

$$A = \{a, b, c\}.$$

Os símbolos podem repetir-se.

Quantos códigos diferentes existem?

Pelo nosso método.

Classificamos os códigos segundo a quantidade de símbolos distintos que utilizam.

Caso 1: exatamente um símbolo distinto.

Existem $T(3,1) = 3$ escolhas possíveis para esse símbolo.

Cada escolha produz apenas um código.

Logo,

$$T(3,1)M(4,1) = 3 \cdot 1 = 3.$$

Caso 2: exatamente dois símbolos distintos.

Existem

$$T(3,2) = 3$$

subconjuntos de dois símbolos.

Para cada subconjunto, já descobrimos que

$$M(4,2) = 2^4 - 2 = 14.$$

Logo, este caso produz

$$T(3,2)M(4,2) = 3 \cdot 14 = 42$$

códigos.

Caso 3: exatamente três símbolos distintos.

Existe apenas um subconjunto com os três símbolos.

Como o código possui quatro posições, um dos símbolos deve aparecer duas vezes, enquanto os outros aparecem uma vez cada.

Podemos escolher o símbolo repetido de três maneiras.

Depois escolhemos as duas posições em que aparecerá:

$$T(4,2) = 6.$$

Os dois símbolos restantes podem ocupar as duas posições livres de 2! maneiras.

Assim,

$$M(4,3) = 3 \cdot T(4,2) \cdot 2! = 3 \cdot 6 \cdot 2 = 36.$$

Reunindo os casos disjuntos,

$$\begin{aligned} N &= T(3,1)M(4,1) + T(3,2)M(4,2) + T(3,3)M(4,3) \\ &= 3 + 42 + 36 \\ &= \boxed{81}. \end{aligned}$$

Pelo método habitual.

Cada uma das quatro posições admite três símbolos.

Pelo Princípio Multiplicativo,

$$N = 3^4 = \boxed{81}.$$

O nosso método exigiu mais trabalho, mas revelou como os 81 códigos se distribuem segundo os símbolos utilizados.

Problema 6. Sinais luminosos Um dispositivo produz cinco sinais sucessivos.

Cada sinal pode ser vermelho ou azul.

Queremos contar as sequências nas quais as duas cores aparecem pelo menos uma vez.

Pelo nosso método.

O subconjunto de cores utilizadas é obrigatoriamente

$$\{\text{vermelho}, \text{azul}\}.$$

Por isso, temos exatamente um subconjunto admissível:

$$T(2,2) = 1.$$

Representamos vermelho por 1 e azul por 0.

Precisamos de vetores de comprimento 5 que não sejam constantes.

Logo,

$$\begin{aligned} M(5,2) &= T(5,1) + T(5,2) + T(5,3) + T(5,4) \\ &= 5 + 10 + 10 + 5 \\ &= 30. \end{aligned}$$

Portanto,

$$N = T(2,2)M(5,2) = 1 \cdot 30 = 30.$$

Pelo método habitual.

Existem 2^5 sequências de cinco sinais.

Excluímos a sequência totalmente vermelha e a totalmente azul.

Assim,

$$N = 2^5 - 2 = \boxed{30}.$$

Problema 7. Utilizar exatamente duas letras Uma palavra de quatro posições é formada com as letras

$$A = \{a, b, c\}.$$

As letras podem repetir-se.

Quantas palavras utilizam exatamente duas letras distintas?

Pelo nosso método.

Primeiro escolhemos quais serão as duas letras utilizadas.

Temos

$$T(3,2) = 3$$

subconjuntos possíveis.

Para um subconjunto fixo de duas letras, a palavra deve utilizar ambas.

Logo,

$$M(4,2) = T(4,1) + T(4,2) + T(4,3).$$

Calculando,

$$M(4,2) = 4 + 6 + 4 = 14.$$

Portanto,

$$N = T(3,2)M(4,2) = 3 \cdot 14 = \boxed{42}.$$

Pelo método habitual.

Podemos escolher qual das três letras ficará de fora.

Para cada escolha, formamos 2^4 palavras com as duas letras restantes.

Precisamos de excluir as duas palavras que utilizam apenas uma das letras.

Assim,

$$N = 3(2^4 - 2) = 3 \cdot 14 = \boxed{42}.$$

Problema 8. Utilizar obrigatoriamente três símbolos Um código possui cinco posições e utiliza os símbolos

$$A = \{a, b, c\}.$$

As repetições são permitidas, mas os três símbolos devem aparecer pelo menos uma vez.

Quantos códigos podemos formar?

Pelo nosso método.

Como os três símbolos devem aparecer, o subconjunto dos símbolos utilizados é obrigatoriamente A.

Logo,

$$N = T(3,3)M(5,3) = M(5,3).$$

Precisamos de descobrir $M(5,3)$.

Como temos cinco posições e três símbolos que devem aparecer, as quantidades de ocorrências só podem distribuir-se de duas maneiras, ignorando a ordem dos símbolos:

$$(3,1,1) \qquad \text{ou} \qquad (2,2,1).$$

Primeiro caso: três, uma e uma ocorrências.

Escolhemos qual dos três símbolos aparecerá três vezes.

Depois escolhemos as suas três posições entre as cinco disponíveis.

Os outros dois símbolos ocupam as posições restantes em qualquer ordem.

Portanto,

$$N_1 = 3 \cdot T(5,3) \cdot 2! = 3 \cdot 10 \cdot 2 = 60.$$

Segundo caso: duas, duas e uma ocorrências.

Escolhemos qual dos três símbolos aparecerá apenas uma vez.

Depois escolhemos a posição desse símbolo.

Restam quatro posições, nas quais os dois outros símbolos devem aparecer duas vezes cada.

Escolhemos duas dessas posições para um deles, ficando as restantes determinadas.

Logo,

$$N_2 = 3 \cdot T(5,1) \cdot T(4,2) = 3 \cdot 5 \cdot 6 = 90.$$

Pelo Princípio Aditivo,

$$M(5,3) = 60 + 90 = \boxed{150}.$$

Pelo método habitual.

Começamos por contar todas as sequências:

$$3^5 = 243.$$

Retiramos as sequências que não utilizam algum dos três símbolos.

Para cada símbolo ausente, existem 2^5 sequências possíveis.

Contudo, ao retirar esses três grupos, as sequências que utilizam apenas um símbolo são retiradas duas vezes.

Precisamos, portanto, de acrescentar uma cópia de cada uma dessas três sequências.

Obtemos

$$N = 3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3.$$

Assim,

$$N = 243 - 96 + 3 = \boxed{150}.$$

Esta última contagem utiliza uma correção para os casos proibidos que pertencem simultaneamente a mais de um grupo.

É uma manifestação do princípio de inclusão e exclusão, que poderemos investigar mais adiante.

Comparando os dois caminhos

As experiências permitem-nos distinguir três situações.

Quando escolhemos r elementos distintos sem nos preocuparmos com a ordem, a contagem é

$$T(n, r).$$

Quando escolhemos r elementos distintos e precisamos de os ordenar, temos

$$T(n, r)\, r!.$$

Quando permitimos repetições e queremos classificar as sequências segundo a quantidade de elementos distintos utilizados, temos

$$\sum_{k=1}^{\min(n,r)} T(n, k) M(r, k).$$

Pergunta da investigação. Será que o nosso método é sempre mais rápido do que o habitual?

Não necessariamente.

Se cada posição admite livremente qualquer um dos n símbolos, a expressão n^r é geralmente mais económica.

Mas quando impomos restrições sobre quais ou quantos símbolos devem aparecer, a decomposição por subconjuntos pode organizar o problema de uma forma útil.

Em particular, a representação binária permite-nos identificar as escolhas, organizar casos disjuntos e contar ou excluir os casos proibidos.

A questão seguinte deixa de ser apenas como utilizar $M(r, k)$ em problemas.

Passamos agora a perguntar:

Pergunta da investigação. Será que os valores de $M(r, k)$ também possuem uma estrutura própria, tal como aconteceu com $T(n, r)$?

Uma nova tabela construída a partir de M

Na investigação anterior, descobrimos uma maneira de contar sequências com repetição utilizando os subconjuntos de um conjunto.

Para isso, introduzimos a quantidade $M(r, k)$, que conta as sequências de comprimento r formadas com k símbolos distintos previamente fixados, utilizando todos eles pelo menos uma vez.

Já conhecemos alguns valores:

$$M(3,1) = 1,$$
$$M(3,2) = 6,$$
$$M(3,3) = 6.$$

Também descobrimos que

$$M(4,2) = 14, \qquad M(4,3) = 36,$$

e, através de um problema com códigos,

$$M(5,3) = 150.$$

Pergunta da investigação. Será que estes números estão relacionados entre si?

Recordemos o que aconteceu quando investigámos a quantidade $T(n,r)$.

Começámos com casos pequenos, organizámos as contagens em tabelas e procurámos uma maneira de construir uma tabela maior a partir da anterior.

Foi assim que encontrámos a recorrência

$$T(n,r) = T(n-1,r) + T(n-1,r-1).$$

Essa recorrência permitiu construir o triângulo de Pascal.

Vamos tentar fazer algo semelhante com M.

Comecemos pelas sequências mais pequenas

Suponhamos que temos apenas um símbolo:

$$A = \{a\}.$$

Se queremos formar uma sequência de comprimento 1, obtemos

$$a.$$

Portanto,

$$M(1,1) = 1.$$

Se o comprimento for 2, obtemos

$$aa.$$

Se for 3, obtemos

$$aaa.$$

Assim, encontramos

$$M(2,1) = 1, \qquad M(3,1) = 1.$$

Pergunta da investigação. Será que esta regularidade continua para qualquer comprimento?

Sim. Com apenas um símbolo disponível, e exigindo que ele apareça, existe exatamente uma sequência de cada comprimento positivo.

Logo,

$$\boxed{M(r,1) = 1}.$$

E se o número de símbolos for igual ao comprimento da sequência?

Consideremos dois símbolos e duas posições:

$$A = \{a, b\}.$$

Se ambos devem aparecer, temos apenas

$$ab, \qquad ba.$$

Portanto,

$$M(2,2) = 2.$$

Com três símbolos e três posições, precisamos de utilizar cada símbolo exatamente uma vez.

Assim,

$$M(3,3) = 3! = 6.$$

Com quatro símbolos e quatro posições,

$$M(4,4) = 4! = 24.$$

A regularidade sugere

$$\boxed{M(r,r) = r!}.$$

De facto, como temos r posições e todos os r símbolos devem aparecer, cada um precisa de ocupar exatamente uma posição.

A contagem transforma-se, portanto, numa permutação dos r símbolos.

Já encontramos duas propriedades:

$$M(r,1) = 1 \qquad \text{e} \qquad M(r,r) = r!.$$

A primeira fornece a coluna inicial da nossa futura tabela.

A segunda fornece a diagonal final.

Mas ainda não sabemos como obter os números que aparecem entre elas.

A experiência de acrescentar uma posição

Voltemos ao caso que já conhecemos:

$$M(3,2) = 6.$$

Queremos construir as sequências de comprimento 4 que utilizam obrigatoriamente os símbolos a e b.

Pergunta da investigação. Será que podemos construir essas sequências acrescentando um símbolo ao final de sequências mais curtas?

Vamos dividir a experiência em dois casos.

Primeiro caso: os dois símbolos já aparecem nas três primeiras posições. Sabemos que existem

$$M(3,2) = 6$$

sequências de comprimento 3 que já utilizam ambos os símbolos.

Podemos acrescentar a ou b ao final de cada uma.

Por exemplo,

$$aba \longrightarrow \begin{cases} abaa, \\ abab. \end{cases}$$

Cada sequência inicial produz duas novas.

Portanto, obtemos

$$2M(3,2) = 2 \cdot 6 = 12.$$

Segundo caso: um dos símbolos aparece pela primeira vez na última posição. Suponhamos que a última posição contém a e que esse é o primeiro aparecimento de a.

Então as três posições anteriores devem conter apenas b:

$$bbba.$$

Se, pelo contrário, o símbolo que aparece pela primeira vez no final é b, obtemos

$$aaab.$$

Assim, este segundo caso produz duas sequências.

Podemos escrever esta contagem como

$$2M(3,1) = 2 \cdot 1 = 2.$$

Reunindo os dois casos. As situações são disjuntas.

Na primeira, o último símbolo já tinha aparecido anteriormente.

Na segunda, aparece pela primeira vez.

Logo,

$$M(4,2) = 2M(3,2) + 2M(3,1).$$

Calculando,

$$M(4,2) = 2 \cdot 6 + 2 \cdot 1 = 14.$$

Recuperámos exatamente o valor que tínhamos encontrado através dos vetores binários!

Pergunta da investigação. Podemos repetir o mesmo raciocínio para três símbolos?

Acrescentando uma posição com três símbolos

Agora queremos construir

$$M(4,3).$$

Consideremos os símbolos

$$A = \{a, b, c\}.$$

A última posição pode corresponder a duas situações distintas.

Primeira situação. Os três símbolos já apareceram nas três primeiras posições.

Existem

$$M(3,3) = 6$$

sequências desse tipo.

A última posição pode receber qualquer um dos três símbolos.

Assim, obtemos

$$3M(3,3) = 3 \cdot 6 = 18.$$

Segunda situação. Um dos três símbolos aparece pela primeira vez na última posição.

Podemos escolher esse símbolo de três maneiras.

As posições anteriores devem utilizar obrigatoriamente os outros dois símbolos.

Como existem

$$M(3,2) = 6$$

sequências de comprimento 3 que utilizam dois símbolos fixos, obtemos

$$3M(3,2) = 3 \cdot 6 = 18.$$

Reunindo as situações. Portanto,

$$M(4,3) = 3M(3,3) + 3M(3,2).$$

Calculando,

$$M(4,3) = 18 + 18 = 36.$$

Encontrámos novamente o valor obtido no problema anterior.

Mais importante: descobrimos uma possível regra de construção.

Procurando a regra geral

Consideremos agora k símbolos distintos e sequências de comprimento r.

Queremos que todos os k símbolos apareçam pelo menos uma vez.

Vamos observar a última posição.

Pergunta da investigação. Que possibilidades existem para o símbolo colocado nessa posição?

Só podem ocorrer duas situações.

Caso 1. O último símbolo já apareceu anteriormente. As primeiras $r-1$ posições devem utilizar todos os k símbolos.

Existem

$$M(r-1,k)$$

sequências desse tipo.

Para a última posição, podemos escolher qualquer um dos k símbolos.

Logo, este caso produz

$$kM(r-1,k).$$

Caso 2. O último símbolo aparece pela primeira vez. Primeiro escolhemos qual dos k símbolos ficará na última posição.

Existem k possibilidades.

As primeiras $r-1$ posições devem utilizar exatamente os outros $k-1$ símbolos, todos eles pelo menos uma vez.

Existem

$$M(r-1,k-1)$$

sequências desse tipo.

Logo, este caso produz

$$kM(r-1,k-1).$$

Somando os casos. Como toda a sequência pertence exatamente a um desses dois casos,

$$\boxed{M(r,k) = kM(r-1,k) + kM(r-1,k-1)}.$$

Também podemos escrever

$$\boxed{M(r,k) = k(M(r-1,k) + M(r-1,k-1))}.$$

Esta é a recorrência que procurávamos.

Para construir a tabela, utilizamos a condição inicial $M(1,1) = 1$ e consideramos $M(r,k) = 0$ quando $k > r$, bem como $M(r,0) = 0$ para $r \geq 1$.

Recorrência das sequências que utilizam todos os símbolos

Para $r \geq 2$ e $1 \leq k \leq r$,

$$\boxed{M(r,k) = k(M(r-1,k) + M(r-1,k-1))}.$$

Justificação. Classificamos as sequências segundo o aparecimento do símbolo da última posição.
Se esse símbolo já apareceu antes, as primeiras $r-1$ posições utilizam todos os k símbolos.
Se aparece pela primeira vez, as primeiras $r-1$ posições utilizam todos os outros $k-1$ símbolos.
Em ambos os casos existem k possibilidades para escolher o símbolo da última posição.
Como os casos são disjuntos e cobrem todas as sequências admissíveis, o Princípio Aditivo fornece a igualdade. □

Construindo uma nova tabela

Já temos informação suficiente para construir os valores sucessivos de M.

Começamos com

$$M(1,1) = 1.$$

Para $r = 2$,

$$M(2,1) = 1 \qquad \text{e} \qquad M(2,2) = 2.$$

Para $r = 3$,

$$\begin{aligned} M(3,1) &= 1, \\ M(3,2) &= 2(2+1) = 6, \\ M(3,3) &= 3! = 6. \end{aligned}$$

Para $r = 4$,

$$\begin{aligned} M(4,1) &= 1, \\ M(4,2) &= 2(6+1) = 14, \\ M(4,3) &= 3(6+6) = 36, \\ M(4,4) &= 4! = 24. \end{aligned}$$

Vamos acrescentar agora uma quinta linha.

Pergunta da investigação. Quanto deverá valer $M(5,3)$ se a nossa recorrência estiver correta?

Utilizando os valores da linha anterior,

$$M(5,3) = 3\big(M(4,3) + M(4,2)\big).$$

Portanto,

$$M(5,3) = 3(36+14) = 150.$$

Este é exatamente o resultado que tínhamos encontrado ao estudar os códigos de cinco posições!

A recorrência permitiu recuperar uma contagem anteriormente obtida através da divisão em casos.

Continuando o mesmo procedimento, construímos a tabela:

$r\backslash k$	1	2	3	4	5
1	1				
2	1	2			
3	1	6	6		
4	1	14	36	24	
5	1	30	150	240	120

Obtivemos uma tabela triangular!

Pergunta da investigação. Como se compara esta estrutura com o triângulo de Pascal?

No triângulo de Pascal, cada valor é a soma de dois valores da linha anterior:

$$T(n,r) = T(n-1,r) + T(n-1,r-1).$$

Na nossa nova tabela, também somamos dois valores da linha anterior, mas depois multiplicamos pelo número de símbolos que precisam de aparecer:

$$M(r,k) = k\big(M(r-1,k) + M(r-1,k-1)\big).$$

Portanto, os dois triângulos surgem de decomposições em dois casos, mas representam objetos diferentes.

Uma nova observação sobre a diagonal

Vejamos os valores finais de cada linha:

$$1, \quad 2, \quad 6, \quad 24, \quad 120.$$

São os fatoriais:

$$1!, \quad 2!, \quad 3!, \quad 4!, \quad 5!.$$

Isto corresponde à propriedade que já tínhamos demonstrado:

$$M(r,r) = r!.$$

Mas essa observação sugere uma nova experiência.

Pergunta da investigação. O que acontece se dividirmos cada valor de $M(r,k)$ por $k!$?

Vamos experimentar alguns casos:

$$\frac{M(3,2)}{2!} = \frac{6}{2} = 3,$$
$$\frac{M(4,2)}{2!} = \frac{14}{2} = 7,$$
$$\frac{M(4,3)}{3!} = \frac{36}{6} = 6,$$
$$\frac{M(5,3)}{3!} = \frac{150}{6} = 25.$$

Em todos esses casos, encontramos números inteiros.

Pergunta da investigação. Será uma coincidência? O que significa dividir por $k!$?

Recordemos que os k símbolos utilizados por $M(r,k)$ são distintos.

Por exemplo, as sequências

$$aab, \qquad bba$$

são diferentes quando os símbolos a e b têm identidades próprias.

Mas observemos apenas quais posições possuem símbolos iguais.

Na primeira sequência, as posições 1 e 2 possuem o mesmo símbolo.

Na segunda, acontece exatamente o mesmo.

Assim, as duas sequências possuem o mesmo padrão de igualdade entre posições.

Ao trocar os nomes dos símbolos, podemos transformar uma na outra.

Como todos os k símbolos aparecem, existem exatamente $k!$ maneiras de lhes atribuir os k nomes distintos.

Portanto, cada padrão sem nomes corresponde a $k!$ sequências contadas por $M(r, k)$.

Isto explica por que a divisão por $k!$ produz números inteiros.

Uma nova quantidade para os padrões sem nomes

Definamos

$$\boxed{S(r, k) = \frac{M(r, k)}{k!}}.$$

Esta quantidade conta as maneiras de dividir as r posições em k grupos não vazios, sem distinguir os nomes dos grupos.

Por exemplo, com três posições e dois grupos, temos:

$$\{\{1, 2\}, \{3\}\},$$
$$\{\{1, 3\}, \{2\}\},$$
$$\{\{1\}, \{2, 3\}\}.$$

Existem três agrupamentos.

Portanto,

$$S(3, 2) = 3.$$

Se atribuirmos os nomes a e b aos dois grupos, cada agrupamento produz duas sequências distintas.

Assim,

$$M(3, 2) = 2!S(3, 2) = 2 \cdot 3 = 6.$$

Construindo o triângulo dos agrupamentos

Vamos dividir os valores da tabela anterior pelos fatoriais correspondentes a cada coluna.

$r\backslash k$	1	2	3	4	5
1	1				
2	1	1			
3	1	3	1		
4	1	7	6	1	
5	1	15	25	10	1

Encontrámos outra tabela triangular!

Agora a primeira e a última entradas de cada linha são iguais a 1.

Isto possui uma interpretação simples.

Existe apenas uma maneira de colocar todas as posições num único grupo.

E existe apenas uma maneira de colocar cada posição num grupo diferente.

Por isso,

$$S(r,1) = S(r,r) = 1.$$

Será que a nova tabela também tem uma recorrência?

Já sabemos que

$$M(r,k) = k\big(M(r-1,k) + M(r-1,k-1)\big).$$

Como

$$M(r,k) = k!S(r,k),$$

podemos substituir esta expressão na recorrência:

$$\begin{aligned} k!S(r,k) = k\big(&k!S(r-1,k) \\ &+ (k-1)!S(r-1,k-1)\big). \end{aligned}$$

Dividindo por $k!$, obtemos

$$\boxed{S(r,k) = kS(r-1,k) + S(r-1,k-1)}.$$

Pergunta da investigação. Conseguimos compreender esta recorrência sem utilizar a álgebra?

Sim. Consideremos uma distribuição das primeiras $r-1$ posições em grupos não vazios.

Ao acrescentarmos a posição r, temos duas possibilidades.

Primeira possibilidade. A nova posição entra num dos k grupos já existentes.

Existem $S(r-1,k)$ maneiras de construir esses grupos e k possibilidades para escolher o grupo que recebe a nova posição.

Isto produz

$$kS(r-1,k).$$

Segunda possibilidade. A nova posição forma um grupo sozinha.

Nesse caso, as primeiras $r-1$ posições devem estar divididas em $k-1$ grupos não vazios.

Existem

$$S(r-1,k-1)$$

possibilidades.

Somando os dois casos,

$$S(r,k) = kS(r-1,k) + S(r-1,k-1).$$

Voltámos a encontrar uma recorrência através de uma decomposição em casos!

Uma nova estrutura descoberta a partir de M

Começámos por contar sequências que utilizam obrigatoriamente todos os símbolos disponíveis.
Essas contagens produziram a tabela triangular de $M(r,k)$.
Depois observámos que, ao esquecer os nomes dos símbolos, cada padrão era representado por $k!$ sequências.
Dividindo por essa quantidade, obtivemos uma nova tabela, cujos valores contam partições de um conjunto de r posições em k grupos não vazios.
A nova quantidade satisfaz

$$S(r,k) = kS(r-1,k) + S(r-1,k-1).$$

Assim, uma investigação iniciada com sequências de zeros e uns conduziu-nos a uma contagem de agrupamentos.

Identificando a estrutura descoberta

Os números $S(r,k)$ que acabámos de construir já são conhecidos na Combinatória.

Recebem o nome de *números de Stirling de segunda espécie*.

Contam as partições de um conjunto com r elementos em exatamente k subconjuntos não vazios, sem considerar a ordem desses subconjuntos.

Como

$$M(r,k) = k!S(r,k),$$

podemos também reescrever a nossa decomposição anterior:

$$n^r = \sum_{k=1}^{\min(n,r)} T(n,k)\, k! S(r,k).$$

Esta igualdade reúne três operações que investigámos separadamente:

1. Escolher quais os k símbolos distintos que serão utilizados.
2. Dividir as r posições em k grupos não vazios.
3. Atribuir os k símbolos escolhidos aos grupos.

A primeira etapa é contada por $T(n,k)$.

A segunda é contada por $S(r,k)$.

A terceira é contada por $k!$.

Pelo Princípio Multiplicativo, o produto dessas três quantidades conta as sequências que utilizam exatamente k símbolos distintos.

E, pelo Princípio Aditivo, somamos os possíveis valores de k.

Uma última pergunta

No triângulo de Pascal, investigámos o que acontecia quando somávamos os elementos de uma linha.

Obtivemos

$$\sum_{k=0}^{n} T(n,k) = 2^n.$$

Agora temos outra tabela:

r	$S(r,1), S(r,2), \ldots, S(r,r)$
1	1
2	1, 1
3	1, 3, 1
4	1, 7, 6, 1
5	1, 15, 25, 10, 1

Pergunta da investigação. O que estaremos a contar se somarmos todos os elementos de uma linha deste novo triângulo?

E será que conseguimos construir uma interpretação para essa soma, sem começar por uma fórmula?

Deixamos esta pergunta como ponto de partida para uma nova investigação.

Parte II

Traduzir a contagem para a álgebra

Capítulo 5

Uma potência que guarda escolhas

Um monómio para cada decisão

Na investigação anterior, representámos os subconjuntos de um conjunto por vetores binários.

Descobrimos que, se um conjunto possui n elementos, cada subconjunto corresponde a uma sequência de $\{0,1\}^n$.

Cada coordenada representa uma decisão:

- O algarismo 0 significa que não escolhemos o elemento correspondente.
- O algarismo 1 significa que escolhemos esse elemento.

Também introduzimos $T(n,r)$ para contar os vetores de comprimento n que possuem exatamente r algarismos iguais a 1.

Através da divisão em camadas, descobrimos a relação

$$T(n,r) = T(n-1,r) + T(n-1,r-1).$$

E, ao calcularmos sucessivamente esses valores, observámos o aparecimento do triângulo de Pascal.

Mas esta descoberta sugere outra pergunta.

Pergunta da investigação. Os números que aparecem no triângulo de Pascal também surgem como coeficientes de certos polinómios. Será que existe uma ligação entre esses coeficientes e a nossa contagem de subconjuntos?

Em vez de começar por uma fórmula conhecida, vamos regressar às nossas sequências binárias.

Primeira experiência: observar os oito vetores

Consideremos novamente o conjunto

$$A = \{a,b,c\}.$$

Os seus subconjuntos correspondem aos oito elementos de

$$\{0,1\}^3.$$

Já sabemos que o número de elementos de cada subconjunto corresponde à quantidade de algarismos iguais a 1 no vetor.

Vamos experimentar uma representação diferente.

Em vez de utilizar os algarismos 0 e 1 apenas como indicadores, vamos associar-lhes potências de uma variável x:

$$0 \longleftrightarrow x^0, \qquad 1 \longleftrightarrow x^1.$$

Por enquanto, não precisamos de assumir que esta representação será útil.

Queremos apenas observar o que acontece quando multiplicamos as potências correspondentes às três coordenadas.

Por exemplo, o vetor 101 produz

$$x^1 \cdot x^0 \cdot x^1 = x^2.$$

Já o vetor 010 produz

$$x^0 \cdot x^1 \cdot x^0 = x.$$

Construamos uma tabela com todos os casos.

Vetor	**Subconjunto**	**Produto**	**Resultado**
000	$\varnothing$	$x^0x^0x^0$	1
001	$\{c\}$	$x^0x^0x^1$	x
010	$\{b\}$	$x^0x^1x^0$	x
100	$\{a\}$	$x^1x^0x^0$	x
011	$\{b,c\}$	$x^0x^1x^1$	x^2
101	$\{a,c\}$	$x^1x^0x^1$	x^2
110	$\{a,b\}$	$x^1x^1x^0$	x^2
111	$\{a,b,c\}$	$x^1x^1x^1$	x^3

Pergunta da investigação. O que aconteceu aos expoentes quando multiplicámos as contribuições de cada coordenada?

Como

$$x^a x^b x^c = x^{a+b+c},$$

o expoente final é a soma dos algarismos do vetor binário.

Mas, como cada algarismo só pode ser 0 ou 1, essa soma é precisamente a quantidade de elementos escolhidos.

Assim, a potência resultante já nos informa quantos elementos possui o subconjunto.

Por exemplo,

$$101 \longmapsto x^2$$

porque o subconjunto correspondente possui dois elementos.

O que acontece se reunirmos todos os resultados?

A tabela produziu os seguintes monómios:

$$1, \quad x, \quad x, \quad x, \quad x^2, \quad x^2, \quad x^2, \quad x^3.$$

Podemos somá-los:

$$P(x) = 1 + x + x + x + x^2 + x^2 + x^2 + x^3.$$

Reunindo os termos semelhantes,

$$\boxed{P(x) = 1 + 3x + 3x^2 + x^3}.$$

Encontrámos os números

$$1, \quad 3, \quad 3, \quad 1.$$

São precisamente as quantidades que tínhamos descoberto ao contar os subconjuntos de $A = \{a, b, c\}$ segundo o seu tamanho!

Pergunta da investigação. O que representa o coeficiente de cada potência de x?

O termo $3x$ surgiu porque existem três vetores com exatamente um algarismo igual a 1.

O termo $3x^2$ surgiu porque existem três vetores com exatamente dois algarismos iguais a 1.

O termo x^3 surgiu porque existe apenas um vetor com três algarismos iguais a 1.

E o termo constante corresponde ao conjunto vazio.

Podemos, portanto, interpretar o polinómio da seguinte maneira:

$$P(x) = \underbrace{1}_{T(3,0)} + \underbrace{3}_{T(3,1)}\,x + \underbrace{3}_{T(3,2)}\,x^2 + \underbrace{1}_{T(3,3)}\,x^3.$$

Uma interpretação para expoentes e coeficientes

O expoente de x regista a quantidade de elementos escolhidos.
O coeficiente de x^r regista quantas escolhas diferentes produziram essa quantidade, isto é, $T(n, r)$.

Desta forma, um único polinómio pode reunir as contagens de todos os tamanhos de subconjuntos.

Podemos construir o polinómio sem enumerar os vetores?

Até agora, obtivemos $P(x)$ construindo os oito vetores binários e somando os monómios correspondentes.

Mas recordemos como esses vetores surgiram.

Cada posição admite exatamente duas escolhas:

$$0 \quad \text{ou} \quad 1.$$

Na nossa nova representação, essas escolhas correspondem a

$$x^0 \quad \text{ou} \quad x^1.$$

Como $x^0 = 1$ e $x^1 = x$, podemos escrever a soma das duas contribuições possíveis:

$$1 + x.$$

Pergunta da investigação. Se cada coordenada contribui com $1 + x$, como podemos representar as três escolhas sucessivas?

Pelo Princípio Multiplicativo, precisamos de combinar uma decisão da primeira coordenada com uma decisão da segunda e uma decisão da terceira.

Podemos representar essas combinações por

$$(1 + x)(1 + x)(1 + x).$$

A distributividade obriga-nos a escolher um termo de cada fator para formar cada produto.

Por exemplo, escolher

$$x \cdot 1 \cdot x$$

corresponde ao vetor 101.

Escolher

$$1 \cdot x \cdot 1$$

corresponde ao vetor 010.

E escolher

$$1 \cdot 1 \cdot 1$$

corresponde ao vetor 000.

Assim, antes de reunirmos os termos semelhantes, cada produto da expansão corresponde exatamente a uma sequência binária.

Temos, portanto,

$$P(x) = (1+x)^3.$$

Vamos verificar por multiplicação.

Primeiro,

$$(1+x)(1+x) = 1 + 2x + x^2.$$

Depois,

$$\begin{aligned} P(x) &= (1+2x+x^2)(1+x) \\ &= 1 + 2x + x^2 + x + 2x^2 + x^3 \\ &= 1 + 3x + 3x^2 + x^3. \end{aligned}$$

Obtivemos exatamente o mesmo polinómio que surgiu da tabela!

Pergunta da investigação. Será uma coincidência que a distributividade reproduza a contagem dos vetores binários?

Não. Ao desenvolver o produto, cada escolha de um termo em cada fator determina um único vetor binário.

E, reciprocamente, cada vetor binário determina uma única escolha de termos na expansão.

Existe, portanto, uma bijeção entre os vetores de $\{0,1\}^3$ e as escolhas individuais de termos na expansão distributiva.

Depois de reunirmos os termos semelhantes, o coeficiente guarda quantas dessas escolhas produziram o mesmo expoente.

Regressando às camadas que estudámos

A nossa investigação anterior não tinha começado por polinómios.

Tínhamos dividido os vetores binários segundo o valor da primeira coordenada.

Quando essa coordenada era 0, ainda precisávamos de escolher os algarismos das posições restantes.

Quando era 1, já tínhamos utilizado um dos algarismos 1 pretendidos.

Foi assim que encontrámos

$$T(n,r) = T(n-1,r) + T(n-1,r-1).$$

Pergunta da investigação. Será que a multiplicação por $(1+x)$ reproduz esta mesma divisão em duas camadas?

Vamos experimentar com os vetores de comprimento 4.

Pelas nossas contagens anteriores, sabemos que

$$T(4,0) = 1,$$
$$T(4,1) = 4,$$
$$T(4,2) = 6,$$
$$T(4,3) = 4,$$
$$T(4,4) = 1.$$

Logo, podemos construir o polinómio

$$P_4(x) = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4.$$

Queremos agora acrescentar uma quinta coordenada binária.

Essa nova coordenada pode ser 0 ou 1, representados respetivamente por 1 e x.

Portanto,

$$P_5(x) = P_4(x)(1 + x).$$

Mas não precisamos de desenvolver todo o produto para descobrir o número de vetores com exatamente dois algarismos 1.

Basta procurar os produtos cujo expoente final é 2.

Uma experiência: encontrar $T(5, 2)$

Temos

$$P_5(x) = (1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4)(1 + x).$$

Pergunta da investigação. Quais os produtos que podem produzir um termo com expoente 2?

Como os expoentes se somam na multiplicação, precisamos de encontrar duas possibilidades cuja soma seja 2.

Podemos escolher expoentes

$$2 + 0 = 2$$

ou

$$1 + 1 = 2.$$

Não existem outras possibilidades, porque o segundo fator possui apenas os expoentes 0 e 1.

Portanto, os termos procurados são

$$\underbrace{6x^2 \cdot 1}_{\text{nova coordenada 0}} + \underbrace{4x \cdot x}_{\text{nova coordenada 1}}.$$

Calculando,

$$6x^2 + 4x^2 = 10x^2.$$

Logo,

$$\boxed{T(5,2) = 10}.$$

Mas já tínhamos descoberto esse resultado utilizando o Princípio Aditivo:

$$T(5,2) = T(4,2) + T(4,1) = 6 + 4 = 10.$$

Pergunta da investigação. Por que os dois métodos produziram exatamente a mesma soma $6 + 4$?

Observemos as duas contribuições.

Quando multiplicamos $6x^2$ por 1, estamos a acrescentar uma coordenada igual a 0. Os dois algarismos 1 já se encontram nas quatro posições anteriores.

Quando multiplicamos $4x$ por x, estamos a acrescentar uma coordenada igual a 1. Por isso, precisamos de apenas mais um algarismo 1 nas quatro posições anteriores.

São precisamente os dois casos que tínhamos separado na contagem por camadas!

Nova coordenada	**Contagem por camadas**	**Produto**
0	$T(4,2) = 6$	$6x^2 \cdot 1$
1	$T(4,1) = 4$	$4x \cdot x$
	Total	$10x^2$

Resposta do investigador. *A multiplicação por $(1 + x)$ reproduz algebricamente a divisão do conjunto de vetores nas duas camadas correspondentes à nova coordenada.*

Os dois princípios reapareceram dentro da álgebra

A distributividade representa as combinações de escolhas sucessivas, que contávamos pelo Princípio Multiplicativo.
A reunião dos termos com o mesmo expoente soma as diferentes maneiras de obter uma mesma quantidade de elementos escolhidos, como fazíamos pelo Princípio Aditivo.
Assim, o produto polinomial reproduz a contagem do produto cartesiano por camadas.

Uma generalização sugerida pelas experiências

Já observámos que

$$\begin{aligned} P_1(x) &= 1 + x, \\ P_2(x) &= (1 + x)^2, \\ P_3(x) &= (1 + x)^3. \end{aligned}$$

Acrescentar uma coordenada binária significa multiplicar o polinómio anterior por $(1+x)$.

Logo, a regularidade sugere

$$P_n(x) = (1+x)^n.$$

Mas também sabemos que o coeficiente de x^r deve contar os vetores de comprimento n com exatamente r algarismos iguais a 1.

Portanto, a nossa conjectura é

$$\boxed{(1+x)^n = \sum_{r=0}^{n} T(n,r)x^r}.$$

Justificação da conjectura

Cada fator $(1+x)$ representa uma coordenada binária.

Ao desenvolvermos o produto de n fatores, escolhemos exatamente um termo de cada fator.

Se escolhermos x em r fatores e 1 nos restantes, o produto resultante será x^r.

Essas escolhas correspondem exatamente aos vetores binários de comprimento n com r algarismos iguais a 1.

Existem $T(n,r)$ desses vetores.

Logo, depois de reunirmos os termos semelhantes, o coeficiente de x^r é precisamente $T(n,r)$.

A conjectura está demonstrada.

Polinómio gerado pelas escolhas binárias

Para qualquer inteiro $n \geq 0$,

$$\boxed{(1+x)^n = \sum_{r=0}^{n} T(n,r)x^r}.$$

Justificação. Cada escolha de um termo em cada fator $(1+x)$ corresponde a um único vetor de $\{0,1\}^n$.
O produto das contribuições desse vetor é x^r, onde r é o número das suas coordenadas iguais a 1.
Como existem $T(n,r)$ vetores com essa propriedade, o coeficiente de x^r é $T(n,r)$. □

O que ganhámos com esta representação?

Antes, contávamos os subconjuntos organizando os vetores binários em tabelas e camadas.

Agora conseguimos representar todas essas contagens num único polinómio.

O expoente indica a propriedade que estamos a observar: a quantidade de elementos escolhidos.

O coeficiente indica quantos objetos possuem essa propriedade.

Mais importante ainda, a construção do polinómio continua a depender dos mesmos dois princípios que utilizávamos na contagem por tabelas.

Pergunta da investigação. Será que podemos modificar os polinómios para representar outras condições, como a soma dos valores escolhidos, em vez de apenas a quantidade de elementos?

Essa pergunta será o ponto de partida para a próxima investigação.

5.1 A soma das coordenadas em vez da quantidade de escolhas

Agora tomemos conjuntos diferentes:

$$A = \{0, 1, 2\}, \qquad B = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Queremos os pares (a, b) com $a + b = 3$. A cada escolha a atribuímos x^a e a b, x^b:

$$F_A(x) = 1 + x + x^2, \qquad F_B(x) = 1 + x + x^2 + x^3.$$

No produto $F_A(x)F_B(x)$, cada par contribui com x^{a+b}. Para o coeficiente de x^3, só podem contribuir

$$1 \cdot x^3, \quad x \cdot x^2, \quad x^2 \cdot x,$$

correspondentes a $(0, 3), (1, 2), (2, 1)$. Logo, existem três pares.

$a\backslash b$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	4
2	2	3	4	5

A tabela marca a mesma antidiagonal de soluções que o coeficiente do polinómio.

Polinómios de contagem ponderada

Se $A_1, \ldots, A_r$ são conjuntos finitos e $v_i : A_i \to \mathbb{N}_0$ atribuem pesos, definimos

$$F_i(x) = \sum_{a \in A_i} x^{v_i(a)}.$$

Então o coeficiente de x^s em $F_1(x) \cdots F_r(x)$ é o número de tuplos $(a_1, \ldots, a_r)$ para os quais

$$v_1(a_1) + \cdots + v_r(a_r) = s.$$

Justificação. Pela distributividade, antes de reunir termos, cada tuplo determina exatamente um produto de monómios. O expoente é a soma dos seus pesos. Agrupar monómios iguais soma precisamente os tuplos com a mesma soma. □

5.2 Elementos diferentes, mas com o mesmo peso

Atribuir pesos não exige que valores distintos tenham pesos distintos. Seja

$$A = \{a, b, c\}, \quad v(a) = 0,\ v(b) = v(c) = 1, \quad B = \{0, 1\}.$$

O primeiro polinómio é $1+2x$, pois existem dois elementos diferentes com peso um. Multiplicando por $1 + x$,

$$(1 + 2x)(1 + x) = 1 + 3x + 2x^2.$$

O coeficiente de x vale três: os pares são $(a, 1)$, $(b, 0)$ e $(c, 0)$.

Acrescentemos $z \in \{0, 1\}$ e exijamos $v(a) + b + z = 2$. Por camadas, $z = 0$ permite dois pares e $z = 1$ permite três; no polinómio,

$$(1 + 3x + 2x^2)(1 + x) = 1 + 4x + 5x^2 + 2x^3.$$

O coeficiente 5 reproduz a mesma soma de camadas $2 + 3$.

5.3 O polinómio determina de onde veio?

Pergunta da investigação. Se nos derem o polinómio pronto, é possível recuperar os seus conjuntos geradores?

Considere $1 + 2x + x^2$. Ele pode vir de um conjunto de quatro objetos com pesos $0, 1, 1, 2$, ou do produto $\{0, 1\} \times \{0, 1\}$ com peso dado pela soma. A distribuição dos coeficientes é a mesma; os objetos e a decomposição em fatores são diferentes.

O que se perde ao reunir termos

O polinómio conserva o número de objetos de cada peso, mas não necessariamente a identidade de cada objeto, a ordem das coordenadas ou a história das escolhas. Por isso, não há em geral recuperação única dos conjuntos originais. O inverso exige informação adicional.

5.4 Problemas que escondem polinómios

Até agora, descobrimos que podemos associar um monómio a cada escolha e que a multiplicação de polinómios permite combinar escolhas independentes.

Também observámos que os coeficientes registam quantas decisões diferentes produzem um mesmo resultado.

Mas será que esta construção tem utilidade fora das tabelas que utilizámos na nossa investigação?

Vamos experimentar problemas em que, à primeira vista, não existe qualquer motivo para pensar em polinómios.

Em cada experiência, começaremos pelo problema concreto e procuraremos uma representação adequada.

5.4.1 Problemas sem repetição

Nestes primeiros problemas, cada objeto pode ser escolhido no máximo uma vez.

Assim, se um objeto possui peso w, temos duas possibilidades:

$$\underbrace{1}_{\text{não escolher}} + \underbrace{x^w}_{\text{escolher}}.$$

O polinómio correspondente será

$$1 + x^w.$$

O significado de w dependerá do problema: poderá ser um preço, uma duração, uma distância ou qualquer outra quantidade aditiva.

Problema 1. Os cupões de desconto

Uma loja oferece cinco cupões, com descontos de

$$2, \quad 3, \quad 4, \quad 5, \quad 6$$

euros.

Cada cupão pode ser utilizado no máximo uma vez.

De quantas maneiras podemos escolher cupões que produzam um desconto total de exatamente 9 euros?

Pergunta da investigação. Como podemos representar a decisão de utilizar ou não cada cupão?

Para o cupão de 2 euros, temos

$$1 + x^2.$$

Para o de 3 euros,

$$1 + x^3.$$

E assim sucessivamente.

O polinómio que representa todas as escolhas possíveis é

$$P(x) = (1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4)(1 + x^5)(1 + x^6).$$

Cada produto obtido pela distributividade corresponde a um subconjunto dos cupões.

O expoente regista a soma dos descontos.

Portanto, queremos encontrar o coeficiente de x^9.

Vamos procurar os produtos que podem contribuir para esse termo:

$$x^3 x^6 = x^9,$$

$$x^4 x^5 = x^9,$$

e

$$x^2 x^3 x^4 = x^9.$$

Não existem outras possibilidades.

Logo,

$$\boxed{[x^9]P(x) = 3}.$$

Aqui, $[x^9]P(x)$ significa o coeficiente de x^9 no polinómio P.

Resposta do investigador. *Existem três escolhas possíveis de cupões que totalizam* 9 *euros.*

Podemos verificar diretamente:

$$\{3,6\}, \qquad \{4,5\}, \qquad \{2,3,4\}.$$

Problema 2. Quatro interruptores

Um dispositivo possui quatro interruptores.

Quando ativados, os interruptores acrescentam, respetivamente,

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8$$

unidades de energia ao dispositivo.

Cada interruptor pode estar ligado ou desligado.

O dispositivo necessita de exatamente 11 unidades de energia.

De quantas maneiras podemos configurar os interruptores?

Pergunta da investigação. Podemos representar todas as configurações por um único polinómio?

Cada interruptor possui duas possibilidades, pelo que construímos

$$P(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8).$$

Vamos multiplicar os dois primeiros fatores:

$$(1+x)(1+x^2) = 1+x+x^2+x^3.$$

Acrescentando o terceiro,

$$\begin{aligned}(1+x+x^2+x^3)(1+x^4)\\ = 1+x+x^2+\cdots+x^7.\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}P(x) &= (1+x+\cdots+x^7)(1+x^8)\\ &= 1+x+x^2+\cdots+x^{15}.\end{aligned}$$

Pergunta da investigação. O que significa que todos os coeficientes deste polinómio sejam iguais a 1?

Significa que cada quantidade inteira entre 0 e 15 pode ser obtida de exatamente uma maneira.

Em particular,

$$[x^{11}]P(x) = 1.$$

A única configuração é

$$11 = 8 + 2 + 1.$$

Portanto, ativamos os interruptores de pesos 8, 2 e 1.

O interruptor de peso 4 permanece desligado.

Resposta do investigador. *Existe exatamente uma configuração que produz* 11 *unidades.*

Uma ligação inesperada com a escrita binária

Os pesos $1, 2, 4, 8$ são potências de 2.
Escolher ou não cada peso é equivalente a escolher um algarismo 0 ou 1 numa representação binária.
Neste caso, a unicidade da representação binária reaparece como o facto de todos os coeficientes do polinómio serem 1.

Problema 3. Tarefas com a mesma duração

Uma pessoa pretende organizar o seu dia e possui quatro tarefas disponíveis:

- Organizar documentos: 2 horas;
- Rever apontamentos: 2 horas;
- Preparar uma apresentação: 3 horas;
- Realizar um projeto: 4 horas.

Cada tarefa pode ser realizada no máximo uma vez.

De quantas maneiras diferentes pode escolher tarefas que ocupem exatamente quatro horas?

Pergunta da investigação. As duas tarefas de duas horas devem corresponder ao mesmo monómio?

As duas tarefas são distintas, mas possuem a mesma duração.

Por isso, cada uma contribui com o fator

$$1 + x^2.$$

O polinómio completo é

$$P(x) = (1 + x^2)^2(1 + x^3)(1 + x^4).$$

Queremos o coeficiente de x^4.

Vamos começar pelos dois primeiros fatores:

$$(1+x^2)^2 = 1 + 2x^2 + x^4.$$

O termo x^4 pode surgir de duas maneiras diferentes:

$$x^2 \cdot x^2,$$

escolhendo ambas as tarefas de duas horas, ou

$$1 \cdot x^4,$$

escolhendo apenas o projeto de quatro horas.

Logo,

$$[x^4]P(x) = 2.$$

Resposta do investigador. *Existem duas maneiras de ocupar exatamente quatro horas.*

Reparemos que o coeficiente 2 não significa que alguma tarefa tenha sido escolhida duas vezes.

Significa que existem duas escolhas diferentes com a mesma duração total.

Problema 4. Uma soma par sem calcular todas as somas

Um painel possui quatro interruptores, com pesos

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 4.$$

Podemos ativar qualquer subconjunto dos interruptores.

Quantas configurações produzem uma soma par dos pesos ativados, incluindo a configuração em que todos estão desligados?

Pergunta da investigação. Conseguimos resolver o problema sem enumerar as dezasseis configurações?

Construímos o polinómio

$$P(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4).$$

Escrevamos

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{10}x^{10}.$$

Queremos somar os coeficientes cujos expoentes são pares:

$$E = a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}.$$

Mas como podemos separar esses coeficientes sem desenvolver todo o produto?

Sabemos que

$$P(1) = a_0 + a_1 + \cdots + a_{10}.$$

Por outro lado,

$$P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + a_{10}.$$

Pergunta da investigação. O que acontece se somarmos as duas expressões?

Os coeficientes dos expoentes ímpares cancelam-se.

Os coeficientes dos expoentes pares aparecem duas vezes.

Portanto,

$$P(1) + P(-1) = 2E.$$

Logo,

$$E = \frac{P(1) + P(-1)}{2}.$$

Agora já não precisamos de desenvolver o polinómio.

Basta calcular

$$P(1) = 2^4 = 16$$

e

$$P(-1) = (1-1)(1+1)(1-1)(1+1) = 0.$$

Assim,

$$E = \frac{16 + 0}{2} = \boxed{8}.$$

Resposta do investigador. *Existem oito configurações cuja soma dos pesos é par.*

Uma verificação sem polinómios. Fixemos as decisões correspondentes aos interruptores de pesos 2, 3 e 4.

Para cada uma dessas configurações, a decisão sobre o interruptor de peso 1 determina a paridade final.

Exatamente uma das duas possibilidades produz uma soma par.

Como os outros três interruptores admitem 2^3 configurações,

$$N = 2^3 = 8.$$

Descobrimos que avaliar o polinómio em 1 e em -1 permite separar as contribuições pares das ímpares.

5.4.2 Problemas com repetição

Até agora, cada objeto podia ser escolhido no máximo uma vez.

Mas muitas situações permitem que a mesma possibilidade seja escolhida várias vezes.

Precisamos de observar duas situações distintas:

- Escolhas efetuadas em posições distinguíveis, nas quais a ordem importa;
- Escolhas nas quais apenas interessa a quantidade de vezes que cada elemento é utilizado.

Vamos experimentar ambas.

Problema 5. Três almoços com orçamento fixo

Uma cantina disponibiliza refeições de 1, 2 e 3 euros.

Uma pessoa vai almoçar na cantina na segunda, terça e quarta-feira.

Pode repetir a mesma refeição em dias diferentes.

De quantas maneiras pode organizar os três almoços para gastar exatamente 6 euros?

Pergunta da investigação. Como representar as três decisões sucessivas?

Cada dia admite as escolhas

$$x, \qquad x^2, \qquad x^3.$$

Portanto, o polinómio diário é

$$F(x) = x + x^2 + x^3.$$

Como existem três dias distinguíveis,

$$P(x) = F(x)^3 = (x + x^2 + x^3)^3.$$

Queremos o coeficiente de x^6.

Vamos observar os preços que podem somar 6.

Podemos escolher

$$1 + 2 + 3 = 6$$

ou

$$2 + 2 + 2 = 6.$$

No primeiro caso, os três preços podem ser distribuídos pelos três dias de

$$3! = 6$$

maneiras.

No segundo, existe apenas uma distribuição.

Logo,

$$[x^6]P(x) = 6 + 1 = \boxed{7}.$$

Resposta do investigador. *Existem sete maneiras de organizar os três almoços.*

A potência do polinómio representa as escolhas dos três dias.

Os produtos representam as combinações de refeições, e os coeficientes distinguem as diferentes distribuições pelos dias.

Problema 6. Os movimentos de um robô

Um pequeno robô pode avançar, num único comando,

$$1, \quad 2, \quad 3 \quad \text{ou} \quad 4$$

casas.

O robô deve receber exatamente dois comandos.

Quantas sequências de comandos fazem o robô avançar exatamente cinco casas?

A ordem dos comandos importa.

Pergunta da investigação. Podemos traduzir a distância percorrida por cada comando num monómio?

O primeiro comando é representado por

$$F(x) = x + x^2 + x^3 + x^4.$$

O segundo admite as mesmas escolhas.

Portanto,

$$P(x) = F(x)^2.$$

O coeficiente de x^5 conta as sequências de comandos cuja distância total é cinco.

Os produtos relevantes são

$$x \cdot x^4, \qquad x^2 \cdot x^3, \qquad x^3 \cdot x^2, \qquad x^4 \cdot x.$$

Logo,

$$[x^5]P(x) = \boxed{4}.$$

Resposta do investigador. *Existem quatro sequências de dois comandos que percorrem exatamente cinco casas.*

Note-se que os comandos $(1, 4)$ e $(4, 1)$ são contados separadamente, pois a ordem dos movimentos distingue as sequências.

Problema 7. Pagar exatamente doze euros

Uma pessoa possui uma quantidade suficiente de moedas de 2 e 3 euros.

Quer pagar exatamente 12 euros.

Não interessa a ordem em que as moedas são entregues, apenas quantas utiliza de cada tipo.

De quantas maneiras pode efetuar o pagamento?

Pergunta da investigação. Podemos representar o número de moedas escolhidas utilizando potências?

Se não utilizarmos moedas de 2 euros, a contribuição é

$$1 = x^0.$$

Se utilizarmos uma moeda, a contribuição é x^2.

Se utilizarmos duas, a contribuição é x^4.

Continuando até atingir 12 euros, obtemos

$$F_2(x) = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + x^{10} + x^{12}.$$

Para as moedas de 3 euros, o mesmo raciocínio produz

$$F_3(x) = 1 + x^3 + x^6 + x^9 + x^{12}.$$

Agora podemos multiplicar os fatores:

$$P(x) = F_2(x)F_3(x).$$

Cada produto da expansão representa uma escolha das quantidades de moedas dos dois tipos.

Queremos o coeficiente de x^{12}.

Os produtos que contribuem são

$$x^{12} \cdot 1, \qquad x^6 \cdot x^6, \qquad 1 \cdot x^{12}.$$

Logo,

$$[x^{12}]P(x) = \boxed{3}.$$

Resposta do investigador. *Existem três maneiras de pagar exatamente doze euros.*

Podemos verificar pelas quantidades de moedas:

Moedas de 2	Moedas de 3	Total
6	0	12
3	2	12
0	4	12

Pergunta da investigação. Por que não utilizámos uma potência como $F(x)^r$?

Porque não escolhemos um número fixo de posições distinguíveis.

Escolhemos quantas moedas utilizaremos de cada tipo.

Os fatores representam agora as multiplicidades possíveis de cada valor, e não decisões em posições sucessivas.

A escolha do polinómio depende do objeto contado

Quando contamos sequências ordenadas, utilizamos fatores associados às posições da sequência.
Quando contamos quantidades de objetos repetidos sem considerar a ordem, podemos utilizar fatores associados aos tipos de objetos.
A mesma técnica algébrica pode representar problemas diferentes, desde que a correspondência entre os produtos e os objetos contados seja corretamente estabelecida.

Problema 8. Distribuir o esforço por quatro dias

Uma pessoa quer realizar uma pequena atividade física durante quatro dias.

Em cada dia pode realizar

$$0, \quad 1 \quad \text{ou} \quad 2$$

unidades de atividade.

Pretende realizar exatamente três unidades no total.

De quantas maneiras diferentes pode distribuir a atividade pelos quatro dias?

A ordem dos dias importa.

Pergunta da investigação. Podemos contar as distribuições sem escrever todas as sequências?

Em cada dia, temos três escolhas:

$$1, \quad x, \quad x^2.$$

Portanto,

$$F(x) = 1 + x + x^2.$$

Para os quatro dias,

$$P(x) = (1 + x + x^2)^4.$$

Queremos determinar

$$[x^3]P(x).$$

Vamos procurar quais os tipos de distribuição que produzem três unidades.

Podemos utilizar três dias com uma unidade e um dia sem atividade:

$$1 + 1 + 1 + 0 = 3.$$

Existem quatro escolhas para o dia sem atividade.

Logo, este caso produz

$$4$$

sequências.

Também podemos utilizar um dia com duas unidades, outro com uma, e dois dias sem atividade:

$$2 + 1 + 0 + 0 = 3.$$

Existem quatro escolhas para o dia com duas unidades.

Depois existem três escolhas para o dia com uma unidade.

Logo, este caso produz

$$4 \cdot 3 = 12$$

sequências.

Pelo Princípio Aditivo,

$$[x^3]P(x) = 4 + 12 = \boxed{16}.$$

Resposta do investigador. *Existem dezasseis maneiras de distribuir as três unidades pelos quatro dias.*

O coeficiente do polinómio reuniu automaticamente as distribuições pertencentes aos dois casos.

5.4.3 O que estes problemas nos ensinaram?

Os oito problemas partiram de situações diferentes, mas todos puderam ser traduzidos para produtos de polinómios.

Contudo, os fatores utilizados não foram sempre os mesmos.

Quando um objeto de peso w podia ser escolhido uma única vez, utilizámos

$$1 + x^w.$$

Quando uma posição admitia escolhas com pesos pertencentes a um conjunto A, utilizámos

$$\sum_{a \in A} x^a.$$

Quando um tipo de objeto podia ser utilizado várias vezes, sem que a ordem importasse, utilizámos um fator da forma

$$1 + x^w + x^{2w} + \cdots + x^{mw},$$

com m suficientemente grande para incluir todas as quantidades relevantes para o problema.

Pergunta da investigação. Qual é, então, o verdadeiro papel da variável x?

A variável não representa necessariamente um objeto físico.

A sua potência regista uma quantidade que queremos acompanhar.

Nos exemplos anteriores, essa quantidade foi o preço, a duração, a energia, a distância ou o esforço realizado.

Quando multiplicamos os monómios, os expoentes somam-se.

Essa propriedade reproduz a adição das quantidades correspondentes a decisões independentes.

Depois, ao reunirmos termos semelhantes, o coeficiente regista quantas escolhas diferentes produzem o mesmo total.

A ideia comum aos oito problemas

Para transformar um problema numa contagem polinomial, procuramos:

1. Identificar os objetos ou decisões que podem ser escolhidos.
2. Atribuir a cada escolha um monómio cujo expoente regista a quantidade que desejamos estudar.
3. Construir um produto que represente todas as escolhas admissíveis.
4. Procurar o coeficiente correspondente ao resultado exigido pelo problema.

O polinómio não é a origem da contagem: é uma representação algébrica das decisões que já sabemos contar pelos Princípios Multiplicativo e Aditivo.

Uma pergunta para a próxima investigação

Até agora, cada expoente registou apenas uma quantidade.

Mas alguns problemas exigem duas condições simultâneas.

Por exemplo, podemos querer escolher exatamente três atividades cuja duração total seja sete horas.

Nesse caso, precisamos de acompanhar tanto a quantidade de atividades como a soma das durações.

Pergunta da investigação. Será que um único expoente continua a ser suficiente, ou precisamos de conservar duas informações diferentes?

Esta pergunta mostra que a escolha da representação é tão importante como a multiplicação dos polinómios.

Será um ponto de partida para investigarmos representações que conservem várias propriedades dos objetos ao mesmo tempo.

Capítulo 6

A diagonal reaparece como substituição polinomial

6.1 Uma restrição que às vezes não modifica a resposta

Se $A = B = \{0, 1, 2, 3\}$ e queremos pares distintos (a, b) com $a + b = 3$, nenhum par da diagonal serve: a igualdade $a = b$ implicaria $2a = 3$, impossível entre inteiros. Logo, a contagem ordinária já funciona.

Pergunta da investigação. E se mudarmos a condição para $a + b = 4$?

Resposta do investigador. *Agora aparece* $(2, 2)$*, que é proibido; restam* $(1, 3)$ *e* $(3, 1)$*, isto é, dois pares.*

Precisamos de subtrair a contribuição da *diagonal inteira*, não somente uma célula. Tomemos

$$F(x) = 1 + x + x^2 + x^3.$$

O produto $F(x)^2$ representa todos os pares. Os pares (a, a) contribuem com x^{2a}, logo

$$D(x) = 1 + x^2 + x^4 + x^6.$$

Pergunta da investigação. Podemos construir D diretamente a partir de F?

Resposta do investigador. *Basta substituir* x *por* x^2*.*

A diagonal é, portanto, $F(x^2)$. Isso permite escrever o polinómio dos pares ordenados com coordenadas distintas:

$$Q(x) = F(x)^2 - F(x^2).$$

6.2 Retirar a ordem sem destruir a diagonal

Como cada par distinto (a, b) possui o inverso (b, a), ambos com o mesmo peso $a+b$, os coeficientes de $Q(x)$ são pares. Assim, o polinómio das escolhas de dois elementos distintos *sem ordem* é

$$H(x) = \frac{F(x)^2 - F(x^2)}{2}.$$

Se permitirmos dois elementos iguais, precisamos de recolocar cada célula diagonal exatamente uma vez:


$$G(x) = H(x) + F(x^2) = \frac{F(x)^2 + F(x^2)}{2}.$$

As duas contagens de pares sem ordem

Se $A \subseteq \mathbb{N}_0$ é finito e $F(x) = \sum_{a \in A} x^a$, então

$$\boxed{H(x) = \frac{F(x)^2 - F(x^2)}{2}} \qquad \boxed{G(x) = \frac{F(x)^2 + F(x^2)}{2}}$$

contam, por soma dos elementos, respetivamente: escolhas sem ordem de dois elementos *distintos*; escolhas sem ordem de dois elementos *com repetição permitida*. **Justificação.** Os pares fora da diagonal aparecem em classes de dois inversos com o mesmo monómio. Os pares diagonais aparecem uma vez. Subtrair $F(x^2)$ elimina os diagonais; dividir por dois identifica os restantes. Para permitir diagonal, acrescentamos uma cópia dela à contagem sem ordem. □



6.3 Uma pequena verificação

Para $A = \{0, 1, 2, 3\}$, o coeficiente de x^3 em $F(x)^2$ é quatro: $(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)$. Como $F(x^2)$ só tem expoentes pares, o coeficiente de x^3 em $H(x)$ é $4/2 = 2$, correspondente às escolhas $\{0, 3\}$ e $\{1, 2\}$.

É tentador pensar que basta eliminar os expoentes pares. Mas os pares $(0, 2)$ e $(2, 0)$ são distintos e produzem ambos x^2. Não é a paridade do *expoente* que revela a simetria; é a paridade dos *coeficientes depois de retirar a diagonal*.

Capítulo 7

Triplos: quando a divisão uniforme deixa de funcionar

7.1 Três padrões de repetição

Voltemos a $A = \{0, 1, 2\}$ e ao produto A^3. Queremos identificar triplos com a mesma coleção de elementos, contando também quantas vezes cada valor aparece. Isso requer a noção de *multiconjunto*: ao contrário de um conjunto usual, nele $0, 0, 1$ não é o mesmo que $0, 1$.

Organizamos a contagem em camadas, fixando a última coordenada z:

Padrão escolhido	$z = 0$	$z = 1$	$z = 2$	Total
$0, 1, 2$ (distintos)	2	2	2	6
$0, 0, 1$ (dois iguais)	2	1	0	3
$1, 1, 1$ (todos iguais)	0	1	0	1

A contagem pode ser confirmada diretamente: em $0, 1, 2$ há $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ posições distintas; em $0, 0, 1$, basta escolher a posição do 1, obtendo três; em $1, 1, 1$, qualquer permutação deixa a sequência igual.

Por que não podemos dividir $F(x)^3$ por 3!

As classes de representações têm tamanhos diferentes: 6, 3 ou 1. A divisão uniforme só se justificava porque, sem repetição, todas as classes tinham o mesmo tamanho. A tabela por camadas revela exatamente onde essa hipótese falha.

7.2 Duas interpretações polinomiais para a mesma tabela

Podemos dar ao expoente o significado de *camada*. Se c_z for a quantidade de representações na camada z, construímos

$$L(y) = c_0 + c_1 y + c_2 y^2.$$

A tabela anterior produz

$$L_{012}(y) = 2 + 2y + 2y^2, \quad L_{001}(y) = 2 + y, \quad L_{111}(y) = y.$$

Mas, se o expoente representar a *soma* dos valores das coordenadas, os mesmos padrões fornecem

$$S_{012}(x) = 6x^3, \quad S_{001}(x) = 3x, \quad S_{111}(x) = x^3.$$

As duas descrições respondem a perguntas diferentes. Podemos conservar as duas informações simultaneamente, atribuindo ao triplo (a, b, c) o monómio $x^{a+b+c}y^c$. O polinómio do produto completo fica

$$P(x, y) = (1 + x + x^2)^2(1 + xy + x^2y^2).$$

A variável x regista a soma, enquanto y regista a terceira coordenada, isto é, a camada. Fazer $y = 1$ apaga a distinção entre camadas; fazer $x = 1$ apaga a distinção entre somas.

Pergunta da investigação. Por que só o terceiro fator contém a variável y?

Resposta do investigador. *Porque a variável y deve contar a camada, isto é, o valor escolhido na terceira coordenada. Se aparecesse nos outros fatores, passaria a contar outra informação.*

Ainda assim, o polinómio não conserva *tudo*: $(0, 2, 1)$ e $(1, 1, 1)$ produzem o mesmo monómio x^3y, mas só o primeiro possui três elementos distintos.

7.3 Conservar todas as coordenadas antes de as esquecer

Introduzimos uma variável por coordenada:

$$G(u, v, w) = (1 + u + u^2)(1 + v + v^2)(1 + w + w^2).$$

O triplo (a, b, c) corresponde a $u^a v^b w^c$. Os exemplos anteriores passam a ser v^2w e uvw, que são distintos.

Representação fiel de um produto cartesiano numérico

Se $A, B, C \subseteq \mathbb{N}_0$ são finitos, o produto

$$G(u, v, w) = \left(\sum_{a\in A} u^a\right)\left(\sum_{b\in B} v^b\right)\left(\sum_{c\in C} w^c\right)$$

possui um monómio diferente $u^a v^b w^c$ para cada triplo $(a, b, c) \in A \times B \times C$; todos esses monómios têm coeficiente 1. **Justificação.** Se dois monómios em variáveis independentes são iguais, os expoentes de u, v e w coincidem coordenada a coordenada. Logo, os triplos de origem são iguais. A distributividade produz uma contribuição por triplo, provando também a sobrejetividade da correspondência. □

Para elementos não numéricos, primeiro atribuímos códigos inteiros distintos em cada coordenada. O polinómio completo preserva o objeto, mas torna-se cada vez mais difícil de manipular. A verdadeira tarefa agora é *simplificar sem perder a informação exigida pelas restrições.*

Capítulo 8


Uma linguagem comum — e o que ela não resolve sozinha

Seja R um conjunto finito de objetos válidos e $v : R \to \mathbb{N}_0$ uma propriedade numérica. Podemos sempre *definir*

$$F_R(x) = \sum_{a \in R} x^{v(a)}.$$

O coeficiente de x^s é a quantidade de objetos com propriedade s, e $F_R(1) = |R|$. O mesmo vale para vários pesos e várias variáveis.

Contudo, *definir* essa soma não é o mesmo que *calculá-la* eficientemente. Se para construir F_R já precisarmos de listar todos os elementos de R, pouco ganhámos em relação à tabela inicial. O valor da álgebra aparece quando podemos fatorizar, decompor em camadas, aplicar filtros ou reconhecer simetrias.



Uma condição para simplificar com segurança

Se duas escolhas diferentes passam a produzir o mesmo monómio, devemos perguntar: *as restrições que ainda queremos aplicar tratam essas escolhas da mesma maneira?* Se não, precisamos de conservar mais variáveis, separar casos, ou aplicar a restrição *antes* de projetar as informações.

8.1 O que sabemos codificar até aqui

Na linguagem das tabelas	Na linguagem dos polinómios
Escolhas sucessivas	Produto dos fatores que codificam as escolhas
Casos disjuntos	Soma das contribuições
Condição de soma	Extrair o coeficiente da potência desejada
Fixar uma camada	Fixar a contribuição de uma coordenada
Excluir a diagonal dos pares	Subtrair $F(x^2)$ de $F(x)^2$
Ignorar ordem em pares distintos	Dividir por 2 após excluir a diagonal
Preservar várias propriedades	Usar várias variáveis ou pesos independentes

Parte III

As fórmulas clássicas vistas de novo

Capítulo 9

Arranjos, combinações e permutações como polinómios

Depois de descobrir as fórmulas pelo princípio multiplicativo, surgiu uma pergunta natural: *será possível vê-las todas como expressões polinomiais?* Para responder, precisamos de uma variável u_i por elemento a_i de um conjunto $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$; o expoente de u_i regista quantas vezes esse elemento foi utilizado. Introduzimos ainda uma variável auxiliar t que regista a quantidade total de elementos escolhidos.

9.1 Escolhas ordenadas com repetição

Se temos r posições independentes e qualquer elemento pode ocupar cada posição, a expressão é

$$(u_1 + \cdots + u_n)^r.$$

Cada termo bruto da distributividade corresponde a uma sequência ordenada. Se ignorarmos os valores específicos e apenas contarmos quantas sequências existem, fazemos $u_i = 1$ e obtemos n^r. Os coeficientes antes da especialização guardam quantas sequências têm cada padrão de repetições.

9.2 Escolher sem repetição

Para cada elemento a_i há apenas duas decisões: não escolhê-lo (contribuição 1) ou escolhê-lo uma vez (contribuição tu_i). Logo,

$$E(t; \mathbf{u}) = \prod_{i=1}^{n} (1 + tu_i).$$

O coeficiente de t^r é a soma dos monómios $u_{i_1} \cdots u_{i_r}$ em que os índices são distintos, cada um aparecendo exatamente uma vez. Portanto, ele representa as *combinações sem repetição.*

Se desejarmos guardar também a ordem, cada monómio selecionado representa $r!$ sequências ordenadas. Assim,

$$\text{arranjos sem repetição:} \quad r!\,[t^r]E(t; \mathbf{u}).$$

9.3 Permitir multiplicidades

Se um elemento pode ser escolhido $0, 1, 2, \ldots$ vezes, as contribuições possíveis são

$$1 + tu_i + t^2u_i^2 + \cdots = \frac{1}{1 - tu_i}.$$

Aqui usamos a expansão como *série formal*; não precisamos de escolher um valor numérico para t. Para seleções de exatamente r elementos, bastam os termos até grau r. Portanto,

$$H(t; \mathbf{u}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{1 - tu_i}$$

representa as escolhas *sem ordem, com repetição*; o coeficiente de t^r reúne todos os padrões de multiplicidade total r, uma vez cada um.

9.4 Permutar um multiconjunto

Se temos $r = m_1 + \cdots + m_n$ posições e queremos exatamente m_i cópias do símbolo a_i, procuramos o coeficiente de $u_1^{m_1} \cdots u_n^{m_n}$ em

$$(u_1 + \cdots + u_n)^r.$$

Este coeficiente vale

$$\frac{r!}{m_1! \cdots m_n!}.$$

Justificação. Se temporariamente distinguirmos por etiquetas as m_i cópias de cada símbolo, haverá $r!$ ordenações dos r objetos etiquetados. Ao apagar as etiquetas de um símbolo que aparece m_i vezes, cada palavra final resulta de $m_i!$ permutações das suas cópias. O número de etiquetas que colapsam em cada palavra é o mesmo, $m_1! \cdots m_n!$; por isso dividimos. □

Quadro de contagens (recolhido somente depois das experiências)

Para n tipos de elementos e comprimento r,

Objeto contado	Expressão de contagem
Ordenados, com repetição	n^r
Ordenados, sem repetição	$\dfrac{n!}{(n-r)!}$, se $r \le n$
Sem ordem, sem repetição	$\dbinom{n}{r}$
Sem ordem, com repetição	$\dbinom{n+r-1}{r}$
Permutação de r símbolos com multiplicidades m_i	$\dfrac{r!}{\prod_i m_i!}$

Os quatro primeiros casos também são codificados por $(\sum_i u_i)^r$, $r![t^r]E$, $[t^r]E$ e $[t^r]H$, respetivamente. A expressão para escolhas sem ordem com repetição será justificada concretamente com separadores no capítulo seguinte.

Cuidado com o significado de "forma fechada"

Uma expressão polinomial pode *codificar* uma contagem sem fornecer imediatamente um valor numérico simples. Escrever $[t^r]H(t;\mathbf{u})$ é uma descrição exata; obter $\binom{n+r-1}{r}$ é um passo adicional de contagem, que precisa da sua própria justificação. Não são objetivos concorrentes: um conserva informação, o outro resume uma quantidade.

Parte IV


Questões em que se aprende a construir a representação

Capítulo 10

Palíndromos: eliminar a restrição antes de contar

10.1 A palavra ANNA

Consideremos palavras de quatro letras escolhidas de $\{A, N\}$. Formar todas as palavras e depois selecionar palíndromos seria possível, mas pouco económico. Um palíndromo é igual à sua leitura invertida: a primeira posição deve coincidir com a quarta e a segunda com a terceira.



Pergunta da investigação. Precisamos escolher quatro letras ou apenas duas escolhas independentes?

Resposta do investigador. *Escolhemos um valor para cada par de posições simétricas; as outras posições ficam determinadas.*

Introduzimos u para contar letras A e v para contar letras N. Cada par de posições simétricas contribui com u^2 ou com v^2. Portanto,

$$P_4(u, v) = (u^2 + v^2)^2 = u^4 + 2u^2v^2 + v^4.$$

O coeficiente 2 de u^2v^2 conta os dois palíndromos com duas letras de cada tipo: ANNA e NAAN. Se não exigirmos quantidades específicas, avaliamos $P_4(1, 1) = 4$.

Polinómios de palíndromos

Para um alfabeto com q símbolos, representados por $u_1, \ldots, u_q$, o polinómio que conta os palíndromos pela multiplicidade de cada símbolo é

$$P_{2m}(\mathbf{u}) = \left(\sum_{i=1}^{q} u_i^2\right)^m, \qquad P_{2m+1}(\mathbf{u}) = \left(\sum_{i=1}^{q} u_i^2\right)^m \left(\sum_{i=1}^{q} u_i\right).$$

Justificação. Cada uma das m duplas simétricas recebe independentemente um símbolo.

A dupla contribui com u_i^2, pois esse símbolo aparece duas vezes na palavra. Se o comprimento é ímpar, a posição central é independente e contribui com apenas u_i. Aplicamos a distributividade. □

10.2 Questão aplicada: cinco letras e quantidades exatas

Problema. Quantos palíndromos de cinco posições podem ser formados com exatamente dois A, dois B e um C?

O polinómio é

$$P_5(u, v, w) = (u^2 + v^2 + w^2)^2(u + v + w).$$

A letra C, que aparece uma única vez, não pode ocupar um par espelhado; deve ficar no centro. Os dois pares restantes recebem A e B em qualquer uma das duas ordens. Assim, há duas palavras: ABCBA e BACAB.

Algebricamente, procuramos o coeficiente de u^2v^2w. Ele só é obtido ao escolher w no fator central e u^2v^2 nos dois fatores de pares; esse produto surge duas vezes. A explicação combinatória e a polinomial coincidem.

A escolha da representação pode eliminar a dificuldade

A condição "ser palíndromo" não foi tratada por uma subtração gigantesca de palavras proibidas. Incorporámo-la no próprio modelo, escolhendo apenas os pares simétricos. Nalguns problemas, uma boa representação vale mais do que uma fórmula complexa.

Capítulo 11

Matrículas: separar os casos antes de multiplicar

Problema. Quantas sequências de nove algarismos decimais contêm o algarismo 0 *exatamente uma vez* e têm soma par nas duas últimas posições?

Este problema retoma a dúvida que iniciou a investigação. O objeto é um elemento de D^9, com $D = \{0, 1, \ldots, 9\}$. A condição seleciona um subconjunto de D^9. Precisamos ainda de esclarecer se a primeira posição pode ser 0: uma matrícula pode admitir zeros iniciais, enquanto um número inteiro de nove algarismos não admite.

11.1 Primeira experiência: contar as duas posições finais

Entre os algarismos não nulos, existem cinco ímpares $(1, 3, 5, 7, 9)$ e quatro pares $(2, 4, 6, 8)$. A soma de dois algarismos não nulos é par em dois casos disjuntos:

$$\text{ímpar+ímpar} : 5 \cdot 5 = 25, \qquad \text{par+par} : 4 \cdot 4 = 16.$$

Assim, quando nenhum dos dois últimos é 0, existem $25 + 16 = 41$ pares finais válidos. Se exatamente um deles é 0, o outro deve ser um dos quatro pares não nulos.

11.2 Dois casos principais

Caso I: o único zero está entre as primeiras sete posições. Podemos escolher a posição do 0 de sete maneiras; os outros seis lugares iniciais recebem um dos nove algarismos não nulos; o par final pode ser escolhido de 41 maneiras. Portanto,

$$N_1 = 7 \cdot 9^6 \cdot 41.$$

Caso II: o único zero está numa das duas posições finais. Escolhemos qual delas de duas maneiras e o outro algarismo final de quatro maneiras. As primeiras sete posições têm nove escolhas não nulas cada:

$$N_2 = 2 \cdot 4 \cdot 9^7.$$

Somando os casos disjuntos,

$$\boxed{N = N_1 + N_2 = 359 \cdot 9^6 = 190\,787\,319}.$$

11.3 E se o primeiro algarismo não puder ser zero?

No primeiro caso, a posição do zero fica restrita às posições 2 a 7: seis possibilidades, e não sete. O segundo caso não muda. Logo,

$$\boxed{N_{\text{primeiro}\neq 0} = 6 \cdot 41 \cdot 9^6 + 8 \cdot 9^7 = 318 \cdot 9^6 = 168\,998\,238}.$$

O que os princípios fizeram

A dificuldade não era reconhecer uma fórmula chamada "arranjo com restrição". Era descobrir uma *partição adequada*: zero no início ou zero no fim. Dentro de cada caso, construímos escolhas com quantidades constantes e multiplicámos. Depois somámos os casos disjuntos. Os polinómios também podem codificar a paridade, mas aqui a decomposição por casos é mais transparente.

11.4 Como seria a tradução polinomial?

Usamos a variável z para registar a quantidade de zeros escolhidos, e uma variável x para registar a soma dos dois últimos algarismos. Para uma posição inicial qualquer, o fator é $z + 9$: uma escolha zero e nove escolhas não nulas. Para cada posição final, o fator é

$$z + \sum_{j=1}^{9} x^j.$$

Assim, se o primeiro algarismo puder ser zero, um polinómio que conserva simultaneamente a quantidade de zeros e a soma final é

$$M(z, x) = (z + 9)^7 \left(z + \sum_{j=1}^{9} x^j \right)^2.$$

Para obter a quantidade pretendida, selecionamos o coeficiente de z^1 e, dentro dele, somamos os coeficientes de $x^0, x^2, x^4, \ldots, x^{18}$. Se o primeiro algarismo for proibido de ser zero, substituímos o primeiro fator $z + 9$ por 9:

$$M_{\text{sem zero inicial}}(z, x) = 9(z + 9)^6 \left(z + \sum_{j=1}^{9} x^j \right)^2.$$

A expressão polinomial não evita a escolha do modelo, mas preserva as duas condições no mesmo objeto algébrico.

Capítulo 12

Palitos e separadores: uma equação torna-se uma sequência

12.1 A equação que recordámos do livro

Queremos contar soluções de

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11.$$

Se as variáveis podem ser quaisquer inteiros, existem infinitas soluções, por exemplo $(t, -t, 0, 11)$ para qualquer inteiro t. A contagem finita exige uma condição. Vamos impor $x_i \in \mathbb{N}_0$.

Pergunta da investigação. Podemos representar a solução $(2, 3, 1, 5)$ com onze palitos e três separadores, recuperando os quatro números a partir das posições?

Resposta do investigador. *Sim. Se os separadores dividirem a linha em quatro regiões, os números de palitos de cada região são as coordenadas da solução.*



De modo mais legível, com • para uma unidade e | para separador:

$$\bullet\bullet \mid \bullet\bullet\bullet \mid \bullet \mid \bullet\bullet\bullet\bullet\bullet.$$

Uma região sem palitos indica uma coordenada zero. Por isso, todas as soluções não negativas são representáveis por sequências de onze símbolos de unidade e três separadores, e vice-versa.

12.2 A bijeção fornece a fórmula

Temos agora uma sequência de 14 lugares, dos quais escolhemos três para os separadores (os outros onze serão palitos). O número de soluções é, portanto,

$$\boxed{\binom{14}{3} = 364}.$$

Distribuir s objetos indistinguíveis por r caixas distintas

O número de soluções inteiras não negativas de

$$x_1 + \cdots + x_r = s$$

é

$$\boxed{\binom{s+r-1}{r-1}}.$$

Justificação. Associamos a cada solução uma sequência de s unidades e $r-1$ separadores, mantendo a ordem das caixas. A contagem de unidades antes, entre e depois dos separadores recupera unicamente a solução; reciprocamente, toda sequência com essas quantidades de símbolos determina uma solução. Basta escolher $r-1$ lugares para os separadores entre os $s+r-1$ lugares totais. □

Esta demonstração completa a contagem *sem ordem, com repetição* anunciada anteriormente: escolher r elementos de n tipos com repetição equivale a escolher multiplicidades $m_1+\cdots+m_n = r$, ou seja, $\binom{n+r-1}{n-1}$ possibilidades.

12.3 O mesmo problema pelo polinómio

Uma variável não negativa contribui com um dos monómios $1, x, x^2, \ldots$. Assim, para quatro variáveis, a função geradora formal é

$$\frac{1}{(1-x)^4}.$$

O coeficiente de x^{11} coincide com a quantidade de sequências de palitos e separadores, isto é, 364. Também podemos trabalhar só com o polinómio finito $(1 + x + \cdots + x^{11})^4$: os termos de grau 11 coincidem porque nenhuma parcela de grau maior pode contribuir para uma soma 11 com expoentes não negativos.

Se exigirmos $x_i \geq 1$, retiramos previamente uma unidade de cada variável: $y_i = x_i - 1 \geq 0$ e $y_1 + \cdots + y_4 = 7$. Assim, o número passa a ser $\binom{10}{3} = 120$. Não decorámos uma nova fórmula: transformámos o problema num caso que já sabíamos representar.

Capítulo 13

Um último exemplo: mudar de representação para evitar proibições

Problema. Quantas palavras de cinco letras se podem formar com exatamente três A e dois B, sem que dois B fiquem consecutivos?

Podemos começar por todas as sequências de três A e dois B e retirar os casos proibidos. Mas há uma construção mais simples: escrevemos primeiro os três A e observamos os quatro intervalos disponíveis, incluindo as extremidades:

$$_\, A \,_\, A \,_\, A \,_.$$

Para os dois B não ficarem consecutivos, cada intervalo pode receber no máximo um B. Basta escolher dois dos quatro intervalos. O número é $\binom{4}{2} = 6$.

Na nossa linguagem polinomial, cada intervalo contribui com $1 + t$ (não colocar B ou colocar um B). O coeficiente de t^2 em $(1+t)^4$ vale 6. A restrição complicada sobre *adjacência* tornou-se uma escolha binária sem repetição depois de mudarmos a representação dos objetos.

Como escolher entre tabela, produto e polinómio

Se uma restrição for fácil de traduzir em pesos aditivos, vale a pena procurar coeficientes. Se depender de simetria, escolhemos posições independentes ou identificamos órbitas. Se depender de posições proibidas, uma representação por intervalos, camadas ou estados pode tornar a construção mais simples do que o produto cartesiano original.

Parte V

Uma fronteira aberta e um primeiro prolongamento

Capítulo 14

Três igualdades que se sobrepõem

A nossa investigação deixou uma pergunta: em A^3, como excluir todos os triplos com coordenadas repetidas sem subtrair certos triplos mais de uma vez?

Seja $F(x) = \sum_{a \in A} x^a$, para $A \subseteq \mathbb{N}_0$ finito. Todos os triplos, classificados pela soma, são representados por $F(x)^3$. A condição "a primeira e a segunda coordenadas são iguais" produz

$$F(x^2)F(x),$$

pois o par igual contribui com x^{2a} e a terceira coordenada pode ser qualquer elemento. O mesmo polinómio conta cada uma das condições $a = b$, $a = c$ e $b = c$.

Se retirarmos três vezes $F(x^2)F(x)$, um triplo (a, a, a) será retirado três vezes, embora aparecesse apenas uma vez em $F(x)^3$. Para corrigi-lo, precisamos devolver duas cópias de sua contribuição. O polinómio dos triplos todos iguais é $F(x^3)$.

Primeiro caso de inclusão–exclusão em funções geradoras

O polinómio que conta os triplos ordenados com três coordenadas *distintas*, classificados pela soma, é

$$\boxed{Q_3(x) = F(x)^3 - 3F(x^2)F(x) + 2F(x^3)}.$$

Justificação. Um triplo com três coordenadas distintas aparece uma vez no primeiro termo e em nenhum dos restantes. Um triplo com exatamente duas iguais aparece uma vez em F^3 e exatamente uma vez numa das três subtrações; a sua contribuição é zero. Um triplo com as três iguais aparece uma vez em F^3, três vezes nas subtrações e duas vezes na correção, com coeficiente total $1 - 3 + 2 = 0$. Assim, permanecem precisamente os triplos desejados.□

Uma verificação no exemplo que motivou a pergunta

Se $A = \{0, 1, 2\}$ e procuramos soma 3, o coeficiente de x^3 em $F(x)^3$ é 7. Em $F(x^2)F(x)$ vale 1 e em $F(x^3)$ também vale 1. Logo, o coeficiente em Q_3 é $7 - 3 + 2 = 6$, as seis permutações de $(0, 1, 2)$. Se a ordem não importar, dividimos esse polinómio por $3! = 6$, porque *agora* todos os triplos permitidos têm três elementos distintos.

Este resultado é um *prolongamento* do caminho realizado: a correção das sobreposições leva-nos ao princípio da inclusão–exclusão. Em problemas maiores, a técnica poderá exigir várias interseções, partições de posições e outras estruturas. A álgebra não substitui a decisão sobre o que queremos contar; torna explícita essa decisão.

Síntese: uma teoria construída a partir de perguntas

O percurso começou com uma tabela $A \times B$ e uma pergunta sobre a legitimidade da multiplicação. A primeira restrição exigiu decompor o conjunto em casos disjuntos. Tornar os conjuntos iguais revelou a diagonal; ignorar a ordem revelou representações equivalentes. Com três coordenadas, contámos por camadas e descobrimos por que a multiplicação é um caso particular da soma de camadas de tamanho constante.

Ao passar para sequências de comprimento r, surgiram naturalmente os fatoriais, os arranjos e as combinações. Ao mudar para zeros e uns, os subconjuntos transformaram-se em vetores binários; a decomposição desses vetores revelou a recorrência de Pascal. Os polinómios nasceram quando representámos cada escolha por um monómio, e a distributividade reproduziu os princípios de contar. Finalmente, percebemos que restringir, identificar e projetar informações são operações diferentes: cada problema exige escolher o que a representação precisa de conservar.

O princípio diretor pode ser registado numa única frase:

A questão central da Combinatória

Antes de procurar uma fórmula, perguntar: *qual é o conjunto dos objetos, como posso representar cada objeto sem ambiguidades, que condições os selecionam, quando duas representações significam a mesma escolha e qual a operação que conta exatamente uma vez cada objeto desejado?*

A partir daí, a tabela, o produto cartesiano, as camadas, as bijeções, os fatoriais e os polinómios deixam de ser assuntos separados: passam a ser maneiras diferentes de olhar para a mesma construção.

Apêndice A

Perguntas de investigação para continuar

1. Se as palavras têm de evitar um padrão proibido (por exemplo, ABBA), como representar apenas as escolhas admissíveis por camadas ou por estados?

2. Quando é melhor manter variáveis diferentes para cada coordenada em vez de substituir todas por x?

3. A nossa expressão para triplos distintos pode ser generalizada a quatro coordenadas? Como as diferentes igualdades se intersectam?

4. Se o objeto é uma combinação com repetição, é mais eficiente usar separadores, produtos de séries geométricas ou uma tabela triangular?

5. Como identificar a ordem e as simetrias quando as classes de representações não têm tamanho constante?

6. Podemos criar, para um problema de matrículas, um polinómio que registe ao mesmo tempo quantidade de zeros, paridade e restrições sobre posições?

7. Que funções geradoras exigem infinitos termos? Que sentido matemático têm essas séries sem escolher um valor numérico de x?

Apêndice B

Convenções e vocabulário que surgiu no percurso

Produto cartesiano
Conjunto de escolhas ordenadas por coordenadas; duas escolhas com os mesmos valores podem diferir pela posição.

Restrição
Condição que seleciona um subconjunto das representações disponíveis.

Camada ou fibra
Subconjunto de tuplos obtido ao fixar uma coordenada.

Bijeção
Correspondência um a um entre dois conjuntos: nenhuma repetição e nenhuma omissão.

Representações equivalentes
Objetos diferentes de uma representação que são tratados como a mesma escolha final.

Multiconjunto
Seleção que conserva a quantidade de cópias de cada elemento, mesmo quando a ordem é ignorada.

Coeficiente de x^s
Quantidade agregada de escolhas que produzem o peso s, na função geradora adequada.

Projeção de informação
Substituição ou transformação que conserva certos pesos e deixa de distinguir outros.

Série formal
Expressão potencialmente infinita em que as operações são feitas coeficiente a coeficiente; não exige analisar convergência numérica para cada manipulação combinatória finita.