$R1 := 68k\Omega \quad R2 := 33k\Omega \quad R3 := 6.8k\Omega$
$\qquad C := 1pF \quad L := 3mH \quad j := \sqrt{-1}$

$R := R3 + \dfrac{1}{\dfrac{1}{R1} + \dfrac{1}{R2}} \qquad \omega_0 := \dfrac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \qquad Q := \omega_0 \cdot \dfrac{L}{R} \qquad Q_N := \omega_0 \cdot \dfrac{L}{R3} \qquad K := \dfrac{R2}{R1 + R2}$

$f_{start} := 1 \cdot 10^6 Hz$

$f_{stop} := 10 \cdot 10^6 Hz$

$T(f) := K \cdot \dfrac{\left[\dfrac{(j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f)}{\omega_0}\right]^2 + \dfrac{1}{Q_N} \cdot \dfrac{(j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f)}{\omega_0} + 1}{\left[\dfrac{(j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f)}{\omega_0}\right]^2 + \dfrac{1}{Q} \cdot \dfrac{(j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f)}{\omega_0} + 1}$

$N := 1024 \qquad i := 0 .. N - 1 \qquad\qquad f_i := f_{start} \cdot \left(\dfrac{f_{stop}}{f_{start}}\right)^{\frac{i}{N-1}}$

$M(f) := 20 \cdot \log(|T(f)|) \qquad \phi(f) := \dfrac{180}{\pi} \cdot \arg(T(f))$

$M(f_i)$ $\qquad$ $\phi(f_i)$

"\\Client\C$\Users\caleb_000\Documents\Y3S1\ECE3043\meimage.jpg"