

Tabela 1: Estatísticas descritivas por status de fumante

Status de fumante	Variavel	Media	Desvio-padroao	Minimo	Maximo	N
Fumante diario	Cigarros/dia	13,51	9,86	1,00	80,00	5.640
Fumante diario	Peso (gramas)	69.753,14	15.045,61	30.900,00	179.000,00	5.640
Fumante diario	TV (horas/dia)	2,65	1,80	0,00	6,50	5.640
Fumante ocasional	Cigarros/dia	4,94	6,93	1,00	60,00	441
Fumante ocasional	Peso (gramas)	69.396,83	14.989,00	39.500,00	138.100,01	441
Fumante ocasional	TV (horas/dia)	2,59	1,81	0,00	6,50	441
Nao fumante	Cigarros/dia	0,00	0,00	0,00	0,00	50.713
Nao fumante	Peso (gramas)	70.725,67	15.228,79	30.000,00	178.000,00	50.713
Nao fumante	TV (horas/dia)	2,34	1,64	0,00	6,50	50.713

Tabela 2: Regressões MQO com erros-padroao robustos HC1

	Modelo 1: nivel	Modelo 2: log	Modelo 3: ampliado
TV (horas/dia)	242.444*** (40.020)	0.003*** (0.001)	0.007*** (0.000)
Cigarros/dia	-8.350 (13.194)		
log(cigarros+1)		-0.004** (0.001)	-0.020*** (0.001)
Refrigerante (copos/semana)			0.001*** (0.000)
Idade centrada			0.003*** (0.000)
Idade centrada ao quadrado			-0.000*** (0.000)
Altura (cm)			0.011*** (0.000)
Mulher			0.003+ (0.002)
N	56794	56794	56794
R2	0.001	0.001	0.302
R2 ajustado	0.001	0.001	0.302

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Erros-padroao robustos HC1 entre parenteses.

O modelo 3 tambem inclui cor/raca, alfabetizacao, estado civil, regioao e tamanho do domicilio.

Maus habitos e peso na PNS 2013

Objetivo e dados. O objetivo e verificar se horas de TV, cigarros por dia e consumo de refrigerante se associam ao peso dos individuos na PNS 2013. Usei o peso final medido (w00103), convertido em *peso_gramas*; TV (p045) foi recodificada pelo ponto medio das faixas; cigarro combina p050 e p05402, com zero para nao fumantes; refrigerante e p020×p022, em copos por semana. A limpeza removeu codigos nao aplicaveis/ignorados e valores fora dos intervalos do dicionario, chegando a 56.794 observacoes na amostra comum. **Descritivas.** A Tabela 1 mostra que nao fumantes pesam em media 70,7 kg, contra 69,8 kg entre fumantes diarios e 69,4 kg entre ocasionais. Fumantes diarios assistem em media 2,65 horas de TV e fumam 13,51 cigarros/dia; nos nao fumantes, a variavel cigarro e mecanicamente zero. Essas diferencas brutas misturam habitos, composicao demografica e altura, por isso as regressoes abaixo controlam parcialmente esses fatores. **Especificacao.** Estimei MQO para: (1) $peso_gramas_i = \beta_0 + \beta_1 TV_i + \beta_2 cigarro_i + u_i$; (2) $\log(peso_i) = \alpha_0 + \alpha_1 TV_i + \alpha_2 \log(cigarro_i + 1) + e_i$; e (3) o modelo log ampliado com refrigerante, idade centrada, idade centrada ao quadrado, altura, sexo, cor/raca, alfabetizacao, estado civil, regioao e tamanho do domicilio. Esses controles reduzem vies por caracteristicas correlacionadas simultaneamente com peso e habitos. **Resultados.** No modelo em nivel, uma hora adicional de TV esta associada a 242 gramas no peso, mantido cigarro constante (p<0,001), enquanto um cigarro/dia adicional se associa a -8 gramas (p=0,527). O ajuste e baixo ($R^2=0,001$), logo maus habitos isolados explicam pouco da variacao individual do peso. No modelo log, TV implica aproximadamente 0,29% no peso por hora (p<0,001) e $\log(cigarro + 1)$ tem coeficiente -0,0038 (p=0,001). Com controles, TV passa a 0,69% (p<0,001), $\log(cigarro + 1)$ a -0,0199 (p<0,001) e refrigerante a 0,113% por copo/semana (p<0,001). O R^2 ajustado sobe de 0,001 para 0,302, principalmente pela inclusao de altura e demografia. **Diagnosticos.** Os graficos de residuos versus ajustados e as distancias de Cook foram gerados em *output/diagnostics*. O maior VIF do modelo ampliado foi 2,05, sem sinal forte de multicolinearidade severa. Breusch-Pagan rejeitou homocedasticidade em pelo menos um modelo (menor p<0,001; White: menor p<0,001), por isso a inferencia reportada usa erros-padroao robustos HC1. Heterocedasticidade afeta erros-padroao e testes t/F, mas nao torna MQO viesado se houver exogeneidade condicional. **Conclusao.** Os resultados indicam associacoes condicionais pequenas entre maus habitos e peso, nao efeitos causais fortes. O modelo ampliado sugere que parte da correlacao simples era composicional. As principais limitacoes sao o desenho transversal, possiveis variaveis omitidas, aproximacoes em categorias de TV/refrigerante, ausencia de pesos amostrais no recorte recebido e medida de cigarro restrita a cigarros industrializados por dia.