

# Plantas Carnívoras

Times new roman, 18, #38761d (verde)

As plantas carnívoras são espécies de vegetais que capturam, matam e digerem insetos ou outros pequenos animais, devido à presença de enzimas digestivas que extraem compostos nitrogenados e assim como fonte de nutrientes, dependem do nitrogênio presente nas proteínas dos animais.

Destaque (negrito) e ênfase (itálico)

Em seu livro ***“Insectivorous Plants”***, Charles Darwin escreveu sobre o processo de alimentação das plantas:

Citação em bloco, com ênfase

*I will now give in detail my experiments on the digestive power of the secretion of Drosera, dividing the substances tried into two series, namely those which are digested more or less completely, and those which are not digested. We shall presently see that all these substances are acted on by the gastric juice of the higher animals in the same manner. (p. 92)*

Darwin explica também que estas plantas conseguem florescer em solos pobres por causa da *“absorption of animal matter from captured insects”* (p.17), ou seja, elas conseguem os nutrientes necessários a partir da matéria animal capturada.

Citação em linha, ênfase

Há mais de 500 espécies de plantas carnívoras distribuídas no mundo todo com exceção da Antártida. São encontradas em diversas regiões desde áreas quentes e florestas tropicais úmidas, e até mesmo nas tundras gélidas da Sibéria. No Brasil há mais de 80 espécies diferentes, sendo considerado o segundo país do mundo a possuir mais espécies destes vegetais, perdendo somente para a Austrália. Veja uma [lista extensa de espécies na Wikipedia](#).

As plantas carnívoras utilizam-se de várias armadilhas para atraírem e capturarem suas presas, como:

- [Armadilhas “Jaula”](#)
- [Armadilhas de “Sucção”](#)

Hyperlinks internos para:

- #jaula
- #succao

Lista de itens não numerados

Hyperlink para: [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_carnivorous\\_plants](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_carnivorous_plants)

Times new roman, 14, #38761d (verde)

## Armadilhas "Jaula"

id="jaula"



Borda de 4px, cor sólida: #6aa84f  
(verde mais claro)

As folhas das plantas carnívoras que possuem este tipo de armadilha estão divididas em duas partes, similar a uma boca, com gatilhos no interior. Este gatilho ao ser tocado pelo animal aciona um mecanismo que imediatamente fecha as metades da folha, sendo abertas somente após a digestão do animal. Ao contrário do que muitas pessoas pensam estas enzimas proteolíticas são inofensivas à pele humana e aos animais de médio e grande porte. Esse tipo de armadilha é encontrada na Dionéia (*Dionaea*) que se alimenta principalmente de aranhas, moscas, largatas, grilos, lesmas, entre outros.

Ênfase

Times new roman, 14, #38761d (verde)

## Armadilhas de "Sucção"

id="succao"



Este tipo de armadilha é encontrado em todas as espécies de Utricularia, que vivem submersas em água doce ou brejos. Possuem utrículos que se assemelham a pequenas bolsas, contendo uma minúscula entrada cercada por gatilhos, e ao serem estimulados provocam a abertura dessa entrada. Quando a entrada é aberta, é sugado para dentro tudo que estiver ao redor incluindo à presa que estimulou o gatilho.

## Criei sua própria planta carnívora

Times new roman, 14, #38761d (verde)

Se você estiver interessado em comprar sementes, visite [nossa loja](#) com preços.

Link para a outra pagina