

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт
По расчётно-графической работе №3
Вариант: 2

Выполнили:
Касьяненко В.М.
Кремпольская Е.А.
Шишминцев Д.В.
Кравцов К.Д.

Преподаватель:
Труфанова А.А.

г. Санкт-Петербург

2023 г.

1. Найти общее решение уравнения

$$y' + \sin \frac{x+y}{2} = \sin \frac{x-y}{2}$$

Решение:

$$y' = \sin \frac{x-y}{2} - \sin \frac{x+y}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} * \sin \frac{A-B}{2}$$

$$y' = -2 \cos \left(\frac{\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}}{2} \right) * \sin \left(\frac{\frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}}{2} \right)$$

$$y' = -2 \cos \left(\frac{2x}{4} \right) * \sin \left(\frac{2y}{4} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = -2 \cos \frac{x}{2} * \sin \frac{y}{2}$$

$$\frac{1}{\sin \frac{y}{2}} dy = -2 \cos \frac{x}{2} dx, \quad y = 0 - \text{уравнение с разделяющимися переменными}$$

$$\int \frac{1}{\sin \frac{y}{2}} dy = -2 \int \cos \frac{x}{2} dx$$

$$\text{Вычислим } \int \frac{1}{\sin \frac{y}{2}} dy:$$

$$t = \frac{y}{2}; dy = 2dt$$

$$\int \frac{2}{\sin t} dt = 2 \int \frac{\sin t}{\sin^2 t} dt = 2 \int \frac{\sin t}{(1-\cos^2 t)} dt$$

$$u = \cos t; dt = -\frac{1}{\sin t} du$$

$$2 \int -\frac{1}{1-u^2} du = 2 * \frac{1}{2*1} * \ln \left(\left| \frac{u-1}{u+1} \right| \right) = \ln \left(\left| \frac{\cos \frac{y}{2} - 1}{\cos \frac{y}{2} + 1} \right| \right) = \ln \left(-tg \left(\frac{y}{4} \right)^2 \right) = 2 \ln \left(tg \frac{y}{4} \right) + C$$

$$\text{Вычислим } \int \cos \frac{x}{2} dx:$$

$$t = \frac{x}{2}; dx = 2dt$$

$$2 \int \cos t dt = 2 \sin t = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

$$2 \ln tg \frac{y}{4} = -4 \sin \frac{x}{2} + C$$

$$\ln tg \frac{y}{4} = C - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad y = 0$$

2. Найти общее решение уравнения

$$y' + \frac{1-2x}{x^2}y = 1$$

Решение:

Линейное уравнение неоднородное первого порядка

Метод Лагранжа вариации произвольной постоянной:

Решим однородное уравнение:

$$y' + \frac{1-2x}{x^2}y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y(1-2x)}{x^2}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{(2x-1)dx}{x^2}, \quad y = 0 - \text{уравнение с разделяющимися переменными}$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2x-1}{x^2} dx$$

$$\text{Вычислим } \int \frac{2x-1}{x^2} dx:$$

$$\int \frac{2x-1}{x^2} dx = 2 \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x^2} dx = 2 \ln(|x|) + \frac{1}{x} + C(x)$$

$$\ln(|y|) = 2 \ln(|x|) + \frac{1}{x} + \ln C(x)$$

$$y = C(x)x^{2\sqrt{x}}e$$

Найдем $C(x)$:

$$y' = C'(x)x^{2\sqrt{x}}e + 2C(x)x^{\sqrt{x}}e - C(x)x^{\sqrt{x}}e$$

$$C'(x)x^{2\sqrt{x}}e + 2C(x)x^{\sqrt{x}}e - C(x)x^{\sqrt{x}}e + \frac{1-2x}{x^2}C(x)x^{2\sqrt{x}}e = 1$$

$$C'(x)x^{2\sqrt{x}}e = 1$$

$$\frac{dC(x)}{dx} = \frac{1}{x^{2\sqrt{x}}e}$$

$$\int 1 dC(x) = \int \frac{1}{x^{2\sqrt{x}}e} dx - \text{уравнение с разделяющимися переменными}$$

$$\text{Вычислим } \int \frac{1}{x^{2\sqrt{x}}e} dx:$$

$$t = \frac{1}{x}; \quad -dt = \frac{1}{x^2} dx$$

$$\int -\frac{1}{e^t} dt$$

$$s = -t; \quad t = -s; \quad dt = -ds$$

$$\int e^s ds = e^s = \frac{1}{e^t} = \frac{1}{\sqrt{x}} + C$$

$$C(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + C$$

Подставим в $y = C(x)x^2\sqrt{x}e$

$$y = Cx^2\sqrt{x}e + x^2$$

3. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее начальным условиям

$$y = x(y' - x \cos x), \quad y(\pi) = -5$$

Решение:

$$y' = \frac{y}{x} + x \cos x$$

$$y' - \frac{1}{x}y = x \cos x - \text{линейное неоднородное уравнение первого порядка}$$

Метод Лагранжа вариации произвольной постоянной:

Решим однородное уравнение:

$$y' - \frac{1}{x}y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}y$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}, \quad y = 0 - \text{уравнение с разделяющимися переменными}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + \ln C(x)$$

$$y = C(x)x$$

Найдем $C(x)$:

$$y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = x \cos x$$

$$C'(x) = \cos x, \quad x = 0$$

$$\frac{dC(x)}{dx} = \cos x$$

$$\int dC(x) = \int \cos x \, dx$$

$$C(x) = \sin x + C$$

Подставим в $y = C(x)x$

$$y = x(C + \sin x)$$

$$y = x \sin x + Cx$$

Решение задачи Коши:

Подставим начальные условия в решение уравнения $y = x \sin x + Cx$

$$5 = 0 + \pi C$$

$$C = \frac{5}{\pi}$$

$$y = x \sin x + \frac{5}{\pi} x$$

4. Найти общее решение уравнения

$$2xy'y'' = (y')^2 + 1$$

Решение:

Дифференциальное уравнение, допускающее понижение порядка (нет “у”)

$$y' = z; y'' = z'$$

$$2xzz' = z^2 - 1$$

$$\frac{zdz}{dx} = \frac{z^2-1}{2x}$$

$$\frac{zdz}{z^2-1} = \frac{dx}{2x}, \quad z = \pm 1, y = \pm x + C_0 - \text{уравнение с разделяющимися переменными}$$

$$\int \frac{zdz}{z^2-1} = \int \frac{dx}{2x}$$

$$\text{Вычислим } \int \frac{zdz}{z^2-1}:$$

$$t = z^2 - 1, \quad \frac{1}{2}dt = zdz$$

$$\int \frac{1}{2t} dt = \frac{1}{2} \ln(|t|) + C = \frac{1}{2} \ln(|z^2 - 1|) + C$$

$$\ln|z^2 - 1| = \ln|x| + C$$

$$z^2 - 1 = Cx$$

$$(y')^2 = Cx + 1$$

$$y' = \pm \sqrt{Cx + 1}$$

$$dy = \pm \sqrt{Cx + 1} dx - \text{уравнение с разделяющимися переменными}$$

$$\int dy = \pm \int \sqrt{Cx + 1} dx$$

$$\text{Вычислим } \int \sqrt{Cx + 1} dx:$$

$$t = Cx + 1, \quad dx = \frac{1}{C} dt$$

$$\int \sqrt{t} \frac{1}{C} dt = \frac{2t^{\frac{3}{2}}}{3C} + C_1 = \frac{2}{3C} (Cx + 1)^{\frac{3}{2}} + C_1$$

$$y = \pm \frac{2}{3C} (Cx + 1)^{\frac{3}{2}} + C_1, \quad y = \pm x + C_0$$

5. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения

$$y'' - 4y' + 5y = 2x^2 e^x, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 3$$

Решение:

Линейное неоднородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами

Составим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

$$D = 16 - 20 = -4$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 2 + i \\ \lambda_2 = 2 - i \end{cases}$$

Решение однородного уравнения:

$$\hat{y} = e^{2x} C_1 \sin x + e^{2x} C_2 \cos x$$

Найдем частное решение, используем метод неопределенных коэффициентов

$$y^* = e^x (Ax^2 + Dx + C)$$

$$y^{*'} = e^x (Ax^2 + x(B + 2A) + C + B)$$

$$y^{*''} = e^x (Ax^2 + x(B + 4A) + C + 2B + 2A)$$

$$2e^x Ax^2 + e^x x(2B - 4A) + e^x (2C - 2B + 2A) = 2x^2 e^x$$

$$\begin{cases} 2A = 2 \\ 2B - 4A = 0 \\ 2C - 2B + 2A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \\ C = 1 \end{cases}$$

$$y^* = e^x (x^2 + 2x + 1)$$

$$y = \hat{y} + y^*$$

$$y = e^{2x} C_1 \sin x + e^{2x} C_2 \cos x + e^x (x^2 + 2x + 1)$$

$$y = e^{2x} C_1 \sin x + e^{2x} C_2 \cos x + e^x x^2 + 2e^x x + e^x$$

Решение задачи Коши:

$$y = e^{2x} C_1 \sin x + e^{2x} C_2 \cos x + e^x x^2 + 2e^x x + e^x$$

$$y' = 2e^{2x} C_1 \sin x - e^{2x} C_2 \sin x + e^{2x} C_1 \cos x + 2e^{2x} C_2 \cos x + e^x x^2 + 4e^x x + 3e^x$$

$$\begin{cases} 2 = 0 + C_2 + 0 + 0 + 1 \\ 3 = 0 - 0 + C_1 + 2C_2 + 0 + 0 + 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = C_2 + 1 \\ 3 = C_1 + 2C_2 + 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -2 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

$$y = -2e^{2x} \sin x + e^{2x} \cos x + e^x x^2 + 2e^x x + e^x$$

6. Составить линейное неоднородное дифференциальное уравнение по характеристическому полиному однородной его части, и решить его

$$9\lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$$

Решение:

$9y'' - 6y' + y = e^x$ – линейное неоднородное дифференциальное уравнение

$$\lambda_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{18} = \frac{1}{3}$$

Решение однородного уравнения:

$$\hat{y} = C_1 e^{\frac{1}{3}x} + C_2 x e^{\frac{1}{3}x}$$

Найдем частное решение, используем метод неопределенных коэффициентов

$$y^* = Ae^x$$

$$y^{*'} = Ae^x$$

$$y^{*''} = Ae^x$$

$$9Ae^x - 6Ae^x + Ae^x = e^x$$

$$4Ae^x = e^x$$

$$A = \frac{1}{4}$$

$$y^* = \frac{e^x}{4}$$

$$y = \hat{y} + y^*$$

$$y = C_1 e^{\frac{1}{3}x} + C_2 x e^{\frac{1}{3}x} + \frac{e^x}{4}$$

7. Решить систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y + z \\ \dot{y} = 2y + x - z \\ \dot{z} = x - y + 2z \end{cases}$$

Решение:

Система дифференциальных уравнений

Метод Эйлера

$$|A - \gamma E| = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Вычислим собственные значения:

$$|A - \gamma E| = \begin{vmatrix} 2 - \gamma & -1 & 1 \\ 1 & 2 - \gamma & -1 \\ 1 & -1 & 2 - \gamma \end{vmatrix} = (2 - \gamma)^3 - 1 + 1 - (2 - \gamma) - (2 - \gamma) + (2 - \gamma) =$$

$$= (2 - \gamma)^3 - (2 - \gamma) = -\gamma^3 + 6\gamma^2 - 12\gamma + 8 + \gamma - 2 = -\gamma^3 + 6\gamma^2 - 11\gamma + 6 =$$

$$= -(\gamma - 1)(\gamma^2 - 5\gamma + 6) = -(\gamma - 1)(\gamma - 2)(\gamma - 3) = 0$$

$$\gamma_1 = 1; \gamma_2 = 2; \gamma_3 = 3$$

$\gamma = 1$:

$$\begin{pmatrix} 2 - 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 - 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_1 + v_2 - v_3 = 0 \\ v_1 - v_2 + v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_1 + v_2 - v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ 2v_2 - 2v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 - v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = v_3 \end{cases}$$

$$\text{Пусть } v_3 = 1, u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\gamma = 2$:

$$\begin{pmatrix} 2 - 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 - 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -v_2 + v_3 = 0 \\ v_1 - v_3 = 0 \\ v_1 - v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 - v_3 = 0 \\ -v_2 + v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 - v_3 = 0 \\ -v_2 + v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = v_3 \\ v_2 = v_3 \end{cases}$$

$$\text{Пусть } v_3 = 1, u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\gamma = 3$:

$$\begin{pmatrix} 2 - 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 - 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 - 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_1 - v_2 - v_3 = 0 \\ v_1 - v_2 - v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 + v_2 - v_3 = 0 \\ v_1 - v_2 - v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 + v_2 - v_3 = 0 \\ -2v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 - v_3 = 0 \\ v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = v_3 \\ v_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Пусть } v_3 = 1, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x(t, c) = C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t} \\ y(t, c) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} \\ z(t, c) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t} \end{cases}$$