
(a) $\Delta_\sigma = 0.1$: plateau
$\Lambda = 2$, $K = 256$, $n_b = 10$
$\Lambda = 2.5$, $K = 128$, $n_b = 10$
$\Lambda = 3$, $K = 128$, $n_b = 10$
$\Lambda = 4$, $K = 64$, $n_b = 10$
settled window (central item)
$10^4\,[\Delta_{\rm loc} - \Delta_E]$
RG time $l = n \ln \Lambda$
(b) $\Delta_\sigma = 0.2$: no plateau, extrapolated
$\Lambda = 2.5$, $K = 128$, $n_b = 16$
$\Lambda = 3$, $K = 128$, $n_b = 16$ (central)
$\Lambda = 3$, $K = 64$, $n_b = 24$
settled window (central item)
$10^4\,[\Delta_{\rm loc} - \Delta_E]$
RG time $l = n \ln \Lambda$
(c) $\Delta_\sigma = 0.249$ ($\varepsilon = 0.004$): slow approach
$\Lambda = 3$, $K = 128$, $n_b = 16$
$\Lambda = 3$, $K = 64$, $n_b = 16$
$\Lambda = 3$, $K = 64$, $n_b = 24$
$\Lambda = 2.5$, $K = 128$, $n_b = 16$
one loop: slope $(N+8)/(N+2) = 3$
$1/(\Delta_{\rm loc} - \Delta_E^{\rm series})$
RG time $l = n \ln \Lambda$
(d) $\Delta_\sigma = 0.001$: Λ and K at 10^{-4}
$\Lambda = 2.5$, $K = 64$, $n_b = 10$
$\Lambda = 2.5$, $K = 128$, $n_b = 10$
$\Lambda = 3$, $K = 128$, $n_b = 16$ (central)
$\Lambda = 4$, $K = 64$, $n_b = 10$
settled window (central item)
$10^4\,[\Delta_{\rm loc} - \Delta_E]$
RG time $l = n \ln \Lambda$