
ÉTAPE 1 De 0 à 3 mois

Le nouveau-né

« Il pleure sans arrêt, c'est normal ? »



Dans cette étape

- Son développement
- Les soins et le bain
- Nourrir bébé
- Les pleurs
- Le sommeil
- Vous, les parents

Son développement de 0 à 3 mois

Mon bébé ne tient pas encore sa tête : est-ce normal ?

MOTEUR

Des réflexes à la tête qui se tient

À la naissance, bébé bouge surtout par **réflexes** : il tète, agrippe votre doigt, sursaute (réflexe de Moro). Ses bras et ses jambes sont toniques, son cou encore mou. Sur le ventre, il commence à **soulever la tête** ; vers 3 mois, il la tient presque seul.

SENSORIEL

Il vous reconnaît déjà

Il voit net à **20-30 cm**, la distance de votre visage quand il boit. Il préfère les visages et les contrastes forts, et suit du regard vers 1-2 mois. Il reconnaît votre **odeur** et votre **voix**, et se calme contre votre peau.

PSYCHOLOGIQUE

L'attachement se construit

Répondre à ses pleurs ne lui donne pas de « mauvaises habitudes » : cela le **sécurise**. C'est vous qui l'aidez à se calmer. Récompense attendue : le **premier sourire** en réponse, vers 6 semaines.

L'ESPACE DU KINÉ

Le temps sur le ventre, chaque jour

Quand il est éveillé et que vous êtes à côté, posez-le quelques minutes sur le ventre, sur un tapis ferme. Commencez par 1 à 2 minutes, plusieurs fois par jour. Il muscle son cou et son dos, et c'est la meilleure prévention de la tête plate.

Parlez-en à votre médecin si votre bébé…

- ne fixe pas et ne suit pas du regard à 2 mois ;
- ne sourit pas en réponse à 3 mois ;
- ne réagit pas aux bruits forts ;
- paraît très mou ou très raide, ou tourne toujours la tête du même côté.

Source : carnet de santé de l'enfant

Mon corps après l'accouchement

J'ai des petites fuites quand je tousse : est-ce normal ?

Votre corps a porté et mis au monde un bébé. Il lui faut **plusieurs mois** pour récupérer, et c'est normal. Certains signes sont fréquents ; d'autres doivent vous faire consulter.

	Fréquent les premières semaines	À signaler
Saignements	Jusqu'à 4-6 semaines, de moins en moins abondants	Saignements qui augmentent, caillots, mauvaise odeur
Périnée	Sensation de lourdeur, petites fuites à l'effort	Fuites qui persistent après la rééducation, boule dans le vagin
Ventre	Ventre encore rond, muscles relâchés	Bosse au milieu du ventre quand vous vous relevez
Cicatrice	Tiraillements, sensibilité	Rougeur, chaleur, écoulement, fièvre

Protéger son périnée

- Expirer en serrant le périnée avant de porter bébé
- Se relever en passant par le côté
- Pas de poussée aux toilettes

La rééducation

Après la consultation postnatale (6 à 8 semaines), une rééducation du périnée avec une sage-femme ou un kiné est **prise en charge**.

L'ESPACE DU KINÉ

Pas d'abdos classiques tout de suite

Les crunchs poussent sur le périnée. On commence par la respiration et le réveil des abdominaux profonds, puis on renforce progressivement.

Trouver sa place quand bébé arrive

? Elle allaite… mais moi, je sers à quoi ?

Le lien se construit en s'occupant de bébé

Le parent qui n'a pas porté l'enfant devient souvent parent « d'un coup ». Se sentir un peu à côté au début est **très courant**. Le bain, le change, le peau à peau, les promenades : chaque soin crée le lien.

Faire plutôt que proposer

« Tu veux que je t'aide ? » oblige l'autre à penser et à demander. Prenez des sujets **entièrement** en charge : repas, courses, linge, rendez-vous, papiers.

Se répartir les nuits

BÉBÉ ALLAITÉ

Le partenaire se lève, change bébé et l'apporte pour la tétée, puis le recouche.

BÉBÉ AU BIBERON

Chacun une demi-nuit « de garde », l'autre dort avec des bouchons d'oreille.

Le congé du second parent

28 jours au total (congé de naissance + congé de paternité), dont 7 jours obligatoires juste après la naissance. Le reste se prend dans les 6 mois. Prévenez votre employeur au moins un mois avant.

Vous aussi, vous pouvez craquer

Irritabilité, fuite dans le travail ou les écrans, sentiment d'être inutile : jusqu'à **1 père sur 10** traverse une dépression autour de la naissance. Parlez-en à votre médecin.

FICHE PRATIQUE

Les repères de mon bébé de 0 à 3 mois

À imprimer et à cocher au fil des semaines. Notez la date : c'est un joli souvenir.

☐	**~ 1 mois**	Fixe mon visage quand je lui parle Le : .....
☐	**1-2 mois**	Suit un objet du regard Le : .....
☐	**~ 6 sem.**	Premier sourire en réponse Le : .....
☐	**~ 2 mois**	Soulève la tête sur le ventre Le : .....
☐	**2-3 mois**	Gazouille, répond par des sons Le : .....
☐	**2-3 mois**	Découvre et regarde ses mains Le : .....
☐	**~ 3 mois**	Tient presque sa tête seul Le : .....

Mes questions pour le prochain rendez-vous

Ces âges sont des **fourchettes**, pas des dates limites. Chaque bébé a son rythme : ce qui compte, c'est qu'il progresse.