1)

$\ker \varphi = \{ x \in G \mid \varphi(x) = 1_H \}$

① $\forall A \in G \quad A \cdot H \cdot A^{-1} \in H \rightarrow \forall A \ \forall H \ \varphi(H) = 1_H \rightarrow \varphi(A \cdot H \cdot A^{-1}) = \varphi(A)\cdot\varphi(H)\cdot\varphi(A^{-1}) =$
$= \varphi(A)\, 1_H \cdot \varphi(A)^{-1} = 1_H$

② $\mathbb{R}^3$ = BASE β → POSSONO ESSERE INDIP. $\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} \in \begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ NON SONO INDIP.

④ UN AUTOVETTORE È UN VETTORE APP. $\wedge$ V T.C. $T(\underline{v}) = \lambda \cdot \underline{v}$ CON λ AUTOVAL ASSOCIATO

2)

② $17^{17 \cdot 16} \equiv 17^{272} \ (100)$ 17 E 100 COPRIMI → TEOR. EULERO. $A^{\varphi(N)} \equiv A(N)$

$\varphi(100) = 5^2 \cdot 2^2 = \varphi(25)\cdot\varphi(4) = 20 \cdot 2 = 40$

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

$272 = 40 \cdot 6 + 32$

1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29

17
16
102
17
272

$\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&4\\4&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&5\\5&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&5\\5&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}6&7\\7&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\8\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\1&3&4&5&2&7&6&8\end{pmatrix} = (2\,3\,4\,5)(6\,7)$

ORDINE = MCM (2,6) = 6

---

④
$$\det\left(\begin{bmatrix}0&0&0&-1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\-1&0&0&0\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\lambda&0&0&0\\0&\lambda&0&0\\0&0&\lambda&0\\0&0&0&\lambda\end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix}-\lambda&0&0&-1\\0&1-\lambda&0&0\\0&0&1-\lambda&0\\-1&0&0&-\lambda\end{bmatrix}\right) \rightarrow \text{LAPLACE 1° RIGA}$$

$$-\lambda \cdot \det\begin{pmatrix}1-\lambda&0&0\\0&1-\lambda&0\\0&0&-\lambda\end{pmatrix} + 1 \cdot \det\begin{pmatrix}0&1-\lambda&0\\0&0&1-\lambda\\-1&0&0\end{pmatrix} \quad \text{1° RIGA}$$

$$\rightarrow -\lambda\left(1-\lambda \cdot \det\begin{pmatrix}1-\lambda&0\\0&-\lambda\end{pmatrix}\right) + 1-\lambda \cdot \det\begin{pmatrix}0&1-\lambda\\-1&0\end{pmatrix}$$

$$= -\lambda\left(1-\lambda\left(1-\lambda\cdot-\lambda\right)\right) + (1-\lambda)\cdot\left(\lambda\ 1-\lambda\cdot-1\right) = -\lambda\left(1-\lambda\cdot\left(-\lambda+\lambda^2\right)\right) + (1-\lambda)(-1+\lambda)$$

$$= -\lambda\left(-\lambda+\lambda^2+\lambda-\lambda^3\right) + \left(-1+\lambda+\lambda-\lambda^2\right) = -\lambda^3-\lambda^3-\lambda^2+\lambda^4-1+2\lambda-\lambda^2 =$$

$$= \lambda^4-\lambda^3-\lambda^2+2\lambda-1$$

RADICI : 1, −1

DIAGONALIZZABILE

$V_1 = \{ \ | \ \}$

$V_{-1} = \{ \ | \ \}$

$$\begin{pmatrix}-1&0&0&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\-1&0&0&-1\end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix}-x-v=0\\-x-v=0\end{matrix} \quad \begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\-1&0&0&1\end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix}x-v=0\\y=0\\z=0\\-x+v=0\end{matrix} \quad \begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$17^{17^{16}}(100)$ $\qquad$ $17^{32}(100)$ $\qquad$ $17^{32}(25) \to 17^{32}(5) \to 2^{32} \to 1$

$17^{32}(4) \to 1$

17 ·
16 =

$\varphi(100) = 40$

102
17
272

17
17
119
17
289

1, 3, 7, 9
11, 13, 17, 19
21, 23, 27, 29



$3x + 25y = 1$

$25 = 3 \cdot 8 + 1$

$19 \cdot 3 = 57$

1 =

$B \cdot A(-8)$

$(-8, 1)$

$(-8 + 25k) = 17$

~~$T(V_0) = \lambda \cdot V_H \to T\, V_H$~~

$T : V \to V \qquad T(T(\underline{v})) = T(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot \lambda \cdot \underline{v}$

$\underline{v} \to \underline{w}$

$V \to V \to V$

$\underline{v} \to \lambda \underline{v} \to \underline{w}$

SE $T \circ T = T \to V \to V \to V$

$\underline{v} \quad \underline{w} \quad \underline{v}$

$\underline{v} = 1 \cdot \underline{w}$

$\underline{0v} = 0 \cdot \underline{0_w}$

$x \equiv 2 \ (9) \to 2 \ (3)$

$x \equiv 17 \ (25) \to 17 \ (25)$

$x \equiv 2 \ (15) \to 2 \ (15)$

25 ·
3 =
75

$(1 + x) + (1 - x)$

$5x + 9y = 1$

$9 = 5 + 4 \to 4 = (-1, 1)$

$5 = 4 + 1 \to 1 = (2, -1) \to (2 + 9k)$

$6x + 25y = 17$

$25 = 6 \cdot 4 + 1$

$(-4, 1) \to (-68, 17)$

$6x + 25y = 1$

$25 = 6 \cdot 4 + 1$

$(-4, 1) \to (-4, 1 + 25k) \quad (-68 + 75k) = 75 - 68 = 7$

$5x \equiv 1 \ (9) \rightarrow x \equiv 2 \ (9) \rightarrow x \equiv 2 \ (3) \rightarrow x \equiv 2 \ (5)$

$3x \equiv 1 \ (5) \rightarrow x \equiv 2 \ (5)$

$x \equiv 2 \ (5)$

$x \equiv 2 \ (3)$

$5x+3y=2$

$5 \cdot 3+2 \rightarrow (1,-1)$

$3 \cdot 5+1 \quad (-1,1) \quad (-2,2) \quad (-2+3k)$

$KT = \{ P(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid T(P(x)) = \underline{0}_V \}$

$x^2+2x+1 = (1+x)^2+2(1+x)+1+(1-x)^2+2(1-x)+1 = 1+2x+x^2+2+2x+1+1-2x+x^2+2-2x+1 = 2x^2+4$

$5x \equiv 1 \ (9) \rightarrow x \equiv 2 \ (9) \quad 5x \equiv 2 \ (9)$

$3x \equiv 1 \ (5) \rightarrow x \equiv 2 \ (5) \quad 9x = 2 \ (5) \rightarrow$

$x \equiv 2 \ (5)$

$x \equiv 2 \ (3)$

$20+27 \equiv 47 \ (45)$

$2 \ (45)$

$9 = 5 \cdot 1+4$

$5 = 4+1 \rightarrow (-1,1) \rightarrow (2,-1) \rightarrow (4,-2)$

$(4+9k) = 4$

$9x+5y=2$

$9 = 5+4 \rightarrow (1,-1)$

$5 = 4+1 \quad (-1,2) \rightarrow (-2,4) \rightarrow (-2+5k) = 3$

2	17	2
7	34	4
6	51	6
5	68	8
4	85	10
3	102	13
2	119	1
1	136	11
	153	
	170	
	187	

15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195

87
90
99
108
117
126
135
144
153

$-x + y \geq 0 \quad \rightarrow \quad x \leq y$

$1 + x \geq 1 - x \geq 0 \quad \rightarrow \quad 1 - 1 + x - x \geq 0 \quad \rightarrow \quad x - x \geq 1 - 1$

$(1+x)(1-x) \geq 1 - x + x - x^2 \geq 1 - x^2$

$(1+x) + (1-x) \geq 2$

$x + y \geq 0 \quad \rightarrow \quad x \geq -y$

$y \geq 0$

$z \geq 0$

$-x \geq 0$

$-y \geq 0$

$-z \geq 0$

$-(1+1) + 2 - 2 \quad 2 - 2 + 4 - 4 - 2$