

Chapitre 4: Isométries vectorielles

$(E, < | >)$ espace euclidien de dimension n , $||.||$ norme associée

1 Isométries (vectorielle)

1.1 Définition

Un endomorphisme de E , $f \in \mathcal{L}(E)$ est une isométrie vectorielle ssi

$$\forall x \in E, ||f(x)|| = ||x||$$

1.2 Remarque

f est un isomorphisme ($\in GL(E)$)

$$f : E \rightarrow E$$

$$\begin{aligned} x \in \ker f & \quad \underbrace{||f(x)||}_0 = ||x|| \\ \Leftrightarrow x = 0_E \end{aligned}$$

1.3 Théorème:

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, Les 4 propositions suivantes sont équivalentes:

1. f est une isométrie
2. f conserve le produit scalaire:
 $\forall (x, y) \in E^2 \quad < f(x) | f(y) > = < x | y >$
3. f transforme une BON en une BON
4. La matrice représentative de f dans une BON est orthogonal

1.4 Preuve:

On va montrer $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$

- $(1) \Rightarrow (2)$

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in E^2 \quad & \langle x|y \rangle = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ \forall (x, y) \in E^2 \quad & \langle f(x), f(y) \rangle = \frac{1}{2}(\|f(x)+f(y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2) \\ & = \frac{1}{2}(\|f(x+y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2) \quad (*) \\ & = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \quad (**) \\ & = \langle x|y \rangle \end{aligned}$$

- $(2) \Rightarrow (3)$

$\{u_1, \dots, u_n\}$ BON de E

On pose $\forall i \in \{1, \dots, n\}, v_i = f(u_i)$

$$\|v_i\|^2 = \langle v_i|v_i \rangle = \langle f(u_i)|f(u_i) \rangle = \langle u_i|u_i \rangle = 1$$

Si $i \neq j$

$$\langle v_i|v_j \rangle = \langle f(u_i)|f(u_j) \rangle = \langle u_i|u_j \rangle = 0$$

$\{v_1, \dots, v_n\}$ famille orthonormée de $n = \dim E$ vecteurs

- $(3) \Rightarrow (4)$

$\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ une BON

$$P = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f = \begin{pmatrix} f(u_1) & \dots & f(u_n) \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$$

matrice de passage de $\{u_1, \dots, u_n\}$ à v_1, \dots, v_n BON donc la matrice est orthogonale

- $(4) \Rightarrow (1)$

Si $P = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f \in O(n)$

Si $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ est une BON

$$x \in E \rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ tq } x = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n$$

Si $y = f(x) \rightarrow Y = PX$

Si BON $\|x\|^2 = \langle x|x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 = X^T \cdot X$

$$\|f(x)\|^2 = \|y\|^2 = Y^T \cdot Y = (PX)^T \cdot (PX) = X^T \cdot P^T \cdot P \cdot X = X^T \cdot X = \|x\|^2$$

(*) Linéarité de f

(**) Isométrie de f

1.5 Théorème:

- Dans E euclidien, l'ensemble des isométries vectorielles de E est noté $O(E)$ et c'est un sous-groupe de $GL(E)$
- Si B est une BON de E
 $O(E) \rightarrow O(n)$
 $f \mapsto Mat_B(f)$ Est un isomorphisme de groupe

1.6 Propriétés supplémentaire: