

# Chapitre 3: Matrices et orthogonalité

On se place ici dans un espace euclidien de dimension  $n$ .

## 1 Écriture dans une base orthonormée.

### 1.1 Rappel:

Soit  $\mathcal{E}$  une BON  $\{e_1, \dots, e_n\}$  de  $E$ .

Comme c'est une base on peut à tout vecteur  $\vec{x}$  de  $E$  associer ses coordonnées  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  dans la

base  $\mathcal{E} : x = \sum x_i e_i$

Et on a un isomorphisme  $\varphi_{\mathcal{E}} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$x \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = X$$

Mais comme la base est orthonormée, on connaît facilement les coordonnées:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle e_i \text{ ou encore } X = \begin{pmatrix} \langle x | e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x | e_n \rangle \end{pmatrix}$$

Et dans ces conditions:

- $\langle x | y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = X^T \cdot Y = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$
- $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = X^T \cdot X = \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle^2$

Comme déjà vu, l'écriture dans une BON est facile à obtenir et pour ces coordonnées le produit scalaire usuel  $\mathbb{R}^n$  qui fait intervenir la transposition.

## 1.2 Orthogonal et transposition

Soit  $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$   $A = ((a_{ij}))$  Donc  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$ , on rappelle que :

$$\ker A = \left\{ X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ tq } AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Im} A = \{AX ; x \in \mathbb{R}^p\}.$$

**Proposition** Soit  $\{f_1, \dots, f_p\}$  p vecteurs de E

et A la matrice constituée des vecteurs colonnes de  $f_1, \dots, f_p$  dans une BON de E. i.e  $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(f_1, \dots, f_p)$

Dans la base  $\mathcal{E} : \text{Vect}\{f_1, \dots, f_p\}^\perp = \ker(A^T)$

Ceci veut dire que  $x \in \text{Vect}\{f_1, \dots, f_p\}^\perp$  SSI ses coordonnées X sont dans  $\ker(A^T)$

**Preuve:** Ici  $A = ((a_{ij}))$

$$\begin{pmatrix} f_1 & \dots & f_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Donc  $\forall 1 \leq j \leq n \quad f_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$  on note  $A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$

Si  $W = \text{Vect}\{f_1, \dots, f_p\}$ ,

$$x \in W^\perp \Leftrightarrow \forall 1 \leq j \leq p \quad \langle f_j | x \rangle = 0$$

$$x \rightarrow \sum x_i e_i \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \forall 1 \leq j \leq p \quad A_j^T \cdot X = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} A_1^T \cdot X \\ \vdots \\ A_p^T \cdot X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_p$$

Mais ici  $A_j^T X = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$  et si  $B = A^T$  alors  $b_{ji} = a_{ij}$

$$A_j^T X = \sum b_{ji} x_i$$

$$\text{donc } x \in W^\perp \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A_1^T \\ \vdots \\ A_p^T \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow A^T \circ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \ker A^T$$

On voit ici que dans une BON, l'orthogonalité est liée à la transposition des matrices.

Par ailleurs, cette proposition n'est pas sans rappeler les matrices de changements de base.

### 1.3 Rappel sur les changements de base

Si  $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$  et  $\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_n\}$  sont des bases d'un ev E de dimension n.

On appelle la matrice de passage  $\mathcal{E}$  à  $\mathcal{F}$  la matrice  $P \in M_n(\mathbb{R})$   $P = \text{mat}_{\mathcal{E}}(f_1 \dots f_n)$

Si  $P = ((p_{ij}))_{1 \leq i, j \leq n}$   $f_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i$

On rappelle que si x a pour coordonnées  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  dans  $\mathcal{E}$  et  $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$  dans  $\mathcal{F}$  alors:

$$\boxed{X = PX'}$$

De plus si v est un endomorphisme de E de matrice représentative A dans  $\mathcal{E}$  et A' dans  $\mathcal{F}$  alors

$$\boxed{A' = P^{-1}AP}$$

Que se passe-t-il avec des BON

## 2 BON et Matrices orthogonales.

### 2.1 Résultat préliminaire:

Soit  $\mathcal{E}$  une BON de  $E$  et  $\{f_1, \dots, f_p\}$   $p$  vecteurs de  $E$

De nouveau on pose  $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(f_1, \dots, f_p) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$

Si  $M$  est la matrice  $p \times p$  constituée des produit scalaires  $\langle f_i | f_j \rangle$  alors

$$M = A^T \cdot A = \begin{pmatrix} \langle f_1 | f_1 \rangle & \dots & \langle f_1 | f_p \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle f_p | f_1 \rangle & \dots & \langle f_p | f_p \rangle \end{pmatrix}$$

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \quad B = A^T = \begin{pmatrix} b_{1,1} & \dots & b_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{p,1} & \dots & b_{p,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \dots & a_{n,1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1,p} & a_{2,p} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \quad b_{i,j} = a_{j,i}$$

d'un côté:

$$\langle f_i | f_j \rangle = \langle \sum_{k=1}^n a_{k,i} e_k, \sum_{l=1}^n a_{l,j} e_l \rangle$$