

Quiz 1 – Curso Validação Psicométrica de Instrumentos em Saúde

1. 1. O que mede uma escala do tipo reflexivo?
 - a) Dados clínicos objetivos
 - b) Um construto latente
 - c) Factos sociodemográficos
 - d) Diagnóstico clínico

2. 2. Qual destes é um exemplo clássico de escala reflexiva?
 - a) Índice de Charlson
 - b) Score APGAR
 - c) Escala de Ansiedade de Beck
 - d) Inventário de Comorbilidade

3. 3. O que significa “validade de conteúdo”?
 - a) O questionário é visualmente apelativo
 - b) Mede exatamente aquilo que se pretende medir
 - c) É compreendido por todos os participantes
 - d) Tem boa consistência interna

4. 4. Quando deve ser avaliada a validade de conteúdo?
 - a) Apenas depois da tradução
 - b) Antes e depois da tradução
 - c) Apenas se o questionário tiver mais de 10 itens
 - d) Só se o questionário for novo

5. 5. Quantos peritos devem compor o painel para avaliar a validade de conteúdo?
 - a) 2-3
 - b) 4-6
 - c) 6-10
 - d) Mais de 15

6. 6. O índice I-CVI mínimo aceitável por item é:

- a) 0,60
- b) 0,78
- c) 0,90
- d) 1,00

7. 7. A validade facial é avaliada por:

- a) Bioestatísticos
- b) Investigadores
- c) Participantes da população-alvo
- d) Tradutores

8. 8. Qual é a principal pergunta associada à validade facial?

- a) "Os peritos consideram este item relevante?"
- b) "A pergunta está bem traduzida?"
- c) "À primeira vista, a pergunta faz sentido para o respondente?"
- d) "O questionário tem estrutura fatorial válida?"

9. 9. Qual dos seguintes é um questionário para medir variáveis latentes?

- a) Questionário sociodemográfico
- b) Questionário de conhecimentos
- c) Depression Anxiety Stress Scale (DASS)
- d) Inquérito telefónico

10. 10. O modo de aplicação com maior taxa de resposta é normalmente:

- a) Online
- b) Correio
- c) Presencial
- d) Telefone