

# Introducción

## 1. Un viaje del sol a los pixeles.

En esta primera práctica nos familiarizaremos con las interfaces gráficas del qgis y de R-studio. Para esto comenzaremos a analizar la imagen correspondiente a la zona de estudio del año 2015 desde el punto de vista espectral. Son nuestros objetivos

- Poder cargar una imagen en qgis.
- Digitalizar coberturas en qgis.
- Poder cargar un archivo raster y uno vectorial en R.
- Realizar un análisis estadístico de la imagen como un todo y de las distintas coberturas digitalizadas en R.

### 1.1. Exploración con el qgis

Comenzamos abriendo la imagen 18 correspondiente a la zona de interés durante el mes de mayo de 2015. Para esto vamos al menú *Capa* → *Añadir capa* → *Añadir capa ráster*. Navegamos hasta la carpeta `raster_data/LC82300772015071` y abrimos el archivo `LC82300772015071.brk`. Una vez abierto el mismo podremos encontrarlo en el *Panel de capas* de q-gis donde podremos manejar la visualización del mismo y estudiar las propiedades de dicha capa.

Usando la barra de herramientas del qgis podremos movernos en la imagen, realizar zoom en la misma entre otros.

**Actividad 1.1.** Cambie la combinación de bandas de la imagen L8 y muevase dentro de la misma.

**Actividad 1.2.** Encuentre el sistema de coordenadas en el cual se encuentra la imagen.

**Actividad 1.3.** Utilizando la herramienta identificar objetos espaciales encuentre los valores de reflectancia de distintas coberturas. Grafique estos valores en una firma espectral y en el espacio de fases nirrojo.

Con la herramienta nueva capa de archivo shape es posible digitalizar zonas de la imagen para su posterior análisis. Para esto puede hacer click en el botón del panel lateral y agregar una capa nueva para lo cual el qgis pedirá un nombre de la misma. Guárdela en la carpeta `vector_data/` con el nombre `firmas.shp`. Recuerde elegir el sistema de coordenadas correspondiente a la imagen anterior.

Una vez creada la nueva capa podemos utilizar la barra de herramientas de qgis para agregar nuevas geometrías a la misma. Para esto hacemos click en el botón de agregar geométrica y digitalizamos una zona uniforme dentro de la imagen. Al terminar de hacerla qgis pedirá un número de ID para la capa que debe ser correlativo.

**Actividad 1.4.** Digitalice coberturas uniformes dentro de la imagen. Recuerde obtener al menos una por cada categoría de uso y cobertura presente dentro de la misma.

**Actividad 1.5.** Utilizando la herramienta de tabla de datos de la imagen modifique la tabla de datos para incluir la categoría de la cobertura, la subcategoría y una pequeña descripción.

### 1.2. Exploración en R

Para trabajar en R deberemos primero cargar las librerías necesarias con el comando

```
1 library(raster)
```

además, deberemos situar nuestra carpeta de trabajo donde se encuentran las carpetas que descargamos. Para esto nos movemos en el explorar de archivos hasta la misma y hacemos click en usar la carpeta como carpeta de trabajo.

Una vez en dicha carpeta, existen varias maneras de abrir una imagen segun queramos hacerlo solo para una banda, varias bandas en archivos separados o un solo archivo multibanda.

Los comandos para esto son **raster**, para abrir una unica banda, **brick**, para abrir un archivo multibanda, y **stack** para abrir distinas bandas por separado. Veamos algunos ejemplo de esto:

**Ejemplo 1.1.** Abrimos la imagen completa del archivo de landsat 8 y consultamos sus propiedades.

```
1      l8 <- brick(filename)
2      l8
```

Una vez abierta la imagen en el R podemos empezar a trabajar con la misma utilizando distintos comandos.

Veamos primero como cambiar los nombres de las bandas por defecto, cambiar la imagen a numeros en reflectancia entre 0 y 1 y luego guardarla nuevamente. Para eso ejecutamos el siguiente codigo.

```
1      l8 <- brick(filename)
2      names(l8) <- c("blue", "gree", "red", "nir", "swirl", "swir2")
3      l8 <- l8/1e4
4      rasterOptions(addheader = "ENVI")
5      writeRaster(l8\_ref, "raster\_data/processed/")
```

Analicemos el codigo linea por linea. La primera de ellas abre la imagen como un raster de multiples bandas. La segunda, cambia los nombres de cada banda a los que figuran en la lista entre parentesis. Es importante resaltar que el numero de nombres debe ser el mismo que el de bandas. En tercer lugar convertimos el archivo de numeros enteros entre 0 y 10000 a numeros entre 0 y 1. En la cuarta linea incluimos el archivo header que nos permitira levantar nuestra imagen con qgis. Por ultimo, guardamos el archivo en el formato nativo de R.

**Actividad 1.6.** Abra el archivo vrt en qgis y vuelva a mirar la firma espectral para distintas coberturas. Entre que valores se encuentra ahora las mismas.

Hagamos un poco de analisis ahora sobre la imagen. Para comenzar podemos calcular los histogramas de todas las bandas con el comando

```
1      hist(l8)
```

y el scatter plot entre dos bandas como

```
1      plot(l8$red, l8$blue)
```

en caso de querer todos los scatterplots e histogramas en un solo grafico podemos hacerlo con el comando

```
1      pairs(l8)
```

Hasta ahora estamos analizando la imagen completa. Podemos sin embargo analizar solo sectores concretos de la imagen muestreandola en funcion de un shapefile. Para esto debemos primero abrir el shapefile de interes cargando primero la libreria

```
1 library(rgdal)
```

y luego leyendo el vector como

```
1 vector <- readOGR(dsn="vector\\_data/", layer="extract")
```

Podemos mostrar las propiedades del vector ejecutando el comando

```
1 vector
```

**Actividad 1.7.** Muestre las propiedades de la capa raster y el vector abiertos y verifique que los mismos se encuentren en el mismo sistema de coordenadas.

Podemos mostrar las imagenes dentro de R si así nos interesa. Para esto utilizaremos la libreria `ggplot` como se muestra a continuacion

```
1 ggRGB(l8, r="nir", g="red", b="blue", geom_raster=TRUE)
```

Por ultimo mostremos como extraer datos de un archivo raster y veamos un par de ejemplo concretos. La funcion que nos permite extraer datos de un raster segun un vector es `extract` que toma dos argumentos

```
1 raster(l8, vector)
```

Veamos algunos ejemplos que pueden ser utiles de aplicacion de todo lo anterior

**Ejemplo 1.2.** Graficar en un scatterplot de dos bandas mostrando la zona del espacio ocupada por una cobertura.

```
1 plot(l8$red, l8$nir)
2 points(as.data.frame(datos[1])$red, as.data.frame(datos[1])$nir,
3 col="green")
```

**Ejemplo 1.3.** Extraer los promedios y desvios standar de un raster y agregarlos a un vector.

```
1 promedio <- extract(l8, vector, fun=mean)
2 desvio <- extract(l8, vector, fun=sd)
3 colnames(promedio) <- paster("mean", colnames("promedio"), sep="_")
4 colnames(desvio) <- paster("sd", colnames("desvio"), sep="_")
5 vector@data <- cbind(vector@data, promedio, desvio)
6 writeOGR(vector, sdn="vector_data/processed/", datos, driver="ESRI
7 Shapefile")
```

**Ejemplo 1.4.** Graficar las firmas espectrales en funcion de la longitud de onda para cada geometria de un vector.

```
1 df <- t(promedio)
2 colnames(df) <- vector@data$descripcion
3 df$wl <- as.matrix(c(485,560,660,830,1650,2215))
4 df <- melt(df, id.vars="wl", variable.name="cobertura")
5 names(df) <- c("wl", "Cobertura", "Reflectancia")
6 dfd <- t(desvio)
7 colnames(dfd) <- vector@data$descripcion
8 dfd$wl <- as.matrix(c(485,560,660,830,1650,2215))
```

```

9         dfd <- melt("wl", "Cobertura", "Desvio")
10
11         df$desvio <- dfd$desvio
12
13         ggplot(df, aes(wl, Reflectancia))+
14             geom_line(aes(colour=Cobertura))+
15             geom_poinr(aes(colour=Cobertura))+
16             geom_errorbar(aes(ymin=Reflectancia-2*desvio,
17                               ymax=Reflectancia+2*desvio))

```

**Actividad 1.8.** Grafique la media y el desvio standar para las distintas coberturas que pudo identificar en el punto uno.

## 2. Rebotando por la atmosfera

En esta segunda actividad practica nos centraremos en la correccion radiometrica de imagenes satelitales. Son objetivos de la misma

- Poder abrir una imagen satelital desde el metadato.
- Convertir los valores de la imagen a reflectancia tope de la atmosfera.
- Corregir la imagen satelital utilizando los metodos de *dos* y *cost*
- Corregir la imagen satelital utilizando el *6S web*

### 2.1. Correccion de imagenes en R

Para abrir una imagen satelital desde el metadato utilizaremos las funciones disponibles en **RStoolbox**. Dicho paquete incluye diversas herramientas para trabajar con sensores remotos y ya lo utilizamos antes para graficar imagenes satelitales.

**Ejemplo 2.1.** Comencemos analizando un ejemplo sencillo, abriremos una imagen landsat 5 desde el metadato y la mostraremos en combinacion de bandas de falso color compuesto, ademas de analizar las propiedades basicas de la misma.

```

1         library(raster)
2         library(RStoolbox)
3         meta.1992 <- readMeta("raster_data/LT52300771992104CUB00/
4                               LT52300771992104CUB00_MTL.txt")
5         dn.1992 <- stackMeta(meta.1992)
6         dn.1992 <- dn.1992[[-6,]]
7         ggRGB(dn.1992,
8               r=4, g=3, b=2,
9               geom_raster = TRUE,
10              stretch = "lin")

```

Cargaremos de esta forma el metadato de la imagen landat 5 del año 1992, abriremos las bandas de la misma y la mostraremos en combinacion de falso color compuesto. Analicemos punto por punto que esta pasando.

1. Las lineas 1 y 2 del script leen las librerias que necesitamos para trabajar con la imagen.
2. La linea 3 crea la variable `meta.1992` con los metadatos correspondientes a la imagen de interes.
3. La linea 4 crea la variable `dn.1992` con las bandas estaqueadas para poder utilizarlas en R. Podemos inspeccionar el elemento poniendo su nombre en la consola.

4. La linea 5 elimina la banda termica de nuestra imagen.
5. Las lineas 6 a 9 nos permiten mostrar la imagen en combinacion falso color compuesto. De ella la linea 6 se refiere a la imagen a mostrar, la linea 7 a la combinacion de colores elegida y la 9 al tipo de realce aplicado.

De esta forma podemos tener el archivo cargado en DN con todos sus metadatos para convertirlo a reflectancia. Para pasar nuestra imagen a reflectancia a tope de la atmosfera tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo a mano utilizando las herramientas algebraicas de R o podemos hacerlo con la funcion especifica de **RStoolbox**.

Veamos ambas. A mano

```
1 calref.1992 <- meta.1992$calref
2 elev.1992 <- pi*meta.1992$SOLAR_PARAMETERS['elevation']/180
3 dn2ref.1992 <- meta.1992$CALREF
4 toa.1992 <- (dn.1992*dn2ref.1992$gain+dn2ref.1992$offset)/sin(elev.1992)
5 names(toa.1992) <- c("B1-toa","B2-toa","B3-toa","B4-toa","B5-toa","B7-toa")
```

de forma automaica

```
1 toa.1992b <- radCor(dn.1992, metaData = meta.1992, method = "apref")
```

podemos comparar los resultados de ambos metodos inspeccionando los objetos.

**Actividad 2.1.** Inspeccione la reflectancia a tope de la atmosfera para todas las bandas. Para esto realice los histogramas, graficos de dispersion, calcule la media, el desvio standar y cualquier otra medida estadistica que le guste.

La funcion **radCor** dispone distintos parametros para hacer distintos tipos de correcciones atmosfericas. Ya vimos *apref* que nos permitio calcular la reflectancia a tope de la atmosfera. Veamos como aplicar el metodo de substraccion de cuerpo obscuro.

```
1 haze.1992 <- estimateHaze(dn.1992,darkProp = 0.01, hazeBands = 1:4, plot=TRUE)
2 sdos.1992 <- radCor(dn.1992, metaData = meta.1992,
3   hazeValues = haze.1992,
4   hazeBands = c("B1-dn","B2-dn","B3-dn","B4-dn"),
5   method="sdos")
```

**Actividad 2.2.** Analice los valores de haze obtenidos por la funcion *estimate haze* y en caso de que sea necesario, corrijalos para la banda indicada.

**Actividad 2.3.** Utilice el metodo *costz* para corregir la imagen a reflectancia a tope de la superficie.

**Actividad 2.4.** Guarde los archivos raster generado por cada uno de los metodos de correccion. Abralos en qgis y comparelos visualmente.

## 2.2. 6S

Veamos ahora como operar con el 6S para obtener una estimacion de los parametros atmosfericos. Para esto utilizaremos la version web del 6S que se encuentra disponible en <http://6s.ltdri.org/pages/run6SV.html>.

Para utilizarla ingresaremos a la pagina y haremos click en el boton *Submit query*. Iremos luego configurando paso a paso nuestro modelo de la atmosfera haciendo siempre luego click en el boton *submit query* para pasar al paso siguiente.

Los parametros para nuestro modelo son

1. Geometrical conditions

- TM (Landsat)
  - Month: 4, Day:13, GTM decimal hour: 13.60, Longitude: -63.8606, Latitude: -24.9937.
2. Atmospheric Model
- Select Atmospheric Profile: Mid latitude summer
  - Select aerosol model: Continental Model
  - Visibility: 60
3. Target & sensor altitude
- Select target altitude: sea level
  - Select sensor altitude: satellite level
4. Spectral conditions
- Select spectral conditions: choose band
  - Select band: 1st band of tm (landat 5)
5. Ground reflectance
- Ground reflectance type: homogeneous surface
  - Directional effect: no directional effect
  - Specify surface reflectance: input constant value of ro
  - input constant value for ro: 0
6. Signal
- Atmospheric correction mode: no atmospheric correction

En *7.Results* podemos ver el resultado haciendo click en *Output file*

Una vez ejecutado el proceso puede usarse el siguiente codigo para corregir todas las bandas utilizando R.

```

1  a <- c(0.98,0.90,...)
2  b <- c(0.81,0.90,...)
3  g <- c(0.15,0.10,...)
4  r <- c(0.08,0.05,...)
5  sss.1992 <- (toa.1992/(a*b)-r/b)/(1+g*(toa.1992/(a*b)-r/b))

```

**Actividad 2.5.** Realice una extraccion de firmas espectrales para distintas coberturas de cada uno de los archivos raster obtenidos y grafiquelos en el mismo grafico. Comparela con la firma espectral obtenida a partir de la imagen corregida por el usgs.