

Material suplementario




Fig S1. Correlación entre la proporción de embriones estructuralmente enteros y la proporción de embriones estructuralmente enteros viables.




Fig S2. Plantas madre cosechadas en diferentes épocas climáticas en el páramo de Sumapaz. a) Plantas madre cosechadas, b) Plantas madre cosechadas de *Espeletia argentea*, c) plantas madre cosechadas de *Espeletia cabrerensis*, d) plantas madre cosechadas de *Espeletia* complejo grandiflora, e) plantas madre cosechadas de *Espeletia* complejo sin brácteas, f) plantas madre cosechadas de *Espeletia killipii*, g) plantas madre cosechadas de *Espeletia miradorensis*, h) plantas madre cosechadas de *Espeletia summapacis*, i) frecuencia de cosecha para cada especie evaluada. *E. argentea* (E. a), *E. cabrerensis* (E. c), *E. complejo grandiflora* (E. cg), *E. killipii* (E. k), *E. miradorensis* (E. m), *E. summapacis* (E. s), *E. complejo sin brácteas* (E. csb).




Fig S5. Plantas madre cosechadas en diferentes altitudes en el páramo de Sumapaz. a) Plantas madre cosechadas para las especies evaluadas, b) plantas madre cosechadas de *Espeletia argentea*, c) plantas madre cosechadas de *Espeletia cabrerensis*, d) plantas madre cosechadas de *Espeletia* complejo *grandiflora*, e) plantas madre cosechadas de *Espeletia* complejo sin brácteas, f) plantas madre cosechadas de *Espeletia killipii*, g) plantas madre cosechadas de *Espeletia miradorensis*, h) plantas madre cosechadas de *Espeletia summapacis*.