







Refiriendose a la longitud de las aletas podemos ver que hay un decaimiento en medio de las mismas y luego también como hay caídas en la longitud del pico y masa corporal




Podemos ver como en la mayoría de casos gentoo esta separado de las otras especies pero gracias al tamaño del pico tenemos separado a Adelie




Aqui Podemos ver como adeline es una de las que mas separadas esta en el largo de su pico, muentrsa que gentoo y chinstrap esta muy parecidas




Podemos ver que la mayor separación de los pingüinos se dan cuando comparamos su masa del cuerpo y el largo del pico esto es lo que mas nos podría ayudar a separar, mientras que en su mayoría chinstrap y adeline se traslapan en esta se puestran separados, además gentoo usualmente esta muy separado de las dos, este será el que mas ayude a predecir.




Como vemos antes los mejores predictores son el tamaño del pico junto a la masa del cuerpo




Aquí Podemos ver como en el tamaño del pico esta mas separado adelia



en el hacho del pico esta mas separado gentoo



Y aqui el largo de las aletas es mayormente de gentoo



Final mente la masa del cuerpo del gentoo es el que mas separado esta de todos

Para concluir gentu nos ayudara mas a predecir para la masa del cuerpo, el largo de las aletas y el ancho del pico mientras que Adelie se separa en el alrgo del pico.