## Tesis

Una tesis

Elio Campitelli

# Índice general

1	Intr	oducción	5
2	Métodos y Materiales		
	2.1	Conceptos básicos	7
	2.2	Fuentes de datos	8
	2.3	Descripción de SPEEDY	8
3	Climatología observada 9		
	3.1	Altura geopotencial	9
	3.2	Temperatura	9
	3.3	Viento zonal	15
	3.4	Viento meridional	15
	3.5	Gradiente meridional de vorticidad absoluta	20
	3.6	Ondas Quasiestacionarias	20
4	Onda 3		
	4.1	Características típicas	25
	4.2	Creación del índice	27
		4.2.1 Antecedentes	27
		4.2.2 Propio	27
	4.3	Composición de campos	29
	4.4	Descripción de la Fase	29
	4.5	Análisis dinámica de septiembre	29
	4.6	Fuentes de variabilidad interna $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	29
	4.7	Fuentes externas	29
5	Experimentos 3		
	5.1	Validación SPEEDY	31
	5.2	Comparación	31
	5.3	Cosas inesperadas	31
6	Conclusiones		33
7	7 Agradecimientos		35
8	8 Referencias		37

Resumen.

4 ÍNDICE GENERAL

## Introducción

- Antecedentes
  Además de lo que hay en lo de las becas + lo que fui encontrando, agregar sobre las climatologías disponibles y sus limitaciones.
- Objetivo General
- Objetivo particular

Esto es para probar una referencia bibliográfica: [?]

## Métodos y Materiales

### 2.1 Conceptos básicos

- Ondas cuasiestacionarias
- Fourier

#### Ejemplo:

#### Cosas para ver de Figura 2.1:

Descripción del "rol" de cada número de onda en generar el campo final. La onda 1 es la principal, marcando altas presiones al sur del pacífico y bajas al sur de África. La onda 3 modifica ese patrón simple haciendo que los máximos y mínimos no sean contínuos.

#### • Wavelets

#### Cosas para ver:

Cambio en el máximo. Localización en vez de un número para cada latitud.

80 100 120 140 160 180 200

Notar que en la amplitud

Figura 2.1: Ejemplo fourier

20

40 60

-140-120-100 -80 -60 -40 -20




Figura 2.2: Wavelets

### 2.2 Fuentes de datos

### 2.3 Descripción de SPEEDY

## Climatología observada

#### 3.1 Altura geopotencial

Campo medio:

Cosas para ver:

Estructura dominantemente zonal. Zona de jet, variación de intensidad estacional. Vórtice polar en invierno/primavera.

Anomalías

Cosas para ver:

Estructura de onda 1. Ciclo estacional de la amplitud. Baroclinicidad.

Propuesta: unir ambos mapas

Corte zonal en -60°

Complementa la figura anterior.

Desvío estándar por círculo de latitud:

Cosas para ver:

Latitud de mayor actividad de onda. Máximo en octubre en 300 hPa. Más adelante, se hace la misma figura pero con el desvío estándar asociado a cada número de onda.

### 3.2 Temperatura

Cosas para ver:

Gradiente muy pequeño en 200 hPa. Gradiente inverso en estratósfera. Núcleo cálido en  $\sim 50^{\circ}$  (que se va a ver mejor en la anomalía zonal). Temperaturas frías en altas y bajas latitudes pero relativamente cálidas en  $\sim 50^{\circ}$  en 100 hPa.

Corte zonal en - $60^{\circ}$ 

Cosas para ver:

Coincidencia entre la onda estacionaria 1 en gh y de t (en primavera).

Propuesta: combinar mapa de T y T\*




Figura 3.1: Altura geopotencial.




Figura 3.2: Anomalía zonal de altura geopotencial.




Figura 3.3: Altura geopotencial (contornos) y anomalías (sombreado).




Figura 3.4: Corte zonal de anomalía de geopotencial en -65°.




Figura 3.5: Desvío estándar por círculo de latitud.




Figura 3.6: Temperatura media.




Figura 3.7: Corte meridional de temperatura media.

#### 3.3 Viento zonal

Cosas para ver:

Extensión y localización vertical de los jets.

Campo medio:

Cosas para ver:

Jet polar en invierno y primavera en niveles altos (< 100 hPa). Jest subtropical en niveles "medios".

Anomalía zonal

Cosas para ver (ambos):

#### 3.4 Viento meridional

Campos medios.

Corte meridional (v medio zonal):

Cosas para ver:

Dipolo entre niveles bajos y altos que alterna entre invierno y verano (parte convergente en superficie y divergente en altura de la ITCZ que se mueve hacia el hemisferio de verano). En altas latitudes, en superficie hay máximos de viento del sur debido a los vientos catabáticos de la antártida.

Cosas para ver:

No mucha actividad salvo por la onda 1 en niveles altos (consistente con la onda 1 de geopotenical).

Anomalía zonal:




Figura 3.8: Anomalía zonal de temperatura.




Figura 3.9: Corte zonal de anomalía de temperatura en -65°.




Figura 3.10: Viento zonal medio.







Figura 3.11: Viento zonal.






Figura 3.12: Anomalía zonal de viento zonal.




Figura 3.13: Media zonal del viento meridional.

Es básicamente igual. No poner gráfico pero aclarar que es no hay casi diferencia ya que la media zonal es casi cero en casi todo el dominio.

#### 3.5 Gradiente meridional de vorticidad absoluta

#### Cosas para ver:

Máximos asociado con los flancos del jet. Zona "prohibida" en 200 y 300 hPa.

### 3.6 Ondas Quasiestacionarias

#### • Fourier

#### Cosas para ver:

Estructura. Zona donde onda 3 explica más que la onda 1 (zona marcada en negro)

#### Cosas para ver:

Onda 1 y 2 principalmente en estratósfera pero baja, salvo en verano. Onda 3 y 4 más de atmósfera media/alta. Región recuadrada: máximo de amplitud de QS 3 y donde su R2 es mayor que la de QS 1.

-1




Figura 3.14: Viento meridional medio.






Figura 3.15: Anomalía zonal de viento meridional.




Figura 3.16: Gradiente meridional de vorticidad absoluta.




Figura 3.17:  $\mathbb{R}^2$  de Fourier.




Figura 3.18: Ampllitud de Fourier.

### Onda 3

### 4.1 Características típicas

#### Cosas para ver:

Solo en 300 porque la estructura es barotrópica (no se gana mucho mirando varios niveles). Localización de los centros de altas y bajas. Corrimiento de fase verano/invierno. Aparente ciclo anual con mínimo en primavera, que luego se ve que no es tan así, parece mínimo porque la fase varía mucho y el promedio se desdibuja mucho.

Esto es el promedio de las ondas 3, pero es idéntico a la onda 3 del promedio.

#### Cosas para ver:

Estrucutra vertical barotrópica equivalente. Ciclo anual en la extensión vertical (se ve también en los cortes de amplitud). Aunque notar que en este corte la extensión en primavera parece la menor, pero de nuevo es por la variabilidad en la fase, ya que en el corte de amplitud se ve que la amplitud es mayor en altura incluso que en otoño.

No tengo idea de cómo interpretar esto...

#### • Wavelets




Figura 4.1: Media de reconstrucción de onda 3.




Figura 4.2: Corte




Figura 4.3: Desvío estándar de la reconstrucción de QS3.




Figura 4.4: Corte sd

### "Amplitud" de wavelets (sombreado) y R2 de Fourier (con




Figura 4.5: Amplitud de fourier y amplitud de wavelets (faaaaaltaaaaa)

Venajas y desventajas. Justificaicón de decisión.

#### 4.2 Creación del índice

#### 4.2.1 Antecedentes

Breve comentario sobre los índices usados en otros lados. Discutir ventajas y debilidades.

- Amplitud
- Fase (impacto en SA)

De todo eso, motiva decisión del índice.

#### 4.2.2 **Propio**

- Niveles elegidos
- Promedio vs. máximo
- Composiciones de campos y flujos.
- Decisión del índice.

Quiero hacer el íncide a partir de la actividad de la onda 3 tomando la región del máximo (latitud entre -65 y -40, y entre 700 y 100 hPa). Variables posibles: amplitud, r2. Parámetros posibles: máximo, media.

#### Cosas para ver:

Casos donde el máximo es mayor pero la media, menor. (1985-01-01 vs 1988-07-01 o ). 1987-11-01 vs 2008-01-01 muestra el caso: igual amplitud máxima pero en 2008 está más "concentrada". Casos donde la actividad está ligeramente fuera de la caja (2000-09-01).




Figura 4.6: Distribució de amplitud para 12 fechas. En rojo la amplitud máxima, en azul la amplitud media.




Figura 4.7: Anomalía zonal geopotencial en 300hPa para fechas seleccionadas.

#### Cosas para ver:

Analizar nivel de similitud entre los campos y similitud entre la estructura de la amplitud.

### 4.3 Composición de campos

#### 4.4 Descripción de la Fase

### 4.5 Análisis dinámica de septiembre

#### 4.6 Fuentes de variabilidad interna

(Discusión escrita más de papers), Pero nos concentramos en la fuente externa.

#### 4.7 Fuentes externas

Campos de correlación con SST y OLR, principalmente ¿Discusión de otros forzantes?

## Experimentos

### 5.1 Validación SPEEDY

- Comparación campos medios.
- Validación de las corridas experimentales (mostrar que es constante lo que tiene que ser consante)

### 5.2 Comparación

Comparación entre corridas y ncep.

### 5.3 Cosas inesperadas...

- ??
- protif!

## Conclusiones

# Agradecimientos

## Referencias