

# Resumen de Lógica

Uziel Ludueña

December 10, 2020

## Contents

<b>1</b>	<b>Relaciones binarias</b>	<b>4</b>
1.1	Propiedades notables de relaciones binarias . . . . .	4
1.2	Relaciones de equivalencia . . . . .	4
1.3	Correspondencia entre relaciones de equivalencia y particiones . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Ordenes parciales</b>	<b>6</b>
2.1	Diagramas de Hasse . . . . .	7
2.2	Elementos maximales, maximos, minimales y minimos . . . . .	7
2.3	Supremos . . . . .	7
2.4	Infimos . . . . .	8
2.5	Homomorfismos de posets . . . . .	8
2.6	Isomorfismo de posets . . . . .	8
2.7	Reticulados . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Version algebraica del concepto de reticulado</b>	<b>13</b>
3.1	Subreticulados . . . . .	15
3.2	Homomorfismo de reticulados . . . . .	15
3.3	Congruencia de reticulados . . . . .	17
<b>4</b>	<b>Reticulados acotados</b>	<b>19</b>
4.1	Subreticulados acotados . . . . .	19
4.2	Homomorfismo de reticulados acotados . . . . .	19
4.3	Congruencias de reticulados acotados . . . . .	20

<b>5</b>	<b>Reticulados complementados</b>	<b>21</b>
5.1	Subreticulados complementados . . . . .	21
5.2	Homomorfismo de reticulados complementados . . . . .	22
5.3	Congruencias de reticulados complementados . . . . .	23
<b>6</b>	<b>Algebras de Boole</b>	<b>24</b>
<b>7</b>	<b>Teoremas del filtro primo y de Rasiova Sikorski</b>	<b>26</b>
<b>8</b>	<b>Sintaxis de la logica de primer orden</b>	<b>29</b>
8.1	Ocurrencias . . . . .	29
8.2	Variables . . . . .	30
8.3	Tipos . . . . .	30
8.4	Terminos . . . . .	31
8.4.1	Unicidad de la lectura de terminos . . . . .	31
8.4.2	Subterminos . . . . .	32
8.5	Formulas . . . . .	34
8.5.1	Unicidad de la lectura de formulas . . . . .	35
8.5.2	Subformulas . . . . .	35
8.6	Variables libres . . . . .	36
<b>9</b>	<b>Semantica de la logica de primer orden</b>	<b>37</b>
9.1	Estructuras de tipo $\tau$ . . . . .	37
9.2	El valor de un termino de una estructura . . . . .	38
9.3	El valor de verdad de una formula en un estructura . . . . .	39
9.4	Equivalencia de formulas . . . . .	40
9.5	Homomorfismos . . . . .	41
<b>10</b>	<b>Notacion declaratoria para terminos</b>	<b>42</b>
<b>11</b>	<b>Notacion declaratoria para formulas</b>	<b>43</b>
<b>12</b>	<b>Teorias de primer orden</b>	<b>46</b>

<b>13 Definicion del concepto de prueba</b>	<b>47</b>
13.1 Reglas . . . . .	47
13.2 Axiomas logicos . . . . .	50
13.3 Justificaciones . . . . .	50
13.4 Concatenaciones balanceadas de justificaciones . . . . .	52
13.5 Pares adecuados . . . . .	53
13.6 Dependencia de constantes en pares adecuados . . . . .	54
13.7 Definicion de prueba . . . . .	54
<b>14 El concepto de teorema</b>	<b>56</b>
<b>15 Propiedades basicas de pruebas y teoremas</b>	<b>56</b>
15.1 Consistencia . . . . .	57
<b>16 El algebra de Lindenbaum</b>	<b>58</b>
<b>17 Teorema de la completitud</b>	<b>61</b>
<b>18 Interpretacion semantica del algebra de Lindembaum</b>	<b>63</b>
<b>19 La aritmetica de Peano</b>	<b>64</b>

# 1 Relaciones binarias

**Definición 1.** Una *relacion binaria* sera un conjunto cuyos elementos son pares ordenados. Una relacion binaria sobre un conjunto  $A$  sera una relacion binaria, la cual es subconjunto de  $A^2$ .

Notese que si  $R$  es una relacion binaria sobre  $A$  y  $A \subseteq B$ , entonces  $R$  es una relacion sobre  $B$ . Como es usual, cuando  $R$  sea una relacion binaria sobre un conjunto  $A$ , diremos  $aRb$  en lugar de  $(a, b) \in R$

## 1.1 Propiedades notables de relaciones binarias

Algunas propiedades que puede cumplir una relacion binaria  $R$  sobre un conjunto  $A$  son:

- Reflexividad:  $xRx$ , cualesquiera sea  $x \in A$
- Transitividad:  $xRy$  y  $yRz$  implica  $xRz$ , cualesquiera sean  $x, y, z \in A$
- Simetria:  $xRy$  implica  $yRx$ , cualesquiera sean  $x, y \in A$
- Antisimetria:  $xRy$  y  $yRx$  implica  $x = y$ , cualesquiera sean  $x, y \in A$

## 1.2 Relaciones de equivalencia

**Definición 2.** Sea  $A$  un conjunto cualquiera. Por una *relacion de equivalencia sobre  $A$*  entenderemos una relacion binaria sobre  $A$  la cual es reflexiva, transitiva y simetrica, con respecto a  $A$ .

**Definición 3.** Dada una funcion  $F: A \rightarrow B$ , definimos:

$$\ker F = \{(x, y) \in A^2 : F(x) = F(y)\}$$

**Definición 4.** Dada una relacion de equivalencia  $R$  sobre  $A$  y  $a \in A$ , definimos:

$$a/R = \{b \in A : aRb\}$$

El conjunto  $a/R$  sera llamado la *clase de equivalencia* de  $a$ , con respecto a  $R$ .

*Observacion 1.*  $a \in a/R$ , pues  $R$  es reflexiva, por lo tanto  $aRa$ .

*Observacion 2.*  $aRb \iff a/R = b/R$ , sencillo de demostrar con las propiedades

*Observacion 3.*  $a/R \cap b/R = \emptyset$  o  $a/R = b/R$ , sencillo de demostrar viendo que pasa si  $aRb$  y si no  $aRb$

**Definición 5.** Dada una relacion de equivalencia  $R$  sobre  $A$ , definimos:

$$A/R = \{a/R : a \in A\}$$

Diremos que  $A/R$  es el cociente de  $A$  por  $R$ . Notese que  $A/R$  es el conjunto de clases de equivalencia de cada elemento de  $A$ .

*Observacion 4.* Sea  $F: A \rightarrow B$ , entonces:

1.  $F$  es inyectiva  $\iff \ker F = \{(x, y) \in A^2 : x = y\}$
2. Si  $F$  es sobreyectiva, entonces hay una biyeccion entre  $A/\ker F$

**Definición 6.** Si  $R$  es una relacion de equivalencia sobre  $A$ , definimos la funcion  $\pi_R: A \rightarrow A/R$  por  $\pi_R(a) = a/R$ , para cada  $a \in A$ . Esta funcion es llamada la *proyeccion canonica* respecto de  $R$ .

*Observacion 5.* Sea  $R$  una relacion de equivalencia sobre  $A$ . Entonces  $\ker \pi_R = R$

### 1.3 Correspondencia entre relaciones de equivalencia y particiones

**Definición 7.** Dado un conjunto  $A$ , por una *particion de*  $A$  entenderemos a un conjunto  $\mathcal{P}$  tal que:

- Cada elemento de  $\mathcal{P}$  es un subconjunto no vacio de  $A$
- Si  $S_1, S_2 \in \mathcal{P}$  y  $S_1 \neq S_2$ , entonces  $S_1 \cap S_2 = \emptyset$
- $A = \bigcup_{S \in \mathcal{P}} S$

*Observacion 6.* Si  $\mathcal{P}$  es una particion de  $A$ , entonces para cada  $a \in A$  hay un unico  $S \in \mathcal{P}$  tal que  $a \in S$ .

**Definición 8.** Dada una particion  $\mathcal{P}$  de un conjunto  $A$ , podemos definir una relacion binaria asociada a  $\mathcal{P}$  de la siguiente manera:

$$R_{\mathcal{P}} = \{(a, b) \in A^2 : a, b \in S, \text{ para algun } S \in \mathcal{P}\}$$

**Teorema 1.** Sea  $A$  un conjunto cualquiera. Sean

$$Part = \{\text{particiones de } A\}$$

$$ReEq = \{\text{relaciones de equivalencia sobre } A\}$$

Entonces, las funciones:

$$f : Part \rightarrow ReEq$$

$$\mathcal{P} \rightarrow R_{\mathcal{P}}$$

$$g : ReEq \rightarrow Part$$

$$R \rightarrow A/R$$

son biyecciones una de la otra

*Proof.* Se acepta sin demostracion

□

## 2 Ordenes parciales

**Definición 9.** Una relacion binaria sobre  $R$  sobre un conjunto  $A$  sera llamada un *orden parcial* sobre  $A$ , si es reflexiva, transitiva y antisimetrica respecto de  $A$ .

Muchas veces denotaremos con  $\leq$  a una relacion binaria que sea un orden parcial.

Ademas, si hemos denotado  $\leq$  a cierto orden parcial sobre un conjunto  $A$ , entonces:

1. Denotaremos con  $<$  a la relacion binaria  $\{(a, b) \in A^2 : a \leq b \text{ y } a \neq b\}$ . Cuando se de que  $a < b$ , diremos que  $a$  es menor que  $b$ , o que  $b$  es mayor que  $a$ .

2. Denotaremos con  $\prec$  a la relacion binaria  $\{(a, b) \in A^2 : a < b \text{ y no existe } z \text{ tal que } a < z < b\}$ .

Cuando se de que  $a \prec b$ , diremos que  $a$  es cubierto por  $b$  o que  $b$  cubre a  $a$ .

**Definición 10.** Un *conjunto* parcialmente ordenado o poset, es un par  $(P, \leq)$ , donde  $P$  es un conjunto no vacio cualquiera y  $\leq$  es un orden parcial sobre  $P$ . Dado un poset  $(P, \leq)$ , el conjunto  $P$  sera llamado el *universo* de  $(P, \leq)$ .

## 2.1 Diagramas de Hasse

Dado un poset  $(P, \leq)$ . con  $P$  finito, podemos realizar un diagrama llamado *diagrama de Hasse*, siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Asociar en forma inyectiva a cada  $a \in P$  un punto  $p_a$  del plano
2. Trazar un segmento de recta uniendo los puntos  $p_a$  y  $p_b$ , cada vez que  $a \prec b$
3. Realizar lo antes dicho de tal forma que:
  - (a) Si  $a \prec b$ , entonces  $p_a$  esta por debajo de  $p_b$
  - (b) Si un punto  $p_a$  ocurre en un segmento del diagrama, entonces lo hace en alguno de sus extremos

La relacion de  $\leq$  puede ser reconstruida facilmente apartir del diagrama.  $a \leq b$  sucedera si y solo si  $p_a = p_b$  o hay una sucesion de caminos ascendentes de segmentos desde  $p_a$  hasta  $p_b$ .

## 2.2 Elementos maximales, maximos, minimales y minimos

**Definición 11.** Sea  $(P, \leq)$  un poset.

Diremos que  $a \in P$  es un elemento maximal de  $(P, \leq)$ , si no existe un  $b \in P$  tal que  $a < b$ .

Diremos que  $a \in P$  es un elemento maximo de  $(P, \leq)$  si  $b \leq a$ , para todo  $b \in P$ . En caso de existir, sera denotado como 1, y muchas veces diremos que  $(P, \leq)$  tiene un 1 para expresar que  $(P, \leq)$  tiene un maximo

Diremos que  $a \in P$  es un elemento minimal de  $(P, \leq)$ , si no existe un  $b \in P$  tal que  $b < a$ .

Diremos que  $a \in P$  es un elemento minimo de  $(P, \leq)$  si  $a \leq b$  para todo  $b \in P$ . En caso de existir, sera denotado como 0, y muchas veces diremos que  $(P, \leq)$  tiene un 0 para expresar que  $(P, \leq)$  tiene un minimo

*Observacion 7.* Un poset  $(P, \leq)$  tiene a lo sumo 1 maximo (resp. minimo)

*Observacion 8.* Todo elemento maximo (resp. minimo) de  $(P, \leq)$  es un elemento maximal (resp. minimal) de  $(P, \leq)$

## 2.3 Supremos

Sea  $(P, \leq)$  un poset. Dado  $S \subseteq P$ , diremos que un elemento  $a \in P$  es *cota superior* de  $S$  en  $(P, \leq)$  cuando  $b \leq a$ , para todo  $b \in S$ . Notese que todo elemento de  $P$  es cota superior de  $\emptyset$  en  $(P, \leq)$ . Un

elemento  $a \in P$  sera llamado *supremo* de  $S$  en  $(P, \leq)$ , cuando se den las siguientes propiedades:

1.  $a$  es cota superior de  $S$  en  $(P, \leq)$
2. Para cada  $b \in P$ , si  $b$  es cota superior de  $S$  en  $(P, \leq)$ , entonces  $a \leq b$

## 2.4 Infimos

Sea  $(P, \leq)$  un poset. Dado  $S \subseteq P$ , diremos que un elemento  $a \in P$  es *cota inferior* de  $S$  en  $(P, \leq)$  cuando  $a \leq b$ , para todo  $b \in S$ . Notese que todo elemento de  $P$  es cota inferior de  $\emptyset$  en  $(P, \leq)$ . Un elemento  $a \in P$  sera llamado *infimo* de  $S$  en  $(P, \leq)$ , cuando se den las siguientes propiedades:

1.  $a$  es cota inferior de  $S$  en  $(P, \leq)$
2. Para cada  $b \in P$ , si  $b$  es cota inferior de  $S$  en  $(P, \leq)$ , entonces  $b \leq a$

*Observacion 9.* Si  $a$  es supremo (resp. infimo) de  $S$  en  $(P, \leq)$  y  $a'$  es supremo (resp. infimo) de  $S$  en  $(P, \leq)$ , entonces  $a = a'$

*Observacion 10.*  $a$  es supremo (resp. infimo) de  $P$  en  $(P, \leq) \iff a$  es maximo (resp. minimo) de  $(P, \leq)$

## 2.5 Homomorfismos de posets

**Definición 12.** Sea  $(P, \leq)$  y  $(P', \leq')$  posets. Una funcion  $F: P \rightarrow P'$  sera llamada un *homomorfismo de*  $(P, \leq)$  en  $(P', \leq')$  si para todo  $x, y \in P$  se cumple que  $x \leq y$  implica  $F(x) \leq' F(y)$ . Escribiremos  $F: (P, \leq) \rightarrow (P', \leq')$  para expresar que  $F$  es un homomorfismo de  $(P, \leq)$  en  $(P', \leq')$

## 2.6 Isomorfismo de posets

**Definición 13.** Sea  $(P, \leq)$  y  $(P', \leq')$  posets. Una funcion  $F: P \rightarrow P'$  sera llamada un *isomorfismo de*  $(P, \leq)$  en  $(P', \leq')$  si  $F$  es biyectiva,  $F$  es un homomorfismo de  $(P, \leq)$  en  $(P', \leq')$  y  $F^{-1}$  es un homomorfismo de  $(P', \leq')$  en  $(P, \leq)$ . Escribiremos  $(P, \leq) \cong (P', \leq')$  cuando exista un isomorfismo de  $(P, \leq)$  en  $(P', \leq')$  y en tal caso diremos que  $(P, \leq)$  y  $(P', \leq')$  son isomorfos.

**Definición 14.** Dada una funcion  $F: A \rightarrow B$  y  $S \subseteq A$ , denotaremos con  $F(S)$  al conjunto  $\{F(a) : a \in S\}$

**Lema 2.** Sean  $(P, \leq)$  y  $(P', \leq')$  posets. Supongamos  $F$  es un isomorfismo de  $(P, \leq)$  y  $(P', \leq')$



1. Para cada  $S \subseteq P$  y cada  $a \in P$ , se tiene que  $a$  es cota superior (resp. cota inferior) de  $S \iff F(a)$  es cota superior (resp. inferior) de  $F(S)$
2. Para cada  $S \subseteq P$  y cada  $a \in P$ , se tiene que existe  $\sup(S) \iff$  existe  $\sup(F(S))$ , y en el caso de que existan tales elementos, se tiene que  $F(\sup(S)) = \sup(F(S))$
3. Para cada  $S \subseteq P$  y cada  $a \in P$ , se tiene que existe  $\inf(S) \iff$  existe  $\inf(F(S))$ , y en el caso de que existan tales elementos, se tiene que  $F(\inf(S)) = \inf(F(S))$
4. Para cada  $a \in P$ ,  $a$  es maximo (resp. minimo)  $\iff F(a)$  es maximo (resp. minimo)
5. Para cada  $a \in P$ ,  $a$  es maximal (resp. minimal)  $\iff F(a)$  es maximal (resp. minimal)
6. Para  $a, b \in P$ , tenemos  $a \prec b \iff F(a) \prec' F(b)$

*Proof.* (a) Supongamos  $a$  es cota superior de  $S$ . Sea  $s \in S$ . Como  $s \leq a$ , tenemos que  $F(s) \leq' F(a)$ . Supongamos ahora que  $F(a)$  es cota superior de  $F(S)$ . Sea  $s \in S$ . Como  $F(s) \leq' F(a)$ , tenemos que  $s = F^{-1}(F(s)) \leq F^{-1}(F(a)) = a$ .

(b) Supongamos que existe  $\sup(S)$ . Entonces por (a)  $F(\sup(S))$  es cota superior de  $F(S)$ . Supongamos  $b$  es cota superior de  $F(S)$ , entonces  $F^{-1}(b)$  es cota superior de  $S$ . Por lo tanto,  $\sup(S) \leq F^{-1}(b)$  y entonces  $F(\sup(S)) \leq' b$ . La *vuelta* es analoga.

(c) La prueba es analoga a (b)

(d) Supongamos  $a \in P$  es maximo. Pero entonces  $a = \sup(P)$ , y entonces  $F(a) = \sup(F(P)) = \sup(P')$ . La *vuelta* es analoga.

(e) Supongamos  $b \in P$  tal que no existe  $a \in P$  tal que  $b \leq a \Rightarrow a = b$ . Sea  $c \in P$  tal que  $F(b) \leq' F(c)$ , entonces  $b \leq c$ , y entonces  $b = c$ ,  $F(b) = F(c)$ . Luego  $F(b)$  es maximal. La *vuelta* es analoga.

(f) Sean  $a, b \in P$  tal que  $a \prec b$ . Luego tenemos que  $F(a) \leq' F(b)$ . Supongamos existe  $z \in P$  tal que  $F(a) \leq' F(z) \leq' F(b)$ , entonces tendríamos  $a \leq z \leq b$ . Como  $a \prec b$ , se sigue que  $z = a$  o  $z = b$ . Luego  $F(a) \prec' F(b)$ . La *vuelta* es analoga.  $\square$

## 2.7 Reticulados

**Definición 15.** Diremos que un poset  $(P, \leq)$  es un *reticulado* si para todo  $a, b \in P$ , existen  $\sup(\{a, b\})$  e  $\inf(\{a, b\})$

**Definición 16.** Dado un reticulado  $(P, \leq)$ , definimos 2 operacion binarias:

$$s : P^2 \rightarrow P$$

$$(a, b) \rightarrow \sup(\{a, b\})$$

$$i : P^2 \rightarrow p$$

$$(a, b) \rightarrow \inf(\{a, b\})$$

Escribiremos  $a \mathbf{s} b$  en lugar de  $s(a, b)$  y  $a \mathbf{i} b$  en lugar de  $i(a, b)$

**Lema 3.** Dado un reticulado  $(L, \leq)$  y elementos  $x, y \in L$ , se cumplen:

1.  $x \leq x \mathbf{s} y$
2.  $x \mathbf{i} y \leq x$
3.  $x \mathbf{s} x = x \mathbf{i} x = x$
4.  $x \mathbf{s} y = y \mathbf{s} x$
5.  $x \mathbf{i} y = y \mathbf{i} x$

*Proof.* (1) Claramente  $(x \mathbf{s} y)$  es cota superior de  $x$ . Por lo tanto  $x \leq x \mathbf{s} y$

(2) Claramente  $(x \mathbf{i} y)$  es cota inferior de  $x$ . Por lo tanto  $x \mathbf{i} y \leq x$

(3) Supongamos  $(x \mathbf{s} x) = z \neq x$ . Tenemos que  $z$  es cota superior de  $x$  por lo tanto  $x \leq z$ . Pero tambien  $x$  es cota superior de  $x$  y por lo tanto  $z$  no puede ser la minima cota superior. El caso del infimo es analogo.

$$(4) (x \mathbf{s} y) = \sup(\{x, y\}) = \sup(\{y, x\}) = (y \mathbf{s} x)$$

$$(5) (x \mathbf{i} y) = \inf(\{x, y\}) = \inf(\{y, x\}) = (y \mathbf{i} x)$$

□

**Lema 4.** Dado un reticulado  $(L, \leq)$  y elementos  $x, y \in L$ , son equivalentes:

1.  $x \leq y$
2.  $x \mathbf{s} y = y$
3.  $x \mathbf{i} y = x$

*Proof.* (1)  $\Rightarrow$  (2) Claramente  $y$  es cota superior de  $\{x, y\}$  por (1). Y trivialmente es la minima ya que es igual a uno de sus elementos.

(2)  $\Rightarrow$  (3) Claramente  $y$  es cota superior de  $\{x, y\}$ , por lo tanto  $x \leq y$ . Luego se tiene que  $x$  es cota inferior de  $\{x, y\}$ . Trivialmente es la maxima.

(3)  $\Rightarrow$  (1) Claramente  $x$  es cota inferior de  $\{x, y\}$ , por lo tanto  $x \leq y$ .  $\square$

**Lema 5** (Leyes de absorcion). *Dado un reticulado  $(L, \leq)$  y elementos  $x, y \in L$ , se tiene que:*

$$1. x \text{ s } (x \text{ i } y) = x$$

$$2. x \text{ i } (x \text{ s } y) = x$$

*Proof.* (1) Claramente  $(x \text{ i } y) \leq x$ , y por lo tanto  $(x \text{ i } y) \text{ s } x = x$

(2) Claramente  $x \leq (x \text{ s } y)$ , y por lo tanto  $x \text{ i } (x \text{ s } y) = x$   $\square$

**Lema 6.** *Dado un reticulado  $(L, \leq)$  y elementos  $x, y, z \in L$ , se tiene que:*

$$1. (x \text{ s } y) \text{ s } z = x \text{ s } (y \text{ s } z)$$

$$2. (x \text{ i } y) \text{ i } z = x \text{ i } (y \text{ i } z)$$

*Proof.* (1) Notese que  $x \text{ s } (y \text{ s } z)$  es cota superior de  $\{x, y, z\}$  ya que:

$$x \leq x \text{ s } (y \text{ s } z)$$

$$y \leq (y \text{ s } z) \leq x \text{ s } (y \text{ s } z)$$

$$z \leq (y \text{ s } z) \leq x \text{ s } (y \text{ s } z)$$

En particular, tenemos que  $x \text{ s } (y \text{ s } z)$  es cota superior de  $\{x, y\}$ , y entonces tenemos que  $x \text{ s } y \leq x \text{ s } (y \text{ s } z)$ . Es decir,  $x \text{ s } (y \text{ s } z)$  es cota superior de  $\{x \text{ s } y, z\}$ , y por lo tanto  $(x \text{ s } y) \text{ s } z \leq x \text{ s } (y \text{ s } z)$ .

Notese ahora que  $(x \text{ s } y) \text{ s } z$  es cota superior de  $\{x, y, z\}$ , ya que:

$$x \leq (x \text{ s } y) \leq (x \text{ s } y) \text{ s } z$$

$$y \leq (x \text{ s } y) \leq (x \text{ s } y) \text{ s } z$$

$$z \leq (x \text{ s } y) \text{ s } z$$

En particular, tenemos que  $(x \text{ s } y) \text{ s } z$  es cota superior de  $\{y, z\}$ , y por lo tanto  $y \text{ s } z \leq (x \text{ s } y) \text{ s } z$ .

Es decir,  $(x \text{ s } y) \text{ s } z$  es cota superior de  $\{x, y \text{ s } z\}$ , y por lo tanto  $x \text{ s } (y \text{ s } z) \leq (x \text{ s } y) \text{ s } z$ .

Luego tenemos que  $(x \text{ s } y) \text{ s } z = x \text{ s } (y \text{ s } z)$

(2) Es analoga, si alguien la quiere hacer □

**Lema 7.** *Dado un reticulado  $(L, \leq)$  y elementos  $x, y, z, w \in L$ , se tiene que si  $x \leq z$  y  $y \leq w$ , entonces*

$$1. x \text{ s } y \leq z \text{ s } w$$

$$2. x \text{ i } y \leq z \text{ i } w$$

*Proof.* (1) Notese que

$$x \leq z \leq z \text{ s } w$$

$$y \leq w \leq z \text{ s } w$$

Luego  $z \text{ s } w$  es cota superior de  $\{x, y\}$  y por lo tanto  $x \text{ s } y \leq z \text{ s } w$

(2) Notese que

$$z \geq x \geq x \text{ i } y$$

$$w \geq y \geq x \text{ i } y$$

Luego  $x \text{ i } y$  es cota inferior de  $\{z, w\}$  y por lo tanto  $x \text{ i } y \leq z \text{ i } w$  □

**Lema 8.** *Dado un reticulado  $(L, \leq)$  y elementos  $x, y, z \in L$ , se tiene que*

$$(x \text{ i } y) \text{ s } (x \text{ i } z) \leq x \text{ i } (y \text{ s } z)$$

*Proof.* Notese que

$$(x \text{ i } y), (x \text{ i } z) \leq x$$

$$(x \text{ i } y), (x \text{ i } z) \leq y \text{ s } z$$

Tenemos entonces que  $(x \text{ i } y), (x \text{ i } z) \leq x \text{ i } (y \text{ s } z)$  y por lo tanto  $(x \text{ i } y) \text{ s } (x \text{ i } z) \leq x \text{ i } (y \text{ s } z)$  □

**Lema 9.** Sea  $(L, \leq)$  un reticulado. Dados elementos  $x_1, \dots, x_n \in L$ , con  $n \geq 2$ , se tiene que:

$$(\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n = \sup(\{x_1, \dots, x_n\})$$

$$(\dots (x_1 \text{ i } x_2) \text{ i } \dots) \text{ i } x_n = \inf(\{x_1, \dots, x_n\})$$

*Proof.* Lo haremos por induccion en  $n$ . Claramente el resultado vale para  $n = 2$ . Supongamos que vale para  $n$  y veamos entonces que vale para  $n + 1$ . Sean  $x_1, \dots, x_{n+1} \in L$ . Por hipotesis tenemos que

$$(\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n = \sup(\{x_1, \dots, x_n\})$$

Es claro que  $(\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_{n+1}$  es cota superior de  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ . Sea  $z$  otra cota superior de  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ , entonces tenemos que:

$$(\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_n \leq z$$

Pero ademas  $x_{n+1} \leq z$  y por lo tanto:

$$(\dots (x_1 \text{ s } x_2) \text{ s } \dots) \text{ s } x_{n+1} \leq z$$

La demostracion para el infimo es analoga.

□

### 3 Version algebraica del concepto de reticulado

**Definición 17.** Una terna  $(L, \text{s}, \text{i})$ , donde  $L$  es un conjunto y  $\text{s}, \text{i}$  son dos operaciones binarias sobre  $L$  sera llamada *reticulado* cuando cumpla:

$$(I1) \quad x \text{ s } x = x \text{ i } x = x, \text{ cualesquiera sea } x \in L$$

$$(I2) \quad x \text{ s } y = y \text{ s } x, \text{ cualesquiera sean } x, y \in L$$

$$(I3) \quad x \text{ i } y = y \text{ i } x, \text{ cualesquiera sean } x, y \in L$$

$$(I4) \quad (x \text{ s } y) \text{ s } z = x \text{ s } (y \text{ s } z), \text{ cualesquiera sean } x, y, z \in L$$

$$(I5) \quad (x \text{ i } y) \text{ i } z = x \text{ i } (y \text{ i } z), \text{ cualesquiera sean } x, y, z \in L$$

(I6)  $x \mathbf{s} (x \mathbf{i} y) = x$ , cualesquiera sean  $x, y \in L$

(I7)  $x \mathbf{i} (x \mathbf{s} y) = x$ , cualesquiera sean  $x, y \in L$

En tal caso que  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  sea un reticulado, diremos que  $L$  es el *universo* del reticulado.

**Teorema 10.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado. La relacion binaria definida por:

$$x \leq y \iff x \mathbf{s} y = y$$

es un orden parcial sobre  $L$  para el cual se cumple que:

$$\sup(\{x, y\}) = x \mathbf{s} y$$

$$\inf(\{x, y\}) = x \mathbf{i} y$$

cualquiera sean  $x, y \in L$

*Proof.*  $\leq$  es reflexiva en  $L$ , pues  $x \leq x \iff x \mathbf{s} x = x$

$\leq$  es antisimetrico en  $L$ , pues si  $x \leq y$  tenemos que  $x \mathbf{s} y = y$ , y por otro lado, tenemos que  $y \leq x$  y entonces  $x \mathbf{s} y = x$ . Luego  $x = y$

$\leq$  es transitivo, pues si suponemos que  $x \leq y$  y  $y \leq z$  entonces  $x \mathbf{s} z = x \mathbf{s} (y \mathbf{s} z) = (x \mathbf{s} y) \mathbf{s} z = y \mathbf{s} z = z$ . Luego  $x \leq z$

Tenemos entonces que  $\leq$  es un orden parcial sobre  $L$ .

Veamos ahora que  $\sup(\{x, y\}) = x \mathbf{s} y$ . Es claro que  $x \mathbf{s} y$  es cota superior de  $\{x, y\}$ . Supongamos que  $x, y \leq z$ , entonces:

$$(x \mathbf{s} y) \mathbf{s} z = x \mathbf{s} (y \mathbf{s} z) = x \mathbf{s} z = z$$

Luego  $x \mathbf{s} y \leq z$  y por lo tanto  $x \mathbf{s} y$  es la menor cota superior.

Para probar que  $\inf(\{x, y\}) = x \mathbf{i} y$ , primero probaremos que para todo  $u, v \in L$ ,

$$u \leq v \iff u \mathbf{i} v = u$$

Supongamos  $u \mathbf{s} v = v$ , entonces  $u \mathbf{i} v = u \mathbf{i} (u \mathbf{s} v) = u$

Ahora si veamos que  $\inf(\{x, y\}) = x \mathbf{i} y$ . Es claro que  $x \mathbf{i} y$  es cota inferior de  $\{x, y\}$ . Supong-

amos que  $z \leq x, y$ , entonces:

$$(x \mathbf{i} y) \mathbf{i} z = x \mathbf{i} (y \mathbf{i} z) = x \mathbf{i} z = z$$

Luego  $z \leq x \mathbf{i} y$  y por lo tanto  $x \mathbf{i} y$  es la mayor cota inferior.  $\square$

### 3.1 Subreticulados

**Definición 18.** Dados reticulados  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  diremos que  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  es un *subreticulado* de  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  si se dan las siguientes condiciones:

1.  $L \subseteq L'$
2.  $\mathbf{s} = \mathbf{s}'|_{L \times L}$
3.  $\mathbf{i} = \mathbf{i}'|_{L \times L}$

**Definición 19.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado. Un conjunto  $S \subseteq L$  es llamado *subuniverso* de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  si es no vacío y cerrado bajo las operaciones  $\mathbf{s}$  y  $\mathbf{i}$

*Observación 11.* Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado.  $S$  es subuniverso de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}) \iff (S, \mathbf{s}|_{S \times S}, \mathbf{i}|_{S \times S})$  es un subreticulado de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$

### 3.2 Homomorfismo de reticulados

**Definición 20.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  reticulados. Una función  $F: L \rightarrow L'$  será llamada un *homomorfismo* de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  si para todo  $x, y \in L$  se cumple que:

$$F(x \mathbf{s} y) = F(x) \mathbf{s}' F(y)$$

$$F(x \mathbf{i} y) = F(x) \mathbf{i}' F(y)$$

Un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  será llamada *isomorfismo* de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  cuando sea biyectivo, y su inversa sea también un homomorfismo.

Escribiremos  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  cuando  $F$  sea un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$

Escribiremos  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}) \cong (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  cuando exista un isomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$

**Lema 11.** Si  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  es un homomorfismo biyectivo, entonces  $F$  es un isomorfismo

*Proof.* Debemos probar que  $F^{-1}$  es tambien un homomorfismo, es decir que para todo  $x, y \in L'$ :

$$F^{-1}(x \mathbf{s}' y) = F^{-1}(x) \mathbf{s} F^{-1}(y)$$

$$F^{-1}(x \mathbf{i}' y) = F^{-1}(x) \mathbf{i} F^{-1}(y)$$

Sean  $z, w \in L$  los unicos elementos de  $L$  tal que cumplen que  $F(z) = x$  y  $F(w) = y$ . Estos elementos existen y son unicos pues  $F$  es biyectiva. Entonces, tenemos que:

$$F^{-1}(F(z) \mathbf{s}' F(w)) = F^{-1}(F(z)) \mathbf{s} F^{-1}(F(w))$$

$$F^{-1}(F(z) \mathbf{i}' F(w)) = F^{-1}(F(z)) \mathbf{i} F^{-1}(F(w))$$

Y por propiedades de homomorfismo y de funciones con inversa tenemos que:

$$F^{-1}(F(z \mathbf{s} w)) = z \mathbf{s} w$$

$$F^{-1}(F(z \mathbf{i} w)) = z \mathbf{i} w$$

□

**Lema 12.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  reticulados y sea  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  un homomorfismo. Entonces  $I_F$  es un subuniverso de  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$ . Es decir que  $F$  es tambien un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(I_F, \mathbf{s}'|_{I_F \times I_F}, \mathbf{i}'|_{I_F \times I_F})$

*Proof.* Ya que  $L$  no es vacio tenemos que  $I_F$  tambien es no vacio. Sean  $a, b \in I_F$ . Sean  $x, y \in L$  tales que  $F(x) = a$  y  $F(y) = b$ . Se tiene que:

$$a \mathbf{s}' b = F(x) \mathbf{s}' F(y) = F(x \mathbf{s} y) \in I_F$$

$$a \mathbf{i}' b = F(x) \mathbf{i}' F(y) = F(x \mathbf{i} y) \in I_F$$

Por lo tanto  $I_F$  es cerrado bajo  $\mathbf{s}'$  y  $\mathbf{i}'$

□

**Lema 13.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$  reticulados y sean  $(L, \leq)$  y  $(L', \leq')$  los posets asociados. Sea



$F: L \rightarrow L'$  una funcion. Entonces  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$   $\iff F$  es un isomorfismo de  $(L, \leq)$  en  $(L', \leq')$

*Proof.*

$\Rightarrow$

Supongamos  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}')$ . Sean  $x, y \in L$  tales que  $x \leq y$ . Tenemos que  $y = x \mathbf{s} y$ , por lo cual  $F(y) = F(x \mathbf{s} y) = F(x) \mathbf{s}' F(y)$ , produciendo  $F(x) \leq' F(y)$ .

Ahora sean  $x, y \in L'$  tales que  $x \leq' y$ . Tenemos que  $y = x \mathbf{s}' y$ , por lo cual  $F^{-1}(y) = F^{-1}(x \mathbf{s}' y) = F^{-1}(x) \mathbf{s} F^{-1}(y)$  produciendo  $F^{-1}(x) \leq F^{-1}(y)$ .

$\Leftarrow$

Supongamos  $F$  es un isomorfismo de  $(L, \leq)$  en  $(L', \leq')$ . Sean  $x, y \in L$  tales que  $y = x \mathbf{s} y$ . Tenemos entonces que  $x \leq y$  y por lo tanto  $F(x) \leq' F(y)$ , produciendo  $F(y) = F(x \mathbf{s} y) = F(x) \mathbf{s}' F(y)$

Ahora sean  $x, y \in L'$  tales que  $y = x \mathbf{s}' y$ . Tenemos entonces que  $x \leq' y$  y por lo tanto  $F^{-1}(x) \leq F^{-1}(y)$ , produciendo  $F^{-1}(y) = F^{-1}(x \mathbf{s}' y) = F^{-1}(x) \mathbf{s} F^{-1}(y)$

□

### 3.3 Congruencia de reticulados

**Definición 21.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado. Una *congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$*  sera una relacion de equivalencia  $\theta$  la cual cumpla:

$$x\theta x' \text{ y } y\theta y' \Rightarrow (x \mathbf{s} y)\theta(x' \mathbf{s} y') \text{ y } (x \mathbf{i} y)\theta(x' \mathbf{i} y')$$

Gracias a tal propiedad podemos definir sobre  $L/\theta$  dos operaciones binarias  $\tilde{\mathbf{s}}$  y  $\tilde{\mathbf{i}}$

$$x/\theta \tilde{\mathbf{s}} y/\theta = (x \mathbf{s} y)/\theta$$

$$x/\theta \tilde{\mathbf{i}} y/\theta = (x \mathbf{i} y)/\theta$$

**Definición 22.** La terna  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}})$  es llamada *cociente de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  sobre  $\theta$* , y la denotaremos con  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})/\theta$

**Lema 14.**  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}})$  es un reticulado. El orden parcial  $\tilde{\leq}$  asociado a este reticulado cumple:

$$x/\theta \tilde{\leq} y/\theta \iff y\theta(x \mathbf{s} y)$$

*Proof.* Veamos que la estructura  $(L/\theta, \tilde{s}, \tilde{i})$  cumple las propiedades para ser reticulado una a una. Sea  $x/\theta, y/\theta, z/\theta$  elementos cualesquiera de  $L/\theta$ .

$$(I1) \quad x/\theta \tilde{s} x/\theta = x/\theta \tilde{i} x/\theta = x/\theta, \text{ pues } x \text{ s } x = x \text{ i } x = x$$

$$(I2) \quad x/\theta \tilde{s} y/\theta = y/\theta \tilde{s} x/\theta, \text{ pues } x \text{ s } y = y \text{ s } x$$

$$(I3) \quad x/\theta \tilde{i} y/\theta = y/\theta \tilde{i} x/\theta, \text{ pues } x \text{ i } y = y \text{ i } x$$

...

Ahora veamos que el orden parcial  $\tilde{\leq}$  dado se cumple en este reticulado. Por definicion,

$$x/\theta \tilde{\leq} y/\theta \iff y/\theta = x/\theta \tilde{s} y/\theta, \text{ por lo cual } x/\theta \tilde{\leq} y/\theta \iff y/\theta = (x \text{ s } y)/\theta \text{ y por lo tanto } y/\theta (x \text{ s } y) \quad \square$$

**Lema 15.** Si  $F: (L, s, i) \rightarrow (L', s', i')$  es un homomorfismo, entonces  $\ker F$  es una congruencia sobre  $(L, s, i)$

*Proof.* Ya sabemos que  $\ker F$  es una relacion de equivalencia, veamos que en este caso cumple la propiedad para ser congruencia.

Sean  $x, x', y, y' \in L$  tal que  $x\theta x'$  y  $y\theta y'$ . Luego, tenemos que  $F(x) = F(x')$  y  $F(y) = F(y')$ . Entonces claramente  $F(x \text{ s } y) = F(x) \text{ s' } F(y) = F(x') \text{ s' } F(y') = F(x' \text{ s } y')$ , y por lo tanto  $(x \text{ s } y)\theta(x' \text{ s } y')$

Claramente tambien  $F(x \text{ i } y) = F(x) \text{ i' } F(y) = F(x') \text{ i' } F(y') = F(x' \text{ i } y')$ , y por lo tanto  $(x \text{ i } y)\theta(x' \text{ i } y')$   $\square$

**Lema 16.** Sea  $(L, s, i)$  un reticulado y sea  $\theta$  una congruencia sobre  $(L, s, i)$ . Entonces  $\pi_\theta$  es un homomorfismo de  $(L, s, i)$  en  $(L/\theta, \tilde{s}, \tilde{i})$ . Ademias  $\ker \pi_\theta = \theta$ .

*Proof.* Sean  $x, y \in L$ . Tenemos que

$$\pi_\theta(x \text{ s } y) = (x \text{ s } y)/\theta = x/\theta \tilde{s} y/\theta = \pi_\theta(x) \tilde{s} \pi_\theta(y)$$

$$\pi_\theta(x \text{ i } y) = (x \text{ i } y)/\theta = x/\theta \tilde{i} y/\theta = \pi_\theta(x) \tilde{i} \pi_\theta(y)$$

Por lo tanto  $\pi_\theta$  conserva la operacion supremo e infimo.  $\square$

## 4 Reti culados acotados

**Definición 23.** Por un *reticulado acotado* entenderemos una 5-upla  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$ , tal que  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  es un reticulado,  $0, 1 \in L$ , y adem as se cumplen las siguientes propiedades

1.  $0 \mathbf{s} x = x$ , para cada  $x \in L$
2.  $1 \mathbf{s} x = 1$ , para cada  $x \in L$

### 4.1 Subreticulados acotados

**Definición 24.** Dados reticulados acotados  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$  diremos que  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  es un *subreticulado acotado de*  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$  si se dan las siguientes condiciones:

1.  $L \subseteq L'$
2.  $0 = 0'$  y  $1 = 1'$
3.  $s = s'|_{L \times L}$
4.  $i = i'|_{L \times L}$

Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  un reticulado acotado. Un conjunto  $S \subseteq L$  es llamado un *subuniverso* de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  si  $0, 1 \in S$ , y  $S$  es cerrado bajo las operaciones  $s$  e  $i$ .

### 4.2 Homomorfismo de reticulados acotados

**Definición 25.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  y  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$  reticulados acotados. Una funci on  $F: L \rightarrow L'$  sera llamada un *homomorfismo de*  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$  si para todo  $x, y \in L$  se cumple que:

$$F(x \mathbf{s} y) = F(x) \mathbf{s}' F(y)$$

$$F(x \mathbf{i} y) = F(x) \mathbf{i}' F(y)$$

$$F(0) = 0'$$

$$F(1) = 1'$$

Un homomorfismo  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  en  $(L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', 0', 1')$  sera llamado *isomorfismo* cuando sea biyectivo y su inversa tambi en sea un homomorfismo.

Escribiremos  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1) \rightarrow (L', s', i', 0', 1')$  cuando  $F$  sea un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  en  $(L', s', i', 0', 1')$

Escribiremos  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1) \cong (L', s', i', 0', 1')$  cuando exista un isomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  en  $(L', s', i', 0', 1')$

**Lema 17.** Si  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1) \rightarrow (L', s', i', 0', 1')$  es un homomorfismo biyectivo, entonces  $F$  es un isomorfismo.

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

**Lema 18.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  y  $(L', s', i', 0', 1')$  reticulados y sea  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1) \rightarrow (L', s', i', 0', 1')$  un homomorfismo. Entonces  $I_F$  es un subuniverso de  $(L', s', i', 0', 1')$ . Es decir que  $F$  es tambien un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  en  $(I_F, s'|_{I_F \times I_F}, i'|_{I_F \times I_F}, 0', 1')$

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

### 4.3 Congruencias de reticulados acotados

**Definición 26.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  un reticulado acotado. Una *congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$*  sera una relacion de equivalencia  $\theta$  la cual sera una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$ . Tenemos definidas sobre  $L/\theta$  dos operaciones binarias  $\tilde{\mathbf{s}}$  y  $\tilde{\mathbf{i}}$

$$x/\theta \tilde{\mathbf{s}} y/\theta = (x \mathbf{s} y)/\theta$$

$$x/\theta \tilde{\mathbf{i}} y/\theta = (x \mathbf{i} y)/\theta$$

La 5-upla  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, 0/\theta, 1/\theta)$  es llamada *cociente de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  sobre  $\theta$*  y la denotaremos con  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)/\theta$

**Lema 19.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  un reticulado acotado y  $\theta$  una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$ .

1.  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, 0/\theta, 1/\theta)$  es un reticulado acotado
2.  $\pi_\theta$  es un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  en  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, 0/\theta, 1/\theta)$  cuyo nucleo es  $\theta$

*Proof.* (1) Cuando hablemos de  $z, w \in L/\theta$ , automaticamente tendremos definidos  $x, y \in L$  tal que  $x/\theta = z$  y  $y/\theta = w$ . Demostraremos una a una las propiedades que se deben cumplir:

- $z \tilde{\mathbf{s}} z = z \tilde{\mathbf{i}} z = z$ , cualesquiera sea  $z \in L/\theta$ , pues  $x \mathbf{s} x = x \mathbf{i} x = x$

- $z \tilde{s} w = w \tilde{s} z$ , cualesquiera sean  $z, w \in L/\theta$ , pues  $x s y = y s x$
- $z \tilde{i} w = w \tilde{i} z$ , cualesquiera sean  $z, w \in L/\theta$ , pues  $x i y = y i x$
- ... Faciles de demostrar ...
- $0/\theta \tilde{s} z = z$ , para cada  $z \in L/\theta$ , pues  $0 s x = x$
- $1/\theta \tilde{s} z = 1$ , para cada  $z \in L/\theta$ , pues  $1 s x = 1$

(2) Es directo de su analogo para reticulados ternas. Capaz en un futuro lo hago □

**Lema 20.** Si  $F: (L, s, i, 0, 1) \rightarrow (L', s', i', 0', 1')$  es un homomorfismo de reticulados acotados, entonces  $\ker F$  es una congruencia sobre  $(L, s, i, 0, 1)$

*Proof.* Es directo de su analogo para reticulados ternas. Capaz en un futuro lo hago □

## 5 Reticulados complementados

**Definición 27.** Sea  $(L, s, i, 0, 1)$  un reticulado acotado. Dado  $a \in L$ , diremos que  $a$  es *complementado* cuando exista un elemento  $b \in L$  (llamado *complemento de a*) tal que:

$$a s b = 1$$

$$a i b = 0$$

**Definición 28.** Entenderemos por *reticulado complementado* a una 6-upla  $(L, s, i, {}^c, 0, 1)$  tal que  $(L, s, i, 0, 1)$  es un reticulado acotado y  ${}^c$  es una operacion unaria sobre  $L$  tal que:

1.  $x s x^c = 1$ , para cada  $x \in L$
2.  $x i x^c = 0$ , para cada  $x \in L$

### 5.1 Subreticulados complementados

**Definición 29.** Dados reticulados complementados  $(L, s, i, {}^c, 0, 1)$  y  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  diremos que  $(L, s, i, {}^c, 0, 1)$  es un *subreticulado complementado de*  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  si se dan las siguientes condiciones:

1.  $L \subseteq L'$

$$2. 0 = 0' \text{ y } 1 = 1'$$

$$3. s = s'|_{L \times L}$$

$$4. i = i'|_{L \times L}$$

$$5. {}^c = {}^{c'}|_L$$

Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  un reticulado complementado. Un conjunto  $S \subseteq L$  es llamado un *subuniverso* de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  si  $0, 1 \in S$ , y  $S$  es cerrado bajo las operaciones  $s$ ,  $i$  y  ${}^c$ .

## 5.2 Homomorfismo de reticulados complementados

**Definición 30.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  y  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  reticulados complementados. Una funcion  $F: L \rightarrow L'$  sera llamada un *homomorfismo de*  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  en  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  si para todo  $x, y \in L$  se cumple que:

$$F(x \mathbf{s} y) = F(x)s'F(y)$$

$$F(x \mathbf{i} y) = F(x)i'F(y)$$

$$F(x^c) = F(x)^{c'}$$

$$F(0) = 0'$$

$$F(1) = 1'$$

Un homomorfismo  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  en  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  sera llamado *isomorfismo* cuando sea biyectivo y su inversa tambien sea un homomorfismo.

Escribiremos  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1) \rightarrow (L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  cuando  $F$  sea un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  en  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$

Escribiremos  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1) \cong (L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  cuando exista un isomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  en  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$

**Lema 21.** Si  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1) \rightarrow (L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  es un homomorfismo biyectivo, entonces  $F$  es un isomorfismo.

*Proof.* Se acepta sin demostracion

□

**Lema 22.** Sean  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  y  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  reticulados y sea  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1) \rightarrow (L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$  un homomorfismo. Entonces  $I_F$  es un subuniverso de  $(L', s', i', {}^{c'}, 0', 1')$ . Es decir que  $F$  es tambien

un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  en  $(I_F, \mathbf{s}'|_{I_F \times I_F}, \mathbf{i}'|_{I_F \times I_F}, {}^{c'}|_{I_F}, 0', 1')$

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

### 5.3 Congruencias de reticulados complementados

**Definición 31.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  un reticulado complementado. Una *congruencia sobre*  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  sera una relacion de equivalencia  $\theta$  sobre  $L$  la cual cumpla:

1.  $\theta$  es una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$
2.  $x/\theta = y/\theta$  implica  $x^c/\theta = y^c/\theta$

Las condiciones anteriores nos permiten definir sobre  $L/\theta$  dos operaciones binarias  $\tilde{\mathbf{s}}$  y  $\tilde{\mathbf{i}}$  y una operacion binaria  $\tilde{^c}$  de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} x/\theta \tilde{\mathbf{s}} y/\theta &= (x \mathbf{s} y)/\theta \\ x/\theta \tilde{\mathbf{i}} y/\theta &= (x \mathbf{i} y)/\theta \\ (x/\theta)^{\tilde{^c}} &= x^c/\theta \end{aligned}$$

La 6-upla  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, \tilde{^c}, 0/\theta, 1/\theta)$  es llamada *cociente de*  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  sobre  $\theta$  y la denotaremos con  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)/\theta$

**Lema 23.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  un reticulado complementado y  $\theta$  una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$ .

1.  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, \tilde{^c}, 0/\theta, 1/\theta)$  es un reticulado complementado
2.  $\pi_\theta$  es un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, {}^c, 0, 1)$  en  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, \tilde{^c}, 0/\theta, 1/\theta)$  cuyo nucleo es  $\theta$

*Proof.* (1) Por un lema anterior, ya sabemos que  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, 0/\theta, 1/\theta)$  es un reticulado acotado. Osea solo nos falta ver que  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, \tilde{^c}, 0/\theta, 1/\theta)$  satisface las propiedades de reticulado complementado. Sea  $x/\theta \in L/\theta$ . Sabemos que  $x \mathbf{s} x^c = 1$  y por lo tanto  $x/\theta \tilde{\mathbf{s}} x^c/\theta = (x \mathbf{s} x^c)/\theta = 1/\theta$ . Similarmente, sabemos que  $x \mathbf{i} x^c = 0$  y por lo tanto  $x \tilde{\mathbf{i}} x^c = 0/\theta$

(2) Por lema anterior tenemos que  $\pi_\theta$  es un homomorfismo de  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  en  $(L/\theta, \tilde{\mathbf{s}}, \tilde{\mathbf{i}}, 0/\theta, 1/\theta)$  cuyo nucleo es  $\theta$ . Notese que por definicion de  $\tilde{^c}$  tenemos que  $x^c/\theta = (x/\theta)^{\tilde{^c}}$ , y por lo tanto  $\pi_\theta(x^c) = (\pi_\theta(x))^{\tilde{^c}}$ , cualquiera sea  $x \in L$ . □

**Lema 24.** Si  $F: (L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, ^c, 0, 1) \rightarrow (L', \mathbf{s}', \mathbf{i}', ^c, 0', 1')$  es un homomorfismo de reticulados complementados, entonces  $\ker F$  es una congruencia sobre  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, ^c, 0, 1)$

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

## 6 Algebras de Boole

**Definición 32.** Un reticulado  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  se llamara *distributivo* cuando cumpla la siguiente propiedad

$$Dis_1 \quad x \mathbf{i} (y \mathbf{s} z) = (x \mathbf{i} y) \mathbf{s} (x \mathbf{i} z) \text{ cualesquiera sean } x, y, z \in L$$

Diremos que un reticulado acotado  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, 0, 1)$  (resp. complementado  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i}, ^c, 0, 1)$ ) es *distributivo* cuando  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  lo sea.

Consideremos la distributividad dual a  $Dis_1$ , es decir:

$$Dis_2 \quad x \mathbf{s} (y \mathbf{i} z) = (x \mathbf{s} y) \mathbf{i} (x \mathbf{s} z) \text{ cualesquiera sean } x, y, z \in L$$

**Lema 25.** Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado. Entonces  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  satisface  $Dis_1 \iff (L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  satisface  $Dis_2$

*Proof.* Supongamos  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  satisface  $Dis_1$ . Notese que

$$\begin{aligned} (x \mathbf{s} y) \mathbf{i} (x \mathbf{s} z) &= ((x \mathbf{s} y) \mathbf{i} x) \mathbf{s} ((x \mathbf{s} y) \mathbf{i} z) && (Dis_1 + \text{idempotencia}) \\ &= x \mathbf{s} (z \mathbf{i} (x \mathbf{s} y)) && (Dis_1) \\ &= x \mathbf{s} ((z \mathbf{i} x) \mathbf{s} (z \mathbf{i} y)) && (\text{Conmutatividad}) \\ &= (z \mathbf{i} y) \mathbf{s} ((z \mathbf{i} x) \mathbf{s} x) && (\text{idempotencia}) \\ &= (z \mathbf{i} y) \mathbf{s} x \end{aligned}$$

Por lo tanto cumple  $Dis_2$ .



Supongamos ahora  $(L, s, i)$  satisface  $Dis_2$ . Notese que

$$\begin{aligned}
(x \mathbf{i} y) \mathbf{s} (x \mathbf{i} z) &= ((x \mathbf{i} y) \mathbf{s} x) \mathbf{i} ((x \mathbf{i} y) \mathbf{s} z) && (Dis_2 + idempotencia) \\
&= x \mathbf{i} (z \mathbf{s} (x \mathbf{i} y)) && (Dis_2) \\
&= x \mathbf{i} ((z \mathbf{s} x) \mathbf{i} (z \mathbf{s} y)) && (Conmutatividad) \\
&= (z \mathbf{s} y) \mathbf{i} ((z \mathbf{s} x) \mathbf{i} x) && (idempotencia) \\
&= (z \mathbf{s} y) \mathbf{i} x
\end{aligned}$$

Por lo tanto cumple  $Dis_1$ . □

**Definición 33.** Por un *Algebra de Boole* entenderemos un reticulado complementado distributivo.

**Lema 26.** Si  $(L, s, i, 0, 1)$  un reticulado acotado y distributivo, entonces todo elemento tiene a lo sumo un complemento.

*Proof.* Supongamos  $x \in L$  tiene complementos  $y, z$ . Se tiene que:

$$y = y \mathbf{i} 1 = y \mathbf{i} (x \mathbf{s} z) = (y \mathbf{i} x) \mathbf{s} (y \mathbf{i} z) = 0 \mathbf{s} (y \mathbf{i} z) = y \mathbf{i} z$$

$$z = z \mathbf{i} 1 = z \mathbf{i} (x \mathbf{s} y) = (z \mathbf{i} x) \mathbf{s} (z \mathbf{i} y) = 0 \mathbf{s} (z \mathbf{i} y) = z \mathbf{i} y$$

Por lo tanto  $y \leq z$  y  $z \leq y$ , entonces  $y = z$ . □

**Lema 27.** Sea  $(B, s, i, {}^c, 0, 1)$  un algebra de Boole, y sean  $x, y \in B$ . Se tiene que  $y = (y \mathbf{i} x) \mathbf{s} (y \mathbf{i} x^c)$

*Proof.* Se tiene que:

$$y = y \mathbf{i} 1 = y \mathbf{i} (x \mathbf{s} x^c) = (y \mathbf{i} x) \mathbf{s} (y \mathbf{i} x^c)$$

□

**Teorema 28.** Sea  $(B, s, i, {}^c, 0, 1)$  un algebra de Boole.

$$1. (x \mathbf{i} y)^c = x^c \mathbf{s} y^c$$

$$2. (x \mathbf{s} y)^c = x^c \mathbf{i} y^c$$

$$3. x^{cc} = x$$

$$4. x \mathbf{i} y = 0 \iff y \leq x^c$$

$$5. x \leq y \iff y^c \leq x^c$$

*Proof.*

(1) Veamos que  $x^c \mathbf{s} y^c$  es complemento de  $x \mathbf{i} y$ :

$$(x^c \mathbf{s} y^c) \mathbf{s} (x \mathbf{i} y) = ((x^c \mathbf{s} y^c) \mathbf{s} x) \mathbf{i} ((x^c \mathbf{s} y^c) \mathbf{s} y) = 1 \mathbf{i} 1 = 1$$

$$(x^c \mathbf{s} y^c) \mathbf{i} (x \mathbf{s} y) = ((x^c \mathbf{s} y^c) \mathbf{i} x) \mathbf{s} ((x^c \mathbf{s} y^c) \mathbf{i} y) = 0 \mathbf{s} 0 = 0$$

Como es un algebra de Boole, se tiene que el complemento es unico y por lo tanto  $(x \mathbf{i} y)^c = x^c \mathbf{s} y^c$ .

(2) Facil, igual al (1)

(3) Por definicion,  $x$  es complemento de  $x^c$ . Como tenemos un algebra de Boole, este complemento es unico y por lo tanto  $x^{cc} = x$

(4) Facil, usar lema anterior

(5) Supongamos  $x \leq y$ . Entonces  $x \mathbf{i} y = x$ , lo cual por (1) nos dice que  $x^c \mathbf{s} y^c = x^c$ , obteniendo  $y^c \leq x^c$ . Supongamos ahora  $y^c \leq x^c$ , luego  $x^c \mathbf{i} y^c = y^c$ , lo cual por (1) nos dice que  $x^{cc} \mathbf{s} y^{cc} = y^{cc}$ . Esto por (3) nos dice que  $x \mathbf{s} y = y$  y por lo tanto  $x \leq y$ .  $\square$

## 7 Teoremas del filtro primo y de Rasiova Sikorski

**Definición 34.** Un *filtro* de un reticulado  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  sera un subconjunto  $F \subseteq L$  tal que:

1.  $F \neq \emptyset$
2.  $x, y \in F \Rightarrow x \mathbf{i} y \in F$
3.  $x \in F, x \leq y \Rightarrow y \in F$

**Definición 35.** Dado un conjunto  $S \subseteq L$ , denotemos con  $[S]$  el siguiente conunto:

$$\{y \in L : y \geq s_1 \mathbf{i} \dots \mathbf{i} s_n, \text{ para algunos } s_1, \dots, s_n \in S, n \geq 1\}$$

**Lema 29.** Supongamos que  $S$  es no vacio. Entonces  $[S]$  es un filtro. Mas aun, si  $F$  es un filtro y  $S \subseteq F$ , entonces  $[S] \subseteq F$ . Es decir,  $[S]$  es el menor filtro que contiene a  $S$ .

*Proof.* Ya que  $S \subseteq [S]$ , tenemos que  $[S] \neq \emptyset$ .

Claramente  $[S]$  cumple la propiedad (3), pues  $x \in [S], x \leq y \Rightarrow y \in [S]$

Veamos que cumple la 2. Sean  $y, z \in S$ , entonces tenemos que  $y \geq s_1 \mathbf{i} \dots \mathbf{i} s_n$  y  $z \geq t_1 \mathbf{i} \dots \mathbf{i} t_m$ , con  $s_1, \dots, s_n, t_1, \dots, t_m \in S$ . Claramente  $y \mathbf{i} z \geq s_1 \mathbf{i} \dots \mathbf{i} s_n \mathbf{i} t_1 \mathbf{i} \dots \mathbf{i} t_m$

Dado este resultado, diremos que  $[S]$  es el *filtro generado por  $S$* .  $\square$

**Definición 36.** Sea  $(P, \leq)$  un poset. Un subconjunto  $C \subseteq P$  sera llamado una *cadena* si para cada  $x, y \in C$  se tiene que  $x \leq y$  o  $y \leq x$

**Lema 30** (Zorn). Sea  $(P, \leq)$  un poset y supongamos cada cadena de  $(P, \leq)$  tiene cota superior. Entonces hay un elemento maximal en  $(P, \leq)$

*Proof.* Supongamos que el lema es falso, es decir, tenemos un poset  $(P, \leq)$  tal que cada cadena de  $(P, \leq)$  tiene cota superior, pero para cada  $x \in P$ , se tiene que existe un  $y \in P$  tal que  $x < y$ .

Por definicion  $P \neq \emptyset$ , (en caso de que se permitiese  $P = \emptyset$ , de todas formas la cadena vacia debe tener cota superior, y por lo tanto  $P \neq \emptyset$ )

Sea  $z \in P$  un elemento cualquiera, y sea  $b$  una funcion que asigna a cada cadena de  $P$  un elemento mayor a su cota superior (cota superior estricta). En particular elegimos  $b$  tal que  $b(\{z\}) = z$

Definimos una cadena  $A \subseteq P$  como *valida* cuando se cumpla la siguiente propiedad:

- Para todo  $x \in A$ , se tiene que  $x = b(\{y \in A : y < x\})$

Es facil ver que si  $A$  y  $B$  son dos cadenas *validas* distintas, entonces  $A \subset B$  o  $B \subset A$

Con esta ultima afirmacion, si tenemos una cadena valida  $A$  y un  $x \in A$ , siempre que exista un  $y < x$ , se tiene que o  $y \in A$  o  $y$  no esta en ninguna cadena valida.

Se sigue que  $U =$  "union de todas las cadenas *validas* posibles", es tambien, una cadena *valida*.

Sea  $x = b(U)$ . Pero entonces  $U \cup \{x\}$  es una *cadena* valida tambien. Ademas  $U = U \cup \{x\}$  por definicion de  $U$ , y por lo tanto  $x \in U$ . **Abss!**, pues  $x$  deberia ser cota superior estricta de  $U$   $\square$

**Definición 37.** Un filtro  $F$  de un reticulado  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  sera llamado *primo* cuando se cumplan:

1.  $F \neq L$
2.  $x \mathbf{s} y \in F \Rightarrow x \in F$  o  $y \in F$

**Teorema 31** (Teorema del Filtro Primo). Sea  $(L, \mathbf{s}, \mathbf{i})$  un reticulado distributivo y  $F$  un filtro. Supongamos  $x_0 \in L - F$ . Entonces hay un filtro primo  $P$  tal que  $x_0 \notin P$  y  $F \subseteq P$

*Proof.* Sea

$$\mathcal{F} = \{F_1 : F_1 \text{ es un filtro, } x_0 \notin F_1 \text{ y } F \subseteq F_1\}$$

Notese que  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ , por lo cual  $(\mathcal{F}, \subseteq)$  es un poset. Veamos que cada cadena en  $(\mathcal{F}, \subseteq)$  tiene cota superior. Sea  $C$  una cadena. Si  $C = \emptyset$ , entonces cualquier elemento de  $\mathcal{F}$  es cota de  $C$ . Supongamos entonces  $C \neq \emptyset$ . Sea

$$G = \{x \in L : x \in F_1, \text{ para algun } F_1 \in C\}$$

Veamos que  $G$  es un filtro. Es claro que  $G$  es no vacio. Supongamos  $x, y \in G$ . Sean  $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$  tales que  $x \in F_1$  y  $y \in F_2$ . Si  $F_1 \subseteq F_2$ , entonces ya que  $F_2$  es un filtro, tenemos que  $x \mathbin{\text{\textbf{i}}} y \in F_2 \subseteq G$ . Similarmente, si  $F_2 \subseteq F_1$ , entonces  $x \mathbin{\text{\textbf{i}}} y \in F_1 \subseteq G$ . No es necesario ver que pasa si  $F_1 \not\subseteq F_2$  y  $F_2 \not\subseteq F_1$  ya que  $C$  es una cadena.

Por otro lado, sean  $x \in G$  e  $y$  tal que  $x \leq y$ . Dado que  $x \in G$ , tenemos que  $x \in F_1$  para algun  $F_1 \in C$ . Como  $F_1$  es un filtro, tenemos que  $y \in F_1$ , y por lo tanto  $y \in G$ . Hemos demostrado que  $G$  es un filtro.

Ademas,  $x_0 \notin G$ , por lo que  $G \in \mathcal{F}$  es cota superior de  $C$ . Por lema de Zorn,  $(\mathcal{F}, \subseteq)$  tiene un elemento maximal  $P$ . Veamos que  $P$  es un filtro primo. Supongamos  $x \mathbin{\text{\textbf{s}}} y \in P$  y  $x, y \notin P$ . Notese que  $[P \cup \{x\}]$  es un filtro el cual contiene propiamente a  $P$ . Entonces ya que  $P$  es maximal de  $(\mathcal{F}, \subseteq)$ , tenemos que  $x_0 \in [P \cup \{x\}]$ . Analogamente tenemos que  $x_0 \in [P \cup \{y\}]$ . Por lo tanto, tenemos elementos  $p_1, \dots, p_n \in P$  tal que:

$$x_0 \geq p_1 \mathbin{\text{\textbf{i}}} \dots \mathbin{\text{\textbf{i}}} p_n \mathbin{\text{\textbf{i}}} x$$

Identicamente tenemos elementos  $q_1, \dots, q_m \in P$  tales que:

$$x_0 \geq q_1 \mathbin{\text{\textbf{i}}} \dots \mathbin{\text{\textbf{i}}} q_m \mathbin{\text{\textbf{i}}} y$$

Sea  $p = p_1 \mathbin{\text{\textbf{i}}} \dots \mathbin{\text{\textbf{i}}} p_n \mathbin{\text{\textbf{i}}} q_1 \mathbin{\text{\textbf{i}}} \dots \mathbin{\text{\textbf{i}}} q_m$ , tenemos que  $x_0 \geq p \mathbin{\text{\textbf{i}}} x$  y  $x_0 \geq p \mathbin{\text{\textbf{i}}} y$ . Se tiene entonces que  $x_0 \geq (p \mathbin{\text{\textbf{i}}} x) \mathbin{\text{\textbf{s}}} (p \mathbin{\text{\textbf{i}}} y) = p \mathbin{\text{\textbf{i}}} (x \mathbin{\text{\textbf{s}}} y) \in P$ . **Abs!** pues  $x_0 \notin P$  □

**Teorema 32** (Rasiova y Sikorski). Sea  $(B, \mathbf{s}, \mathbf{i}, ^c, 0, 1)$  un algebra de Boole. Sea  $x \in B, x \neq 0$ . Supongamos que  $(A_1, A_2, \dots)$  es un infinitupla de subconjuntos de  $B$  tal que existe  $\inf(A_j)$ , para cada  $j = 1, 2, \dots$ . Entonces hay un filtro primo  $P$  el cual cumple:

1.  $x \in P$
2.  $A_j \subseteq P \Rightarrow \inf(A_j) \in P$ , para cada  $j = 1, 2, \dots$

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

## 8 Sintaxis de la logica de primer orden

### 8.1 Ocurrencias

**Definición 38.** Dadas palabras  $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ , con  $|\alpha|, |\beta| \geq 1$ , y un natural  $i \in \{1, \dots, |\beta|\}$ , se dice que  $\alpha$  ocurre a partir de  $i$  en  $\beta$  cuando se de que existan palabras  $\delta, \gamma$  tales que  $\beta = \delta\alpha\gamma$  y  $|\delta| = i - 1$

Notese que una palabra  $\alpha$  puede ocurrir en  $\beta$  a partir de  $i$  y tambien a partir de  $j$ , con  $i \neq j$ . Por ejemplo, *aba* ocurre dos veces en la palabra

*abacaba*

Cuando dos ocurrencias no se superpongan en alguna posicion, se las llamara *disjuntas*

A veces, diremos que una ocurrencia esta *contenida* o *sucede* dentro de otra. Por ejemplo, la segunda ocurrencia de *b* esta contenida en la segunda ocurrencia de *aba*

Tambien se podra hablar de *reemplazos* de ocurrencias por palabras. Por ejemplo, podriamos reemplazar las ocurrencias de *aca* por *abacaba*, dando como resultado

*ababacababa*

En algunos casos, se debera especificar que los reemplazos se haran *simultaneamente* en vez de *secuencialmente*. Por ejemplo, no es lo mismo primero reemplazar *aca* por *d* y luego *d* por *bb*

*abbbba*

Que hacerlo simultaneamente dando como resultado

*abdba*

**Definición 39.** Diremos que  $\alpha$  es subpalabra (propia) de  $\beta$  cuando ( $\alpha \notin \{\varepsilon, \beta\}$  y) existan palabras  $\delta, \gamma$ , tales que  $\beta = \delta\alpha\gamma$

**Definición 40.** Diremos que  $\beta$  es un *tramo inicial (propio)* de  $\alpha$  si hay una palabra de  $\gamma$  tal que  $\alpha = \beta\gamma$  (y  $\beta \notin \{\varepsilon, \alpha\}$ ). En forma similar se define *tramo final (propio)*

## 8.2 Variables

**Definición 41.** Sea  $Var$  el siguiente conjunto de palabras del alfabeto  $\{X, 0, 1, \dots, 9, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \dots, \mathbf{9}\}$ :

$$Var = \{X\mathbf{0}, \dots, X\mathbf{9}, X1\mathbf{0}, \dots, X2\mathbf{0}, \dots, X10\mathbf{0}, \dots\}$$

Es decir, el  $n$ -ésimo elemento de  $Var$  será la palabra de la forma  $X\alpha$ , donde  $\alpha$  es el resultado de reemplazar en la representación decimal de  $n$  su último símbolo por el numeral en bold, y el resto por sus numerales en italics.

A los elementos de  $Var$  se los llamará *variables*.

Denotaremos con  $x_i$  al  $i$ -ésimo elemento de  $Var$ , para cada  $i \in \mathbf{N}$ .

## 8.3 Tipos

**Definición 42.** Por un tipo (de primer orden) entenderemos una 4-upla  $\tau = (\mathcal{C}, \mathcal{F}, \mathcal{R}, a)$  tal que:

1. Hay alfabetos finitos  $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$  tales:

$$(a) \ \mathcal{C} \subseteq \Sigma_1^+, \mathcal{F} \subseteq \Sigma_2^+, \mathcal{R} \subseteq \Sigma_3^+$$

- (b)  $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$  son disjuntos de a pares

$$(c) \ \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_3 \text{ no contiene ningún símbolo de la lista: } \forall \exists \neg \vee \wedge \rightarrow \leftrightarrow ( ) , \equiv \\ X \ 0 \ 1 \ \dots \ 9 \ \mathbf{0} \ \mathbf{1} \ \dots \ \mathbf{9}$$

2.  $a: \mathcal{F} \cup \mathcal{R} \rightarrow \mathbf{N}$  es una función que a cada  $p \in \mathcal{F} \cup \mathcal{R}$  le asocia un número natural  $a(p)$ , llamado la *aridad* de  $p$

3. Ninguna palabra de  $\mathcal{C}$  (resp.  $\mathcal{F}, \mathcal{R}$ ) es subpalabra propia de otra palabra de  $\mathcal{C}$  (resp.  $\mathcal{F}, \mathcal{R}$ )

A los elementos de  $\mathcal{C}$  (resp.  $\mathcal{F}, \mathcal{R}$ ) los llamaremos *nombres de constante* (resp. *nombres de función, nombres de relación*) de tipo  $\tau$

Dado  $n \geq 1$ , definamos

$$\mathcal{F}_n = \{f \in \mathcal{F} : a(f) = n\}$$

$$\mathcal{R}_n = \{r \in \mathcal{R} : a(r) = n\}$$

## 8.4 Terminos

Dado un tipo  $\tau$ , definamos recursivamente los conjuntos de palabras  $T_k^\tau$ , con  $k \geq 0$ , de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} T_0^\tau &= \text{Var} \cup \mathcal{C} \\ T_{k+1}^\tau &= T_k^\tau \cup \{f(t_1, \dots, t_n) : f \in \mathcal{F}_n, n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T_k^\tau\} \end{aligned}$$

Sea

$$T^\tau = \bigcup_{k \geq 0} T_k^\tau$$

Los elementos de  $T^\tau$  seran llamados *terminos de tipo  $\tau$* . Un termino  $t$  es llamado *cerrado* si  $x_i$  no ocurre en  $t$ , para cada  $i \in \mathbf{N}$ .

Definimos tambien:

$$T_c^\tau = \{t \in T^\tau : t \text{ es cerrado}\}$$

**Lema 33.** *Supongamos  $t \in T_k^\tau$ , con  $k \geq 1$ . Entonces ya sea  $t \in \text{Var} \cup \mathcal{C}$  o  $t = f(t_1, \dots, t_n)$ , con  $f \in \mathcal{F}_n, n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T_{k-1}^\tau$*

*Proof.*

Caso  $k = 1$ : Es directo ya que por definicion:

$$T_1^\tau = \text{Var} \cup \mathcal{C} \cup \{f(t_1, \dots, t_n) : f \in \mathcal{F}_n, n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T_0^\tau\}$$

Caso  $k \implies k + 1$ . Sea  $t \in T_{k+1}^\tau$ . Por definicion tenemos que  $t \in T_k^\tau$  o  $t = f(t_1, \dots, t_n)$  con  $f \in \mathcal{F}_n, n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T_k^\tau$ . Si se da  $t \in T_k^\tau$  entonces aplicamos hipotesis inductiva. Si no se da tal cosa, entonces es justamente lo que nos dice el enunciado del lema.  $\square$

### 8.4.1 Unicidad de la lectura de terminos

**Lema 34** (Mordizqueo de Terminos). *Sean  $s, t \in T^\tau$  y supongamos que hay palabras  $x, y, z$ , con  $y \neq \varepsilon$  tales que  $s = xy$  y  $t = yz$ . Entonces  $x = z = \varepsilon$  o  $s, t \in \mathcal{C}$ . En particular si un termino es tramo inicial o final de otro termino, entonces dichos terminos son iguales.*

*Proof.* Se acepta sin demostracion  $\square$

**Teorema 35** (Lectura unica de terminos). *Dado  $t \in T^\tau$  se da una de las siguientes:*

1.  $t \in Var \cup \mathcal{C}$

2. Hay unicos  $n \geq 1, f \in \mathcal{F}_n, t_1, \dots, t_n \in T^\tau$  tales que  $t = f(t_1, \dots, t_n)$

*Proof.* Solo necesitamos demostrar la unicidad del punto 2, el resto ya se demostro. Supongamos que

$$t = f(t_1, \dots, t_n) = g(s_1, \dots, s_m)$$

con  $n, m \geq 1, f \in \mathcal{F}_n, g \in \mathcal{F}_m, t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_m \in T^\tau$ . Claramente  $f = g$  y por lo tanto  $n = m = a(f)$ . Ahora bien, si leemos letra por letra apartir del primer parentesis ‘(’, terminara primero  $t_1$  o  $s_1$ , pero nunca deben diferir entre si. Esto nos dice que  $t_1$  es tramo inicial de  $s_1$  o viceversa. Por lema anterior,  $t_1 = s_1$ . Con el mismo razonamiento podemos demostrar que se cumple  $t_2 = s_2, \dots, t_n = s_n$   $\square$

#### 8.4.2 Subterminos

**Definición 43.** Sean  $s, t \in T^\tau$ . Diremos que  $s$  es *subtermino (propio)* de  $t$  si (no es igual a  $t$  y)  $s$  es subpalabra de  $t$ .

**Lema 36.** Sean  $r, s, t \in T^\tau$

1. Si  $s \neq t = f(t_1, \dots, t_n)$  y  $s$  ocurre en  $t$ , entonces dicha ocurrencia sucede dentro de algun  $t_j$ ,  $j = 1, \dots, n$
2. Si  $r, s$  ocurren en  $t$ , entonces dichas ocurrencias son disjuntas o una ocurre dentro de otra. En particular las distintas ocurrencias de  $r$  en  $t$  son disjuntas
3. Si  $t'$  es el resultado de reemplazar una ocurrencia de  $s$  en  $t$  por  $r$ , entonces  $t' \in T^\tau$

*Proof.*

(1) Haremos analisis por casos:

- Si  $s$  ocurriera en  $t$  a partir de  $i \in \{1, \dots, |f|\}$ , entonces tenemos que  $s$  es de la forma  $g(s_1, \dots, s_m)$  (no puede ser ni  $Var$  ni  $\mathcal{C}$ ), y por lo tanto  $g$  es tramo final de  $f$  **Abs!**
- Es claro que  $s$  no comienza ni con “,”, ni con “(”, ni con “)”
- Solo queda el caso en el que la ocurrencia de  $s$  comienza en algun  $t_j$ . (Fotocopia dice  $\rightarrow$  Lema de Mordizqueo para Terminos nos conduce a que debe estar contenida en  $t_j$  y listo, pero yo soy menos picante y no entiendo porque)



Supongamos que la ocurrencia no esta contenida en  $t_j$ , y sea  $t_k$  ( $j < k$ ) el ultimo termino que forma parte de la ocurrencia (aunque sea parcialmente).

Es evidente que este  $k$  existe, pues la ocurrencia de  $s$  no puede tomar el ultimo parentesis de  $t$ , sino, seria tramo final de  $t$  y podriamos aplicar Lema de Mordizqueo para terminos directamente. Ademas,  $s$  no puede terminar con una ",",.

Sea  $n = |t_j|$  y  $m = |t_k|$ . Se usara la notacion  $p[i]$  para referirse a la letra  $i$ -esima de  $p$ .

Tenemos entonces que  $s = t_j[l] \dots t_j[n], t_{j+1}, \dots, t_{k-1}, t_k[1] \dots t_k[r]$  Notese que hay una coma justo despues de  $t_j[n]$ , por lo tanto apartir de algun  $i \in \{l, \dots, n\}$  debe comenzar el nombre de una funcion. Esta funcion no cierra su parentesis dentro de  $t_j$ . Es importante notar que los parentesis se cierran a la derecha, no a la izquierda, osea que no nos importa la parte  $t_j[1] \dots t_j[l-1]$ , y por lo tanto esto nos dice que los parentesis en  $t_j$  no estan balanceados  
**Abs!**

(2) Supongamos  $t \in Var \cup \mathcal{C}$ , si  $r, s$  ocurren en  $t$ , entonces  $r = s = t$  y por lo tanto  $r$  esta contenida en la ocurrencia de  $s$ .

Ahora supongamos que vale para  $T_k^\tau$  y veamos para  $T_{k+1}^\tau$ . Si  $t \in T_k^\tau$  podemos aplicar hipotesis directamente, y sino, tenemos que  $t = f(t_1, \dots, t_n)$ , para  $f \in \mathcal{F}_n, n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T_k^\tau$ . Si  $r$  o  $s$  ocurren a partir de algun  $i \in \{1, \dots, |f|\}$ , entonces solo pueden ocurrir a partir de 1, y eso hace que las ocurrencias se contengan trivialmente. Ahora si no pasa esto, las ocurrencias suceden dentro de los  $t_i$ . Sean  $r_1, \dots, r_q$  y  $s_1, \dots, s_w$  los indices de los terminos donde ocurren  $r$  y  $s$  respectivamente. Tomemos cualquier  $1 \leq x \leq q$  y  $1 \leq y \leq w$ . Si  $r_x = s_y$  entonces por hipotesis las ocurrencias se contienen o son disjuntas, y sino, las ocurrencias son claramente disjuntas.

(3) Supongamos  $t \in Var \cup \mathcal{C}$ , si  $s$  ocurre en  $t$  entonces  $s = t$ . Si reemplazamos la ocurrencia por  $r$ , entonces  $t' = r$  es un termino. Ahora supongamos que vale para  $T_k^\tau$  y veamos para  $T_{k+1}^\tau$ . Si  $t \in T_k^\tau$  entonces vale por hipotesis. Si  $t = f(t_1, \dots, t_n)$ , con  $f \in \mathcal{F}_n, n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T_k^\tau$ , de nuevo tenemos dos casos. Si  $s$  ocurre apartir de  $\{1, \dots, |f|\}$  entonces  $s$  ocurre a partir de 1, y por lo tanto  $t = s$ , y por lo tanto  $t' = r$  es termino. Sino,  $s$  ocurre en algun  $t_i$ , y por hipotesis, reemplazar en ese termino la ocurrencia nos da como resultado un termino, y por lo tanto  $t' \in T^\tau$  es termino.

□

## 8.5 Formulas

**Definición 44.** Sea  $\tau$  un tipo. Las palabras de alguna de las siguientes dos formas:

$$(t \equiv s), \text{ con } t, s \in T^\tau$$

$$r(t_1, \dots, t_n), \text{ con } r \in \mathcal{R}_n, n \geq 1, \text{ y } t_1, \dots, t_n \in T^\tau$$

seran llamadas *formulas atomicas de tipo  $\tau$*

**Definición 45.** Dado un tipo  $\tau$  definamos recursivamente los conjuntos de palabras  $F_k^\tau$ , con  $k \geq 0$ , de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} F_0^\tau &= \{\text{formulas atomicas}\} \\ F_{k+1}^\tau &= F_k^\tau \cup \{\neg\varphi : \varphi \in F_k^\tau\} \cup \{(\varphi \vee \psi) : \varphi, \psi \in F_k^\tau\} \cup \{(\varphi \wedge \psi) : \varphi, \psi \in F_k^\tau\} \\ &\quad \cup \{(\varphi \rightarrow \psi) : \varphi, \psi \in F_k^\tau\} \cup \{(\varphi \leftrightarrow \psi) : \varphi, \psi \in F_k^\tau\} \\ &\quad \cup \{\forall v\varphi : \varphi \in F_k^\tau, v \in Var\} \cup \{\exists v\varphi : \varphi \in F_k^\tau, v \in Var\} \end{aligned}$$

Sea

$$F^\tau = \bigcup_{k \geq 0} F_k^\tau$$

Los elementos de  $F^\tau$  seran llamados *formulas de tipo  $\tau$*

**Lema 37.** Supongamos  $\varphi \in F_k^\tau$ , con  $k \geq 1$ . Entonces  $\varphi$  es de alguna de las siguientes formas:

- $(t \equiv s)$ , con  $t, s \in T^\tau$
- $r(t_1, \dots, t_n)$ , con  $r \in \mathcal{R}_n, t_1, \dots, t_n \in T^\tau$
- $(\varphi_1 \eta \varphi_2)$ , con  $\eta \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ ,  $\varphi_1, \varphi_2 \in F_{k-1}^\tau$
- $\neg\varphi_1$ , con  $\varphi_1 \in F_{k-1}^\tau$
- $Qv\varphi_1$ , con  $Q \in \{\forall, \exists\}, v \in Var$  y  $\varphi_1 \in F_{k-1}^\tau$

*Proof.* Induccion en  $k$  simple. □

### 8.5.1 Unicidad de la lectura de formulas

**Proposicion 38** (Mordizqueo de formulas). Si  $\varphi, \psi \in F^\tau$  y  $x, y, z$  son tales que  $\varphi = xy$ ,  $\psi = yz$  y  $y \neq \varepsilon$ , entonces  $z = \varepsilon$  y  $x \in (\{\neg\} \cup \{Qv : Q \in \{\forall, \exists\} \text{ y } v \in Var\})^*$ . En particular ningun tramo inicial propio de una formula es una formula

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

**Teorema 39** (Lectura unica de formulas). Dada  $\varphi \in F^\tau$  se da una y solo una de las siguientes:

1.  $(t \equiv s)$ , con  $t, s \in T^\tau$
2.  $r(t_1, \dots, t_n)$ , con  $r \in \mathcal{R}_n, t_1, \dots, t_n \in T^\tau$
3.  $(\varphi_1 \eta \varphi_2)$ , con  $\eta \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ ,  $\varphi_1, \varphi_2 \in F^\tau$
4.  $\neg \varphi_1$ , con  $\varphi_1 \in F^\tau$
5.  $Qv \varphi_1$ , con  $Q \in \{\forall, \exists\}, v \in Var$  y  $\varphi_1 \in F^\tau$

Mas aun, tales descomposiciones son unicas.

*Proof.* Si una formula  $\varphi$  satisface (1), entonces  $\varphi$  no puede contener simbolos del alfabeto  $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  lo cual garantiza que  $\varphi$  no puede satisfacer (3). Ademas  $\varphi$  no puede satisfacer (2), (4), (5) ya que comienza con "(". Es facil ver que cumplir (2), (3), (4), (5) es excluyente tambien.

La unicidad de la descomposicion de (4), (5) es obvia. La de (3) se desprende del lema anterior (supongamos que lo descomponemos de otra forma, entonces  $\varphi_1$  sera tramo inicial propio de  $\varphi'_1$  o al revés). La de (1), (2) se desprenden del lema analogo para terminos. □

### 8.5.2 Subformulas

**Definición 46.** Una formula  $\varphi$  sera llamada una *subformula (propia)* de una formula  $\psi$ , cuando  $\varphi$  (sea no igual a  $\psi$  y) tenga alguna ocurrencia en  $\psi$ .

**Lema 40.** Sea  $\tau$  un tipo

1. Las formulas atomicas no tienen subformulas propias
2. Si  $\varphi$  ocurre propiamente en  $(\psi \eta \phi)$ , entonces tal ocurrencia es en  $\psi$  o en  $\phi$
3. Si  $\varphi$  ocurre propiamente en  $\neg \psi$ , entonces tal ocurrencia es en  $\psi$

4. Si  $\varphi$  ocurre propiamente en  $Qx_k\psi$ , entonces tal ocurrencia es en  $\psi$
5. Si  $\varphi_1, \varphi_2$  ocurren en  $\varphi$ , entonces dichas ocurrencias son disjuntas o una contiene a la otra
6. Si  $\lambda'$  es el resultado de reemplazar alguna ocurrencia de  $\varphi$  en  $\lambda$  por  $\psi$ , entonces  $\lambda' \in F^\tau$

*Proof.* Se acepta sin demostración

□

## 8.6 Variables libres

**Definición 47.** Definimos recursivamente la relación " $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i$ ", donde  $v \in Var$ ,  $\varphi \in F^\tau$  y  $i \in \{1, \dots, |\varphi|\}$  de la siguiente manera:

1. Si  $\varphi$  es atómica, entonces  $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i \iff v$  ocurre en  $\varphi$  a partir de  $i$
2. Si  $\varphi = (\varphi_1\eta\varphi_2)$ , entonces  $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i \iff v$  ocurre libremente en  $\varphi_1$  a partir de  $i - 1$  o  $v$  ocurre libremente en  $\varphi_2$  a partir de  $i - |(\varphi_1\eta)|$
3. Si  $\varphi = \neg\varphi_1$ , entonces  $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i \iff v$  ocurre libremente en  $\varphi_1$  a partir de  $i - 1$
4. Si  $\varphi = Qw\varphi_1$ , entonces  $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i \iff v \neq w$  y  $v$  ocurre libremente en  $\varphi_1$  a partir de  $i - |Qw|$

Dados  $v \in Var$ ,  $\varphi \in F^\tau$  y  $i \in \{1, \dots, |\varphi|\}$ , diremos que " $v$  ocurre acotadamente en  $\varphi$  a partir de  $i$ " cuando  $v$  ocurre en  $\varphi$  a partir de  $i$  y  $v$  no ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i$

**Definición 48.** Dada una fórmula  $\varphi$ , sea

$$Li(\varphi) = \{v \in Var : \text{hay un } i \text{ tal que } v \text{ ocurre libremente en } \varphi \text{ a partir de } i\}$$

Los elementos de  $Li(\varphi)$  serán llamados *variables libres de  $\varphi$* . Una *sentencia* será una fórmula  $\varphi$  tal que  $Li(\varphi) = \emptyset$ . Usaremos  $S^\tau$  para denotar el conjunto de las sentencias de tipo  $\tau$ .

**Lema 41.** Sea  $\tau$  un tipo

1.  $Li((t \equiv s)) = \{v \in Var : v \text{ ocurre en } t \text{ o } v \text{ ocurre en } s\}$
2.  $Li(r(t_1, \dots, t_n)) = \{v \in Var : v \text{ ocurre en algún } t_i\}$

$$3. Li(\neg\varphi) = Li(\varphi)$$

$$4. Li((\varphi\eta\psi)) = Li(\varphi) \cup Li(\psi)$$

$$5. Li(Qx_j\varphi) = Li(\varphi) - \{x_j\}$$

*Proof.* Para (1), (2), tenemos por definiciones que si  $v \in Var$  ocurren en  $(t \equiv s)$  (resp. en  $(r(t_1, \dots, t_n))$ ), entonces  $v$  ocurre en  $t$  o  $v$  ocurre en  $s$  (resp.  $v$  ocurre en algún  $t_i$ ).

Para (3), notar que si  $v \in Li(\varphi)$ , entonces  $v$  ocurre libremente a partir de  $i$  en  $\varphi$ , y entonces ocurriría libremente a partir de  $i + 1$  en  $\neg\varphi$  y por lo tanto  $v \in Li(\neg\varphi)$ . Ahora bien si  $v \in Li(\neg\varphi)$ , entonces ocurre libremente a partir de  $i$ , pero por definición ocurre libremente a partir de  $i - 1$  en  $\varphi$ , y entonces  $v \in Li(\varphi)$ .

Para (4), notar que si  $v \in Li((\varphi\eta\psi))$ , entonces  $v$  ocurre libremente en  $(\varphi\eta\psi)$  a partir de  $i$ . Por definición, tenemos que  $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i - 1$  o  $v$  ocurre libremente en  $\psi$  a partir de  $i - |(\varphi\eta)|$ , con lo cual  $v \in Li(\varphi) \cup Li(\psi)$ . Ahora si  $v \in Li(\varphi) \cup Li(\psi)$ , tenemos 2 casos. Si  $v \in Li(\varphi)$ , entonces  $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i$ , y por definición  $v$  ocurre libremente en  $(\varphi\eta\psi)$  a partir de  $i + 1$ , con lo cual  $v \in Li((\varphi\eta\psi))$ . Si  $v \in Li(\psi)$ , entonces  $v$  ocurre libremente en  $\psi$  a partir de  $i$ , y por definición  $v$  ocurre libremente en  $(\varphi\eta\psi)$  a partir de  $i + |(\varphi\eta)|$ , y por lo tanto  $v \in Li((\varphi\eta\psi))$ .

Para (5) supongamos que  $v \in Li(Qx_j\varphi)$ , entonces hay un  $i$  tal que  $v$  ocurre libremente en  $Qx_j\varphi$  a partir de  $i$ . Por definición tenemos que  $v \neq x_j$  y  $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i - |Qx_j|$ , con lo cual  $v \in Li(\varphi) - \{x_j\}$ . Supongamos ahora que  $v \in Li(\varphi) - \{x_j\}$ . Por definición tenemos que hay un  $i$  tal que  $v$  ocurre libremente en  $\varphi$  a partir de  $i$ . Ya que  $v \neq x_j$  esto nos dice por definición que  $v$  ocurre libremente en  $Qx_j\varphi$  a partir de  $i + |Qx_j|$ , con lo cual  $v \in Li(Qx_j\varphi)$   $\square$

## 9 Semantica de la logica de primer orden

### 9.1 Estructuras de tipo $\tau$

**Definición 49.** Sea  $A$  un conjunto y sea  $n \in \mathbf{N}$ . Por una *operación  $n$ -aria sobre  $A$* , entenderemos una función cuyo dominio es  $A^n$  y cuya imagen está contenida en  $A$ .

**Definición 50.** Sea  $A$  un conjunto y sea  $n \in \mathbf{N}$ . Por una *relación  $n$ -aria sobre  $A$*  entenderemos un subconjunto de  $A^n$ .

**Definición 51.** Sea  $A$  un conjunto,  $n \in \mathbf{N}$  y  $\tau$  un tipo. Una *estructura o modelo de tipo  $\tau$*  sera un par  $\mathbf{A} = (A, i)$  tal que:

1.  $A$  es un conjunto no vacio llamado el *universo* de  $\mathbf{A}$
2.  $i$  es una funcion con dominio  $\mathcal{C} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{R}$  tal que:
  - (a) para cada  $c \in \mathcal{C}$ ,  $i(c)$  es un elemento de  $A$
  - (b) para cada  $f \in \mathcal{F}_n$ ,  $i(f)$  es una operacion  $n$ -aria sobre  $A$
  - (c) para cada  $r \in \mathcal{R}_n$ ,  $i(r)$  es una relacion  $n$ -aria sobre  $A$

**Lema 42.** Dados  $A, B$  conjuntos finitos no vacios, hay  $|B|^{|A|}$  funciones tales que su dominio es  $A$  y su imagen esta contenida en  $B$ .

*Proof.* Notese que a cada elemento  $a \in A$  podemos asignarle cualquier  $b \in B$ , esto nos da facilmente  $|B|^{|A|}$  funciones posibles. Mas formalmente, deberiamos probar que la siguiente funcion es biyectiva:

$$F : \{f : D_f = A \text{ y } I_f \subseteq B\} \rightarrow B^{|A|}$$

$$f \rightarrow (f(a_1), \dots, f(a_n))$$

Lo cual es bastante facil de hacer. □

## 9.2 El valor de un termino de una estructura

**Definición 52.** Sea  $\mathbf{A} = (A, i)$  una estructura de tipo  $\tau$ . Una *asignacion* de  $\mathbf{A}$  sera un elemento de  $A^{\mathbf{N}} = \{\text{infinituplas de elementos de } A\}$ . Si  $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots)$  es una asignacion, entonces diremos que  $a_j$  es el valor que  $\vec{a}$  le asigna a la variable  $x_j$

**Definición 53.** Sea  $\mathbf{A} = (A, i)$  una estructura de tipo  $\tau$ ,  $t \in T^\tau$  y  $\vec{a} \in A^{\mathbf{N}}$  una asignacion, definimos recursivamente  $t^{\mathbf{A}}[\vec{a}]$ :

1. Si  $t = x_i \in Var$ , entonces  $t^{\mathbf{A}}[\vec{a}] = a_i$
2. Si  $t = c \in \mathcal{C}$ , entonces  $t^{\mathbf{A}}[\vec{a}] = i(c)$
3. Si  $t = f(t_1, \dots, t_n)$  con  $f \in \mathcal{F}_n, n \geq 1$  y  $t_1, \dots, t_n \in T^\tau$ , entonces  $t^{\mathbf{A}}[\vec{a}] = i(f)(t_1^{\mathbf{A}}[\vec{a}], \dots, t_n^{\mathbf{A}}[\vec{a}])$

El elemento  $t^{\mathbf{A}}[\vec{a}]$  sera llamado el *valor de  $t$  en la estructura  $\mathbf{A}$  para la asignacion  $\vec{a}$*

**Lema 43.** Sea  $\mathbf{A}$  una estructura de tipo  $\tau$  y sea  $t \in T^\tau$ . Supongamos que  $\vec{a}, \vec{b}$  son asignaciones tales que  $a_i = b_i$ , cada vez que  $x_i$  ocurra en  $t$ . Entonces  $t^{\mathbf{A}}[\vec{a}] = t^{\mathbf{B}}[\vec{b}]$

*Proof.* Sea  $\text{Teo}_k$  la proposición que dice que el lema vale para  $t \in T_k^\tau$ .

$\text{Teo}_0$  es fácil de probar (constantes no cambian con las asignaciones, y las simples variables obviamente tendrán el mismo valor).

Veamos  $\text{Teo}_k \implies \text{Teo}_{k+1}$ . Supongamos  $t \in T_{k+1}^\tau - T_k^\tau$  y sean  $\vec{a}, \vec{b}$  asignaciones tales que  $a_i = b_i$  cada vez que  $x_i$  ocurra en  $t$ . Notese que  $t = f(t_1, \dots, t_n)$ , con  $f \in \mathcal{F}_n, n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T_k^\tau$ . Para cada  $j = 1, \dots, n$  tenemos que  $a_i = b_i$  cada vez que  $x_i$  ocurra en  $t_j$ , entonces por hipótesis inductiva tenemos que

$$t_j^{\mathbf{A}}[\vec{a}] = t_j^{\mathbf{A}}[\vec{b}], j = 1, \dots, n$$

Se tiene entonces que  $t^{\mathbf{A}}[\vec{a}] = i(f)(t_1^{\mathbf{A}}[\vec{a}], \dots, t_n^{\mathbf{A}}[\vec{a}]) = i(f)(t_1^{\mathbf{A}}[\vec{b}], \dots, t_n^{\mathbf{A}}[\vec{b}]) = t^{\mathbf{A}}[\vec{b}]$  □

### 9.3 El valor de verdad de una fórmula en una estructura

**Definición 54.** Sea  $\vec{a} \in A^{\mathbf{N}}$  una asignación y  $a \in A$ , denotaremos con  $\downarrow_i^a(\vec{a})$  a la asignación que resulta de reemplazar en  $\vec{a}$  el  $i$ -ésimo elemento por  $a$ .

**Definición 55.** Sea  $\mathbf{A}$  una estructura de tipo  $\tau$ ,  $\vec{a} \in A^{\mathbf{N}}$  una asignación y  $\varphi \in F^\tau$ , definimos entonces recursivamente la relación  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}]$  (escribiremos  $\mathbf{A} \not\models \varphi[\vec{a}]$  cuando no se da  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}]$ ):

1. Si  $\varphi = (t \equiv s)$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff t^{\mathbf{A}}[\vec{a}] = s^{\mathbf{A}}[\vec{a}]$
2. Si  $\varphi = r(t_1, \dots, t_m)$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff (t_1^{\mathbf{A}}[\vec{a}], \dots, t_m^{\mathbf{A}}[\vec{a}]) \in i(r)$
3. Si  $\varphi = (\varphi_1 \wedge \varphi_2)$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff \mathbf{A} \models \varphi_1[\vec{a}]$  y  $\mathbf{A} \models \varphi_2[\vec{a}]$
4. Si  $\varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2)$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff \mathbf{A} \models \varphi_1[\vec{a}]$  o  $\mathbf{A} \models \varphi_2[\vec{a}]$
5. Si  $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff \mathbf{A} \models \varphi_2[\vec{a}]$  o  $\mathbf{A} \not\models \varphi_1[\vec{a}]$
6. Si  $\varphi = (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff$  ya sea se dan  $\mathbf{A} \models \varphi_1[\vec{a}]$  y  $\mathbf{A} \models \varphi_2[\vec{a}]$  o se dan  $\mathbf{A} \not\models \varphi_1[\vec{a}]$  y  $\mathbf{A} \not\models \varphi_2[\vec{a}]$
7. Si  $\varphi = \neg \varphi_1$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff \mathbf{A} \not\models \varphi_1[\vec{a}]$
8. Si  $\varphi = \forall x_i \varphi_1$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff$  para cada  $a \in A$ , se da que  $\mathbf{A} \models \varphi_1[\downarrow_i^a(\vec{a})]$
9. Si  $\varphi = \exists x_i \varphi_1$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff$  hay un  $a \in A$  tal que  $\mathbf{A} \models \varphi_1[\downarrow_i^a(\vec{a})]$

Cuando se de  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}]$  diremos que la *estructura*  $\mathbf{A}$  *satisface*  $\varphi$  *en la asignacion*  $\vec{a}$  y en tal caso diremos que  $\varphi$  *es verdadera en*  $\mathbf{A}$  *para la asignacion*  $\vec{a}$ .

Cuando se de  $\mathbf{A} \not\models \varphi[\vec{a}]$  diremos que la *estructura*  $\mathbf{A}$  *no satisface*  $\varphi$  *en la asignacion*  $\vec{a}$  y en tal caso diremos que  $\varphi$  *es falsa en*  $\mathbf{A}$  *para la asignacion*  $\vec{a}$ .

Tambien hablaremos del *valor de verdad de*  $\varphi$  *en*  $\mathbf{A}$  *para la asignacion*  $\vec{a}$  el cual sera igual a 1 si se da  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}]$  y 0 en caso contrario.

**Lema 44.** *Supongamos que  $\vec{a}, \vec{b}$  son asignaciones tales que si  $x_i \in Li(\varphi)$ , entonces  $a_i = b_i$ . Entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff \mathbf{A} \models \varphi[\vec{b}]$*

*Proof.* TODO □

**Corolario 45.** *Si  $\varphi$  es una sentencia, entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff \mathbf{A} \models \varphi[\vec{b}]$ , cualesquiera sean las asignaciones  $\vec{a}, \vec{b}$*

*Proof.* Trivial ya que las sentencias no tienen variables libres, y por lo tanto aplica el lema anterior. □

**Definición 56.** Dada una sentencia  $\varphi$ , diremos que  $\varphi$  es *verdadera* en  $\mathbf{A}$  cuando su valor de verdad sea 1, y, en caso de que su valor de verdad sea 0, diremos que es *falsa*

Ademas una sentencia de tipo  $\tau$  sera llamada *universalmente valida* si es verdadera en cada modelo de tipo  $\tau$

## 9.4 Equivalencia de formulas

**Definición 57.** Dadas  $\varphi, \psi \in F^\tau$  diremos que  $\varphi$  y  $\psi$  son *equivalentes* cuando se de la siguiente condicion:

$$\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff \mathbf{A} \models \psi[\vec{a}], \text{ para cada modelo de tipo } \tau, \mathbf{A} \text{ y cada } \vec{a} \in A^{\mathbf{N}}$$

Escribiremos  $\varphi \sim \psi$  cuando  $\varphi$  y  $\psi$  sean equivalentes. Notese que  $\sim$  es una relacion de equivalencia.

**Lema 46.** *Son validas las siguientes propiedades:*

1. Si  $Li(\phi) \cup Li(\psi) \subseteq \{x_{i_1}, \dots, x_{i_n}\}$ , entonces  $\phi \sim \psi \iff$  la sentencia  $\forall x_{i_1}, \dots, \forall x_{i_n}(\phi \leftrightarrow \psi)$  es universalmente valida
2. Si  $\phi_i \sim \psi_i, i = 1, 2$ , entonces  $\neg\phi_1 \sim \neg\psi_1, (\phi_1 \wedge \phi_2) \sim (\psi_1 \wedge \psi_2)$  y  $Qv\phi_1 \sim Qv\psi_1$



3. Si  $\phi \sim \psi$  y  $\alpha'$  es el resultado de reemplazar en una formula  $\alpha$  algunas (posiblemente 0) ocurrencias de  $\phi$  por  $\psi$ , entonces  $\alpha \sim \alpha'$

*Proof.* TODO □

## 9.5 Homomorfismos

**Definición 58.** Dado un modelo de tipo  $\tau$ ,  $\mathbf{A} = (A, i)$ , para cada  $s \in \mathcal{C} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{R}$ , usaremos  $s^{\mathbf{A}}$  para denotar a  $i(s)$ .

**Definición 59.** Sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  modelos de tipo  $\tau$ . Una funcion  $F: A \rightarrow B$  sera un *homomorfismo de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$*  si se cumplen las siguientes:

1.  $F(c^{\mathbf{A}}) = c^{\mathbf{B}}$ , para todo  $c \in \mathcal{C}$
2.  $F(f^{\mathbf{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathbf{B}}(F(a_1), \dots, F(a_n))$ , para cada  $f \in \mathcal{F}_n, a_1, \dots, a_n \in A$
3.  $a_1, \dots, a_n \in r^{\mathbf{A}}$  implica  $(F(a_1), \dots, F(a_n)) \in r^{\mathbf{B}}$ , para todo  $r \in \mathcal{R}_n, a_1, \dots, a_n \in A$

Un *isomorfismo de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$*  sera un homomorfismo de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$  el cual sea biyectivo y cuya inversa sea un homomorfismo de  $\mathbf{B}$  en  $\mathbf{A}$ . Diremos que los modelos  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{B}$  son *isomorfos* (en simbolos:  $\mathbf{A} \cong \mathbf{B}$ ) cuando haya un isomorfismo  $F$  de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$ .

Diremos que  $F: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  es un *homomorfismo* para expresar que  $F$  es un homomorfismo de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$

Diremos que  $F: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  es un *isomorfismo* para expresar que  $F$  es un isomorfismo de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$

**Lema 47.** Sea  $F: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  un homomorfismo. Entonces

$$F(t^{\mathbf{A}}[(a_1, a_2, \dots)]) = t^{\mathbf{B}}[(F(a_1), F(a_2), \dots)]$$

para cada  $t \in T^\tau, (a_1, a_2, \dots) \in A^{\mathbf{N}}$

*Proof.* TODO □

**Lema 48.** Supongamos que  $F: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  es un isomorfismo. Sea  $\varphi \in F^\tau$ . Entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[(a_1, a_2, \dots)] \iff \mathbf{B} \models \varphi[(F(a_1), F(a_2), \dots)]$$

para cada  $(a_1, a_2, \dots) \in A^{\mathbf{N}}$ . En particular  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{B}$  satisfacen las mismas sentencias de tipo  $\tau$ .

*Proof.* TODO □

## 10 Notacion declaratoria para terminos

**Definición 60.** Sea  $t$  un termino de tipo  $\tau$ , entonces escribiremos  $t =_d t(v_1, \dots, v_n)$  para declarar que  $v_1, \dots, v_n$  son variables distintas tales que toda variable que ocurre en  $t$  pertenece a  $\{v_1, \dots, v_n\}$

**Convencion 1.** Cuando hayamos hecho la declaracion  $t =_d t(v_1, \dots, v_n)$ , si  $P_1, \dots, P_n$  son palabras cualesquiera, entonces  $t(P_1, \dots, P_n)$  denotara la palabra que resulta de reemplazar simultaneamente cada ocurrencia de  $v_1$  por  $P_1$ ,  $\dots$ , cada ocurrencia de  $v_n$  por  $P_n$

**Convencion 2.** Cuando hayamos declarado  $t =_d t(v_1, \dots, v_n)$ , si  $\mathbf{A}$  es un modelo de tipo  $\tau$  y  $a_1, \dots, a_n \in A$ , entonces con  $t^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n]$  denotaremos al elemento  $t^{\mathbf{A}}[\vec{b}]$ , donde  $\vec{b}$  es una asignacion tal que a cada  $v_i$  le asigna el valor  $a_i$

**Lema 49.** Sea  $\tau$  un tipo cualquiera y supongamos  $t \in T^\tau$ . Si  $t =_d t(v_1, \dots, v_n)$ , entonces se da alguna de las siguientes:

1.  $t = c$ , para algun  $c \in \mathcal{C}$
2.  $t = v_j$ , para algun  $j$
3.  $t = f(t_1, \dots, t_m)$ , con  $f \in \mathcal{F}_m$  y  $t_1, \dots, t_m \in T^\tau$  tales que las variables que ocurren en cada uno de ellos estan en  $\{v_1, \dots, v_n\}$

*Proof.* TODO □

**Convencion 3.** Cuando hayamos declarado  $t =_d t(v_1, \dots, v_n)$  y se de el caso (3) del lema anterior, tendremos hechas las declaraciones  $t_1 =_d t_1(v_1, \dots, v_n), \dots, t_m =_d t_m(v_1, \dots, v_n)$

**Lema 50.** Sea  $\tau$  un tipo cualquiera y  $t \in T^\tau$ . Supongamos  $t =_d t(v_1, \dots, v_n)$ . Sea  $\mathbf{A}$  un modelo de tipo  $\tau$ . Sean  $a_1, \dots, a_n \in A$ . Se tiene que:

1. Si  $t = c$ , entonces  $t^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n] = c^{\mathbf{A}}$
2. Si  $t = v_j$ , entonces  $t^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n] = a_j$
3. Si  $t = f(t_1, \dots, t_m)$ , con  $f \in \mathcal{F}_m$  y  $t_1, \dots, t_m \in T^\tau$ , entonces

$$t^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n] = f^{\mathbf{A}}(t_1^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n], \dots, t_m^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n])$$

*Proof.* TODO □

## 11 Notacion declaratoria para formulas

**Definición 61.** Si  $\varphi$  es una formula de tipo  $\tau$ , entonces escribiremos  $\varphi =_d \varphi(v_1, \dots, v_n)$  para declarar que  $v_1, \dots, v_n$  son variables distintas tales que  $Li(\varphi) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$ .

**Convencion 4.** Cuando hayamos hecho la declaracion  $\varphi =_d \varphi(v_1, \dots, v_n)$ , si  $P_1, \dots, P_n$  son palabras cualesquiera, entonces  $\varphi(P_1, \dots, P_n)$  denotaria la palabra que resulta de reemplazar simultaneamente cada ocurrencia libre de  $v_1$  en  $\varphi$  por  $P_1$ ,  $\dots$ , cada ocurrencia libre de  $v_n$  en  $\varphi$  por  $P_n$ .

**Convencion 5.** Cuando hayamos declarado  $\varphi =_d \varphi(v_1, \dots, v_n)$ , si  $\mathbf{A}$  es un modelo de tipo  $\tau$  y  $a_1, \dots, a_n \in A$ , entonces  $\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n]$  significara que  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{b}]$ , donde  $\vec{b}$  es una asignacion tal que a cada  $v_i$  le asigna el valor  $a_i$ . En general,  $\mathbf{A} \not\models \varphi[a_1, \dots, a_n]$  significara que no sucede  $\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n]$ .

**Lema 51.** Sea  $\tau$  un tipo cualquiera y  $\varphi \in F^\tau$ . Supongamos  $\varphi =_d \varphi(v_1, \dots, v_n)$ , entonces se cumple una y solo una de las siguientes:

1.  $\varphi = (t \equiv s)$ , con  $t, s \in T^\tau$ , unicos y tales que las variables que ocurren en  $t$  o en  $s$  estan todas en  $\{v_1, \dots, v_n\}$
2.  $\varphi = r(t_1, \dots, t_m)$ , con  $r \in \mathcal{R}_m$  y  $t_1, \dots, t_m \in T^\tau$ , unicos y tales que las variables que ocurren en cada  $t_i$  estan todas en  $\{v_1, \dots, v_n\}$
3.  $\varphi = (\varphi_1 \wedge \varphi_2)$ , con  $\varphi_1, \varphi_2 \in F^\tau$ , unicas y tales que  $Li(\varphi_1) \cup Li(\varphi_2) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$
4.  $\varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2)$ , con  $\varphi_1, \varphi_2 \in F^\tau$ , unicas y tales que  $Li(\varphi_1) \cup Li(\varphi_2) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$
5.  $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ , con  $\varphi_1, \varphi_2 \in F^\tau$ , unicas y tales que  $Li(\varphi_1) \cup Li(\varphi_2) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$
6.  $\varphi = (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$ , con  $\varphi_1, \varphi_2 \in F^\tau$ , unicas y tales que  $Li(\varphi_1) \cup Li(\varphi_2) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$
7.  $\varphi = \neg\varphi_1$ , con  $\varphi_1 \in F^\tau$ , unica y tal que  $Li(\varphi_1) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$
8.  $\varphi = \forall v_j \varphi_1$ , con  $v_j \in \{v_1, \dots, v_n\}$ , y  $\varphi_1 \in F^\tau$ , unica y tal que  $Li(\varphi_1) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$
9.  $\varphi = \forall v_j \varphi_1$ , con  $v_j \in Var - \{v_1, \dots, v_n\}$ , y  $\varphi_1 \in F^\tau$ , unica y tal que  $Li(\varphi_1) \subseteq \{v_1, \dots, v_n, v\}$
10.  $\varphi = \exists v_j \varphi_1$ , con  $v_j \in \{v_1, \dots, v_n\}$ , y  $\varphi_1 \in F^\tau$ , unica y tal que  $Li(\varphi_1) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$
11.  $\varphi = \exists v_j \varphi_1$ , con  $v_j \in Var - \{v_1, \dots, v_n\}$ , y  $\varphi_1 \in F^\tau$ , unica y tal que  $Li(\varphi_1) \subseteq \{v_1, \dots, v_n, v\}$

*Proof.* TODO □

**Convencion 6.** Cuando hayamos declarado  $\varphi =_d \varphi(v_1, \dots, v_n)$  entonces:

- Si se da el caso (1) del lema anterior, supondremos tacitamente que tambien hemos hecho las declaraciones  $t =_d t(v_1, \dots, v_n)$  y  $s =_d s(v_1, \dots, v_n)$
- Si se da el caso (2) del lema anterior, supondremos tacitamente que tambien hemos hecho las declaraciones  $t_1 =_d t_1(v_1, \dots, v_n), \dots, t_m =_d t_m(v_1, \dots, v_n)$
- Si se da alguno de los casos (3), (4), (5) o (6) del lema anterior, supondremos tacitamente que tambien hemos hecho las declaraciones  $\varphi_1 =_d \varphi_1(v_1, \dots, v_n)$  y  $\varphi_2(v_1, \dots, v_n)$
- Si se da alguno de los casos (7), (8) o (10) del lema anterior, supondremos tacitamente que tambien hemos hecho la declaracion  $\varphi_1 =_d \varphi_1(v_1, \dots, v_n)$
- Si se da alguno de los casos (9) u (11) del lema anterior, supondremos tacitamente que tambien hemos hecho la declaracion  $\varphi_1 =_d \varphi_1(v_1, \dots, v_n, v)$

**Lema 52.** *Supongamos  $\varphi =_d \varphi(v_1, \dots, v_n)$ . Sea  $\mathbf{A} = (A, i)$  un modelo de tipo  $\tau$  y sean  $a_1, \dots, a_n \in A$ . Entonces:*

1. Si  $\varphi = (t \equiv s)$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff t^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n] = s^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n]$$

2. Si  $\varphi = r(t_1, \dots, t_m)$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff (t_1^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n], \dots, t_m^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n]) \in r^{\mathbf{A}}$$

3. Si  $\varphi = (\varphi_1 \wedge \varphi_2)$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathbf{A} \models \varphi_1[a_1, \dots, a_n] \text{ y } \mathbf{A} \models \varphi_2[a_1, \dots, a_n]$$

4. Si  $\varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2)$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathbf{A} \models \varphi_1[a_1, \dots, a_n] \text{ o } \mathbf{A} \models \varphi_2[a_1, \dots, a_n]$$

5. Si  $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathbf{A} \models \varphi_2[a_1, \dots, a_n] \text{ o } \mathbf{A} \not\models \varphi_1[a_1, \dots, a_n]$$

6. Si  $\varphi = (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \text{ya sea se dan } \mathbf{A} \models \varphi_1[a_1, \dots, a_n] \text{ y } \mathbf{A} \models \varphi_2[a_1, \dots, a_n], \text{ o se dan } \mathbf{A} \not\models \varphi_1[a_1, \dots, a_n] \text{ y } \mathbf{A} \not\models \varphi_2[a_1, \dots, a_n]$$

7. Si  $\varphi = \neg\varphi_1$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathbf{A} \not\models \varphi_1[a_1, \dots, a_n]$$

8. Si  $\varphi = \forall v_j \varphi_1$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathbf{A} \models \varphi_1[a_1, \dots, a_{j-1}, a, a_{j+1}, \dots, a_n], \text{ para todo } a \in A$$

9. Si  $\varphi = \forall v \varphi_1$ , con  $v \notin \{v_1, \dots, v_n\}$  y  $\varphi_1 =_d \varphi_1(v_1, \dots, v_n, v)$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathbf{A} \models \varphi_1[a_1, \dots, a_n, a], \text{ para todo } a \in A$$

10. Si  $\varphi = \exists v_j \varphi_1$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathbf{A} \models \varphi_1[a_1, \dots, a_{j-1}, a, a_{j+1}, \dots, a_n], \text{ para algun } a \in A$$

11. Si  $\varphi = \exists v \varphi_1$ , con  $v \notin \{v_1, \dots, v_n\}$  y  $\varphi_1 =_d \varphi_1(v_1, \dots, v_n, v)$ , entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \iff \mathbf{A} \models \varphi_1[a_1, \dots, a_n, a], \text{ para algun } a \in A$$

*Proof.* Se acepta sin demostracion

□

## Dos teoremas de reemplazo

**Teorema 53** (De reemplazo para terminos).

Supongamos  $t =_d t(w_1, \dots, w_k)$ ,  $s_1 =_d s_1(v_1, \dots, v_n), \dots, s_k =_d s_k(v_1, \dots, v_n)$ . Todas las variables de  $t(s_1, \dots, s_k)$  estan en  $\{v_1, \dots, v_n\}$  y si declaramos  $t(s_1, \dots, s_k) =_d t(s_1, \dots, s_k)(v_1, \dots, v_n)$ , entonces para cada estructura  $\mathbf{A}$  y  $a_1, \dots, a_n \in A$  se tiene que:

$$t(s_1, \dots, s_k)^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n] = t^{\mathbf{A}}[s_1^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n], \dots, s_k^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n]]$$

*Proof.* Se acepta sin demostracion

□

**Definición 62.** Sea  $\varphi \in F^T$ ,  $v, w \in Var$ . Diremos que  $v$  es *sustituible por  $w$  en  $\varphi$*  cuando ninguna ocurrencia libre de  $v$  en  $\varphi$  sucede dentro de una ocurrencia de una subformula de la forma  $Qw\psi$  en  $\varphi$ .

**Lema 54.** Sea  $\varphi \in F^T$ ,  $v, w \in Var$ . Se cumplen las siguientes propiedades:

1. Si  $\varphi$  es atomica, entonces  $v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi$
2. Si  $\varphi = (\varphi_1 \eta \varphi_2)$ , entonces  $v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi \iff v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi_1$  y  $\varphi_2$
3. Si  $\varphi = \neg\varphi_1$ , entonces  $v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi \iff v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi_1$

4. Si  $\varphi = Qv\varphi_1$ , entonces  $v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi$
5. Si  $\varphi = Qw\varphi_1$  y  $v \in Li(\varphi_1)$ , entonces  $v$  no es sustituible por  $w$  en  $\varphi$
6. Si  $\varphi = Qw\varphi_1$  y  $v \notin Li(\varphi_1)$ , entonces  $v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi$
7. Si  $\varphi = Qu\varphi_1$ , con  $u \neq v, w$ , entonces  $v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi \iff v$  es sustituible por  $w$  en  $\varphi_1$

*Proof.* TODO □

**Teorema 55.** Supongamos  $\varphi =_d \varphi(w_1, \dots, w_k), t_1 =_d t_1(v_1, \dots, v_n), \dots, t_k =_d t_k(v_1, \dots, v_n)$  y supongamos además que cada  $w_j$  es sustituible por  $t_j$  en  $\varphi$ . Entonces:

1.  $Li(\varphi(t_1, \dots, t_k)) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$
2. Si declaramos  $\varphi(t_1, \dots, t_k) =_d \varphi(t_1, \dots, t_k)(v_1, \dots, v_n)$ , entonces para cada estructura  $\mathbf{A}$  y  $\vec{a} \in A^n$  se tiene

$$\mathbf{A} \models \varphi(t_1, \dots, t_k)[\vec{a}] \iff \mathbf{A} \models \varphi[t_1^{\mathbf{A}}[\vec{a}], \dots, t_k^{\mathbf{A}}[\vec{a}]]$$

*Proof.* Se acepta sin demostración □

## Elementos definibles

**Definición 63.** Sea  $\mathbf{A}$  un modelo de tipo  $\tau$ . Diremos que un elemento  $a$  de  $A$  es *definible* en  $\mathbf{A}$  si hay una fórmula  $\varphi =_d \varphi(v)$  tal que  $\mathbf{A} \models \varphi[a]$  y para cada  $b \in A - \{a\}$  se tiene que  $\mathbf{A} \not\models \varphi[b]$ . Es decir,  $a$  es el único elemento de  $A$  que cumple  $\mathbf{A} \models \varphi[a]$ . En tal caso también diremos que  $\varphi$  *define*  $a$  en  $\mathbf{A}$ .

## 12 Teorías de primer orden

**Definición 64.** Una *teoría de primer orden* será un par  $(\Sigma, \tau)$ , donde  $\tau$  es un tipo y  $\Sigma$  es un conjunto de sentencias de tipo  $\tau$ . Los elementos de  $\Sigma$  serán llamados *axiomas propios* de  $(\Sigma, \tau)$ . Un *modelo* de  $(\Sigma, \tau)$  será una estructura de tipo  $\tau$  la cual satisfaga todos los axiomas propios de  $(\Sigma, \tau)$ .

## 13 Definicion del concepto de prueba

### 13.1 Reglas

**Definición 65.** Definiremos una serie de conjuntos los cuales poseen informacion deductiva basica. Sea  $T_c^\tau$  el conjunto de los terminos cerrados de tipo  $\tau$ . Sean

- (1)  $Partic^\tau = \{(\forall v\varphi(v), \varphi(t)) : \varphi =_d \varphi(v) \in F^\tau \text{ y } t \in T_c^\tau\}$
- (2)  $Exist^\tau = \{(\varphi(t), \exists v\varphi(v)) : \varphi =_d \varphi(v) \in F^\tau \text{ y } t \in T_c^\tau\}$
- (3)  $Evoc^\tau = \{(\varphi, \varphi) : \varphi \in S^\tau\}$
- (4)  $Absur^\tau = \{((\neg\varphi \rightarrow (\psi \wedge \neg\psi)), \varphi) : \varphi, \psi \in S^\tau\} \cup \{((\varphi \rightarrow (\psi \wedge \neg\psi)), \neg\varphi) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$
- (5)  $ConjElim^\tau = \{((\varphi \wedge \psi), \varphi) : \varphi, \psi \in S^\tau\} \cup \{((\varphi \wedge \psi), \psi) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$
- (6)  $EquivElim^\tau = \{((\varphi \leftrightarrow \psi), (\varphi \rightarrow \psi)) : \varphi, \psi \in S^\tau\} \cup \{((\varphi \leftrightarrow \psi), (\psi \rightarrow \varphi)) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$
- (7)  $DisjInt^\tau = \{(\varphi, (\varphi \vee \psi)) : \varphi, \psi \in S^\tau\} \cup \{(\psi, (\varphi \vee \psi)) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$

Diremos que  $\varphi$  se deduce de  $\psi$  por la regla de *particularizacion* (resp. *existencia*, *evocacion*, *absurdo*, *conjuncion-eliminacion*, *equivalencia-eliminacion*, *disjuncion-introduccion*), con respecto a  $\tau$  para expresar que  $(\psi, \varphi) \in Partic^\tau$  (resp.  $Exist^\tau, Evoc^\tau, Absur^\tau, ConjElim^\tau, EquivElim^\tau, DisjInt^\tau$ ).

Sea

$$Commut^\tau = Commut1^\tau \cup Commut2^\tau$$

donde

$$Commut1^\tau = \{((t \equiv s), (s \equiv t)) : s, t \in T_c^\tau\}$$

$$Commut2^\tau = \{((\varphi \leftrightarrow \psi), (\psi \leftrightarrow \varphi)) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$$

Diremos que  $\varphi$  se deduce de  $\psi$  por regla de *commutatividad*, con respecto a  $\tau$  para expresar que  $(\psi, \varphi) \in Commut^\tau$

Sean

$$ModPon^\tau = \{(\varphi, (\varphi \rightarrow \psi), \psi) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$$

$$ConjInt^\tau = \{(\varphi, \psi, (\varphi \wedge \psi)) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$$

$$EquivInt^\tau = \{((\varphi \rightarrow \psi), (\psi \rightarrow \varphi), (\varphi \leftrightarrow \psi)) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$$

$$DisjElim^\tau = \{(\neg\varphi, (\varphi \vee \psi), \psi) : \varphi, \psi \in S^\tau\} \cup \{(\neg\psi, (\varphi \vee \psi), \varphi) : \varphi, \psi \in S^\tau\}$$

Diremos que  $\varphi$  se deduce de  $\psi_1$  y  $\psi_2$  por la regla de *Modus Ponens* (resp. *conjuncion-introduccion*, *equivalencia-introduccion*, *disjuncion-eliminacion*), con respecto a  $\tau$  para expresar que  $(\psi_1, \psi_2, \varphi) \in ModPon^\tau$  (resp.  $ConjInt^\tau$ ,  $EquivInt^\tau$ ,  $DisjElim^\tau$ ).

Sea

$$DivPorCas^\tau = \{((\varphi_1 \vee \varphi_2), (\varphi_1 \rightarrow \psi), (\varphi_2 \rightarrow \psi), \psi) : \varphi_1, \varphi_2, \psi \in S^\tau\}$$

Diremos que  $\varphi$  se deduce de  $\psi_1, \psi_2, \psi_3$  por la regla de *division por casos* con respecto a  $\tau$  para expresar que  $(\psi_1, \psi_2, \psi_3, \varphi) \in DivPorCas^\tau$ .

Sea

$$Reemp^\tau = Reemp1^\tau \cup Reemp2^\tau$$

donde

$$Reemp1^\tau = \{((t \equiv s), \gamma, \hat{\gamma}) : s, t \in T_c^\tau, \gamma \in S^\tau, \hat{\gamma} = \text{resultado de reemplazar en } \gamma \text{ una ocurrencia de } t \text{ por } s\}$$

$$Reemp2^\tau = \{(\forall v_1 \dots v_n (\varphi \leftrightarrow \psi), \gamma, \hat{\gamma}) : \varphi, \psi \in F^\tau, Li(\varphi) = Li(\psi) = \{v_1, \dots, v_n, n \geq 0, \gamma \in S^\tau,$$

$$\hat{\gamma} = \text{resultado de reemplazar en } \gamma \text{ una ocurrencia de } \varphi \text{ por } \psi\}$$

Diremos que  $\varphi$  se deduce de  $\psi_1, \psi_2$  por la regla de *reemplazo*, con respecto a  $\tau$  para expresar que  $(\psi_1, \psi_2, \varphi) \in Reemp^\tau$ .

Sea

$$Trans^\tau = Trans1^\tau \cup Trans2^\tau \cup Trans3^\tau$$



donde

$$Trans1^\tau = \{((t \equiv s), (s \equiv u), (t \equiv u)) : t, s, u \in T_c^\tau\}$$

$$Trans2^\tau = \{((\varphi \rightarrow \psi), (\psi \rightarrow \Phi), (\varphi \rightarrow \Phi)) : \varphi, \psi, \Phi \in S^\tau\}$$

$$Trans3^\tau = \{((\varphi \leftrightarrow \psi), (\psi \leftrightarrow \Phi), (\varphi \leftrightarrow \Phi)) : \varphi, \psi, \Phi \in S^\tau\}$$

Diremos que  $\varphi$  se deduce de  $\psi_1, \psi_2$  por la regla de *transitividad*, con respecto a  $\tau$  para expresar que  $(\psi_1, \psi_2, \varphi) \in Trans^\tau$ .

Sea

$$Generaliz^\tau = \{(\psi, \forall v \hat{\psi}) : \psi \in S^\tau, v \text{ no ocurre en } \psi \text{ y existe } c \in \mathcal{C} \text{ tal que } c \text{ ocurre en } \psi \text{ y}$$

$$\hat{\psi} = \text{resultado de reemplazar en } \psi \text{ cada ocurrencia de } c \text{ por } v\}$$

**Lema 56.** Si  $(\varphi_1, \varphi_2) \in Generaliz^\tau$ , entonces el nombre de constante  $c$  del cual habla la definicion de  $Generaliz^\tau$  esta univocamente determinado por el par  $(\varphi_1, \varphi_2)$

*Proof.* Notese que  $c$  es el unico nombre de constante que ocurre en  $\varphi_1$  y no ocurre en  $\varphi_2$ . □

Escribiremos  $(\varphi_1, \varphi_2) \in Generaliz^\tau$  via  $c$  para expresar que  $(\varphi_1, \varphi_2) \in Generaliz^\tau$  y que  $c$  es el unico nombre de constante que ocurre en  $\varphi_1$  y no ocurre en  $\varphi_2$ . Diremos que  $\varphi_2$  se deduce de  $\varphi_1$  por la regla de *generalizacion con nombre de constante  $c$* , con respecto a  $\tau$ , para expresar que  $(\varphi_1, \varphi_2) \in Generaliz^\tau$  via  $c$ .

Sea

$$Elec^\tau = \{(\exists v \varphi(v), \varphi(e)) : \varphi =_d \varphi(v) \in F^\tau, Li(\varphi) = \{v\}, \text{ y } e \in \mathcal{C} \text{ no ocurre en } \varphi\}$$

**Lema 57.** Si  $(\varphi_1, \varphi_2) \in Elec^\tau$ , entonces el nombre de constante  $e$  del cual habla la definicion de  $Elec^\tau$  esta univocamente determinado por el par  $(\varphi_1, \varphi_2)$

*Proof.* Notese que  $e$  es el unico nombre de constante que ocurre en  $\varphi_2$  pero no en  $\varphi_1$ . Esto es porque en la definicion,  $Li(\varphi) = \{v\}$ , por lo tanto sabemos que  $e$  va a ocurrir en  $\varphi_2$ . □

Escribiremos  $(\varphi_1, \varphi_2) \in Elec^\tau$  via  $e$  para expresar que  $(\varphi_1, \varphi_2) \in Elec^\tau$  y que  $e$  es el unico nombre de constante que ocurre en  $\varphi_2$  y no ocurre en  $\varphi_1$ . Diremos que  $\varphi_2$  se deduce de  $\varphi_1$  por la

regla de *eleccion con nombre de constante*  $e$ , con respecto a  $\tau$ , para expresar que  $(\varphi_1, \varphi_2) \in Elec^\tau$  via  $e$ .

**Lema 58.** *Sea  $\tau$  un tipo. Todas las reglas excepto las reglas de eleccion y generalizacion son universales en el sentido que si  $\varphi$  se deduce de  $\psi_1, \dots, \psi_k$  por alguna de estas reglas, entonces  $((\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_k) \rightarrow \varphi)$  es una sentencia valida.*

*Proof.* TODO □

## 13.2 Axiomas logicos

**Definición 66.** Llamaremos *axiomas logicos de tipo  $\tau$*  a todas las sentencias de alguna de las siguientes formas:

- $(\varphi \leftrightarrow \varphi)$
- $(t \equiv t)$
- $(\varphi \vee \neg\varphi)$
- $(\varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi)$
- $(\neg\forall v\psi \leftrightarrow \exists v\neg\psi)$
- $(\neg\exists v\psi \leftrightarrow \forall v\neg\psi)$

donde  $t \in T_c^\tau, \varphi \in S^\tau, \psi \in F^\tau, v \in Var$  y  $Li(\psi) \subseteq \{v\}$ . Con  $AxLog^\tau$  denotaremos el conjunto

$$\{\varphi \in S^\tau : \varphi \text{ es un axioma logico de tipo } \tau\}$$

## 13.3 Justificaciones

**Definición 67.** Llamaremos *numerales a lo siguientes simbolos*:

$$0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9$$

Usaremos  $Num$  para denotar al conjunto de numerales. Notese que  $Num \cap \omega = \emptyset$ . Sea  $S: Num^* \rightarrow Num^*$  definida de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 S(\varepsilon) &= 1 \\
 S(\alpha 0) &= \alpha 1 \\
 S(\alpha 1) &= \alpha 2 \\
 S(\alpha 2) &= \alpha 3 \\
 S(\alpha 3) &= \alpha 4 \\
 S(\alpha 4) &= \alpha 5 \\
 S(\alpha 5) &= \alpha 6 \\
 S(\alpha 6) &= \alpha 7 \\
 S(\alpha 7) &= \alpha 8 \\
 S(\alpha 8) &= \alpha 9 \\
 S(\alpha 9) &= S(\alpha)0
 \end{aligned}$$

Definamos  $-: \omega \rightarrow Num^*$  de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 \bar{0} &= \varepsilon \\
 \overline{n+1} &= S(\bar{n})
 \end{aligned}$$

Sea  $Nombres_1$  el conjunto formado por las siguientes palabras:

EXISTENCIA  
 COMMUTATIVIDAD  
 PARTICULARIZACION  
 ABSURDO  
 EVOCACION  
 CONJUNCIONELIMINACION  
 EQUIVALENCIAELIMINACION  
 DISJUNCIONINTRODUCCION  
 ELECCION

## GENERALIZACION

Sea  $Nombres_2$  el conjunto formado por las siguientes palabras:

MODUSPONENS  
TRANSITIVIDAD  
CONJUNCIONINTRODUCCION  
EQUIVALENCIAINTRODUCCION  
DISJUNCIONELIMINACION  
REEMPLAZO

Una *justificacion basica* es una palabras perteneciente a la union de los siguientes conjuntos de palabras:

$\{\text{CONCLUSION, AXIOMAPROPIO, AXIOMALOGICO}\}$   
 $\{\alpha(\bar{k}) : k \in \mathbf{N} \text{ y } \alpha \in Nombres_1\}$   
 $\{\alpha(\bar{j}, \bar{k}) : j, k \in \mathbf{N} \text{ y } \alpha \in Nombres_2\}$   
 $\{\text{DIVISIONPORCASOS}(\bar{j}, \bar{k}, \bar{l}) : j, k, l \in \mathbf{N}\}$

Usaremos  $JustBas$  para denotar al conjunto formado por todas las justificaciones basicas. Una *justificacion* es una palabra que ya sea es una justificacion basica o pertenece a la union de los siguientes conjuntos de palabras:

$\{\text{HIPOTESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$   
 $\{\text{TESIS}\bar{j}\alpha : j \in \mathbf{N} \text{ y } \alpha \in JustBas\}$

Usaremos  $Just$  para denotar el conjunto formado por todas las justificaciones.

Cabe destacar que los elementos de  $Just$  son palabras del alfabeto formado por los siguientes simbolos:

$( ) , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E G H I J L M N O P Q R S T U V X Z$

### 13.4 Concatenaciones balanceadas de justificaciones

**Lema 59.** Sea  $\mathbf{J} \in Just^+$ . Hay unicos  $n \geq 1$  y  $J_1, \dots, J_n \in Just$  tales que  $\mathbf{J} = J_1 \dots J_n$

*Proof.* Se acepta sin demostracion

□

**Definición 68.** Dada  $\mathbf{J} \in Just^+$ , usaremos  $n(\mathbf{J})$  y  $\mathbf{J}_1, \dots, \mathbf{J}_{n(\mathbf{J})}$  para denotar los unicos  $n$  y  $J_1, \dots, J_n$  cuya existencia garantiza el lema anterior.

**Definición 69.** Dados numeros naturales  $i \leq j$ , usaremos  $\langle i, j \rangle$  para denotar al conjunto  $\{i, i+1, \dots, j\}$ . A los conjuntos de la forma  $\langle i, j \rangle$  los llamaremos *bloques*.

**Definición 70.** Dada  $\mathbf{J} \in Just^+$  definamos:

$$\mathcal{B}^{\mathbf{J}} = \{\langle i, j \rangle \mid \exists k : \mathbf{J}_i = \text{HIPOTESIS}\bar{k} \text{ y } \mathbf{J}_j = \text{TESIS}\bar{k}\alpha \text{ para algun } \alpha \in JustBas\}$$

**Definición 71.** Diremos que  $\mathbf{J} \in Just^+$  es *balanceada* si se dan las siguientes:

1. Por cada  $k \in \mathbf{N}$  a lo sumo hay un  $i$  tal que  $\mathbf{J}_i = \text{HIPOTESIS}\bar{k}$  y a lo sumo hay un  $i$  tal que  $\mathbf{J}_i = \text{TESIS}\bar{k}\alpha$ , con  $\alpha \in JustBas$ .
2. Si  $\mathbf{J}_i = \text{HIPOTESIS}\bar{k}$ , entonces hay un  $l > i$  tal que  $\mathbf{J}_l = \text{TESIS}\bar{k}\alpha$ , con  $\alpha \in JustBas$ .
3. Si  $\mathbf{J}_i = \text{TESIS}\bar{k}\alpha$ , con  $\alpha \in JustBas$ , entonces hay un  $l < i$  tal que  $\mathbf{J}_l = \text{HIPOTESIS}\bar{k}$ .
4. Si  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}^{\mathbf{J}}$ , entonces  $B_1 \cap B_2 = \emptyset$  o  $B_1 \subseteq B_2$  o  $B_2 \subseteq B_1$

### 13.5 Pares adecuados

**Lema 60.** Sea  $\varphi \in S^{\tau+}$ . Hay unicos  $n \geq 1$  y  $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in S^{\tau}$  tales que  $\varphi = \varphi_1 \dots \varphi_n$ .

*Proof.* TODO □

**Definición 72.** Dada  $\varphi \in S^{\tau+}$ , usaremos  $n(\varphi)$  y  $\varphi_1, \dots, \varphi_{n(\varphi)}$  para denotar los unicos  $n$  y  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  cuya existencia garantiza el lema anterior.

**Definición 73.** Un *par adecuado de tipo  $\tau$*  es un par  $(\varphi, \mathbf{J}) \in S^{\tau+} \times Just^+$  tal que  $n(\varphi) = n(\mathbf{J})$  y  $\mathbf{J}$  es balanceada.

Si  $\langle i, j \rangle \in \mathcal{B}^{\mathbf{J}}$ , entonces  $\varphi_i$  sera la *hipotesis* del bloque  $\langle i, j \rangle$  en  $(\varphi, \mathbf{J})$  y  $\varphi_j$  sera la *tesis* del bloque  $\langle i, j \rangle$  en  $(\varphi, \mathbf{J})$ .

Diremos que  $\varphi_i$  esta *bajo la hipotesis  $\varphi_l$*  en  $(\varphi, \mathbf{J})$  o que  $\varphi_l$  es una *hipotesis de  $\varphi_i$*  en  $(\varphi, \mathbf{J})$  cuando haya en  $\mathcal{B}^{\mathbf{J}}$  un bloque de la forma  $\langle l, j \rangle$  el cual contenga a  $i$ .

Sean  $i, j \in \langle 1, n(\varphi) \rangle$ . Diremos que  $i$  es *anterior* a  $j$  en  $(\varphi, \mathbf{J})$  si  $i < j$  y ademas para todo  $B \in \mathcal{B}^{\mathbf{J}}$  se tiene que  $i \in B \Rightarrow j \in B$ .

### 13.6 Dependencia de constantes en pares adecuados

**Definición 74.** Dadas  $e, d \in \mathcal{C}$ , diremos que  $e$  *depende directamente de*  $d$  en  $(\varphi, \mathbf{J})$  si hay numeros  $1 \leq l \leq j \leq n(\varphi)$  tales que:

1.  $l$  es anterior a  $j$  en  $(\varphi, \mathbf{J})$
2.  $\mathbf{J}_j = \alpha \text{ELECCION}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$  y  $(\varphi_l, \varphi_j) \in \text{Elec}^\tau$  via  $e$
3.  $d$  ocurre en  $\varphi_l$

Dados  $e, d \in \mathcal{C}$  diremos que  $e$  *depende de*  $d$  en  $(\varphi, \mathbf{J})$  si existen  $e_0, \dots, e_{k+1} \in \mathcal{C}$ , con  $k \geq 0$  tales que:

1.  $e_0 = e$  y  $e_{k+1} = d$
2.  $e_i$  depende directamente de  $e_{i+1}$  en  $(\varphi, \mathbf{J})$ , para  $i = 0, \dots, k$

### 13.7 Definicion de prueba

**Definición 75.** Sea  $(\Sigma, \tau)$  una teoria de primer orden. Sea  $\varphi$  una sentencia de tipo  $\tau$ . Una *prueba de*  $\varphi$  en  $(\Sigma, \tau)$  sera un par adecuado  $(\varphi, \mathbf{J})$  de algun tipo  $\tau_1 = (\mathcal{C} \cup \mathcal{C}_1, \mathcal{F}, \mathcal{R}, a)$  con  $\mathcal{C}_1$  finito y disjunto con  $\mathcal{C}$  tal que:

1. Cada  $\varphi_i$  es una sentencia de tipo  $\tau_1$
2.  $\varphi_{n(\varphi)} = \varphi$
3. Si  $\langle i, j \rangle \in \mathcal{B}^{\mathbf{J}}$ , entonces  $\varphi_{j+1} = (\varphi_i \rightarrow \varphi_j)$  y  $\mathbf{J}_{j+1} = \alpha \text{CONCLUSION}$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$
4. Para cada  $i = 1, \dots, n(\varphi)$  se da una de las siguientes:
  - (a)  $\mathbf{J}_i = \text{HIPOTESIS}\bar{k}$  para algun  $k \in \mathbf{N}$
  - (b)  $\mathbf{J}_i = \alpha \text{CONCLUSION}$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$  y hay un  $j$  tal que  $\langle j, i-1 \rangle \in \mathcal{B}^{\mathbf{J}}$  y  $\varphi_i = (\varphi_j \rightarrow \varphi_{i-1})$
  - (c)  $\mathbf{J}_i = \alpha \text{AXIOMALOGICO}$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$  y  $\varphi_i$  es un axioma logico de tipo  $\tau_1$
  - (d)  $\mathbf{J}_i = \alpha \text{AXIOMAPROPIO}$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$  y  $\varphi_i \in \Sigma$

- (e)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{PARTICULARIZACION}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{Partic}^{\tau_1}$
- (f)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{COMMUTATIVIDAD}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{Commut}^{\tau_1}$
- (g)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{ABSURDO}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{Absur}^{\tau_1}$
- (h)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{EVOCACION}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{Evoc}^{\tau_1}$
- (i)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{EXISTENCIA}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{Exist}^{\tau_1}$
- (j)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{CONJUNCIONELIMINACION}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{ConjElim}^{\tau_1}$
- (k)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{DISJUNCIONINTRODUCCION}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{DisjElim}^{\tau_1}$
- (l)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{EQUIVALENCIAELIMINACION}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{EquivElim}^{\tau_1}$
- (m)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{MODUSPONENS}(\bar{l}_1, \bar{l}_2)$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l_1$  y  $l_2$  anteriores a  $i$  y  $(\varphi_{l_1}, \varphi_{l_2}, \varphi_i) \in \text{ModPon}^{\tau_1}$
- (n)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{CONJUNCIONINTRODUCCION}(\bar{l}_1, \bar{l}_2)$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l_1$  y  $l_2$  anteriores a  $i$  y  $(\varphi_{l_1}, \varphi_{l_2}, \varphi_i) \in \text{ConjInt}^{\tau_1}$
- (o)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{EQUIVALENCIAINTRODUCCION}(\bar{l}_1, \bar{l}_2)$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l_1$  y  $l_2$  anteriores a  $i$  y  $(\varphi_{l_1}, \varphi_{l_2}, \varphi_i) \in \text{EquivInt}^{\tau_1}$
- (p)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{DISJUNCIONINTRODUCCION}(\bar{l}_1, \bar{l}_2)$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l_1$  y  $l_2$  anteriores a  $i$  y  $(\varphi_{l_1}, \varphi_{l_2}, \varphi_i) \in \text{DisjElim}^{\tau_1}$
- (q)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{REEMPLAZO}(\bar{l}_1, \bar{l}_2)$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l_1$  y  $l_2$  anteriores a  $i$  y  $(\varphi_{l_1}, \varphi_{l_2}, \varphi_i) \in \text{Reemp}^{\tau_1}$
- (r)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{TRANSITIVIDAD}(\bar{l}_1, \bar{l}_2)$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l_1$  y  $l_2$  anteriores a  $i$  y  $(\varphi_{l_1}, \varphi_{l_2}, \varphi_i) \in \text{Trans}^{\tau_1}$
- (s)  $\mathbf{J}_i = \alpha\text{DIVISIONPORCASOS}(\bar{l}_1, \bar{l}_2, \bar{l}_3)$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  
 $l_1, l_2$  y  $l_3$  anteriores a  $i$  y  $(\varphi_{l_1}, \varphi_{l_2}, \varphi_{l_3}, \varphi_i) \in \text{DivPorCas}^{\tau_1}$

- (t)  $\mathbf{J}_i = \alpha \text{ELECCION}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{Elec}^{\tau_1}$  via un nombre de constante  $e$ , el cual no pertenece a  $\mathcal{C}$  y no ocurre en  $\varphi_1, \dots, \varphi_{i-1}$
- (u)  $\mathbf{J}_i = \alpha \text{GENERALIZACION}(\bar{l})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ ,  $l$  anterior a  $i$  y  $(\varphi_l, \varphi_i) \in \text{Generaliz}^{\tau_1}$  via un nombre de constante  $e$ , el cual cumple:
- i.  $c \notin \mathcal{C}$
  - ii. Para cada  $u \in \langle 1, n(\varphi) \rangle$ , si  $\mathbf{J}_u = \alpha \text{ELECCION}(\bar{v})$ , con  $\alpha \in \{\varepsilon\} \cup \{\text{TESIS}\bar{k} : k \in \mathbf{N}\}$ , entonces no se da que  $(\varphi_v, \varphi_u) \in \text{Elec}^{\tau_1}$  via  $c$ .
  - iii.  $c$  no ocurre en ninguna hipótesis de  $\varphi_l$
  - iv. Ningun nombre de constante que ocurra en  $\varphi_l$  o en sus hipótesis, depende de  $c$ .

## 14 El concepto de teorema

**Definición 76.** Cuando haya una prueba de  $\varphi$  en  $(\Sigma, \tau)$ , diremos que  $\varphi$  es un *teorema* de la teoría  $(\Sigma, \tau)$ , y escribiremos  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ .

## 15 Propiedades básicas de pruebas y teoremas

**Lema 61** (Cambio de índice de hipótesis). Sea  $(\varphi, \mathbf{J})$  una prueba formal de  $\varphi$  en  $(\Sigma, \tau)$ . Sea  $m \in \mathbf{N}$  tal que  $\mathbf{J}_i \neq \text{HIPOTESIS}\bar{m}$ , para cada  $i = 1 = \dots, n(\varphi)$ . Supongamos que  $\mathbf{J}_i = \text{HIPOTESIS}\bar{k}$  y que  $\mathbf{J}_j = \text{TESIS}\bar{k}\alpha$ , con  $[\alpha]_1 \notin \text{Num}$ . Sea  $\tilde{\mathbf{J}}$  el resultados de reemplazar en  $\mathbf{J}$  la justificación  $\mathbf{J}_i$  por  $\text{HIPOTESIS}\bar{m}$  y reemplazar la justificación  $\mathbf{J}_j$  por  $\text{TESIS}\bar{m}\alpha$ . Entonces  $(\varphi, \tilde{\mathbf{J}})$  es una prueba formal de  $\varphi$  en  $(\Sigma, \tau)$ .

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

**Lema 62** (Cambio de constantes auxiliares). Sea  $(\varphi, \mathbf{J})$  una prueba formal de  $\varphi$  en  $(\Sigma, \tau)$ . Sea  $\mathcal{C}_1$  el conjunto de nombres de constante que ocurren en  $\varphi$  y que no pertenecen a  $\mathcal{C}$ . Sea  $e \in \mathcal{C}_1$ . Sea  $\tilde{e} \notin \mathcal{C} \cup \mathcal{C}_1$  tal que  $(\mathcal{C} \cup (\mathcal{C}_1 - \{e\}) \cup \{\tilde{e}\}, \mathcal{F}, \mathcal{R}, a)$  es un tipo. Sea  $\tilde{\varphi}_i =$  resultado de reemplazar en  $\varphi_i$  cada ocurrencia de  $e$  por  $\tilde{e}$ . Entonces  $(\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_{n(\varphi)}, \mathbf{J})$  es una prueba forma de  $\varphi$  en  $(\Sigma, \tau)$ .

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

**Lema 63.** Sea  $(\Sigma, \tau)$  una teoría.



1. Si  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi_1, \dots, \varphi_n$  y  $(\Sigma \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}, \tau) \vdash \varphi$ , entonces  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$
2. Si  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi_1, \dots, \varphi_n$  y  $\varphi$  se deduce por alguna regla universal a partir de  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ , entonces  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$
3.  $(\Sigma, \tau) \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$  si y solo si  $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau) \vdash \psi$

*Proof.*

(1) Como  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi_1, \dots, \varphi_n$ , hay una prueba formal  $(s_1 \dots s_{k_i}, J_1 \dots J_{k_i})$  para cada  $\varphi_i$ . Si  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ , terminamos. Sino, comencemos la prueba de  $\varphi$  concatenando las pruebas de todas las  $\varphi_i$ , reasignando los índices correspondientes en las justificaciones. Ahora en esta prueba podemos usar  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  para probar  $\varphi$ . Como  $(\Sigma \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}, \tau) \vdash \tau$ , usamos esa prueba formal seguido de lo que fuimos construyendo, reemplazando los índices correspondientes, y cambiando las apariciones de AXIOMAPROPIO cuando hablamos de alguna  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  por EVOCACION con el índice correspondiente.

(2) En particular, el lema dice que  $(\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}, \tau) \vdash \varphi$ . Por lo tanto  $(\Sigma \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}, \tau) \vdash \varphi$ . Por (1) queda demostrado  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ .

(3) TODO □

## 15.1 Consistencia

**Definición 77.** Una teoría  $(\Sigma, \tau)$  sera *inconsistente* cuando haya una sentencia  $\varphi$  tal que  $(\Sigma, \tau) \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi)$ . Una teoría  $(\Sigma, \tau)$  sera *consistente* cuando no sea inconsistente.

**Lema 64.** Sea  $(\Sigma, \tau)$  una teoría.

1. Si  $(\Sigma, \tau)$  es inconsistente, entonces  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ , para toda sentencia  $\varphi$
2. Si  $(\Sigma, \tau)$  es consistente y  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ , entonces  $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$  es consistente
3. Si  $(\Sigma, \tau) \not\vdash \neg\varphi$ , entonces  $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$  es consistente

*Proof.*

(1) Si  $(\Sigma, \tau)$  es inconsistente, entonces por definicion  $(\Sigma, \tau) \vdash (\psi \wedge \neg\psi)$ . Dada una sentencia cualquiera  $\varphi$ , tenemos que  $\varphi$  se deduce por la regla del absurdo a partir de  $\psi \wedge \neg\psi$ , y por lema anterior  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ .

(2) Supongamos que  $(\Sigma, \tau)$  es consistente y  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ . Si  $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$  fuera inconsistente, entonces  $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau) \vdash (\psi \wedge \neg\psi)$ , y por lema anterior  $(\Sigma, \tau) \vdash (\psi \wedge \neg\psi)$ , **Abs!**

(3) Si  $(\Sigma, \tau)$  fuera inconsistente,  $(\Sigma, \tau) \vdash \neg\varphi$ , **Abs!**. Luego  $(\Sigma, \tau)$  es consistente.  $\square$

**Definición 78.** Dada  $(\Sigma, \tau)$  una teoria, escribiremos  $(\Sigma, \tau) \models \varphi$  cuando  $\varphi$  sea verdadera en todo modelo de  $(\Sigma, \tau)$ .

**Teorema 65** (Teorema de Correccion).  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi \implies (\Sigma, \tau) \models \varphi$

*Proof.* Se acepta sin demostracion  $\square$

**Corolario 66.** Si  $(\Sigma, \tau)$  tiene un modelo, entonces  $(\Sigma, \tau)$  es consistente.

*Proof.* Supongamos **A** es un modelo de  $(\Sigma, \tau)$ . Si  $(\Sigma, \tau)$  fuera inconsistente, tendríamos que hay una  $\varphi \in S^\tau$  tal que  $(\Sigma, \tau) \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi)$ , lo cual por el teorema de Correccion nos diría que **A**  $\models (\varphi \wedge \neg\varphi)$   $\square$

## 16 El algebra de Lindenbaum

**Definición 79.** Sea  $T = (\Sigma, \tau)$  una teoria. Definimos la siguiente relacion sobre  $S^\tau$ .

$$\varphi \dashv\vdash_T \psi \iff T \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$$

**Lema 67.**  $\dashv\vdash_T$  es una relacion de equivalencia

*Proof.* La relacion es reflexiva que  $(\varphi \leftrightarrow \varphi)$  es un axioma logico, y por lo tanto  $((\varphi \leftrightarrow \varphi), \text{AXIOMALOGICO})$  es una prueba formal de  $(\varphi \leftrightarrow \varphi)$  en  $T$ .

La relacion es simetrica, pues supongamos  $\varphi \dashv\vdash_T \psi$ , es decir  $T \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$ . Como  $(\psi \leftrightarrow \varphi)$  se deduce de  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  por la regla de commutatividad, tenemos que  $T \vdash (\psi \leftrightarrow \varphi)$ .

La relacion es transitiva, pues supongamos  $\varphi \dashv\vdash_T \psi$  y  $\psi \dashv\vdash_T \Phi$ . Como  $\varphi \leftrightarrow \Phi$  se deduce de  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ ,  $(\psi \leftrightarrow \Phi)$  por la regla de transitividad, tenemos que  $T \vdash (\varphi \leftrightarrow \Phi)$ .  $\square$

**Definición 80.** Sea  $\tau$  un tipo y  $\varphi \in S^\tau$ . Se dice que  $\varphi$  es *refutable* en  $(\Sigma, \tau)$  si  $(\Sigma, \tau) \vdash \neg\varphi$

**Lema 68.** Dada una teoria  $T = (\Sigma, \tau)$ , se tiene que:

1.  $\{\varphi \in S^\tau : \varphi \text{ es un teorema de } T\} \in S^\tau / \dashv\vdash_T$
2.  $\{\varphi \in S^\tau : \varphi \text{ es refutable en } T\} \in S^\tau / \dashv\vdash_T$

*Proof.* (1) Sean  $\varphi, \psi$  teoremas de  $T$ , veremos que  $\varphi \dashv\vdash_T \psi$ . La siguiente prueba justifica que  $(\Sigma \cup \{\varphi, \psi\}, \tau) \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$

1.	$\varphi$	HIPOTESIS1
2.	$\psi$	TESIS1AXIOMAPROPIO
3.	$(\varphi \rightarrow \psi)$	CONCLUSION
4.	$\psi$	HIPOTESIS2
5.	$\varphi$	TESIS2AXIOMAPROPIO
6.	$(\psi \rightarrow \varphi)$	CONCLUSION
7.	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$	EQUIVALENCIAINTRODUCCION(3, 6)

Y por lo tanto  $(\Sigma, \tau) \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$  lo cual implica  $\varphi \dashv\vdash_T \psi$ .

Ahora veamos que si  $\varphi$  es un teorema de  $T$  y  $\varphi \dashv\vdash_T \psi$ ,  $\psi$  es tambien un teorema de  $T$ . La siguiente prueba justifica que  $(\Sigma \cup \{\varphi, \varphi \leftrightarrow \psi\}) \vdash \psi$ , y por lo tanto  $(\Sigma, \tau) \vdash \psi$ .

1.	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$	AXIOMAPROPIO
2.	$\varphi$	AXIOMAPROPIO
3.	$(\varphi \rightarrow \psi)$	EQUIVALENCIAELIMINACION(1)
3.	$\psi$	MODUSPONENS(2, 3)

(2) Sean  $\varphi, \psi$  refutables en  $T$ , veremos que  $\varphi \dashv\vdash_T \psi$ . La siguiente prueba justifica que  $(\Sigma \cup \{\neg\varphi, \neg\psi\}, \tau) \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$ .

1.	$\varphi$	HIPOTESIS1
2.	$\neg\psi$	HIPOTESIS2
3.	$\neg\varphi$	AXIOMAPROPIO
4.	$(\varphi \wedge \neg\varphi)$	TESIS2CONJUNCIONINTRODUCCION(1, 3)
5.	$(\neg\psi \rightarrow (\varphi \wedge \neg\varphi))$	CONCLUSION
6.	$\psi$	TESIS1ABSURDO(5)
7.	$(\varphi \rightarrow \psi)$	CONCLUSION
8.	$\psi$	HIPOTESIS3
9.	$\neg\varphi$	HIPOTESIS4
10.	$\neg\psi$	AXIOMAPROPIO
11.	$(\psi \wedge \neg\psi)$	TESIS4CONJUNCIONINTRODUCCION(8, 10)
12.	$(\neg\varphi \rightarrow (\psi \wedge \neg\psi))$	CONCLUSION
13.	$\varphi$	TESIS3ABSURDO(5)
14.	$(\psi \rightarrow \varphi)$	CONCLUSION
15.	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$	EQUIVALENCIAINTRODUCCION(7, 14)

Como  $(\Sigma, \tau) \vdash \neg\varphi, \neg\psi$ ,  $(\Sigma, \tau) \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$ , lo cual dice  $\varphi \dashv\vdash_T \psi$ .

Ahora veamos que si  $\varphi$  es refutable en  $T$  y  $\varphi \dashv\vdash_T \psi$ , entonces  $\psi$  tambien es refutable en  $T$ . La siguiente prueba justifica que  $(\Sigma \cup \{\neg\varphi, \varphi \leftrightarrow \psi\}, \tau) \vdash \neg\psi$ , y por lo tanto  $(\Sigma, \tau) \vdash \neg\psi$ .

1.	$\psi$	HIPOTESIS1
2.	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$	AXIOMAPROPIO
3.	$(\psi \rightarrow \varphi)$	EQUIVALENCIAELIMINACION(2)
4.	$\varphi$	MODUSPONENS(1, 3)
5.	$\neg\varphi$	AXIOMAPROPIO
6.	$(\varphi \wedge \neg\varphi)$	TESIS1CONJUNCIONINTRODUCCION(5)
7.	$(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \neg\varphi))$	CONCLUSION
8.	$\neg\psi$	ABSURDO(7)

□

**Definición 81.** Dada una teoria  $T = (\Sigma, \tau)$  y  $\varphi \in S^\tau$ ,  $[\varphi]_T$  denotara la clase de  $\varphi$  con respecto a la relacion de equivalencia  $\dashv\vdash_T$ . Definiremos sobre  $S^\tau / \dashv\vdash_T$  la siguiente operacion binaria  $s^T$ :

$$[\varphi]_T \mathbf{s}^T [\psi]_T = [(\varphi \vee \psi)]_T$$

En forma analoga, definimos una operacion binaria  $i^T$  sobre  $S^\tau / \dashv\vdash_T$ :

$$[\varphi]_T \mathbf{i}^T [\psi]_T = [(\varphi \wedge \psi)]_T$$

Ademas definimos una operacion unaria  $c^T$  sobre  $S^\tau / \dashv\vdash_T$ :

$$([\varphi]_T)^{c^T} = [\neg\varphi]_T$$

Denotaremos ademas con  $1^T$  al conjunto  $\{\varphi \in S^\tau : \varphi \text{ es un teorema de } T\}$  y con  $0^T$  al conjunto  $\{\varphi \in S^\tau : \varphi \text{ es refutable en } T\}$ .

*Observacion 12* ( $s^T$  bien definida). Si  $[\varphi]_T = [\varphi']_T$  y  $[\psi]_T = [\psi']_T$ , entonces  $[(\varphi \vee \psi)]_T = [(\varphi' \vee \psi')]_T$

*Proof.* TODO □

**Teorema 69.** Sea  $T = (\Sigma, \tau)$  una teoria. Entonces  $(S^\tau / \dashv\vdash_T, s^T, i^T, c^T, 0^T, 1^T)$  es un algebra de Boole.

*Proof.* TODO □

**Definición 82.** Dada una teoria  $T = (\Sigma, \tau)$ , denotaremos con  $\mathcal{A}_T$  al algebra de Boole  $(S^\tau / \dashv\vdash_T, s^T, i^T, c^T, 0^T, 1^T)$ . El algebra  $\mathcal{A}_T$  sera llamada el *algebra de Lindenbaum de la teoria T*.

**Lema 70.** Sea  $T$  una teoria y sea  $\leq^T$  el orden parcial asociado al algebra de Boole  $\mathcal{A}_T$  (es decir  $[\varphi]_T \leq^T [\psi]_T \iff [\varphi]_T \mathbf{s}^T [\psi]_T = [\psi]_T$ ), entonces se tiene que:

$$[\varphi]_T \leq^T [\psi]_T \iff T \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$$

*Proof.* TODO □

## 17 Teorema de la completitud

**Lema 71.** Sean  $\tau = (\mathcal{C}, \mathcal{F}, \mathcal{R}, a)$  y  $\tau' = (\mathcal{C}', \mathcal{F}', \mathcal{R}', a')$  tipos. Se cumplen:

1. Si  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}', \mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}', \mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$  y  $a' \upharpoonright_{\mathcal{F} \cup \mathcal{R}} = a$ , entonces  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$  implica  $(\Sigma, \tau') \vdash \varphi$
2. Si  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}', \mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}', \mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$  y  $a' = a$ , entonces  $(\Sigma, \tau') \vdash \varphi$  implica  $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ , cada vez que  $\Sigma \cup \{\varphi\} \subseteq S^\tau$

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

**Lema 72** (Lema del infimo). *Sea  $T = (\Sigma, \tau)$  una teoria y supongamos que  $\tau$  tiene una cantidad infinita de nombres de constante que no ocurren en las sentencias de Sigma. Entonces para cada formula  $\varphi =_d \varphi(v)$ , se tiene que en el algebra de Lindembaym  $\mathcal{A}_T$ :*

$$[\forall v \varphi(v)]_T = \inf(\{[\varphi]_T : t \in T_c^\tau\})$$

*Proof.* TODO □

**Lema 73** (Lema de Coincidencia). *Sea  $\tau = (\mathcal{C}, \mathcal{F}, \mathcal{R}, a)$  y  $\tau' = (\mathcal{C}', \mathcal{F}', \mathcal{R}', a')$  dos tipos cualesquiera y sea  $\tau_\cap = (\mathcal{C}_\cap, \mathcal{F}_\cap, \mathcal{R}_\cap, a_\cap)$  donde:*

$$\mathcal{C}_\cap = \mathcal{C} \cap \mathcal{C}'$$

$$\mathcal{F}_\cap = \{f \in \mathcal{F} \cap \mathcal{F}' : a(f) = a'(f)\}$$

$$\mathcal{R}_\cap = \{r \in \mathcal{R} \cap \mathcal{R}' : a(r) = a'(r)\}$$

$$a_\cap = a|_{\mathcal{F}_\cap \cup \mathcal{R}_\cap}$$

*Entonces  $\tau_\cap$  es un tipo tal que  $T^{\tau_\cap} = T^\tau \cap T^{\tau'}$  y  $F^{\tau_\cap} = F^\tau \cap F^{\tau'}$ . Sean  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{A}'$  modelos de tipo  $\tau$  y  $\tau'$  respectivamente. Supongamos  $A = A'$  y que  $c^\mathbf{A} = c^{\mathbf{A}'}$ , para cada  $c \in \mathcal{C}_\cap$ ,  $f^\mathbf{A} = f^{\mathbf{A}'}$ , para cada  $f \in \mathcal{F}_\cap$  y  $r^\mathbf{A} = r^{\mathbf{A}'}$ , para cada  $r \in \mathcal{R}_\cap$ . Entonces se cumplen:*

1. *Para cada  $t =_d t(\vec{v}) \in T^{\tau_\cap}$  se tiene que  $t^\mathbf{A}[\vec{a}] = t^{\mathbf{A}'}[\vec{a}]$ , para cada  $\vec{a} \in A^n$*
2. *Para cada  $\varphi =_d \varphi(\vec{v}) \in F^{\tau_\cap}$  se tiene que  $\mathbf{A} \models \varphi[\vec{a}] \iff \mathbf{A}' \models \varphi[\vec{a}]$*
3. *Si  $\Sigma \cup \{\varphi\} \subseteq S^{\tau_\cap}$ , entonces  $(\Sigma, \tau) \models \varphi \iff (\Sigma, \tau') \models \varphi$*

*Proof.* Se acepta sin demostracion □

**Lema 74.** *Sea  $\tau$  un tipo. Hay una infinitupla  $(\gamma_1, \gamma_2, \dots) \in F^{\tau\mathbf{N}}$  tal que:*

1.  *$|Li(\gamma_j)| \leq 1$ , para cada  $j = 1, 2, \dots$*
2. *Si  $|Li(\gamma)| \leq 1$ , entonces  $\gamma = \gamma_j$  para algun  $j \in \mathbf{N}$*

*Proof.* TODO □

**Teorema 75** (Teorema de Completitud). Sea  $T = (\Sigma, \tau)$  una teoria de primer orden. Si  $T \models \varphi$ , entonces  $T \vdash \varphi$

*Proof.* TODO □

**Corolario 76.** Toda teoria consistente tiene un modelo

*Proof.* TODO □

**Corolario 77** (Teorema de Compacidad). Sea  $(\Sigma, \tau)$  una teoria.

1. Si  $(\Sigma, \tau)$  es tal que  $(\Sigma_0, \tau)$  tiene un modelo, para cada subconjunto finito  $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$ , entonces  $(\Sigma, \tau)$  tiene un modelo
2. Si  $(\Sigma, \tau) \models \varphi$ , entonces hay un subconjunto finito  $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$  tal que  $(\Sigma_0, \tau) \models \varphi$

*Proof.* TODO □

## 18 Interpretacion semantica del algebra de Lindembaum

**Definición 83.** Sea  $T = (\Sigma, \tau)$  una teoria. Dada  $\varphi \in S^\tau$  definamos

$$\text{Mod}_T(\varphi) = \{\mathbf{A} : \mathbf{A} \text{ es modelo de } T \text{ y } \mathbf{A} \models \varphi\}$$

**Lema 78.** Dadas  $\varphi, \psi \in S^\tau$ , se tiene:

1.  $[\varphi]_T \leq^T [\psi]_T \iff \text{Mod}_T(\varphi) \subseteq \text{Mod}_T(\psi)$
2.  $[\varphi]_T = [\psi]_T \iff \text{Mod}_T(\varphi) = \text{Mod}_T(\psi)$
3.  $[\varphi]_T <^T [\psi]_T \iff \text{Mod}_T(\varphi) \subsetneq \text{Mod}_T(\psi)$

*Proof.* TODO □

## 19 La aritmetica de Peano

**Definición 84.** Sea  $\tau_A = (\{0, 1\}, \{+^2, \cdot^2\}, \{\leq\}, a)$ . Denotaremos con  $\omega$  a la estructura de tipo  $\tau_A$  que tiene a  $\omega$  como universo e interpreta los nombres  $\tau_A$  en la manera usual, es decir:

$$\begin{aligned} 0^\omega &= 0 \\ 1^\omega &= 1 \\ \leq^\omega &= \{(n, m) \in \omega^2 : n \leq m\} \\ +^\omega(n, m) &= n + m, \text{ para cada } n, m \in \omega \\ \cdot^\omega(n, m) &= n \cdot m, \text{ para cada } n, m \in \omega \end{aligned}$$

Sea  $\Sigma$  el conjunto formado por las siguientes sentencias:

1.  $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 \ x_1 + (x_2 + x_3) \equiv (x_1 + x_2) + x_3$
2.  $\forall x_1 \forall x_2 \ x_1 + x_2 \equiv x_2 + x_1$
3.  $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 \ x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3) \equiv (x_1 \cdot x_2) \cdot x_3$
4.  $\forall x_1 \forall x_2 \ x_1 \cdot x_2 \equiv x_2 \cdot x_1$
5.  $\forall x_1 \ x_1 + 0 \equiv x_1$
6.  $\forall x_1 \ x_1 \cdot 0 \equiv 0$
7.  $\forall x_1 \ x_1 \cdot 1 \equiv x_1$
8.  $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 \ x_1 \cdot (x_2 + x_3) \equiv (x_1 \cdot x_2) + (x_1 \cdot x_3)$
9.  $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 \ (x_1 + x_3 \equiv x_2 + x_3 \rightarrow x_1 \equiv x_2)$
10.  $\forall x_1 \ x_1 \leq x_1$
11.  $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 \ ((x_1 \leq x_2 \wedge x_2 \leq x_3) \rightarrow x_1 \leq x_3)$
12.  $\forall x_1 \forall x_2 \ ((x_1 \leq x_2 \wedge x_2 \leq x_1) \rightarrow x_1 \equiv x_2)$
13.  $\forall x_1 \forall x_2 \ (x_1 \leq x_2 \vee x_2 \leq x_1)$
14.  $\forall x_1 \forall x_2 \ (x_1 \leq x_2 \leftrightarrow \exists x_3 \ x_2 \equiv x_1 + x_3)$



15.  $0 < 1$

Es facil ver que estas sentencias son satisfechas por  $\omega$ , por lo cual  $\omega$  es un modelo de la teoria  $(\Sigma, \tau_A)$ . Definamos

$$Verd_{\omega} = \{\varphi : S^{\tau_A} : \omega \models \varphi\}$$

*Observacion 13.* Sea  $\mathbf{Q}^{\geq 0}$  la estructura de tipo  $\tau_A$  que tiene a  $r \in \mathbf{Q} : r \geq 0$  como universo e interpreta los nombres de  $\tau_A$  de la manera usual. Notese que  $\mathbf{Q}^{\geq 0}$  tambien es un modelo de la teoria  $(\Sigma, \tau_A)$  definida justo antes. Pero entonces los teoremas de  $(\Sigma, \tau_A)$  deben ser verdaderos en  $\mathbf{Q}^{\geq 0}$ , pero la sentencia  $\forall x(x \leq 1 \rightarrow (x \equiv 0 \wedge x \equiv 1))$  es falsa en  $\mathbf{Q}^{\geq 0}$ , por lo cual no es un teorema de  $(\Sigma, \tau_A)$ , sin embargo pertenece a  $Verd_{\omega}$ .

Es decir, los axiomas que habiamos definido antes son demasiado generales y deberiamos agregar axiomas mas caracteristicos de la estructura particular de  $\omega$ .

**Definición 85.** Dada una formula  $\psi \in F^{\tau_A}$  y variables  $v_1, \dots, v_{n+1}$ , con  $n \geq 0$ , tales que  $Li(\psi) \subseteq \{v_1, \dots, v_{n+1}\}$  y  $v_i \neq v_j$  siempre que  $i \neq j$ , denotaremos con  $Ind_{\psi, v_1, \dots, v_{n+1}}$  a la siguiente sentencia de tipo  $\tau_A$

$$\forall v_1, \dots, \forall v_n ((\psi(\vec{v}, 0) \wedge \forall v_{n+1} (\psi(\vec{v}, v_{n+1}) \rightarrow \psi(\vec{v}, +(v_{n+1}, 1)))) \rightarrow \forall v_{n+1} \psi(\vec{v}, v_{n+1}))$$

donde suponemos que hemos declarado  $\psi =_d \psi(v_1, \dots, v_{n+1})$ .

Sea  $\Sigma_A$  el conjunto que resulta de agregarla al  $\Sigma$  definido anteriormente todas las sentencias de la forma  $Ind_{\psi, v_1, \dots, v_{n+1}}$ . La teoria  $(\Sigma_A, \tau_A)$  sera llamada *Aritmetica DE Peano* y la denotaremos con *Arit*.

**Lema 79.**  $\omega$  es un modelo de *Arit*

*Observacion 14.*  $Ind_{\psi, v_1, \dots, v_{n+1}}$  es verdadera en  $\omega$ .

*Proof.* Supongamos que no. Entonces existen valores  $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$  tal que

$$\omega \not\models ((\psi(\vec{v}, 0) \wedge (\forall v_{n+1} (\psi(\vec{v}, v_{n+1}) \rightarrow \psi(\vec{v}, +(v_{n+1}, 1)))) \rightarrow \forall v_{n+1} \psi(\vec{v}, v_{n+1}))[(v_1, \dots, v_n, \dots)])$$

Pero entonces  $\omega \models (\psi(\vec{v}, 0) \wedge (\forall v_{n+1} (\psi(\vec{v}, v_{n+1}) \rightarrow \psi(\vec{v}, +(v_{n+1}, 1))))$  y  $\omega \not\models \forall v_{n+1} \psi(\vec{v}, v_{n+1})$ , por lo tanto existe un valor para  $v_{n+1}$  que no satisface  $\psi(\vec{v}, v_{n+1})$ . Es facil ver que ese valor no puede ser 0, y por lo tanto no puede ser 1, y por lo tanto no puede ser 2,  $\dots$  **Abs!**

□

*Observacion 15.*  $\mathbf{Q}^{\geq 0}$  no es un modelo de *Arit*

*Proof.* TODO □

**Definición 86.** Definimos la funcion  $\widehat{\cdot}: \omega \rightarrow \{(\cdot), + 0 1\}^*$  de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\widehat{0} &= 0 \\ \widehat{1} &= 1 \\ \widehat{n+1} &= +(\widehat{n}, 1), \text{ para cada } n \geq 1\end{aligned}$$

**Proposicion 80.** Hay un modelo de *Arit* el cual no es isomorfo a  $\omega$

**Lema 81.** Las siguientes sentencias son teoremas de la aritmetica de Peano:

1.  $\forall x \ 0 \leq x$
2.  $\forall x \ (x \leq 0 \rightarrow x \equiv 0)$
3.  $\forall x \forall y \ (x + y \equiv 0 \rightarrow x \equiv 0 \wedge y \equiv 0)$
4.  $\forall x \ (\neg(x \equiv 0) \rightarrow \exists z(x \equiv z + 1))$
5.  $\forall x \forall y \ (x < y \rightarrow x + 1 \leq y)$
6.  $\forall x \forall y \ (x < y + 1 \rightarrow x \leq y)$
7.  $\forall x \forall y \ (x \leq y + 1 \rightarrow (x \leq y \vee x \equiv y + 1))$

*Proof.* Prueba de (1) - TODO

Prueba de (2)

1.	$x_0 \leq 0$	HIPOTESIS1
2.	$\forall x \ 0 \leq x$	TEOREMA
3.	$0 \leq x_0$	PARTICULARIZACION(2)
4.	$x_0 \leq 0 \wedge 0 \leq x_0$	CONJUNCIONINTRODUCCION(1, 3)
5.	$\forall x_1 \forall x_2 \ ((x_1 \leq x_2 \wedge x_2 \leq x_1) \rightarrow x_1 \equiv x_2)$	AXIOMAPROPIO
6.	$\forall x_2 \ ((x_0 \leq x_2 \wedge x_2 \leq x_0) \rightarrow x_0 \equiv x_2)$	PARTICULARIZACION(5)
7.	$((x_0 \leq 0 \wedge 0 \leq x_0) \rightarrow x_0 \equiv 0)$	PARTICULARIZACION(6)
8.	$x_0 \equiv 0$	TESIS1MODUSPONENS(4, 7)
9.	$(x_0 \leq 0 \rightarrow x_0 \equiv 0)$	CONCLUSION
10.	$\forall x \ (x \leq 0 \rightarrow x \equiv 0)$	GENERALIZACION(9)

Prueba de (3)

1.	$x_0 + y_0 \equiv 0$	HIPOTESIS1
2.	$0 \equiv x_0 + y_0$	COMMUTATIVIDAD(1)
3.	$\exists x_3 (0 \equiv x_0 + x_3)$	EXISTENCIA(2)
4.	$\forall x_1 \forall x_2 (x_1 \leq x_2 \leftrightarrow \exists x_3 x_2 \equiv x_1 + x_3)$	AXIOMAPROPIO
5.	$(x_0 \leq 0 \leftrightarrow \exists x_3 0 \equiv x_0 + x_3)$	PARTICULARIZACION <sup>2</sup> (5)
6.	$x_0 \leq 0$	REEMPLAZO(5, 3)
7.	$\forall x (x \leq 0 \rightarrow x \equiv 0)$	TEOREMA
8.	$(x_0 \leq 0 \rightarrow x_0 \equiv 0)$	PARTICULARIZACION(7)
9.	$x_0 \equiv 0$	MODUSPONENS(6, 8)
10.	$0 + y_0 \equiv 0$	REEMPLAZO(9, 1)
11.	$\forall x_1 x_1 + 0 \equiv x_1$	AXIOMAPROPIO
12.	$y_0 + 0 \equiv y_0$	PARTICULARIZACION(11)
13.	$\forall x_1 \forall x_2 x_1 + x_2 \equiv x_2 + x_1$	AXIOMAPROPIO
14.	$y_0 + 0 \equiv 0 + y_0$	PARTICULARIZACION <sup>2</sup> (13)
15.	$0 + y_0 \equiv y_0$	REEMPLAZO(14, 12)
16.	$y_0 \equiv 0$	TRANSITIVIDAD(15, 10)
17.	$x_0 \equiv 0 \wedge y_0 \equiv 0$	TESIS1CONJUNCIONINTRODUCCION(12, 16)
18.	$(x_0 + y_0 \equiv 0 \rightarrow (x_0 \equiv 0 \wedge y_0 \equiv 0))$	CONCLUSION
19.	$\forall x \forall y (x + y \equiv 0 \rightarrow (x \equiv 0 \wedge y \equiv 0))$	GENERALIZACION <sup>2</sup> (18)

Prueba de (4) - TODO

Prueba de (5) - TODO

Prueba de (6) - TODO

Prueba de (7)

1.	$x_0 \leq y_0 + 1$	HIPOTESIS1
2.	$x_0 \leq y_0$	HIPOTESIS2
3.	$(x_0 < y_0 + 1 \rightarrow x_0 + 1 \leq y_0 + 1)$	PARTICULARIZACION <sup>2</sup> (2)
4.	$x_0 + 1 \leq y_0 + 1$	TESIS1MODUSPONENS(1, 3)
5.	$(x_0 < y_0 + 1 \rightarrow x_0 + 1 \leq y_0 + 1)$	CONCLUSION
6.	$x_0 \leq 0$	REEMPLAZO(5, 3)
7.	$\forall x (x \leq 0 \rightarrow x \equiv 0)$	TEOREMA
8.	$(x_0 \leq 0 \rightarrow x_0 \equiv 0)$	PARTICULARIZACION(7)
9.	$x_0 \equiv 0$	MODUSPONENS(6, 8)
10.	$0 + y_0 \equiv 0$	REEMPLAZO(9, 1)
11.	$\forall x_1 x_1 + 0 \equiv x_1$	AXIOMAPROPIO
12.	$y_0 + 0 \equiv y_0$	PARTICULARIZACION(11)
13.	$\forall x_1 \forall x_2 x_1 + x_2 \equiv x_2 + x_1$	AXIOMAPROPIO
14.	$y_0 + 0 \equiv 0 + y_0$	PARTICULARIZACION <sup>2</sup> (13)
15.	$0 + y_0 \equiv y_0$	REEMPLAZO(14, 12)
16.	$y_0 \equiv 0$	TRANSITIVIDAD(15, 10)
17.	$x_0 \equiv 0 \wedge y_0 \equiv 0$	TESIS1CONJUNCIONINTRODUCCION(12, 16)
18.	$(x_0 + y_0 \equiv 0 \rightarrow (x_0 \equiv 0 \wedge y_0 \equiv 0))$	CONCLUSION
19.	$\forall x \forall y (x + y \equiv 0 \rightarrow (x \equiv 0 \wedge y \equiv 0))$	GENERALIZACION <sup>2</sup> (18)

□