

EXAMEN DE SECONDE SESSION – MAG303

Les exercices sont indépendants. Tout matériel électronique est interdit.

Exercice 1 Soit $n \geq 3$ un entier. On considère les éléments de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ suivants :

$$\sigma := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \tau := \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & -\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) \end{pmatrix}.$$

1. Quelles sont les interprétations géométriques de σ et τ ?
2. Déterminer l'ordre de σ et de τ .
3. Montrer que $\sigma\tau = \tau^{n-1}\sigma$.
4. Déterminer l'ordre de G , de H et de K .
5. Le sous-groupe H de G est-il distingué ? Si oui, décrire le groupe G/H .
6. Le sous-groupe K de G est-il distingué ? Si oui, décrire le groupe G/K .

On pose maintenant $K' := \{g \in G : \det(g) = 1\}$.

7. Montrer que K' est un sous-groupe de G et que $K = K'$.

Rappelons que le groupe dérivé $D(G)$ de G est le sous-groupe de G engendré par les commutateurs, i.e.

$$D(G) := \langle ghg^{-1}h^{-1}, : g, h \in G \rangle.$$

8. Si n est impair, montrer que $D(G) = K$.
9. Si n est pair, montrer que $D(G) = \langle \tau^2 \rangle$ est d'indice 2 dans K , puis que $G/D(G) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Soit $G \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ l'action linéaire de G usuelle.

10. L'action est-elle transitive ? Est-elle fidèle ?
11. Déterminer les points fixes de cette action.

12. Déterminer le stabilisateur et l'orbite du vecteur $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

13. Déterminer le stabilisateur du couple $\{x_0, -x_0\}$.

Exercice 2 Soit G un groupe fini non-abélien. Supposons que tout sous-groupe strict de G est abélien. On veut montrer que G n'est pas simple, c'est-à-dire que G admet un sous-groupe distingué distinct de G et $\{1\}$.

1. Soit G_1 un groupe simple. Si H et K sont deux sous-groupes maximaux pour l'inclusion distincts de G_1 , tous deux abéliens, montrer que $K \cap H = \{1\}$.
2. Soient G_1 un groupe fini simple et H un sous-groupe maximal de G_1 distinct de G_1 . Supposons que H est abélien. En utilisant la question précédente, montrer que

$$\left| \bigcup_{g \in G_1} gHg^{-1} \right| = |G_1| + 1 - \frac{|G_1|}{|H|}.$$

3. Soit G un groupe qui n'a pas de sous-groupe strict non-trivial. Montrer que G est cyclique de cardinal premier, et qu'en particulier, il est abélien.
4. Conclure.

Exercice 3 (Groupes d'ordre 12) Soient G un groupe et H, K deux sous-groupes de G . Soit $p : H \times K \rightarrow G$ l'application définie pour $(h, k) \in H \times K$ par $p(h, k) = hk$.

1. Supposons que $H \cap K = \{1\}$. Montrer que p est injective.
2. Montrer que si H est distingué ou si K est distingué, alors l'image HK de p est le sous-groupe de G engendré par H et K .

(Indication : On pourra commencer par montrer que $HK = KH$)

On suppose maintenant que G est un groupe d'ordre 12.

3. Combien G peut-il avoir de 3-Sylow et de 2-Sylow ?
4. Montrer que
 - les 3-Sylow sont cycliques isomorphes à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$,
 - les 2-Sylow sont soit cycliques isomorphes à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, soit isomorphes à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
5. Soient H un 2-Sylow de G et K un 3-Sylow de G . Montrer que soit H est distingué, soit K est distingué.
6. Déterminer G si H et K sont tous les deux distingués.
7. Supposons que H est distingué et que K ne l'est pas. Montrer que G est isomorphe au groupe alterné \mathfrak{A}_4 .