9.1 Tegn en skitse af mængden

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le y \le 2, 1 - y \le x \le 1\}$$
 (1)

som her er opskrevet på formen (5.2) fra bogens side 154.

Udregn planintegralet af x^2y over D som et itereret integral med integration mht. x inderst.

Opskriv dernæst den samme mængde D på lærebogens form (5.1) og udregn det samme planintegral, nu med integration mht. x yderst.

Illustrer ved brug af Maple den figur, hvis rumfang integralet udtrykker.

Først identificerer vi delelementerne af (5.2) formen

$$c = 0$$
 $d = 2$ $v(y) = 1 - y$ $h(y) = 1$ (2)

Så opstiller og beregner vi planintegralet af x^2y over D som et itereret integral med x Fy := Int(y * x^2 , y=u(x)..o(x)) inderst, ud fra sætning 5.2 TK, pkt. 2

$$\int_0^2 \left(\int_{1-u}^1 x^2 y \ dx \right) \ dy = \frac{4}{5} \tag{3}$$

I Maple skriver jeg da

$$c := 0; d := 2;$$

 $v := y \rightarrow 1 - y; h := y \rightarrow 1;$

$$\begin{array}{ll} {\rm Fx} \; := \; {\rm Int} \, (\, y \! * \! x \, \hat{\,}^{\, 2} \, , \; \; x \! = \! v \, (\, y\,) \, \ldots \, h \, (\, y\,) \,) \\ {\rm Int} \, (\, {\rm Fx} \, , \; \; y \! = \! c \, \ldots \, d\,) \end{array}$$

Hvilket giver $\frac{4}{5}$, som angivet i ligningen oven-

Omskriver vi (1) fra til lærebogens form (5.1) har vi

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \le x \le 1, 1 \le y \le x + 1\}$$
(4)

hvilket vi da kan opstille integralet for, jvf. sætning 5.2 TK, pkt. 1

$$\int_{-1}^{1} \left(\int_{x+1}^{2} x^{2} y \ dy \right) \ dx = \frac{4}{5}$$
 (5)

I Maple skriver ligeledes

$$c = 0$$
 $d = 2$ $v(y) = 1 - y$ $h(y) = 1$ (2) $a := -1$; $b := 1$; $c := x -> x + 1$; $c := x -> 2$;

$$Fy := Int(y * x^2, y=u(x)..o(x))$$

 $Int(Fy, x=a..b)$

 $\int_{0}^{2} \left(\int_{1...}^{1} x^{2}y \ dx \right) \ dy = \frac{4}{5}$ (3) Hvilket igen giver $\frac{4}{5}$, som angivet i ligningen




Figure 1: Illustration af x^2y over D

9.2 Udregn både ved brug af kartesiske koordinater og ved brug af polære koordinater planintegralet $\int_D x^2 dA$, når D er den halve cirkelskive

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \le x \le 0, -\sqrt{1 - x^2} \le y \le \sqrt{1 - x^2}\}$$
 (6)

...

9.3 Udtryk mængden

$$R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \le y, x^2 + y^2 + z^2 \le 1\}$$
 (7)

i sfæriske koordinater, og udregn derefter rumintegralet af funktionen f(x,y,z)=y over R.

...