



Calcolo integrale — Scheda di esercizi n. 8  
18 Maggio 2023 — Compito n. 00021

**Istruzioni:** le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "**C**" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data. Per selezionare una casella, annerirla completamente: ☐ (non ☐ o ☐).

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

Matricola:

--	--	--	--	--	--	--

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'(t) = (8t + 3)y(t) + Ae^{4t^2+3t}.$$

1A) Esistono infinite soluzioni dell'equazione tali che  $y(2) = 3$ .

1B) Se  $A = 0$ , la funzione  $y(t) = 4e^{4t^2+3t}$  è soluzione dell'equazione.

1C) La funzione  $y(t) = (3 + At)e^{4t^2+3t}$  non è soluzione dell'equazione.

1D) Se  $y(0) = 0$  e  $A = 5$ , si ha

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0.$$

2) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'(t) = 8 \cos(t) y(t) + 7 \sin(t) \cos(t).$$

2A) Se  $y(0) = 0$ , si ha  $y'(0) \neq 0$ .

2B) Se  $y(0) = 0$ , si ha  $y''(0) = 7$ .

2C) Se  $y(0) = 5$ , la soluzione  $y(t)$  è decrescente in un intorno di  $t = 0$ .

2D) Se  $y(\frac{\pi}{2}) = 6$ , si ha  $T_1(y(t); \frac{\pi}{2}) = 6$ .

3) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'(t) = \frac{e^{y(t)} - 1}{e^{y(t)}} \cos(t).$$

3A) L'equazione è a variabili separabili.

3B) Se  $y(0) = 0$ , la soluzione  $y(t)$  non è costante.

3C) Se  $y(0) = 4$ , non esiste  $t_0 > 0$  tale che  $y(t_0) = 0$ .

3D) Se  $y(0) = \ln(7)$ , si ha

$$y(s) = \ln(6) + \sin(s).$$

4) Si consideri l'equazione differenziale  $y'(t) = t(y(t)^3 - 25y(t))$ .

4A) Se  $y(0) = 5$ , la soluzione non è costante.

4B) Se  $y(0) = 1$ , si ha  $y'(0) \neq 0$ .

4C) Se  $y(0) = -1$ , si ha  $T_2(y(t); 0) = -1 + 12t^2$ .

4D) Se  $y(0) = 1$ , la soluzione ha un massimo relativo per  $t = 0$ .

Docente

- ☐ DelaTorre Pedraza  
☐ Orsina



Cognome

Nome

Matricola

Compito 00021

5) Si consideri il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y'(t) = a(t)y(t) + b(t), \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

a) Si risolva (1) se  $a(t) = -4$ ,  $b(t) = 3$  e  $y_0 = 0$ .b) Si risolva (1) se  $a(t) = \sin(t)$ ,  $b(t) = 7 \sin(t)$  e  $y(0) = \pi$ .c) Si scriva il polinomio di Taylor di ordine 1 di  $y(t)$  nell'origine se  $a(t) = e^{10t}$ ,  $b(t) = 5 \cos(t)$  e  $y_0 = 7$ .d) Si scriva il polinomio di Taylor di ordine 2 di  $y(t)$  nell'origine se  $a(t) = 12t$ ,  $b(t) = 5t^2$  e  $y_0 = 3$ .

$$(a) \quad y'(t) = -4y(t) + 3 \quad e \quad y(0) = 0$$

$$y(t) = e^{-4t} \left[ \int_0^t 3e^{4t} dt \right] = e^{-4t} \left[ 3 \int_0^t e^{4t} dt \right] = e^{-4t} \left[ 3 \left[ \frac{e^{4t}}{4} - \frac{1}{4} \right] \right] = e^{-4t} \left[ \frac{3}{4} e^{4t} - \frac{3}{4} \right] =$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{3}{4} e^{-4t} = \underline{\underline{\frac{3}{4} [1 - e^{-4t}]}}$$

$$(b) \quad y'(t) = \sin(t)y(t) + 7\sin(t) \quad e \quad y(0) = \pi$$

$$A(t) = \int_0^t \sin(t) dt = [-\cos(t) + \cos(0)]$$

$$y(t) = e^{-\cos(t)+1} \left[ \pi + \int_0^t 7\sin(t) e^{\cos(t)-1} dt \right] =$$

$$\text{INTEGRO} \quad 7 \int_0^t \sin(t) e^{\cos(t)-1} dt \Rightarrow \begin{cases} y = \cos(t)-1 \\ dy = -\sin(t) dt \\ dt = -\frac{dy}{\sin(t)} \end{cases} = -7 \int \sin(t) e^y \frac{dy}{\sin(t)} = -7 \int e^y dy = -7 e^y \Big|$$

$$-7 e^{\cos(t)-1} \Big|_0^t = -7 e^{\cos(t)-1} + 7$$

$$= e^{-\cos(t)+1} \left[ \pi - 7 e^{\cos(t)-1} + 7 \right] = \pi e^{-\cos(t)+1} - 7 + e^{-\cos(t)+1} = e^{-\cos(t)+1} [\pi + 1] - 7$$

$$(c) \quad y'(t) = e^{10t} y(t) + 5 \cos(t) \quad y(0) = 7 \quad y'(0) = 12 \quad T = 7 + 12t$$

$$(d) \quad y'(t) = 12t y(t) + 5t^2 \quad y(0) = 3 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 36$$

$$y''(t) = 12y(t) + 12t y'(t) + 10t$$

$$12 \cdot 3 +$$

$$T = 3 + 18t^2$$



Cognome

Nome

Matricola

Compito 00021

6) Si risolvano le seguenti equazioni differenziali a variabili separabili.

a)  $y'(t) = 12y(t) + 11$ , se  $y(0) = 0$ .

b)  $y'(t) = 10t(4 + y^2(t))$ , se  $y(0) = 0$ .

c)  $y'(t) = e^{-y(t)} e^{2t}$ , se  $y(0) = 0$ .

d)  $y'(t) = \frac{3(1+y^2(t))}{y(t)}$ , se  $y(0) = 1$ .

a)  $y'(t) = 12y(t) + 11$   $y(0) = 0$

$$y(t) = e^{12t} \left[ \int_0^t 11 e^{-12\tau} d\tau \right] = e^{12t} \left[ 11 \int_0^t e^{-12\tau} d\tau \right] = e^{12t} \left[ 11 \left[ -\frac{e^{-12\tau}}{12} + \frac{1}{12} \right] \right]$$
$$= e^{12t} \left[ -\frac{11}{12} e^{-12t} + \frac{11}{12} \right] = -\frac{11}{12} + \frac{11}{12} e^{12t} = \frac{11}{12} [e^{12t} - 1]$$

b)  $f(t) = 10t$   $F(t) = 5t^2$

$$g(s) = 4 + s^2$$
$$G(s) = \int \frac{1}{4+s^2} \rightarrow \frac{2}{4} \operatorname{arctan}\left(\frac{2s}{4}\right) = \frac{1}{2} \operatorname{arctan}\left(\frac{s}{2}\right)$$
$$\frac{1}{2} \operatorname{arctan}\left(\frac{y(t)}{2}\right) = 5t^2 \rightarrow \operatorname{arctan}\left(\frac{y(t)}{2}\right) = 10t^2 \rightarrow y(t) = 2 \tan(10t^2)$$

c)  $y'(t) = e^{-y(t)} e^{2t}$   $y(0) = 0$

$$f(t) = e^{2t}$$
$$F(t) = \frac{e^{2t}}{2}$$
$$g(s) = e^{-s}$$
$$G(s) = \int \frac{1}{e^s} = e^{-s}$$
$$e^{y(t)} = \frac{e^{2t} + 1}{2} \rightarrow y(t) = \ln\left(\frac{e^{2t} + 1}{2}\right)$$

d)  $y'(t) = 3 \cdot \frac{1+y^2(t)}{y(t)}$   $y(0) = 1$

$$\frac{y'(t)}{\frac{1+y^2(t)}{y(t)}} = 3$$

$$G(s) = \int \frac{s}{1+s^2} = \frac{1}{2} \int \frac{2s}{1+s^2} = \frac{1}{2} \ln(1+s^2) = G(s)$$

$$F(t) = 3t$$

$$\ln(1+y^2(t)) = \ln(2) + 6t$$

$$y(t) = \sqrt{2e^{6t} - 1}$$

## Soluzioni del compito 00021

1) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'(t) = (8t + 3)y(t) + Ae^{4t^2+3t}.$$

---

Ricordiamo la formula risolutiva per il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y'(t) = a(t)y(t) + b(t), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Posto

$$A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds,$$

si ha

$$(2) \quad y(t) = e^{A(t)} \left[ y_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-A(s)} ds \right].$$

---

**1A)** Esistono infinite soluzioni dell'equazione tali che  $y(2) = 3$ .

**Falso:** Trattandosi di un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine, è sufficiente una sola condizione iniziale affinché esista un'unica soluzione.

---

**1B)** Se  $A = 0$ , la funzione  $y(t) = 4e^{4t^2+3t}$  è soluzione dell'equazione.

**Vero:** Se  $y(t) = 4e^{4t^2+3t}$ , si ha

$$y'(t) = 4(8t + 3)e^{4t^2+3t} = (8t + 3)y(t) = (8t + 3)y(t) + Ae^{4t^2+3t},$$

e quindi  $y(t)$  è soluzione dell'equazione.

---

**1C)** La funzione  $y(t) = (3 + At)e^{4t^2+3t}$  non è soluzione dell'equazione.

**Falso:** Se  $y(t) = (3 + At)e^{4t^2+3t}$ , derivando si ha

$$y'(t) = Ae^{4t^2+3t} + (3 + At)(8t + 3)e^{4t^2+3t} = (8t + 3)y(t) + Ae^{4t^2+3t},$$

e quindi  $y(t)$  è soluzione dell'equazione.

---

**1D)** Se  $y(0) = 0$  e  $A = 5$ , si ha

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0.$$

**Falso:** Il problema rientra nel caso (1) con

$$a(t) = 8t + 3, \quad b(t) = 5e^{4t^2+3t}, \quad t_0 = 0, \quad y_0 = 0.$$

Dato che

$$A(t) = \int_0^t a(s) ds = \int_0^t (8s + 3) ds = (4s^2 + 3s) \Big|_0^t = 4t^2 + 3t,$$

e dato che

$$\int_0^t b(s) e^{-A(s)} ds = \int_0^t 5e^{4s^2+3s} e^{-(4s^2+3s)} ds = \int_0^t 5 ds = 5t,$$

dalla (2) si ha

$$y(t) = 5te^{4t^2+3t},$$

da cui segue che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty \neq 0.$$



**2)** Si consideri l'equazione differenziale

$$y'(t) = 8 \cos(t) y(t) + 7 \sin(t) \cos(t).$$

---

Derivando l'equazione si ha

$$(1) \quad y''(t) = -8 \sin(t) y(t) + 8 \cos(t) y'(t) + 7 \cos^2(t) - 7 \sin^2(t).$$

---

**2A)** Se  $y(0) = 0$ , si ha  $y'(0) \neq 0$ .

**Falso:** Dall'equazione, sostituendo  $t = 0$ , si ha

$$y'(0) = 8 \cos(0) y(0) + 7 \sin(0) \cos(0) = 8 \cdot 1 \cdot 0 + 7 \cdot 0 \cdot 1 = 0.$$

---

**2B)** Se  $y(0) = 0$ , si ha  $y''(0) = 7$ .

**Vero:** Dall'equazione con  $t = 0$  si ha (si veda l'esercizio **2A**)

$$y'(0) = 0.$$

Dalla (1) con  $t = 0$  si ha

$$y''(0) = 7,$$

dato che il primo, secondo e quarto termine si annullano.

---

**2C)** Se  $y(0) = 5$ , la soluzione  $y(t)$  è decrescente in un intorno di  $t = 0$ .

**Falso:** Dall'equazione si ha

$$y'(0) = 8 \cdot \cos(0) \cdot y(0) = 8 \cdot 5 = 40 > 0,$$

per ipotesi. Essendo  $y'(0) > 0$ , si ha  $y'(t) > 0$  in un intorno dell'origine (per il teorema di permanenza del segno per funzioni continue) e quindi  $y(t)$  è crescente in un intorno dell'origine.

---

**2D)** Se  $y(\frac{\pi}{2}) = 6$ , si ha  $T_1(y(t); \frac{\pi}{2}) = 6$ .

**Vero:** Dall'equazione si ha

$$y'(\frac{\pi}{2}) = 8 \cos(\frac{\pi}{2}) y(\frac{\pi}{2}) + 7 \sin(\frac{\pi}{2}) \cos(\frac{\pi}{2}) = 8 \cdot 0 \cdot 6 + 7 \cdot 1 \cdot 0 = 0.$$

Ricordando che

$$T_1(y(t); \frac{\pi}{2}) = y(\frac{\pi}{2}) + y'(\frac{\pi}{2}) (t - \frac{\pi}{2}),$$

si ha

$$T_1(y(t); \frac{\pi}{2}) = 6.$$

---

**3)** Si consideri l'equazione differenziale

$$y'(t) = \frac{e^{y(t)} - 1}{e^{y(t)}} \cos(t).$$

---

Osserviamo che l'equazione è a variabili separabili, essendo della forma

$$y'(t) = f(y(t)) g(t),$$

con

$$f(s) = \frac{e^s - 1}{e^s}, \quad g(t) = \cos(t).$$

Dato che  $f(0) = 0$ , se all'equazione abbiniamo la condizione iniziale  $y(0) = 0$  abbiamo la soluzione costante  $y(t) \equiv 0$ . Se, invece  $y(0) = y_0 > 0$  allora  $y(t) \neq 0$  per ogni  $t$  e possiamo separare le variabili, riscrivendo l'equazione come

$$\frac{e^{y(t)} y'(t)}{e^{y(t)} - 1} = \cos(t).$$

Integrando tra zero e  $s$  si ha

$$\int_0^s \frac{e^{y(t)} y'(t)}{e^{y(t)} - 1} dt = \int_0^s \cos(t) dt = \sin(s).$$

Per il primo integrale, con la sostituzione  $z = y(t)$ , da cui  $dz = y'(t) dt$ , si ha

$$\int_0^s \frac{e^{y(t)} y'(t)}{e^{y(t)} - 1} dt = \int_{y_0}^{y(s)} \frac{e^z}{e^z - 1} dz.$$

Con la sostituzione  $w = e^z - 1$ , da cui  $dw = e^z dz$ , si ha

$$\int_{y_0}^{y(s)} \frac{e^z}{e^z - 1} dz = \int_{e^{y_0}-1}^{e^{y(s)}-1} \frac{dw}{w} = \ln(|w|) \Big|_{e^{y_0}-1}^{e^{y(s)}-1} = \ln \left( \left| \frac{e^{y(s)} - 1}{e^{y_0} - 1} \right| \right).$$

Essendo  $y_0 > 0$  possiamo levare i moduli (perché?) e scrivere che

$$\ln \left( \frac{e^{y(s)} - 1}{e^{y_0} - 1} \right) = \sin(s),$$

da cui segue, dopo alcuni calcoli, che

$$(1) \quad y(s) = \ln[(e^{y_0} - 1)e^{\sin(s)} + 1].$$

Osserviamo di passaggio che la (1) è valida anche nel caso in cui  $y_0 = 0$ .

---

**3A)** L'equazione è a variabili separabili.

**Vero:** Per quanto detto sopra, l'equazione è a variabili separabili.

---

**3B)** Se  $y(0) = 0$ , la soluzione  $y(t)$  non è costante.

**Falso:** Dato che  $f(y_0) = f(0) = 0$ , la funzione costante  $y(t) \equiv y_0 = 0$  è soluzione dell'equazione.

---

**3C)** Se  $y(0) = 4$ , non esiste  $t_0 > 0$  tale che  $y(t_0) = 0$ .

**Vero:** Se esistesse  $t_0 > 0$  tale che  $y(t_0) = 0$ , il problema di Cauchy con dato iniziale  $y(t_0) = 0$  avrebbe due soluzioni: la funzione  $y(t)$  che stiamo considerando (e che non è la funzione nulla dato che in  $t = 0$  vale 4), e la funzione  $w(t) \equiv 0$ . Dato che il problema di Cauchy ha un'unica soluzione, si ha  $y(t) \neq 0$  per ogni  $t > 0$ .

---

**3D)** Se  $y(0) = \ln(7)$ , si ha

$$y(s) = \ln(6) + \sin(s).$$

**Falso:** Dalla (1), con  $y_0 = \ln(7)$ , da cui segue che  $e^{y_0} - 1 = 7 - 1 = 6$ , si ha

$$y(s) = \ln(6 e^{\sin(s)} + 1) \neq \ln(6) + \sin(s) .$$

---



4) Si consideri l'equazione differenziale  $y'(t) = t(y(t)^3 - 25y(t))$ .

---

Osserviamo che l'equazione è a variabili separabili, essendo della forma

$$y'(t) = f(y(t))g(t),$$

con

$$(1) \quad f(s) = s^3 - 25s, \quad g(t) = t.$$

---

**4A)** Se  $y(0) = 5$ , la soluzione non è costante.

**Falso:** Se  $f(s)$  è come in (1), dato che si ha  $f(5) = 0$ , la funzione costante  $y(t) \equiv 5$  è soluzione dell'equazione.

---

**4B)** Se  $y(0) = 1$ , si ha  $y'(0) \neq 0$ .

**Falso:** Dall'equazione, scritta per  $t = 0$ , si ha

$$y'(0) = 0 \cdot (y(0)^3 - 25y(0)) = 0 \cdot (1 - 25) = 0.$$

---

**4C)** Se  $y(0) = -1$ , si ha  $T_2(y(t); 0) = -1 + 12t^2$ .

**Vero:** Derivando l'equazione si ha

$$y''(t) = y(t)^3 - 25y(t) + t(3y(t)^2 - 25)y'(t),$$

da cui segue che  $y''(0) = 24$ . Dato che dall'equazione segue che  $y'(0) = 0$  (si veda l'esercizio **4B**), si ha

$$T_2(y(t); 0) = y(0) + y'(0)t + \frac{y''(0)}{2}t^2 = -1 + 12t^2.$$

---

**4D)** Se  $y(0) = 1$ , la soluzione ha un massimo relativo per  $t = 0$ .

**Vero:** Derivando l'equazione si ha

$$y''(t) = y(t)^3 - 25y(t) + t(3y(t)^2 - 25)y'(t),$$

da cui segue che  $y''(0) = -24 < 0$ . Dato che dall'equazione segue che  $y'(0) = 0$  (si veda l'esercizio **4B**), si ha che  $t = 0$  è un punto di massimo relativo per  $y(t)$ .

---

5) Si consideri il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y'(t) = a(t) y(t) + b(t), \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

a) Si risolva (1) se  $a(t) = -4$ ,  $b(t) = 3$  e  $y_0 = 0$ .

b) Si risolva (1) se  $a(t) = \sin(t)$ ,  $b(t) = 7 \sin(t)$  e  $y(0) = \pi$ .

c) Si scriva il polinomio di Taylor di ordine 1 di  $y(t)$  nell'origine se  $a(t) = e^{10t}$ ,  $b(t) = 5 \cos(t)$  e  $y_0 = 7$ .

d) Si scriva il polinomio di Taylor di ordine 2 di  $y(t)$  nell'origine se  $a(t) = 12t$ ,  $b(t) = 5t^2$  e  $y_0 = 3$ .

---

**Soluzione:**

Ricordiamo che la soluzione del problema di Cauchy (1) è data da

$$(2) \quad y(t) = e^{A(t)} \left[ y_0 + \int_0^t b(s) e^{-A(s)} ds \right], \quad \text{dove} \quad A(t) = \int_0^t a(s) ds.$$

a) Dato che  $a(t) = -4$ , si ha

$$A(t) = - \int_0^t 4 ds = -4t.$$

Pertanto, per la (2) si ha

$$y(t) = e^{-4t} \left[ 0 + \int_0^t 3 e^{4s} ds \right] = e^{-4t} \left[ \frac{3}{4} e^{4s} \Big|_0^t \right] = \frac{3}{4} e^{-4t} [e^{4t} - 1] = \frac{3}{4} [1 - e^{-4t}].$$

b) Dato che  $a(t) = \sin(t)$ , si ha

$$A(t) = \int_0^t \sin(s) ds = -\cos(s) \Big|_0^t = 1 - \cos(t),$$

e quindi, per la (2),

$$y(t) = e^{1-\cos(t)} \left[ \pi + \int_0^t 7 \sin(s) e^{\cos(s)-1} ds \right].$$

Con il cambio di variabile  $z = \cos(s) - 1$ , da cui  $dz = -\sin(s) ds$ , si ha

$$\int_0^t 7 \sin(s) e^{\cos(s)-1} ds = -7 \int_0^{\cos(t)-1} e^z dz = -7 e^z \Big|_0^{\cos(t)-1} = 7(1 - e^{\cos(t)-1}).$$

Pertanto

$$y(t) = e^{1-\cos(t)} [\pi + 7(1 - e^{\cos(t)-1})] = (\pi + 7) e^{1-\cos(t)} - 7.$$

c) Dall'equazione si ha

$$y'(0) = e^{10 \cdot 0} y(0) + 5 \cos(0) = 1 \cdot 7 + 5 = 12,$$

da cui segue che

$$T_1(y(t); 0) = y(0) + y'(0)t = 7 + 12t.$$

d) Dall'equazione si ha

$$y'(0) = 12 \cdot 0 \cdot y(0) + 5 \cdot 0^2 = 0.$$

Derivando l'equazione si ha poi

$$y''(t) = 12y(t) + 12ty'(t) + 10t,$$

da cui segue che

$$y''(0) = 12y(0) + 12 \cdot 0 \cdot y'(0) + 10 \cdot 0 = 36.$$

Si ha quindi

$$T_2(y(t); 0) = y(0) + y'(0)t + \frac{y''(0)}{2}t^2 = 3 + 18t^2.$$

6) Si risolvano le seguenti equazioni differenziali a variabili separabili.

a)  $y'(t) = 12y(t) + 11$ , se  $y(0) = 0$ .

b)  $y'(t) = 10t(4 + y^2(t))$ , se  $y(0) = 0$ .

c)  $y'(t) = e^{-y(t)} e^{2t}$ , se  $y(0) = 0$ .

d)  $y'(t) = \frac{3(1+y^2(t))}{y(t)}$ , se  $y(0) = 1$ .

---

**Soluzione:**

a) Dividendo per  $12y(t) + 11$ , l'equazione è equivalente a

$$\frac{y'(t)}{12y(t) + 11} = 1.$$

Integrando tra 0 e  $s$  si ha

$$\int_0^s \frac{y'(t)}{12y(t) + 11} dt = \int_0^s 1 dt = s.$$

Con la sostituzione  $z = y(t)$  si ha, ricordando che  $y(0) = 0$ , ed osservando che  $12y(s) + 11 > 0$  per  $s$  vicino a zero,

$$\int_0^s \frac{y'(t)}{12y(t) + 11} dt = \int_0^{y(s)} \frac{dz}{12z + 11} = \frac{1}{12} \ln(|12z + 11|) \Big|_0^{y(s)} = \frac{1}{12} [\ln(12y(s) + 11) - \ln(11)].$$

Pertanto,

$$\frac{1}{12} [\ln(12y(s) + 11) - \ln(11)] = s,$$

da cui segue (dopo facili calcoli...) che

$$\frac{12y(s) + 11}{11} = e^{12s},$$

e quindi che

$$y(s) = \frac{11e^{12s} - 11}{12}.$$

b) Separando le variabili, si ha che deve essere

$$\frac{y'(t)}{4 + y^2(t)} = 10t.$$

Integrando (con la consueta sostituzione  $z = y(t)$ ) si ha

$$\int_0^{y(s)} \frac{dz}{4 + z^2} = \int_0^s 10t dt = 5s^2.$$

Dato che

$$\int \frac{dz}{4 + z^2} = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{z}{2}\right),$$

si ha

$$\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{y(s)}{2}\right) = 5s^2,$$

da cui segue che

$$y(s) = 2 \tan(10s^2).$$

c) Separando le variabili si arriva a

$$\int_0^{y(s)} e^z dz = \int_0^s e^{2t} dt = \frac{e^{2s} - 1}{2}.$$

Il primo integrale è immediato, e porta a

$$e^{y(s)} - 1 = \frac{e^{2s} - 1}{2},$$

da cui

$$y(s) = \ln \left( \frac{e^{2s} + 1}{2} \right).$$

**d)** Separando le variabili si arriva a

$$\int_1^{y(s)} \frac{z}{1+z^2} dz = \int_0^s 3 dt = 3s.$$

Dato che

$$\int \frac{z}{1+z^2} dz = \frac{1}{2} \frac{2z}{1+z^2} dz = \frac{1}{2} \ln(1+z^2),$$

si ha

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2(s)) - \frac{1}{2} \ln(2) = 3s,$$

da cui

$$y^2(s) = 2e^{6s} - 1,$$

e quindi

$$y(s) = \sqrt{2e^{6s} - 1}.$$

Perché, tra le due radici, si è scelta quella positiva?