

Esercizio 1. Utilizzando la dimostrazione del teorema cinese del resto determinare l'unica soluzione mod $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$ del sistema cinese

$$(1) \quad \begin{cases} X \equiv 3(5) \\ X \equiv 4(7) \\ X \equiv 4(11) \end{cases}.$$

$$R = 385$$

$$1) R_1 = 77 \quad \text{hw} \quad 77t_1 + 5y_1 = 1 \Rightarrow 1 = 77(-2) + 5 \cdot (31) \quad \tilde{x}_1 = -2 \cdot 3$$

$$2) R_2 = 55 \quad \text{hw} \quad 55t_2 + 7y_2 = 1 \Rightarrow 1 = 55(-2) + 7 \cdot (8) \quad \tilde{x}_2 = -2 \cdot 4$$

$$3) R_3 = 35 \quad \text{hw} \quad 35t_3 + 11y_3 = 1 \Rightarrow 1 = 35(-5) + 11 \cdot (16) \quad \tilde{x}_3 = -5 \cdot 4$$

$$\tilde{X} = -6 \cdot 77 + (-4) \cdot 55 + (-20) \cdot 35 = -1282 = 150 \pmod{385}$$

Esercizio 3. Ho comprato un grosso barattolo di caramelle; il negoziante mi ha assicurato che sono circa mille ma mi ha anche detto che se le metto in fila per 13 ne rimangono 11, se le metto in fila per 11 ne rimangono 7 e ne manca una per riuscire a metterle in fila per 7. Quante caramelle ci sono nel barattolo?

$$\begin{cases} X \equiv 11 \pmod{13} \\ X \equiv 7 \pmod{11} \\ X \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$$

$$1) R_1 = 77 \quad \text{hw} \quad 1 = 77t_1 + 13y_1 \Rightarrow 1 = 77(-1) + 13(6) \quad \tilde{x}_1 = 11 \cdot (-1) = -11$$

$$2) R_2 = 91 \quad \text{hw} \quad 1 = 91(4) + 11(-33) \quad \tilde{x}_2 = 7 \cdot 4 = 28$$

$$3) R_3 = 143 \quad \text{hw} \quad 1 = 143(-2) + 7(41) \quad \tilde{x}_3 = 1 \cdot (-2) = -2$$

$$\tilde{X} = 77(-11) + 91 \cdot 28 + 143(-2) = -847 + 2548 - 286 = 1415 = 414 \pmod{1001}$$

Il maggiorante è in Bruffaloro.

Esercizio 4. Risolvere il sistema congruenziale

$$\begin{cases} 4X \equiv 2(22) \\ 3X \equiv 2(7) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 4X &\equiv 2(22), \quad \text{MCD}(4, 22) = 2 & \begin{cases} 2X &\equiv 1(11) \text{ moltiplico per } 6 \\ 3X &\equiv 2(7) \text{ moltiplico per } 5 \end{cases} \\ 3X &\equiv 2(7), \quad \text{MCD}(3, 7) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} X \equiv 6(11) \\ X \equiv 10(7) \end{cases}$$

$$1) R_1 = 7 \quad \text{hw} \quad 7(-3) + 11(2) = 1 \quad \tilde{x}_1 = -3 \cdot 6 = (-18)$$

$$2) R_2 = 11 \quad \text{hw} \quad 11(2) + 7(-3) = 1 \quad \tilde{x}_2 = 2 \cdot 10 = 20$$

$$\tilde{X} = 7 \cdot (-18) + 11 \cdot 20 = 94 \pmod{77} = 17$$

$$\begin{cases} 18X \equiv 12(30) \\ 7X \equiv 4(9) \\ 28X \equiv 14(98) \end{cases}$$

$$1) \text{MCD}(18, 30) = 30 = 18 \cdot 1 + 12 \Rightarrow 18 = 12 \cdot 1 + \textcircled{6} \Rightarrow 12 = 6 \cdot 2 + 0 \quad 6 \mid 12$$

$$2) \text{MCD}(7, 9) = \textcircled{1} \quad 1 \mid 4$$

$$3) \text{MCD}(28, 98) = 98 = 28 \cdot 3 + \textcircled{14} \Rightarrow 28 = 14 \cdot 2 + 0 \quad 14 \mid 14$$

$$\begin{cases} 3X \equiv 2 \quad (5) \\ 7X \equiv 4 \quad (9) \\ 2X \equiv 1 \quad (7) \end{cases} \quad \text{moltiplic. per gl. inversa} \quad \begin{cases} X \equiv 4 \quad (5) \\ X \equiv 7 \quad (9) \\ X \equiv 4 \quad (7) \end{cases}$$

$$1) R_1 = 63 \quad \text{hw} \quad 1 = 63(2) + 5(-25) \quad \tilde{X}_1 = 2 \cdot 4 = 8$$

$$2) R_2 = 35 \quad \text{hw} \quad 1 = 35(-1) + 9(4) \quad \tilde{X}_2 = -1 \cdot 7 = -7$$

$$3) R_3 = 45 \quad \text{hw} \quad 1 = 45(5) + 7(-32) \quad \tilde{X}_3 = 5 \cdot 4 = 20$$

$$\tilde{X} = 63 \cdot 8 + 35 \cdot (-7) + 45(20) = 1159 \pmod{315} = \textcircled{214}$$

Esercizio 6. È dato il sistema congruenziale dipendente dal parametro $a \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} 3X \equiv 4(10) \\ 2X \equiv 7(9) \\ 5X \equiv a(12) \end{cases}$$

Determinare per quali $a \in \mathbb{Z}$, $1 \leq a \leq 11$, tale sistema è compatibile. Per tali a risolvere il sistema.

Suggerimento: il metodo di sostituzione può essere utile

per essere trasformato in un sistema cinese, è necessario che gli argomenti dei moduli siano CO-PRIMI fra loro. 10 e 12 non lo sono! posso moltiplicare 12 o 10 per qualsiasi $k \in \mathbb{Z}$ ma resteranno sempre con $\text{MCD} \neq 1$. Questo sistema NON è risolvibile o cinese. Trovo le sol. generiche delle eq.

$$1) 3X \equiv 4 \quad (10) \quad \text{RISOLVO} \quad 3X + 10Y = 4$$